



DZIENNIK URZĘDOWY

MINISTRA ZDROWIA

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r.

Poz. 49

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA¹⁾

z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych²⁾

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696 oraz z 2012 r. poz. 95), ustala się na dzień 1 lipca 2012 r. wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA

¹⁾ Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

²⁾ Niniejsze obwieszczenie zawiera także leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyroby medyczne, które są objęte refundacją od dnia 1 stycznia 2012 r., od dnia 1 marca 2012 r. oraz od dnia 1 maja 2012 r. na okres obowiązywania decyzji o objęciu refundacją tych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywnościowego oraz wyrobów medycznych.

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia
28 czerwca 2012

Wykaz refundowanych leków, rodków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r.

A 1. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

| lp. | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin wejścia w życie decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena detaliczna | Wysokość limitu finansowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją | Poziom odpłatności | Wysokość dopłaty wliczenia -biorcy |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|---|--|--------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Acarbosum | Adeksa, tabl., 100 mg | 30 tabl. | 5909990893423 | 2012-05-01 | 2 lata | 17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza | 10,44 | 14,90 | 14,90 | Cukrzyca | | 30% | 4,47 |
| 2 | Acarbosum | Glucobay 100, tabl., 100 mg | 30 tabl. | 5909990285518 | 2012-01-01 | 2 lata | 17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza | 13,93 | 18,65 | 14,90 | Cukrzyca | | 30% | 8,22 |
| 3 | Acarbosum | Glucobay 50, tabl., 50 mg | 30 tabl. | 5909990285419 | 2012-01-01 | 2 lata | 17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza | 11,02 | 13,97 | 7,45 | Cukrzyca | | 30% | 8,76 |
| 4 | Acarbosum | Glucobay 50, tabl., 50 mg | 90 tabl. | 5909990335541 | 2012-01-01 | 2 lata | 17.0. Doustne leki przeciwcukrzycowe - inhibitory alfa-glukozydazy - akarboza | 32,94 | 40,10 | 22,35 | Cukrzyca | | 30% | 24,46 |
| 5 | Acebutololum | Sectral 200, tabl. powł., 200 mg | 30 tabl. | 5909990109920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,36 | 9,73 | 2,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 9,73 |
| 6 | Acebutololum | Sectral 400, tabl. powł., 400 mg | 30 tabl. | 5909990110018 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0. Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,74 | 18,38 | 5,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadciśnienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 16,18 |
| 7 | Acenocoumarolum | Acenocumarol WZF, tabl., 4 mg | 60 tabl. | 5909990055715 | 2012-01-01 | 2 lata | 21.0. Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K | 8,32 | 12,07 | 12,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 5,12 |
| 8 | Aciclovirum | Hascovir, tabl., 800 mg | 30 tabl. (2 blist. po 15 szt.) | 5909990835782 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 32,40 | 43,33 | 43,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażeń wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 21,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 9 | Aciclovirum | Hascovir, tabl. , 200 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991049515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 9,90 | 14,17 | 12,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 7,89 |
| 10 | Aciclovirum | Hascovir, tabl. , 400 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991052218 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 16,76 | 23,55 | 23,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 11,78 |
| 11 | Aciclovirum | Heviran, tabl. powl., 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990840014 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 12,10 | 16,53 | 12,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 10,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---------------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 12 | Aciclovirum | Heviran, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990840113 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 21,60 | 28,73 | 25,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 16,17 |
| 13 | Aciclovirum | Heviran, tabl. powl., 800 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990840229 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 38,88 | 50,26 | 50,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 25,13 |
| 14 | Aciclovirum | Virolex, ma do oczu, 30 mg/g | 4,5 g | 5909990273317 | 2012-01-01 | 2 lata | 115.1. Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir | 32,18 | 40,83 | 32,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 24,64 |
| 15 | Aciclovirum | Viru-POS, ma do oczu, 30 mg/g | 4,5 g | 5909990053049 | 2012-01-01 | 2 lata | 115.1. Leki przeciwwirusowe do stosowania do oczu - acyklowir | 24,30 | 32,39 | 32,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,20 |
| 16 | Acidum alendronicum | Alenato, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990919017 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 10,80 | 15,40 | 14,35 | Osteoporoza | | 30% | 5,36 |
| 17 | Acidum alendronicum | Alendran 70, tabl. , 70 mg | 4 tabl. | 5909990072156 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 10,80 | 15,24 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 5,87 |
| 18 | Acidum alendronicum | Alendrogen, tabl. , 70 mg | 4 tabl. | 5909990623112 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 9,72 | 14,08 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 4,71 |
| 19 | Acidum alendronicum | Alendronat - ratiopharm 70, tabl. , 70 mg | 12 tabl. (3 blist.po 4 szt.) | 5909990566303 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0. Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 43,72 | 54,19 | 40,17 | Osteoporoza | | 30% | 26,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 20 | Acidum alendronicum | Alendronate Arrow, tabl., 70 mg | 4 tabl. | 5909990693726 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 9,72 | 14,08 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 4,71 |
| 21 | Acidum alendronicum | Alendronat-ratiopharm 70, tabl., 70 mg | 4 tabl. | 5909990566297 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 15,34 | 20,09 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 10,72 |
| 22 | Acidum alendronicum | Alendronatum 123ratio, Alendronatum Farmacom, tabl., 70 mg | 4 tabl. (blis.) | 5909990036653 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 8,64 | 12,93 | 12,93 | Osteoporoza | | 30% | 3,88 |
| 23 | Acidum alendronicum | Ostemax 70 comfort, tabl., 70 mg | 4 tabl. (blis.) | 5909991081713 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 22,68 | 27,95 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 18,58 |
| 24 | Acidum alendronicum | Ostenil 70, tabl., 70 mg | 4 tabl. (blis. w pudełku) | 5909991087418 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 19,02 | 24,03 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 14,66 |
| 25 | Acidum alendronicum | Ostenil 70, tabl., 70 mg | 6 tabl. (blis. w pudełku) | 5909991087425 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 27,95 | 34,68 | 20,09 | Osteoporoza | | 30% | 20,62 |
| 26 | Acidum alendronicum | Ostolek, tabl. powł., 70 mg | 4 tabl. (blis.) | 5909991032517 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 17,77 | 22,69 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 13,32 |
| 27 | Acidum alendronicum | Sedron 70, tabl. powł., 70 mg | 4 tabl. (blis.) | 5909990039692 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 10,78 | 15,22 | 13,39 | Osteoporoza | | 30% | 5,85 |
| 28 | Acidum alendronicum | Sedron 70, tabl. powł., 70 mg | 12 tabl. (3 blis. po 4 szt.) | 5909990039708 | 2012-01-01 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniary doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 30,62 | 40,17 | 40,17 | Osteoporoza | | 30% | 12,05 |
| 29 | Acidum folicum | Acidum Folicum Richter, tabl., 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 1,57 | 1,97 | 1,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 1,97 |
| 30 | Acidum folicum | Acidum Folicum Richter, tabl., 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 2,00 | 2,99 | 2,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 2,99 |
| 31 | Acidum folicum | Folacid, tabl., 5 mg | 30 tabl. (1 blis. po 30 szt.) | 5909990960811 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 1,57 | 1,97 | 1,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 1,97 |
| 32 | Acidum folicum | Folacid, tabl., 15 mg | 30 tabl. (1 blis. po 30 szt.) | 5909990960910 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 2,01 | 3,00 | 2,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | U chorych przyjmujących metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------------|---|-------------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 33 | Acidum mycophenolicum | Myfortic, tabl. , 360 mg | 120 tabl. | 5909990219209 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 821,66 | 912,64 | 889,13 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 26,71 |
| 34 | Acidum mycophenolicum | Myfortic, tabl. , 180 mg | 120 tabl. | 5909990219797 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 397,87 | 448,70 | 444,56 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 7,34 |
| 35 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml | 1 fiol.a 5 ml | 5909990587810 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 60,62 | 76,64 | 76,62 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 3,22 |
| 36 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990587841 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 128,50 | 153,27 | 153,24 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 3,23 |
| 37 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml | 1 fiol.a 20 ml | 5909990587872 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 267,98 | 306,51 | 306,49 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 3,22 |
| 38 | Acidum pamidronicum | Pamidronat medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 3 mg/ml | 1 fiol.a 30 ml | 5909990587902 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 407,78 | 459,73 | 459,73 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 3,20 |
| 39 | Acidum pamidronicum | Pamifos-30, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 30 mg | 2 fiol.s.subs. (+2 rozp.szko) | 5909990661671 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 273,60 | 312,52 | 306,49 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 9,23 |
| 40 | Acidum pamidronicum | Pamifos-60, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 60 mg | 1 fiol.s.subs.a 10 ml (+ rozp.szko) | 5909990661688 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 273,60 | 312,52 | 306,49 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 9,23 |
| 41 | Acidum pamidronicum | Pamifos-90, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 90 mg | 1 fiol.s.subs.a 10 ml (+ rozp.szko) | 5909990661695 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 410,40 | 462,54 | 459,73 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 6,01 |
| 42 | Acidum pamidronicum | Pamitor, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml | 1 amp.a 2 ml (PE) | 5909991012649 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 135,00 | 160,22 | 153,24 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 10,18 |
| 43 | Acidum pamidronicum | Pamitor, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml | 1 amp.a 4 ml (PE) | 5909991012663 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 270,00 | 308,67 | 306,49 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 5,38 |
| 44 | Acidum pamidronicum | Pamitor, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 15 mg/ml | 1 amp.a 6 ml (PE) | 5909991012687 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.2, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosfoniany do podawania pozajelitowego - kwas pamidronowy | 406,08 | 457,91 | 457,91 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 3,20 |
| 45 | Acidum tranexamicum | Exacyl, tabl. powl., 500 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990035915 | 2012-01-01 | 2 lata | 24.2, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie stałe | 10,80 | 15,37 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,69 |
| 46 | Acidum tranexamicum | Exacyl, roztwór doustny , 1 g/10ml | 5 amp.a 10 ml | 5909990036011 | 2012-01-01 | 2 lata | 24.3, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania doustnego - postacie płynne | 10,09 | 14,46 | 14,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------------------------------|---|---------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|------|
| 47 | Acidum tranexamicum | Exacyl, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990306916 | 2012-01-01 | 2 lata | 24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego | 7,72 | 11,18 | 10,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,70 |
| 48 | Acidum tranexamicum | Exacyl, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml | 5 amp.a 5 ml | 5909990309313 | 2012-01-01 | 2 lata | 24.1, Leki antyfibrynolityczne - kwas traneksamowy do stosowania pozajelitowego | 7,52 | 10,96 | 10,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,48 |
| 49 | Acidum valproicum | Convulex , kaps. mi kkie, 500 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990023813 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 35,87 | 46,52 | 46,52 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 50 | Acidum valproicum | Convulex , kaps. mi kkie, 500 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990023813 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 35,87 | 46,52 | 46,52 | Padaczka | | ryczałt | 3,56 |
| 51 | Acidum valproicum | Convulex 150, kaps. mi kkie, 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 14,52 | 19,29 | 14,21 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe | | bezpłatny | 5,08 |
| 52 | Acidum valproicum | Convulex 150, kaps. mi kkie, 150 mg | 100 kaps. | 5909990244317 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 14,52 | 19,29 | 14,21 | Padaczka | | ryczałt | 8,28 |
| 53 | Acidum valproicum | Convulex 300, kaps. mi kkie, 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 21,06 | 28,41 | 28,41 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 54 | Acidum valproicum | Convulex 300, kaps. mi kkie, 300 mg | 100 kaps. | 5909990244416 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 21,06 | 28,41 | 28,41 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 55 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 200+87 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990694327 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o przedlu onym uwalnianiu | 12,96 | 17,65 | 14,63 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe | | bezpłatny | 3,02 |
| 56 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chrono 300, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 200+87 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990694327 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o przedlu onym uwalnianiu | 12,96 | 17,65 | 14,63 | Padaczka | | ryczałt | 6,22 |
| 57 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 333+145 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990694426 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o przedlu onym uwalnianiu | 17,82 | 24,39 | 24,39 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 58 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chrono 500, tabl. powl. o przedlu onym uwalnianiu, 333+145 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990694426 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o przedlu onym uwalnianiu | 17,82 | 24,39 | 24,39 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 59 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 100, granulat o przedlu onym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg | 30 sasz.po 303 mg | 5909990425693 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postaci farmaceutyczne o przedlu onym uwalnianiu | 5,02 | 6,89 | 4,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowe | | bezpłatny | 2,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----------|------|
| 60 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 100, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 66,66+29,03 mg | 30 sasz.po 303 mg | 5909990425693 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 5,02 | 6,89 | 4,88 | Padaczka | | ryczałt | 5,21 |
| 61 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 1000, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg | 30 sasz.po 3030 mg | 5909990425754 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 42,23 | 53,41 | 48,78 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 4,63 |
| 62 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 1000, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 666,60+290,27 mg | 30 sasz.po 3030 mg | 5909990425754 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 42,23 | 53,41 | 48,78 | Padaczka | | ryczałt | 7,83 |
| 63 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 250, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg | 30 sasz.po 758 mg | 5909990425709 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 12,56 | 16,80 | 12,20 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 4,60 |
| 64 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 250, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 166,76+72,61 mg | 30 sasz.po 758 mg | 5909990425709 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 12,56 | 16,80 | 12,20 | Padaczka | | ryczałt | 7,80 |
| 65 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 500, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg | 30 sasz.po 1515 mg | 5909990425730 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 21,11 | 27,91 | 24,39 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,52 |
| 66 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 500, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 333,30+145,14 mg | 30 sasz.po 1515 mg | 5909990425730 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 21,11 | 27,91 | 24,39 | Padaczka | | ryczałt | 6,72 |
| 67 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 750, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg | 30 sasz.po 2273 mg | 5909990425747 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 31,67 | 40,68 | 36,59 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 4,09 |
| 68 | Acidum valproicum + Natrii valproas | Depakine Chronosphere 750, granulatu o przedłu onym uwalnianiu, 500,06+217,75 mg | 30 sasz.po 2273 mg | 5909990425747 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 31,67 | 40,68 | 36,59 | Padaczka | | ryczałt | 7,29 |
| 69 | Acidum valproicum + Natrii valproas | ValproLEK 300, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,2+0,087 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990619658 | 2012-01-01/2012-03-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 9,72 | 14,19 | 14,19 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 70 | Acidum valproicum + Natrii valproas | ValproLEK 300, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,2+0,087 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990619658 | 2012-01-01/2012-03-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 9,72 | 14,19 | 14,19 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 71 | Acidum valproicum + Natrii valproas | ValproLEK 500, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,333+0,145 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990619672 | 2012-01-01/2012-03-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 16,63 | 23,10 | 23,10 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 72 | Acidum valproicum + Natrii valproas | ValproLEK 500, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,333+0,145 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990619672 | 2012-01-01/2012-03-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 16,63 | 23,10 | 23,10 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------------------|--|---------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|--------|
| 73 | Acitretinum | Neotigason, kaps., 25 mg | 100 kaps. | 5909990696925 | 2012-01-01 | 2 lata | 53.0. Leki przeciwluszczywcowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna | 523,80 | 586,98 | 586,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 7,62 |
| 74 | Acitretinum | Neotigason, kaps., 10 mg | 100 kaps. | 5909990697021 | 2012-01-01 | 2 lata | 53.0. Leki przeciwluszczywcowe do stosowania ogólnego - retynoidy - acytretyna | 209,52 | 242,29 | 242,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 75 | Adrenalinum | Adrenalina WZF 0,1%, roztwór do wstrzykiwa , 1 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990182510 | 2012-01-01 | 2 lata | 32.0. Leki pobudzajace czynno serca - leki adrenergiczne i dopaminergiczne - epinefryna - do podawania pozajelitowego | 12,96 | 18,14 | 18,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 76 | Alergeny kurzu domowego | Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, | 3 fiol.a 4,5 ml (st .1-3) | 5909990001118 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego | 405,21 | 449,21 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 293,86 |
| 77 | Alergeny kurzu domowego | Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, | 4 fiol.a 4,5 ml (st .0-3) | 5909990001125 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego | 216,00 | 246,77 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 91,42 |
| 78 | Alergeny kurzu domowego | Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, | 1 but.a 9,5 ml | 5909990001132 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.2. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymujacego | 422,56 | 467,79 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 312,44 |
| 79 | Alergeny kurzu domowego | Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub st enie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml | 4 fiol.a 5 ml | 5909990820313 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.1. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podstawowego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 80 | Alergeny kurzu domowego | Phostal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 10 IR/ml lub st enie: 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml | 1 fiol.a 5 ml | 5909990820320 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.2. Alergeny kurzu domowego - produkty do leczenia podtrzymujacego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 81 | Alergeny pyłków ro lin | Allergovit , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, zestaw: 2 fiol. po 3 ml (st enia A i B) TU | 2 fiol.a 3 ml | 5909990001316 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 311,04 | 348,46 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 193,11 |
| 82 | Alergeny pyłków ro lin | Allergovit , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, 3 ml | 1 fiol.a 3 ml | 5909990001323 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 293,76 | 329,97 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 174,62 |
| 83 | Alergeny pyłków ro lin | Allergovit , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, | 2 fiol.a 3 ml | 5909990001415 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 194,40 | 223,65 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 68,30 |
| 84 | Alergeny pyłków ro lin | Allergovit , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, | 1 fiol.a 3 ml | 5909990001422 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 183,60 | 212,10 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 56,75 |
| 85 | Alergeny pyłków ro lin | Catalet C, zawiesina do wstrzykiwa , st enie 1-25 JS/ml, st enie 2-250 JS/ml, st enie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); st enie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymuj ce) ml | 3 fiol.a 2 ml | 5909990011117 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 77,86 | 98,96 | 98,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 86 | Alergeny pyłków ro lin | Catalet C, zawiesina do wstrzykiwa , 4 - 5000 JS/ml | 1 fiol.a 2 ml | 5909990011124 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 70,03 | 90,58 | 90,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|------------------------|--|--------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|--------|
| 87 | Alergeny pyłków ro lin | Catalet D 1-3, zawiesina do wstrzykiwa , st enie 1-25 JS/ml, st enie 2-250 JS/ml, st enie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); st enie 4-5000 JS/ml (leczenie podtrzymuj ce) ml | 3 fioła 2 ml | 5909990011216 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 77,86 | 98,96 | 98,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 88 | Alergeny pyłków ro lin | Catalet D 4, zawiesina do wstrzykiwa , 4 - 5000 JS/ml | 1 fioła 2 ml | 5909990011223 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 70,03 | 90,58 | 90,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 89 | Alergeny pyłków ro lin | Catalet T 1-3, zawiesina do wstrzykiwa , st enie 1-25 JS/ml, st enie 2-250 JS/ml, st enie 3-2500 JS/ml (leczenie podstawowe); st enie 4-10000 JS/ml (leczenie podtrzymuj ce) ml | 3 fioła 2 ml | 5909990011018 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 77,86 | 98,96 | 98,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 90 | Alergeny pyłków ro lin | Catalet T 4, zawiesina do wstrzykiwa , 4 - 10 000 JS/ml JS/ml | 1 fioła 2 ml | 5909990011025 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 70,03 | 90,58 | 90,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 91 | Alergeny pyłków ro lin | Novo-Helisen Depot , zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, Leczenie pocz tkowe: st enie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; st enie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; st enie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; st enie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymuj ca: ste enie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU | 3 fioła 4,5 ml (st .1-3) | 5909990000715 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 405,21 | 449,21 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 293,86 |
| 92 | Alergeny pyłków ro lin | Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, Leczenie pocz tkowe: st enie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; st enie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; st enie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; st enie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymuj ca: ste enie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU | 4 fioła 4,5 ml (st .0-3) | 5909990000722 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 216,00 | 246,77 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 91,42 |
| 93 | Alergeny pyłków ro lin | Novo-Helisen Depot, zawiesina do wstrzykiwa podskórnych, Leczenie pocz tkowe: st enie 0 - 5 TU/ml lub 5 PNU/ml; st enie 1 - 50 TU/ml lub 50 PNU/ml; st enie 2 - 500 TU/ml lub 500 PNU/ml; st enie 3 - 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml. Dawka podtrzymuj ca: ste enie 3-5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml TU | 1 but.a 9,5 ml (st .3) | 5909990000739 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 422,56 | 467,79 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 312,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|--|--|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|--------|
| 94 | Alergeny pyłków ro lin | Postal, zawiesina do wstrzykiwa , st enie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub st enie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml | 4 fioła 5 ml | 5909990820115 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 95 | Alergeny pyłków ro lin | Postal, zawiesina do wstrzykiwa , 10 IR/ml | 1 fioła 5 ml | 5909990820122 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 96 | Alergeny pyłków ro lin | Pollinex Tree, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; SU/ml | 3 fiołki po 1 ml (fiołka nr 1- 600 SU/ml, fiołka nr 2 - 1600 SU/ml, fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 5 strzykawek jednorazowego u ytku + 5 igieł jednorazowego u ytku | 5909990687411 | 2012-07-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 97 | Alergeny pyłków ro lin | Pollinex Tree, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podtrzymuj cego: 4000 SU/ml SU/ml | 1 fiołka po 1,5 ml (fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 3 strzykawki jednorazowego u ytku + 3 igły jednorazowego u ytku | 5909990687428 | 2012-07-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 98 | Alergeny pyłków ro lin | Pollinex+Rye, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podstawowego: 600 SU/ml, 1600 SU/ml, 4000 SU/ml; SU/ml | 3 fiołki po 1 ml (fiołka nr 1- 600 SU/ml, fiołka nr 2 - 1600 SU/ml, fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 5 strzykawek jednorazowego u ytku + 5 igieł jednorazowego u ytku | 5909990684816 | 2012-07-01 | 2 lata | 214.3. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podstawowego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 99 | Alergeny pyłków ro lin | Pollinex+Rye, zawiesina do wstrzykiwa , dawki do leczenia podtrzymuj cego: 4000 SU/ml SU/ml | 1 fiołka po 1,5 ml (fiołka nr 3- 4000 SU/ml)+ 3 strzykawki jednorazowego u ytku + 3 igły jednorazowego u ytku | 5909990684823 | 2012-07-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 100 | Alergeny pyłków ro lin | Purethal, zawiesina do wstrzykiwa , 20000 AUM | 1 fioła 3 ml (+8 strzyk.z igł) | 5909990975310 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 226,80 | 258,32 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 102,97 |
| 101 | Alergeny pyłków ro lin | Purethal, zawiesina do wstrzykiwa , 20000 AUM | 1 fioła 3 ml (+8 strzyk.z igł) | 5909990975419 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.4. Alergeny pyłków ro lin - produkty do leczenia podtrzymuj cego | 226,80 | 258,32 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 102,97 |
| 102 | Alfacalcidolum | Alfadiol, kaps. mi kkie, 0,25 g | 100 kaps. (2 blist.po 50 szt.) | 5909990296828 | 2012-01-01 | 2 lata | 18.1. Witamina D i jej analogi - alfacalcydol | 10,67 | 12,92 | 4,89 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 11,23 |
| 103 | Alfacalcidolum | Alfadiol, kaps. mi kkie, 1 g | 100 kaps. (2 blist.po 50 szt.) | 5909990296927 | 2012-01-01 | 2 lata | 18.1. Witamina D i jej analogi - alfacalcydol | 14,05 | 19,54 | 19,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 10,67 |
| 104 | Alfuzosinum | Alfabax, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990746576 | 2012-05-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 22,68 | 31,02 | 31,02 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,27 |
| 105 | Alfuzosinum | AlfuLEK 10, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990609246 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 35,64 | 44,89 | 34,18 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 14,98 |
| 106 | Alfuzosinum | Alfuzostad, tabl. dojelitowe o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. | 5909990619580 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,76 | 32,18 | 32,18 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|
| 107 | Alfuzosinum | Alugen 10, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. | 5909990037933 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,76 | 32,18 | 32,18 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,27 |
| 108 | Alfuzosinum | Dalfaz, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990681211 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 15,12 | 18,80 | 8,55 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 13,45 |
| 109 | Alfuzosinum | Dalfaz SR 5, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 5 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990812714 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 11,88 | 16,05 | 11,39 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 7,86 |
| 110 | Alfuzosinum | Dalfaz Uno, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990837816 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 35,64 | 44,89 | 34,18 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 14,98 |
| 111 | Alfuzosinum | Kofuzin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990718337 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 24,30 | 32,75 | 32,75 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,27 |
| 112 | Allopurinolum | Allapol, tabl. , 100 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990109418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol | 5,00 | 7,75 | 7,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 113 | Allopurinolum | Milurit, tabl. , 100 mg | 50 tabl. | 5909990163212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol | 5,94 | 8,77 | 8,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 114 | Allopurinolum | Milurit, tabl. , 300 mg | 30 tabl. | 5909990414819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopuryinol | 10,80 | 15,35 | 15,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 115 | Amantadinum | Viregyt-K, kaps., 100 mg | 50 kaps. | 5909990320912 | 2012-01-01 | 2 lata | 169.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - amantadyna | 14,90 | 20,63 | 20,63 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 6,19 |
| 116 | Ambenonium | Mytelase, tabl. , 10 mg | 50 tabl. (but.) | 5909990030927 | 2012-01-01 | 2 lata | 189.0, Leki parasympatykomimetyczne - ambenonium | 8,14 | 11,82 | 11,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,55 |
| 117 | Amiloridum + Hydrochlorothiazidum | Tialorid, tabl. , 5+50 mg | 50 tabl. (poj.plast.w pudeł.) | 5909990206025 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,59 | 9,17 | 9,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,75 |
| 118 | Amiloridum + Hydrochlorothiazidum | Tialorid mite, tabl. , 2,5+25 mg | 50 tabl. (poj.plast.w pudeł.) | 5909990373819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,19 | 7,34 | 6,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,04 |
| 119 | Amiodaronum | Opacorden, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990086818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 31.0, Leki przeciwyrytmiczne klasy III - amiodaron | 14,69 | 20,37 | 20,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, cz stoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,40 |
| 120 | Amisulpridum | Amisan, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990762897 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 27,11 | 36,10 | 35,94 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|--|-----------|------|
| 121 | Amisulpridum | Amisan, tabl. , 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990762965 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 56,70 | 71,30 | 71,30 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 122 | Amisulpridum | Amisan, tabl. , 400 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990762996 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 117,72 | 140,59 | 140,59 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 123 | Amisulpridum | Candela, tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 5909990798193 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 28,62 | 37,71 | 35,94 | Schizofrenia | | ryczałt | 4,97 |
| 124 | Amisulpridum | Candela, tabl. , 200 mg | 30 tabl. | 5909990798209 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 57,78 | 72,44 | 71,87 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,77 |
| 125 | Amisulpridum | Candela, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. | 5909990798230 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 118,80 | 141,74 | 141,74 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 126 | Amisulpridum | SOLIAN, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. | 5909997195520 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 122,04 | 145,21 | 143,74 | Schizofrenia | | ryczałt | 4,67 |
| 127 | Amisulpridum | Solian, tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 5909990840816 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 30,51 | 39,74 | 35,94 | Schizofrenia | | ryczałt | 7,00 |
| 128 | Amisulpridum | Solian, tabl. , 200 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990840915 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 57,24 | 71,87 | 71,87 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 129 | Amisulpridum | Solian, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990841011 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.11, Leki przeciwpsychotyczne - amisulpiryd | 122,04 | 145,21 | 143,74 | Schizofrenia | | ryczałt | 4,67 |
| 130 | Amitriptylinum | Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909991048914 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 7,02 | 8,49 | 3,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,29 |
| 131 | Amitriptylinum | Amitryptilinum VP, tabl. powl., 25 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909991048914 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 7,02 | 8,49 | 3,14 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 5,35 |
| 132 | Amitriptylinum | Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909991049010 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 3,89 | 4,55 | 1,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,67 |
| 133 | Amitriptylinum | Amitryptilinum VP, tabl. powl., 10 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909991049010 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 3,89 | 4,55 | 1,26 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,29 |
| 134 | Amlodipinum | Adipine, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990642267 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 135 | Amlodipinum | Adipine, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990642311 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,51 | 8,27 | 8,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|------|
| 136 | Amlodipinum | Agen 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991099022 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,10 | 16,95 | 16,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,09 |
| 137 | Amlodipinum | Agen 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991098926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,94 | 8,73 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,70 |
| 138 | Amlodipinum | Aldan, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991008635 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 8,10 | 11,05 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,02 |
| 139 | Amlodipinum | Aldan, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991008734 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,88 | 17,78 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,71 |
| 140 | Amlodipinum | Amlodipine Arrow 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990057399 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 9,72 | 14,40 | 14,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,32 |
| 141 | Amlodipinum | Amlodipine Arrow 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990057351 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,97 | 7,70 | 7,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,31 |
| 142 | Amlodipinum | Amlodipine Teva, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990721580 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,97 | 7,70 | 7,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,31 |
| 143 | Amlodipinum | Amlodipine Teva, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990721603 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 144 | Amlodipinum | Amlomyl, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990842476 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,08 | 7,82 | 7,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,35 |
| 145 | Amlodipinum | Amlomyl, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990842698 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 146 | Amlodipinum | Amlonor, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990642618 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,18 | 7,91 | 7,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,37 |
| 147 | Amlodipinum | Amlonor, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990642625 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 148 | Amlodipinum | Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990048977 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 15,12 | 20,18 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 8,11 |
| 149 | Amlodipinum | Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990048939 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 8,64 | 11,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,59 |
| 150 | Amlodipinum | Amlozek, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990799718 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,96 | 16,24 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 10,21 |
| 151 | Amlodipinum | Amlozek, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990799817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 17,82 | 23,07 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|------|
| 152 | Amlodipinum | Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990565993 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,80 | 16,62 | 16,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,99 |
| 153 | Amlodipinum | Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990565986 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,96 | 8,76 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,73 |
| 154 | Amlodipinum | Cardilopin, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990907311 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,95 | 6,55 | 4,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 3,53 |
| 155 | Amlodipinum | Cardilopin, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990907410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 9,94 | 13,01 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 6,98 |
| 156 | Amlodipinum | Cardilopin, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990907519 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 16,46 | 21,61 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 9,54 |
| 157 | Amlodipinum | Finamlox, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990794430 | 2012-07-01 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,86 | 7,57 | 7,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,27 |
| 158 | Amlodipinum | Finamlox, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990794461 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,23 | 16,02 | 16,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,81 |
| 159 | Amlodipinum | Lofral 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990636075 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,54 | 17,42 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 160 | Amlodipinum | Lofral 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990636068 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,94 | 8,73 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,70 |
| 161 | Amlodipinum | Normodipine, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990993017 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 6,24 | 9,06 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 3,03 |
| 162 | Amlodipinum | Normodipine, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990993116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,34 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,84 |
| 163 | Amlodipinum | Tenox, tabl. , 5 mg | 90 tabl. | 5909990421824 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 26,46 | 33,55 | 25,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 15,45 |
| 164 | Amlodipinum | Tenox, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990963010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 9,18 | 12,19 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 6,16 |
| 165 | Amlodipinum | Tenox, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990963119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 16,74 | 21,90 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 9,83 |
| 166 | Amlodipinum | Vilpin, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990621217 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,83 | 8,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 167 | Amlodipinum | Vilpin, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991042912 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,99 | 16,83 | 16,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,05 |
| 168 | Amoxicillinum | Amotaks, tabl. , 1 g | 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) | 5909990691319 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 11,79 | 16,38 | 14,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,87 |
| 169 | Amoxicillinum | Amotaks, kaps. twarde, 500 mg | 16 kaps. (2 blist.po 8 szt.) | 5909990691517 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 7,70 | 10,43 | 7,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,27 |
| 170 | Amoxicillinum | Amotaks, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml | 60 ml (39,2 g) | 5909990794379 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne | 7,32 | 10,57 | 10,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,49 |
| 171 | Amoxicillinum | Amotaks DIS, tabl. , 500 mg | 16 tabl. | 5909991043520 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 5,78 | 8,37 | 7,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,21 |
| 172 | Amoxicillinum | Amotaks DIS, tabl. , 750 mg | 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) | 5909991043629 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 8,55 | 12,18 | 11,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,35 |
| 173 | Amoxicillinum | Amotaks DIS, tabl. , 1 g | 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) | 5909991043728 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 10,52 | 15,02 | 14,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,51 |
| 174 | Amoxicillinum | Duomox, tabl. , 250 miligram | 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) | 5909990063215 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 5,79 | 7,61 | 4,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,21 |
| 175 | Amoxicillinum | Duomox, tabl. , 500 miligram | 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) | 5909990063314 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 9,00 | 12,25 | 9,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,25 |
| 176 | Amoxicillinum | Duomox, tabl. , 1000 miligram | 20 tabl. | 5909990063413 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 13,15 | 18,39 | 18,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 177 | Amoxicillinum | Duomox, tabl. , 375 miligram | 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) | 5909990328314 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 7,27 | 9,86 | 6,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,16 |
| 178 | Amoxicillinum | Duomox, tabl. , 750 miligram | 20 tabl. (4 blist.po 5 szt.) | 5909990328413 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 10,26 | 14,59 | 13,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,00 |
| 179 | Amoxicillinum | Hiconcil, kaps. twarde, 250 mg | 16 kaps. | 5909990066018 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 3,24 | 4,59 | 3,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,11 |
| 180 | Amoxicillinum | Hiconcil, kaps. twarde, 500 mg | 16 kaps. | 5909990066117 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 5,80 | 8,40 | 7,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,24 |
| 181 | Amoxicillinum | Hiconcil, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml | 5909990083619 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne | 5,80 | 8,57 | 8,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------------------|--|-----------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 182 | Amoxicillinum | Hiconcil, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml | 60 ml | 5909990086016 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne | 4,62 | 5,68 | 2,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 5,68 |
| 183 | Amoxicillinum | Ospamox, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,125 g/5 ml | 60 ml (5,1 g) | 5909990086580 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.2, Penicyliny półsyntetyczne doustne - płynne postacie farmaceutyczne | 3,78 | 4,78 | 2,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,78 |
| 184 | Amoxicillinum | Ospamox, tabl. powl., 0,5 g | 16 tabl. | 5909990293124 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 5,72 | 8,31 | 7,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,15 |
| 185 | Amoxicillinum | Ospamox, tabl. powl., 0,75 g | 16 tabl. | 5909990293223 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 8,42 | 12,04 | 11,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,21 |
| 186 | Amoxicillinum | Ospamox, tabl. powl., 1 g | 16 tabl. | 5909990293322 | 2012-01-01 | 2 lata | 88.1, Penicyliny półsyntetyczne doustne - stałe postacie farmaceutyczne | 9,72 | 14,15 | 14,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 187 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoclan, tabl. powl., 875+125 g | 14 tabl. (but.) | 5909990572991 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 25,27 | 33,52 | 33,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,02 |
| 188 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, tabl. powl., 0,25+0,125 g | 21 tabl. | 5909990077120 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 16,20 | 21,11 | 14,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,04 |
| 189 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, tabl. powl., 0,5+0,125 g | 14 tabl. (blis.) | 5909990081912 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 15,12 | 20,71 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,28 |
| 190 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, tabl. powl., 0,5+0,125 g | 21 tabl. (but.) | 5909990081929 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 19,98 | 27,30 | 27,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,65 |
| 191 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, tabl. powl., 0,875+0,125 g | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990411115 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 24,84 | 33,06 | 33,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,56 |
| 192 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml | 35 ml (8,75 g) | 5909990894819 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 9,18 | 12,21 | 7,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,28 |
| 193 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml | 70 ml (17,5 g) | 5909990894826 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 15,93 | 21,07 | 15,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,21 |
| 194 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml | 140 ml (35 g) | 5909990894833 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 23,76 | 31,70 | 31,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 15,97 |
| 195 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav QUICKTAB 1000 mg, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej /tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 0,875+0,125 g | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990649747 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 21,60 | 29,74 | 29,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,87 |
| 196 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Amoksiklav QUICKTAB 625 mg, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej /tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 0,5+0,125 g | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990646906 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,94 | 17,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 197 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, tabl. powł., 250+125 mg | 21 tabl. (3 blist.po 7 szt.) | 5909990064120 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 15,66 | 20,54 | 14,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,47 |
| 198 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, tabl. powł., 500+125 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990368235 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 17,28 | 23,02 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,59 |
| 199 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/5ml | 35 ml (5,3 g) | 5909990419319 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 11,34 | 14,52 | 7,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,59 |
| 200 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml | 70 ml (10,6 g) | 5909990419326 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 20,52 | 25,97 | 15,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,11 |
| 201 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 400+57 mg/ml | 140 ml (21 g) | 5909990419333 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 27,00 | 35,17 | 31,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,44 |
| 202 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, tabl. powł., 875+125 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990717521 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 28,62 | 37,10 | 33,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 20,60 |
| 203 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, tabl. powł., 875+125 mg | 14 tabl. | 5909997198385 | 2012-03-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 24,84 | 33,06 | 33,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,56 |
| 204 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, tabl. powł., 500+125 mg | 14 tabl. | 5909997199702 | 2012-03-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 14,21 | 19,73 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,30 |
| 205 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin, tabl. powł., 500+125 mg | 14 tabl. | 5909997200576 | 2012-07-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 14,15 | 19,67 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,24 |
| 206 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin ES, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 600+ 42,9 mg/5ml | 50 ml (but.) | 5909990614288 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 20,52 | 26,15 | 16,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,73 |
| 207 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin ES, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 600+42,9 mg/5ml | 100 ml (but.) | 5909990614318 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - płynne postacie farmaceutyczne | 32,94 | 41,80 | 33,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 24,95 |
| 208 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Augmentin SR, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 1000+62,5 mg | 28 tabl. (7 blist.po 4 szt.) | 5909990041985 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 50,67 | 64,78 | 64,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 32,39 |
| 209 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Forcid 1000, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 875+125 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990219087 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,21 | 33,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,71 |
| 210 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Forcid 312, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250+62,5 mg | 20 tabl. (5 blist.po 4 szt.) | 5909990968015 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 16,50 | 21,32 | 13,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,59 |
| 211 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Forcid 625, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 500+125 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990968114 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 14,20 | 19,72 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,29 |
| 212 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Taromentin, tabl. powł., 0,5+0,125 g | 21 tabl. | 5909990430611 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 19,87 | 27,18 | 27,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---|--------|--------|-------|---|----|-----------|-------|
| 213 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Taromentin, tabl. powł., 0,5+0,125 g | 14 tabl. | 5909990430628 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 14,15 | 19,67 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,24 |
| 214 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml | 140 ml (25,2 g) | 5909990793587 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne | 23,54 | 31,46 | 31,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 15,73 |
| 215 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml | 35 ml (6,3 g) | 5909990793594 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne | 8,96 | 11,98 | 7,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,05 |
| 216 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Taromentin, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,4+0,057 g/5ml | 70 ml (12,6 g) | 5909990793600 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.2, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - plynne postacie farmaceutyczne | 15,71 | 20,82 | 15,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,96 |
| 217 | Amoxicillinum + Acidum clavulanicum | Taromentin, tabl. powł., 0,875+0,125 g | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909991087715 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 24,79 | 33,00 | 33,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,50 |
| 218 | Anastrozolum | Anastralan, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. | 5909990670468 | 2012-01-01/2012-07-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 91,80 | 110,77 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 17,90 |
| 219 | Anastrozolum | Anastrozol Bluefish, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. | 5909990802432 | 2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 96,12 | 115,39 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 22,52 |
| 220 | Anastrozolum | Anastrozol medac, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. | 5909990786497 | 2012-03-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 97,20 | 116,55 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 23,68 |
| 221 | Anastrozolum | Ansyn, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990635511 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 96,12 | 115,39 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 22,52 |
| 222 | Anastrozolum | Apo-Nastrol, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990802050 | 2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 97,20 | 116,55 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 23,68 |
| 223 | Anastrozolum | Arimidex, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990756711 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 118,80 | 139,66 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 46,79 |
| 224 | Anastrozolum | Atrozol , tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. | 5909991090029 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 98,17 | 117,59 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 24,72 |
| 225 | Anastrozolum | Egistrozol, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990082148 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 98,28 | 117,70 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 24,83 |
| 226 | Anastrozolum | Mamostrol, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990082346 | 2012-01-01/2012-03-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 104,76 | 124,64 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, Wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 31,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------|--|----------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|---|-----------|-------|
| 227 | Anastrozolum | Symanastrol, tabl. powł., 1 mg | 28 tabl. | 5909990661909 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 130,26 | 151,93 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 59,06 |
| 228 | Anastrozolum | Zolastrol, tabl. powł., 1 miligram | 28 tabl. | 5909990666379 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 130,25 | 151,92 | 92,87 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 59,05 |
| 229 | Aprepitantum | Emend, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg | 3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g) | 5909990007387 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant | 210,60 | 243,48 | 243,48 | Wczesne albo opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m ² – profilaktyka | Wczesne lub opóźnione wymioty u osób dorosłych związane z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka | ryczałt | 3,20 |
| 230 | Aqua pro injectione | Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 5 ml | 100 amp.a 5 ml | 5909990248230 | 2012-01-01 | 2 lata | 218.3, Płyny i roztoczenia - czynniki do wstrzykiwania - woda do wstrzykiwania | 18,00 | 23,30 | 15,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,36 |
| 231 | Aqua pro injectione | Aqua pro injectione Polpharma, Aqua pro injectione, rozpuszczalnik do sporządzenia leków parenteralnych, 10 ml | 100 amp.a 10 ml | 5909990248247 | 2012-01-01 | 2 lata | 218.3, Płyny i roztoczenia - czynniki do wstrzykiwania - woda do wstrzykiwania | 23,77 | 31,75 | 31,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,88 |
| 232 | Aripiprazolum | Abilify, tabl., 15 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990002306 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.7, Leki przeciwpsychotyczne - aripiprazol | 362,53 | 410,11 | 410,11 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 233 | Atenololum | Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990370610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 2,40 | 3,60 | 3,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadciężenie tętna, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 234 | Atenololum | Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990011414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 2,15 | 3,33 | 3,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadciężenie tętna, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 235 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 10 mg | 7 kaps. | 5909990568550 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 71,97 | 78,59 | 4,33 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją lub niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 77,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|--------------------------------|----------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|-------|---|----|---------|--------|
| 236 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 10 mg | 28 kaps. | 5909990568574 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 287,88 | 312,67 | 17,34 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 298,53 |
| 237 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 18 mg | 7 kaps. | 5909990568628 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 71,97 | 79,64 | 7,80 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 75,04 |
| 238 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 18 mg | 28 kaps. | 5909990568642 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 287,88 | 314,77 | 31,21 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 286,76 |
| 239 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 25 mg | 7 kaps. | 5909990568666 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 71,97 | 80,46 | 10,84 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b/d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 72,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|--------|
| 240 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 25 mg | 28 kaps. | 5909990568680 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 287,88 | 316,43 | 43,34 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 276,29 |
| 241 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 40 mg | 7 kaps. | 5909990568703 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 71,97 | 81,66 | 17,34 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 67,52 |
| 242 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 40 mg | 28 kaps. | 5909990568727 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 287,88 | 318,82 | 69,35 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 252,67 |
| 243 | Atomoxetine | Strattera, kaps. twarde, 60 mg | 28 kaps. | 5909990568765 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 287,88 | 321,25 | 104,03 | Nadpobudliwość psychoruchowa z deficytem uwagi oraz ze współistniejącymi chorobami, takimi jak: tiki, zespół Tourette'a, zaburzenia lękowe lub z udokumentowaną nietolerancją b d niepowodzeniem terapii lekami psychostymulującymi jako element pełnego programu leczenia u dzieci od 6 roku życia oraz u młodzieży. | | ryczałt | 220,42 |
| 244 | Atorvastatin | Apo-Atorva, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990787586 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,13 | 11,57 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 245 | Atorvastatinum | Apo-Atorva, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787609 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,28 | 22,08 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,48 |
| 246 | Atorvastatinum | Apo-Atorva, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787647 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 32,54 | 42,06 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,87 |
| 247 | Atorvastatinum | Atorgamma, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990792290 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 9,23 | 9,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,77 |
| 248 | Atorvastatinum | Atorgamma, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990792573 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,88 | 17,37 | 17,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,21 |
| 249 | Atorvastatinum | Atorgamma, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990792887 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 23,76 | 32,66 | 32,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,80 |
| 250 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 10 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990336647 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 30,24 | 38,41 | 29,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,01 |
| 251 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 20 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990419173 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 45,36 | 57,78 | 57,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 17,33 |
| 252 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990623464 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,70 | 39,03 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,84 |
| 253 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 30 mg | 30 tabl. | 5909990885282 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,15 | 26,54 | 26,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,96 |
| 254 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 60 mg | 30 tabl. | 5909990885336 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 35,55 | 47,28 | 47,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 14,18 |
| 255 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 80 mg | 30 tabl. | 5909990885374 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 48,65 | 62,88 | 62,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 18,86 |
| 256 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990991815 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,34 | 15,00 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,20 |
| 257 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990991914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,66 | 21,42 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 258 | Atorvastatinum | Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990848904 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 9,23 | 9,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 2,77 |
| 259 | Atorvastatinum | Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990849086 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,85 | 17,34 | 17,34 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,20 |
| 260 | Atorvastatinum | Atorvastatinum 123ratio (Atorvastatin Teva Pharma), tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990849246 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 23,76 | 32,66 | 32,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,80 |
| 261 | Atorvastatinum | Atorvastatinum Farmacom, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990073443 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,50 | 10,90 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,10 |
| 262 | Atorvastatinum | Atorvastatinum Farmacom, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990073450 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,85 | 17,34 | 17,34 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,20 |
| 263 | Atorvastatinum | Atorvastatinum Farmacom, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990073467 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 27,15 | 36,29 | 36,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,89 |
| 264 | Atorvastatinum | Atorvasterol, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990077847 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,18 | 14,82 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,02 |
| 265 | Atorvastatinum | Atorvasterol, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990077939 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,82 | 23,74 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,14 |
| 266 | Atorvastatinum | Atorvasterol, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078028 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 35,64 | 45,38 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,19 |
| 267 | Atorvastatinum | ATORVOX, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573547 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 32,18 | 41,67 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,48 |
| 268 | Atorvastatinum | Atorvox, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573400 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,04 | 13,60 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,80 |
| 269 | Atorvastatinum | Atorvox, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573530 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,29 | 21,02 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,42 |
| 270 | Atorvastatinum | Atorvox, tabl. powł., 80 mg | 30 tabl. | 5909990849390 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 67,61 | 83,16 | 77,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 28,77 |
| 271 | Atorvastatinum | Atractin, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078141 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,75 | 12,23 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 272 | Atorvastatinum | Atractin, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078264 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,66 | 21,42 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,82 |
| 273 | Atorvastatinum | Atractin, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990078356 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,70 | 39,03 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,84 |
| 274 | Atorvastatinum | Atrox 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991124618 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,64 | 12,11 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,31 |
| 275 | Atorvastatinum | Atrox 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991124717 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,42 | 22,23 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,63 |
| 276 | Atorvastatinum | Atrox 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991124816 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 30,24 | 39,60 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,41 |
| 277 | Atorvastatinum | Corator, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991150914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,80 | 14,42 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,62 |
| 278 | Atorvastatinum | Corator, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991151010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,23 | 23,10 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,50 |
| 279 | Atorvastatinum | Corator, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991151119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,27 | 40,70 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,51 |
| 280 | Atorvastatinum | Lambrinex, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990905508 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,38 | 8,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,59 |
| 281 | Atorvastatinum | Lambrinex, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990905638 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,80 | 16,22 | 16,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,87 |
| 282 | Atorvastatinum | Lambrinex, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990905782 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 21,60 | 30,35 | 30,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,11 |
| 283 | Atorvastatinum | Larus, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078530 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,18 | 12,69 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,89 |
| 284 | Atorvastatinum | Larus, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078707 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,20 | 22,00 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 285 | Atorvastatinum | Larus, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078790 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 37,80 | 47,69 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 20,50 |
| 286 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755547 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,62 | 8,87 | 8,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,66 |
| 287 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powl., 80 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755554 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 44,93 | 58,90 | 58,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 17,67 |
| 288 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755561 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,23 | 16,68 | 16,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,00 |
| 289 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755578 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 22,46 | 31,27 | 31,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,38 |
| 290 | Atorvastatinum | Torvacard 10, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338290 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 12,42 | 16,16 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,36 |
| 291 | Atorvastatinum | Torvacard 20, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338368 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 20,84 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,24 |
| 292 | Atorvastatinum | Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338436 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,70 | 39,03 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,84 |
| 293 | Atorvastatinum | Torvacard 40, tabl. powl., 40 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990338443 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 80,83 | 99,73 | 99,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 29,92 |
| 294 | Atorvastatinum | Torvalipin, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053179 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,80 | 14,42 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,62 |
| 295 | Atorvastatinum | Torvalipin, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053230 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 13,74 | 19,36 | 19,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,81 |
| 296 | Atorvastatinum | Torvalipin, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053278 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,54 | 38,85 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,66 |
| 297 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powl., 0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990998814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,04 | 17,89 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|-----------|-------|
| 298 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,01 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990998821 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 28,08 | 34,71 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 21,11 |
| 299 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,01 g | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990998838 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 42,12 | 51,12 | 29,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 30,72 |
| 300 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,02 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990998913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 18,36 | 24,31 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,71 |
| 301 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,02 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990998920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 36,72 | 46,53 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 19,34 |
| 302 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,02 g | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990998937 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 57,24 | 70,49 | 58,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 29,69 |
| 303 | Atorvastatinum | Tulip 40 mg, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990810161 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 25,90 | 34,95 | 34,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,49 |
| 304 | Atorvastatinum | Xavitor, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078448 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,78 | 13,33 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,53 |
| 305 | Atorvastatinum | Xavitor, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078622 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 18,61 | 24,58 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,98 |
| 306 | Atropinum | Atropinum sulfuricum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml | 5 ml | 5909990243112 | 2012-01-01 | 2 lata | 226,0. Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu | 11,43 | 15,26 | 11,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 6,99 |
| 307 | Azathioprinum | Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg | 50 tabl. | 5909990232819 | 2012-01-01 | 2 lata | 140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 22,68 | 30,41 | 30,41 | Nowotwory złośliwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 308 | Azathioprinum | Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg | 50 tabl. | 5909990232819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 22,68 | 30,41 | 30,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, płamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie kości czyżny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 309 | Azathioprinum | Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990232826 | 2012-01-01 | 2 lata | 140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 17,28 | 22,90 | 18,25 | Nowotwory złośliwe | | bezpłatny | 4,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----------|-------|
| 310 | Azathioprinum | Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990232826 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 17,28 | 22,90 | 18,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 7,85 |
| 311 | Azathioprinum | Imuran, tabl. powl., 25 mg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909990144211 | 2012-01-01 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 31,21 | 39,53 | 30,41 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 9,12 |
| 312 | Azathioprinum | Imuran, tabl. powl., 25 mg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909990144211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 31,21 | 39,53 | 30,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 12,32 |
| 313 | Azathioprinum | Imuran, tabl. powl., 50 mg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909990277810 | 2012-01-01 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 50,22 | 63,09 | 60,82 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,27 |
| 314 | Azathioprinum | Imuran, tabl. powl., 50 mg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909990277810 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 50,22 | 63,09 | 60,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 5,83 |
| 315 | Azithromycinum | Azibiot, tabl. powl., 500 mg | 3 tabl. | 5909991054816 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,82 | 21,78 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,10 |
| 316 | Azithromycinum | Azigen, tabl. powl., 250 mg | 6 tabl. | 5909990859887 | 2012-03-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,55 | 21,49 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,81 |
| 317 | Azithromycinum | Azigen, tabl. powl., 500 mg | 3 tabl. | 5909990859955 | 2012-03-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,55 | 21,49 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,81 |
| 318 | Azithromycinum | Azimycin, tabl. powl., 125 mg | 6 tabl. | 5909991034313 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,58 | 21,36 | 4,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-----------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 319 | Azithromycinum | Azimycin, tabl. powł., 250 mg | 6 tabl. | 5909991034412 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,98 | 24,09 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,41 |
| 320 | Azithromycinum | Azimycin, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909991035518 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 21,92 | 26,15 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 21,47 |
| 321 | Azithromycinum | Aziteva, Azithromycinum 123ratio, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909990609925 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,28 | 21,20 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 16,52 |
| 322 | Azithromycinum | Azitrin, tabl. powł., 250 mg | 6 tabl. | 5909990635641 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,52 | 24,66 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,98 |
| 323 | Azithromycinum | Azitrin, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909990635702 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,52 | 24,66 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,98 |
| 324 | Azithromycinum | AzitroLEK, tabl. powł., 0,25 g | 6 tabl. (1 blist.po 6 szt.) | 5909990573738 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 28,08 | 32,75 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 28,07 |
| 325 | Azithromycinum | AzitroLEK, tabl. powł., 0,5 g | 3 tabl. (blist.) | 5909990573752 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,52 | 24,66 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,98 |
| 326 | Azithromycinum | AzitroLEK, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,1 g/5ml | 1 but.a 20 ml (16,5 g) | 5909990635320 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 15,12 | 19,08 | 9,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 14,38 |
| 327 | Azithromycinum | AzitroLEK, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 0,2 g/5 ml | 1 but.a 20 ml (16,5 g) | 5909990635337 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 22,14 | 28,39 | 18,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,00 |
| 328 | Azithromycinum | Azitrox 500, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. (blist.) | 5909991087319 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,33 | 23,39 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 18,71 |
| 329 | Azithromycinum | Azycyna, tabl. powł., 250 mg | 6 tabl. | 5909991098421 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 25,42 | 29,91 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 25,23 |
| 330 | Azithromycinum | Azycyna, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909991098520 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,84 | 19,65 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 14,97 |
| 331 | Azithromycinum | Bactrazol, granulatu do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml | 20 ml | 5909990073559 | 2012-07-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 11,07 | 14,74 | 9,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 10,04 |
| 332 | Azithromycinum | Bactrazol, granulatu do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml | 20 ml | 5909990073566 | 2012-07-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 22,14 | 28,39 | 18,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,00 |
| 333 | Azithromycinum | Bactrazol, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909990664672 | 2012-05-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,28 | 21,20 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 16,52 |
| 334 | Azithromycinum | Canbiox, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909990740543 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,98 | 24,09 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|----------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|---------|-------|
| 335 | Azithromycinum | Macromax, tabl. powł., 0,5 g | 3 tabl. (blist.) | 5909990713608 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,84 | 25,01 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 20,33 |
| 336 | Azithromycinum | Macromax, kaps., 0,25 g | 6 kaps. (blist.) | 5909991027124 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,54 | 32,18 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 27,50 |
| 337 | Azithromycinum | Nobaxin, tabl. powł., 125 mg | 6 tabl. (blist.) | 5909991108625 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 26,35 | 29,66 | 4,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 27,32 |
| 338 | Azithromycinum | Nobaxin, tabl. powł., 250 mg | 6 tabl. (blist.) | 5909991108724 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 26,14 | 30,68 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 26,00 |
| 339 | Azithromycinum | Nobaxin, tabl. powł., 500 mg | 2 tabl. (blist.) | 5909991108830 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,76 | 24,17 | 6,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,05 |
| 340 | Azithromycinum | Nobaxin, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. (blist.) | 5909991108847 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 23,81 | 28,18 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 23,50 |
| 341 | Azithromycinum | Sumamed, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg/5ml | 1 but.a 20 ml (HDPE) | 5909990742110 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 17,93 | 22,09 | 9,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,39 |
| 342 | Azithromycinum | Sumamed, kaps. twarde, 250 mg | 6 kaps. | 5909990742318 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 29,46 | 34,23 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 29,55 |
| 343 | Azithromycinum | Sumamed, tabl. powł., 500 mg | 3 tabl. | 5909990742417 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 29,01 | 33,75 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 29,07 |
| 344 | Azithromycinum | Sumamed, tabl. powł., 500 mg | 2 tabl. | 5909990742424 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 21,71 | 25,20 | 6,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 22,08 |
| 345 | Azithromycinum | Sumamed, tabl. powł., 125 mg | 6 tabl. | 5909990846214 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,32 | 30,70 | 4,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 28,36 |
| 346 | Azithromycinum | Sumamed Forte, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml | 1 but.a 20 ml (HDPE) | 5909990742219 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 27,49 | 34,11 | 18,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 24,72 |
| 347 | Azithromycinum | Sumamed Forte, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 200 mg/5ml | 1 but.a 30 ml (HDPE) | 5909990742226 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 36,29 | 44,92 | 28,19 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 30,83 |
| 348 | Azithromycinum | Zetamax, granulaty o przedlu onym uwalnianiu do sporz dzania zawiesiny doustnej, 2 g | 1 but.a 2g | 5909990707577 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 34,82 | 45,76 | 45,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 22,88 |
| 349 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn | 1 op. (200 daw.) | 5909990061303 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 36,29 | 50,63 | 50,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 15,19 |
| 350 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn | 1 op. (200 daw.) | 5909990061303 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 36,29 | 50,63 | 50,63 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---|---|--------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 351 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 op. (200 daw.) | 5909990061440 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 29,15 | 38,07 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,09 |
| 352 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 op. (200 daw.) | 5909990061440 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 29,15 | 38,07 | 35,69 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 5,58 |
| 353 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.) | 5909990908615 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 61,56 | 76,21 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 26,24 |
| 354 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.) | 5909990908615 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 61,56 | 76,21 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 10,16 |
| 355 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn | 1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.) | 5909990908714 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 75,28 | 96,35 | 96,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 28,91 |
| 356 | Beclometasonum | Cortare, aerozol inhalacyjny, roztwór, 250 mcg/dawk inhalacyjn | 1 zest.a 400 daw. (2x200 daw.) | 5909990908714 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 75,28 | 96,35 | 96,35 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 13,33 |
| 357 | Beclometasonum + Formoterolum | Fostex, aerozol inhalacyjny, roztwór, (0,1 mg+6 mcg) /dawk inhalacyjn | 180 daw. (1 poj.) | 5909990054152 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach | 162,00 | 190,17 | 190,17 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 4,80 |
| 358 | Benazeprilum | Lotensin, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990118816 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 18,40 | 3,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 17,87 |
| 359 | Benazeprilum | Lotensin, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990118915 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,76 | 25,38 | 7,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 21,91 |
| 360 | Benazeprilum | Lotensin, tabl. powl., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990119011 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,76 | 34,40 | 14,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 27,45 |
| 361 | Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas | Diprophos, zawiesina do wstrzykiwa , 6,43+2,63 mg/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990121625 | 2012-01-01 | 2 lata | 81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego | 29,62 | 38,94 | 38,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,33 |
| 362 | Betamethasonum | Celestone, roztwór do wstrzykiwa , 4 mg/ml | 1 amp.a 1 ml | 5909990121410 | 2012-01-01 | 2 lata | 81.1, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania pozajelitowego | 4,05 | 5,78 | 4,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,53 |
| 363 | Betaxololum | Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml | 5 ml | 5909990186518 | 2012-01-01 | 2 lata | 213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu | 12,84 | 15,14 | 4,91 | Jaskra | | 30% | 11,70 |
| 364 | Betaxololum | Betoptic S, krople do oczu, zawiesina, 2,5 mg/ml | 10 ml | 5909990186525 | 2012-01-01 | 2 lata | 213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu | 21,75 | 25,88 | 9,82 | Jaskra | | 30% | 19,01 |
| 365 | Betaxololum | Optibetol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990925513 | 2012-01-01 | 2 lata | 213.0, Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu | 6,33 | 8,18 | 4,91 | Jaskra | | 30% | 4,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|---------|-------|
| 366 | Bimatoprostum | Lumigan, krople do oczu, roztwór, 0,3 mg/ml | 1 but.a 3 ml | 5909990008469 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone | 45,36 | 57,47 | 53,85 | Jaskra | | ryczałt | 6,82 |
| 367 | Bimatoprostum + Timololum | Ganfort, krople do oczu, roztwór, 0,3+5 mg/ml | 1 but.a 3 ml | 5909990574315 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone | 51,51 | 64,06 | 53,85 | Jaskra | | ryczałt | 13,41 |
| 368 | Biperideni hydrochloridum | Akineton, tabl., 2 mg | 50 tabl. | 5909990503834 | 2012-07-01 | 2 lata | 167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden | 13,50 | 18,95 | 18,95 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 5,69 |
| 369 | Biperidenum | Akineton, tabl., 2 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990193219 | 2012-01-01 | 2 lata | 167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden | 14,04 | 19,53 | 19,53 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 5,86 |
| 370 | Biperidenum | Akineton, tabl., 2 mg | 50 tabl. | 5909990500604 | 2012-01-01 | 2 lata | 167.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - biperiden | 15,12 | 20,68 | 19,53 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 7,01 |
| 371 | Bisoprololum | Bisoratio 10, tabl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991015114 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,15 | 10,26 | 5,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 8,06 |
| 372 | Bisoprololum | Bisoratio 5, tabl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991015015 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 5,08 | 6,22 | 2,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 6,22 |
| 373 | Bisoprololum | Coronal 10, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990633852 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 7,42 | 9,48 | 5,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 7,28 |
| 374 | Bisoprololum | Coronal 5, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990633791 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 5,08 | 6,22 | 2,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 6,22 |
| 375 | Brimonidinum | Alphagan, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml | 5 ml | 5909990865024 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 27,00 | 35,55 | 34,39 | Jaskra | | ryczałt | 4,36 |
| 376 | Brimonidinum | Biprolast, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990874194 | 2012-03-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 22,68 | 30,93 | 30,93 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 377 | Brimonidinum | Brimoteva, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml | 1 but. a 5 ml | 5909990727063 | 2012-05-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 22,68 | 30,93 | 30,93 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 378 | Brimonidinum | Luxfen, krople do oczu, roztwór, 2 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990677733 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 23,92 | 32,25 | 32,25 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 379 | Brimonidinum + Timololum | Combigan, krople do oczu, roztwór złożony, 2+5 mg/ml | 5 ml | 5909990570546 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 32,55 | 41,49 | 34,39 | Jaskra | | ryczałt | 10,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|--------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 380 | Brinzolamidum | Azopt, krople do oczu, zawiesina, 10 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990869114 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zlo one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 37,13 | 46,39 | 34,39 | Jaskra | | ryczałt | 15,20 |
| 381 | Bromocriptinum | Bromergon, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990173013 | 2012-01-01 | 2 lata | 62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna | 14,58 | 20,21 | 20,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 382 | Bromocriptinum | Bromocorn, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990211913 | 2012-01-01 | 2 lata | 62.0, Leki ginekologiczne - inhibitory wydzielania prolaktyny - bromokryptyna | 12,30 | 17,78 | 17,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 383 | Budesonidum | Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem) | 5909990335169 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 58,58 | 73,03 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 23,06 |
| 384 | Budesonidum | Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem) | 5909990335169 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 58,58 | 73,03 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,98 |
| 385 | Budesonidum | Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.) | 5909990335176 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 60,48 | 75,06 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 25,09 |
| 386 | Budesonidum | Budair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.) | 5909990335176 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 60,48 | 75,06 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 9,01 |
| 387 | Budesonidum | Entocort, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg | 100 kaps. | 5909990430314 | 2012-01-01 | 2 lata | 11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid | 246,24 | 282,56 | 282,56 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,56 |
| 388 | Budesonidum | Entocort, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg | 100 kaps. | 5909990430314 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid | 246,24 | 282,56 | 282,56 | Choroba Le niowskiego-Crohna | Choroba Le niowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku ycia; Posta jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi | ryczałt | 3,56 |
| 389 | Budesonidum | Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990926213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 19,19 | 25,54 | 21,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 10,55 |
| 390 | Budesonidum | Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990926213 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 19,19 | 25,54 | 21,42 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 7,32 |
| 391 | Budesonidum | Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990926312 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 32,78 | 42,83 | 42,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 12,85 |
| 392 | Budesonidum | Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990926312 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 32,78 | 42,83 | 42,83 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-----------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|-------|---|------------------------------------|---------|-------|
| 393 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 100, proszek do inhalacji, 100 mcg | 1 poj.a 200 daw. (zest. startowy) | 5909990337354 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 42,12 | 51,95 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 26,97 |
| 394 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 100, proszek do inhalacji, 100 mcg | 1 poj.a 200 daw. (zest. startowy) | 5909990337354 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 42,12 | 51,95 | 35,69 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 19,46 |
| 395 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 200, proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (zest. startowy) | 5909990337323 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 63,72 | 78,53 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 28,56 |
| 396 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 200, proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (zest. startowy) | 5909990337323 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 63,72 | 78,53 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 12,48 |
| 397 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 400, proszek do inhalacji, 400 mcg | 1 poj.a 100 daw. (zest. startowy) | 5909990337286 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 51,84 | 65,81 | 65,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 19,74 |
| 398 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 400, proszek do inhalacji, 400 mcg | 1 poj.a 100 daw. (zest. startowy) | 5909990337286 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 51,84 | 65,81 | 65,81 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 5,33 |
| 399 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach | 72,34 | 89,64 | 89,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 400 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445615 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach | 72,34 | 89,64 | 89,64 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 401 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445714 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w rednich dawkach | 72,90 | 90,30 | 90,30 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 402 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445714 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w rednich dawkach | 72,90 | 90,30 | 90,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 403 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445813 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach | 94,85 | 113,85 | 90,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 50,19 |
| 404 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445813 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach | 94,85 | 113,85 | 90,94 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 26,11 |
| 405 | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 200 daw. | 5909990677313 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 35,89 | 45,29 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 20,31 |
| 406 | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 200 daw. | 5909990677313 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 35,89 | 45,29 | 35,69 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 12,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|------------------------------------|---------|-------|
| 407 | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 100 daw. | 5909990677412 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 32,25 | 41,39 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 16,41 |
| 408 | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 100 daw. | 5909990677412 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 32,25 | 41,39 | 35,69 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 8,90 |
| 409 | Budesonidum | Ribuspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj. (z ustnik.) | 5909990335183 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 58,58 | 73,03 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 23,06 |
| 410 | Budesonidum | Ribuspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj. (z ustnik.) | 5909990335183 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 58,58 | 73,03 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,98 |
| 411 | Budesonidum | Ribuspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj. (z komor inhal.) | 5909990335190 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 60,48 | 75,06 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 25,09 |
| 412 | Budesonidum | Ribuspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj. (z komor inhal.) | 5909990335190 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 60,48 | 75,06 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 9,01 |
| 413 | Budesonidum | Tafen Nasal, aerozol do nosa, zawiesina, 0,05 mg/dawk | 1 poj.a 200 daw. | 5909990849611 | 2012-01-01 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 9,99 | 14,33 | 14,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,17 |
| 414 | Budesonidum | Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer) | 5909991033224 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 64,26 | 79,11 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 29,14 |
| 415 | Budesonidum | Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer) | 5909991033224 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 64,26 | 79,11 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 13,06 |
| 416 | Budesonidum | Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. | 5909991033248 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 61,02 | 75,63 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 25,66 |
| 417 | Budesonidum | Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. | 5909991033248 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 61,02 | 75,63 | 71,38 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 9,58 |
| 418 | Budesonidum + Formoterolum | Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 80+4,5 mcg + mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 60 daw. | 5909990882014, 5909990872886 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach | 62,87 | 78,03 | 72,11 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 9,12 |
| 419 | Budesonidum + Formoterolum | Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 160+4,5 mcg + mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 60 daw. | 5909990882113, 5909990873029 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w średnich dawkach | 73,80 | 89,25 | 63,39 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 29,06 |
| 420 | Budesonidum + Formoterolum | Symbicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 320+9 mcg + mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 60 daw. | 5909991079314, 5909990873241 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach | 147,59 | 174,20 | 172,00 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 5,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|-----------|-------|
| 421 | Buprenorphinum | Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,2 mg | 60 tabl. (fiol.) | 5909990351718 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego | 27,32 | 36,11 | 36,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,83 |
| 422 | Buprenorphinum | Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,2 mg | 60 tabl. (fiol.) | 5909990351718 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego | 27,32 | 36,11 | 36,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 423 | Buprenorphinum | Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,4 mg | 30 tabl. (fiol.) | 5909990351817 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego | 27,32 | 36,11 | 36,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,83 |
| 424 | Buprenorphinum | Bunondol, tabl. podj zykowe, 0,4 mg | 30 tabl. (fiol.) | 5909990351817 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania podj zykowego | 27,32 | 36,11 | 36,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 425 | Buprenorphinum | Transec 35 g/h, system transdermalny, 20 mg | 5 szt. | 5909990966127 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 68,20 | 84,76 | 84,76 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 426 | Buprenorphinum | Transec 35 g/h, system transdermalny, 20 mg | 5 szt. | 5909990966127 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 68,20 | 84,76 | 84,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 427 | Buprenorphinum | Transec 52,5 g/h, system transdermalny, 30 mg | 5 szt. | 5909990966226 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 104,12 | 125,39 | 125,39 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 428 | Buprenorphinum | Transec 52,5 g/h, system transdermalny, 30 mg | 5 szt. | 5909990966226 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 104,12 | 125,39 | 125,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 429 | Buprenorphinum | Transec 70 g/h, system transdermalny, 40 mg | 5 szt. | 5909990966325 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 140,49 | 166,12 | 166,12 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 430 | Buprenorphinum | Transec 70 g/h, system transdermalny, 40 mg | 5 szt. | 5909990966325 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 140,49 | 166,12 | 166,12 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 431 | Buspironum | Spamilan, tabl. , 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990073597 | 2012-01-01 | 2 lata | 182.0, Leki przeciwl kowe - buspiron | 18,25 | 24,26 | 19,86 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 10,36 |
| 432 | Buspironum | Spamilan, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990073603 | 2012-01-01 | 2 lata | 182.0, Leki przeciwl kowe - buspiron | 30,24 | 39,71 | 39,71 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 11,91 |
| 433 | Calcifediolum | Devisol-25, krople doustne, 150 mcg/ml | 10 ml | 5909990227211 | 2012-01-01 | 2 lata | 18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalciferol i kalcyfediol | 10,13 | 12,51 | 5,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,88 |
| 434 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 30 mg | 5 amp.a 3 ml | 5909990356515 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego | 40,10 | 52,40 | 52,40 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 435 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg | 5 amp.a 10 ml | 5909990356522 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego | 102,60 | 126,44 | 126,44 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 436 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwa , 200 mg | 1 fiol. po 20 ml | 5909990356546 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego | 41,90 | 55,99 | 55,99 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 437 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, kaps. twarde, 15 mg | 20 kaps. | 5909990356713 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.1, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania doustnego | 21,60 | 29,08 | 29,08 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 438 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 10 fiol. | 5909990123421 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego | 69,12 | 81,45 | 38,34 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 43,11 |
| 439 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 25 mg | 10 fiol. | 5909990123520 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego | 77,76 | 95,86 | 95,86 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|--------|--|--|-----------|-------|
| 440 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. po 50 ml | 5909991117566 | 2012-01-01 | 2 lata | 215.2, Kwas folinowy i jego sole - postacie do stosowania pozajelitowego | 90,72 | 113,73 | 113,73 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 441 | Calcitoninum | Calcitonin 100 Jelfa, płyn do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990808410 | 2012-01-01 | 2 lata | 86.0, Leki wpływające na gospodark wapniow - kalcytonina | 20,52 | 27,75 | 27,75 | Osteoporoza | | 30% | 8,33 |
| 442 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 8 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990430017 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 21,17 | 25,06 | 7,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,50 |
| 443 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 8 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990430024 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 40,48 | 47,35 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 36,24 |
| 444 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 16 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990430116 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 20,12 | 25,58 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 14,47 |
| 445 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 16 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990430123 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 40,24 | 49,37 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 27,15 |
| 446 | Candesartanum | Karbis, tabl. , 8 mg | 28 tabl. | 5909990772162 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 21,60 | 27,15 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,04 |
| 447 | Candesartanum | Karbis, tabl. , 16 mg | 28 tabl. | 5909990772193 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 29,16 | 37,51 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 15,29 |
| 448 | Candesartanum cilexetilum | Ranacand, tabl., 16 mg | 28 tabl. | 5909990801350 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 24,84 | 32,89 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,67 |
| 449 | Candesartanum cilexetilum | Ranacand, tabl., 8 mg | 28 tabl. | 5909990801367 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 14,57 | 19,64 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,53 |
| 450 | Candesartanum cilexetilum + Hydrochlorothiazidum | Karbicombi, tabl. , 16+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990865178 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anagatoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 29,16 | 37,51 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 15,29 |
| 451 | Captoprilum | Captopril Polfarmex, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990495238 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 2,53 | 3,57 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,57 |
| 452 | Captoprilum | Captopril Polfarmex, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990495337 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 4,97 | 7,04 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,25 |
| 453 | Captoprilum | Captopril Polfarmex, tabl. , 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990830817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 1,87 | 2,43 | 1,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 2,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----------|------|
| 454 | Carbamazepinum | Amizepin, tabl. , 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990043910 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 14,59 | 10,54 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 4,05 |
| 455 | Carbamazepinum | Amizepin, tabl. , 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990043910 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 14,59 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 7,25 |
| 456 | Carbamazepinum | Finlepsin, tabl. , 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991014117 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,10 | 10,54 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,56 |
| 457 | Carbamazepinum | Finlepsin, tabl. , 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991014117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,10 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,76 |
| 458 | Carbamazepinum | Finlepsin 200 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991030315 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,10 | 10,54 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,56 |
| 459 | Carbamazepinum | Finlepsin 200 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991030315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,10 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,76 |
| 460 | Carbamazepinum | Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991014216 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 11,80 | 16,15 | 12,64 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----------|------|
| 461 | Carbamazepinum | Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 400 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991014216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 11,80 | 16,15 | 12,64 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,71 |
| 462 | Carbamazepinum | Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 400 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991014223 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 20,43 | 26,74 | 21,07 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 5,67 |
| 463 | Carbamazepinum | Finlepsin 400 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 400 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991014223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 20,43 | 26,74 | 21,07 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 8,87 |
| 464 | Carbamazepinum | Neurotop retard 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990244515 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,96 | 17,90 | 15,81 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 2,09 |
| 465 | Carbamazepinum | Neurotop retard 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990244515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,96 | 17,90 | 15,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 5,29 |
| 466 | Carbamazepinum | Neurotop retard 600, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 600 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990244614 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 23,65 | 31,61 | 31,61 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|--|-----------|------|
| 467 | Carbamazepinum | Neurotop retard 600, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 600 mg | 50 tabl. (5 blist. po 10 szt.) | 5909990244614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 23,65 | 31,61 | 31,61 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr. bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 468 | Carbamazepinum | Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml | 100 ml | 5909990341917 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 6,83 | 9,83 | 8,69 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 1,14 |
| 469 | Carbamazepinum | Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml | 100 ml | 5909990341917 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 6,83 | 9,83 | 8,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr. bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 4,34 |
| 470 | Carbamazepinum | Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml | 250 ml | 5909990341924 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 15,76 | 21,73 | 21,73 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 471 | Carbamazepinum | Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml | 250 ml | 5909990341924 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 15,76 | 21,73 | 21,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr. bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 472 | Carbamazepinum | Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. | 5909990120215 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 11,99 | 15,86 | 10,54 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 5,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|----------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----------|------|
| 473 | Carbamazepinum | Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. | 5909990120215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 11,99 | 15,86 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 8,52 |
| 474 | Carbamazepinum | Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg | 30 tabl. | 5909990120116 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,12 | 16,50 | 12,64 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,86 |
| 475 | Carbamazepinum | Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg | 30 tabl. | 5909990120116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,12 | 16,50 | 12,64 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 7,06 |
| 476 | Carbamazepinum | Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg | 50 tabl. | 5909990751013 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,64 | 11,64 | 7,90 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,74 |
| 477 | Carbamazepinum | Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg | 50 tabl. | 5909990751013 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,64 | 11,64 | 7,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,94 |
| 478 | Carbamazepinum | Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg | 50 tabl. | 5909990751211 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 13,18 | 18,14 | 15,81 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 2,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|-----------|-------|
| 479 | Carbamazepinum | Timonil 300 retard, tabl., 300 mg | 50 tabl. | 5909990751211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 13,18 | 18,14 | 15,81 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 5,53 |
| 480 | Carbamazepinum | Timonil 600 retard, tabl., 600 mg | 50 tabl. | 5909990751310 | 2012-01-01 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,27 | 32,27 | 31,61 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,66 |
| 481 | Carbamazepinum | Timonil 600 retard, tabl., 600 mg | 50 tabl. | 5909990751310 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,27 | 32,27 | 31,61 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 3,86 |
| 482 | Carbocisteinum | Mukolina, syrop, 50 mg/ml | 120 ml | 5909990032211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina | 4,42 | 6,62 | 6,62 | Mukowiscydoza , Pierwotna dyskineza rz sek | Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 1,99 |
| 483 | Carvedilolum | Atram 12,5, tabl., 12,5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990570430 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,42 | 9,52 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 8,26 |
| 484 | Carvedilolum | Atram 25, tabl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570409 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 10,80 | 12,58 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,06 |
| 485 | Carvedilolum | Atram 6,25, tabl., 6,25 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990570454 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,80 | 7,53 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,90 |
| 486 | Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074051 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,80 | 7,53 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,90 |
| 487 | Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074099 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,96 | 10,10 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 8,84 |
| 488 | Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074129 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 11,56 | 13,39 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|------|---|--|-----|-------|
| 489 | Carvedilolum | Carvedigamma 12,5 mg, tabl. powł., 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990419654 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,64 | 9,76 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 8,50 |
| 490 | Carvedilolum | Carvedigamma 25 mg, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990419609 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 11,12 | 12,93 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,41 |
| 491 | Carvedilolum | Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powł., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990419685 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,37 | 7,07 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,44 |
| 492 | Carvedilolum | Carvedilol Teva, tabl. , 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338788 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,37 | 7,07 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,44 |
| 493 | Carvedilolum | Carvedilol Teva, tabl. , 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338856 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 7,80 | 8,86 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 7,60 |
| 494 | Carvedilolum | Carvedilol Teva, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338931 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,76 | 10,40 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 7,88 |
| 495 | Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl. powł., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990727100 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,43 | 7,13 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,50 |
| 496 | Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl. powł., 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990727148 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,32 | 9,41 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 8,15 |
| 497 | Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990727193 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 10,82 | 12,61 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,09 |
| 498 | Carvedilolum | Carvetrend, tabl. , 3,125 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991016814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,31 | 9,02 | 0,45 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,71 |
| 499 | Carvedilolum | Carvetrend, tabl. , 6,25 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991016913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 9,34 | 10,24 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,61 |
| 500 | Carvedilolum | Carvetrend, tabl. , 12,5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991017019 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 10,37 | 11,62 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,36 |
| 501 | Carvedilolum | Carvetrend, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909991017118 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 12,45 | 14,34 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 11,82 |
| 502 | Carvedilolum | Coryol , tabl. , 6,25 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990983315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,54 | 16,89 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 503 | Carvedilolum | Coryol 12,5, tabl. , 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990216505 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 17,73 | 19,48 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 18,22 |
| 504 | Carvedilolum | Coryol 25, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909990216567 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 20,60 | 23,07 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 20,55 |
| 505 | Carvedilolum | Coryol 3,125, tabl. , 3,125 mg | 30 tabl. | 5909990216604 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 11,80 | 12,75 | 0,45 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 12,44 |
| 506 | Carvedilolum | Dilatrend, tabl. , 6,25 mg | 30 tabl. | 5909990716111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,82 | 17,19 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,56 |
| 507 | Carvedilolum | Dilatrend, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909990717613 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 20,90 | 23,38 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 20,86 |
| 508 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. | 5909990048465 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,85 | 7,59 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,96 |
| 509 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg | 100 tabl. | 5909990048472 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 22,81 | 25,26 | 3,00 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 23,16 |
| 510 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990048489 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,99 | 10,14 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 8,88 |
| 511 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 12,5 mg | 100 tabl. | 5909990048496 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 29,96 | 33,78 | 6,00 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 29,58 |
| 512 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. | 5909990048502 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 11,56 | 13,39 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,87 |
| 513 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 25 mg | 100 tabl. | 5909990048540 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 38,51 | 44,29 | 12,00 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 35,89 |
| 514 | Carvedilolum | Symtrend, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074662 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 11,23 | 13,05 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 10,53 |
| 515 | Carvedilolum | Symtrend, tabl. powl., 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074754 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 7,56 | 8,60 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 7,34 |
| 516 | Carvedilolum | Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074792 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,80 | 7,53 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,90 |
| 517 | Carvedilolum | Vivacor, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990687862 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 19,85 | 22,27 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 19,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 518 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 25 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990687879 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 39,70 | 44,52 | 7,20 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 39,48 |
| 519 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990687886 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,03 | 16,34 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 15,71 |
| 520 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 6,25 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990687893 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 30,07 | 32,69 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 31,43 |
| 521 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990687909 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 17,18 | 18,90 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 17,64 |
| 522 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 12,5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990687930 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 34,37 | 37,81 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 35,29 |
| 523 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 12,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990789924 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 17,18 | 18,90 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 17,64 |
| 524 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 12,5 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990789931 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 34,37 | 37,81 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 35,29 |
| 525 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 25 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990790029 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 19,85 | 22,27 | 3,60 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 19,75 |
| 526 | Carvedilolum | Vivacor, tabl., 25 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990790036 | 2012-01-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 39,70 | 44,52 | 7,20 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | | 30% | 39,48 |
| 527 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml | 75 ml (47,6 g) | 5909990137411 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 15,95 | 20,83 | 13,89 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,89 |
| 528 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml | 100 ml (63,47 g) | 5909990137428 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 20,89 | 26,85 | 18,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,59 |
| 529 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 75 ml (47,6 g) | 5909990137510 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 32,32 | 40,46 | 27,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 26,57 |
| 530 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml (63,47 g) | 5909990137527 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 37,92 | 47,57 | 37,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 29,05 |
| 531 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml | 75 ml (47,6 g) | 5909990775910 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 39,93 | 50,30 | 41,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 29,46 |
| 532 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporz dzania zawiesiny doustnej, 375/5 mg/ml | 100 ml (63,47 g) | 5909990775927 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 47,79 | 60,14 | 55,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 32,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|----------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 533 | Cefaclorum | Ceclor, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 250/5 mg/ml | 63,47g granulatu/100ml zawiesiny | 5909997207827 | 2012-07-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 27,00 | 35,90 | 35,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 17,95 |
| 534 | Cefaclorum | Ceclor Mr, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 375 mg | 10 tabl. (blis.) | 5909990676514 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 24,76 | 30,51 | 15,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 22,82 |
| 535 | Cefaclorum | Ceclor Mr, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 10 tabl. (blis.) | 5909990676613 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 26,38 | 33,08 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 22,82 |
| 536 | Cefaclorum | Ceclor Mr, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 14 tabl. (blis.) | 5909990676620 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 36,95 | 45,56 | 28,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 31,20 |
| 537 | Cefaclorum | Ceclor Mr, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 750 mg | 10 tabl. (blis.) | 5909990676712 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 44,22 | 53,58 | 30,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 38,19 |
| 538 | Cefaclorum | Vercef, kaps., 500 mg | 15 kaps. (blis.) | 5909990453511 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,00 | 35,16 | 30,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,77 |
| 539 | Cefaclorum | Vercef, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 75 ml (37,5 g) | 5909990453610 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 30,24 | 38,24 | 27,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 24,35 |
| 540 | Cefaclorum | Vercef, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml (50 g) | 5909990453627 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 30,24 | 39,36 | 37,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 20,84 |
| 541 | Cefaclorum | Vercef, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml | 75 ml (37,5 g) | 5909990732111 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 14,58 | 19,35 | 13,89 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 12,41 |
| 542 | Cefaclorum | Vercef, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 125/5 mg/ml | 100 ml (50 g) | 5909990732128 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 14,58 | 20,10 | 18,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 10,84 |
| 543 | Cefadroxilum | Biodroxil, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,25 g/5ml | 60 ml (45 g) | 5909990780211 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 7,72 | 11,46 | 11,12 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 5,90 |
| 544 | Cefadroxilum | Biodroxil, granulaty do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,5 g/5ml | 60 ml (45 g) | 5909990780310 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 12,42 | 18,40 | 18,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 9,20 |
| 545 | Cefadroxilum | Biodroxil, kaps., 0,5 g | 12 kaps. | 5909990780419 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,88 | 16,22 | 12,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 10,07 |
| 546 | Cefadroxilum | Biodroxil, tabl. powł., 1 g | 12 tabl. | 5909990780518 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,31 | 26,18 | 24,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,87 |
| 547 | Cefadroxilum | Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 60 ml | 5909990050819 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 9,67 | 13,55 | 11,12 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 7,99 |
| 548 | Cefadroxilum | Duracef, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml | 5909990050826 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 18,86 | 24,69 | 18,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 549 | Cefadroxilum | Duracef, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml | 60 ml | 5909990050918 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 16,61 | 22,87 | 22,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,76 |
| 550 | Cefadroxilum | Duracef, proszek do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 500 mg/5ml | 100 ml | 5909990050925 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 29,25 | 38,31 | 37,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,79 |
| 551 | Cefadroxilum | Duracef, kaps., 500 1mg | 12 kaps. | 5909990051113 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,87 | 19,42 | 12,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,27 |
| 552 | Cefadroxilum | Duracef, kaps., 500 1mg | 20 kaps. | 5909990051120 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,37 | 34,14 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 23,88 |
| 553 | Cefadroxilum | Duracef, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 1 1g | 10 tabl. | 5909990764617 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 23,60 | 30,10 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,84 |
| 554 | Cefalexinum | Cefaleksyna TZF, kaps. twarde, 500 mg | 16 kaps. (1 blist.po 16 szt.) | 5909990657216 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,85 | 24,35 | 16,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 16,14 |
| 555 | Cefalexinum | Keflex, kaps., 250 mg | 12 kaps. | 5909990070213 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 7,02 | 9,52 | 6,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,44 |
| 556 | Cefalexinum | Keflex, kaps., 500 mg | 12 kaps. | 5909990070312 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,58 | 19,11 | 12,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,96 |
| 557 | Cefalexinum | Keflex, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 60 ml (38,1g granulatu) | 5909990070411 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 13,50 | 17,65 | 11,12 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,09 |
| 558 | Cefuroximium | Biofuroksym, proszek do sporz. dziania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwa, 750 mg | 1 fiol.a 17 ml | 5909990059416 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 5,71 | 8,15 | 5,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,26 |
| 559 | Cefuroximium | Biofuroksym, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 1500 mg | 1 fiol.a 26 ml | 5909990059515 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 10,51 | 14,80 | 11,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,01 |
| 560 | Cefuroximium | Biofuroksym, proszek do sporz. dziania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwa, 250 mg | 1 fiol.a 10 ml | 5909990806812 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 3,38 | 4,30 | 1,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,34 |
| 561 | Cefuroximium | Biofuroksym, proszek do sporz. dziania roztworu lub zawiesiny do wstrzykiwa, 500 mg | 1 fiol.a 17 ml | 5909990806911 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 5,00 | 6,71 | 3,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,78 |
| 562 | Cefuroximium | Bioracef, tabl. powl., 500 mg | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990063697 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 33,48 | 43,35 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 22,83 |
| 563 | Cefuroximium | Bioracef, tabl. powl., 500 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990063703 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 46,44 | 58,88 | 57,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 30,15 |
| 564 | Cefuroximium | Bioracef, tabl. powl., 125 mg | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990063727 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,26 | 18,27 | 10,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 565 | Cefuroxim | Bioracef, tabl. powl., 125 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990063734 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,28 | 22,34 | 14,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 15,16 |
| 566 | Cefuroxim | Bioracef, tabl. powl., 250 mg | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990063840 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 25,60 | 32,24 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,98 |
| 567 | Cefuroxim | Bioracef, tabl. powl., 250 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990063857 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,32 | 39,53 | 28,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 25,17 |
| 568 | Cefuroxim | Ceroxim, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 50 ml (46,2 g) (pr.) | 5909991009113 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 27,35 | 36,26 | 36,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,13 |
| 569 | Cefuroxim | Ceroxim, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml (88,2 g) (prosz.) | 5909991009120 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 55,30 | 69,68 | 69,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 34,84 |
| 570 | Cefuroxim | Ceroxim, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 50 ml (46,2 g) (pr.) | 5909991009212 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 15,18 | 20,75 | 18,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,49 |
| 571 | Cefuroxim | Ceroxim, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 100 ml (88,2 g) (prosz.) | 5909991009229 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 27,35 | 36,26 | 36,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,13 |
| 572 | Cefuroxim | Ceroxim, tabl. , 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991010614 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,85 | 25,03 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,77 |
| 573 | Cefuroxim | Ceroxim, tabl. , 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991010621 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 38,31 | 48,51 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 27,99 |
| 574 | Cefuroxim | Ceroxim, tabl. , 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991012519 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,97 | 41,74 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,22 |
| 575 | Cefuroxim | Ceroxim, tabl. , 500 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991012526 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 66,20 | 82,03 | 82,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 41,02 |
| 576 | Cefuroxim | Novocef, tabl. powl., 250 mg | 10 tabl. | 5909991033811 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,79 | 24,96 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,70 |
| 577 | Cefuroxim | Novocef, tabl. powl., 500 mg | 10 tabl. | 5909991034016 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,86 | 41,61 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,09 |
| 578 | Cefuroxim | Tarsime, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 1500 mg | 1 fiol.a 20 ml | 5909990442812 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 6,67 | 10,68 | 10,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,34 |
| 579 | Cefuroxim | Tarsime, proszek do sporz dzania roztworu / zawiesiny do wstrzykiwa , 750 mg | 1 fiol.a 20 ml | 5909990442911 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 3,41 | 5,68 | 5,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 2,84 |
| 580 | Cefuroxim | Xorimax 125, tabl. dra owane, 125 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990224890 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 14,57 | 10,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|--------|--------|--|----|-----|-------|
| 581 | Cefuroximium | Xorimax 250, tabl. dra owane, 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990224951 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,36 | 24,50 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,24 |
| 582 | Cefuroximium | Xorimax 500, tabl. dra owane, 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990224456 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,32 | 41,04 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 20,52 |
| 583 | Cefuroximium | Zamur 250, tabl. powl., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990216383 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,79 | 24,96 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,70 |
| 584 | Cefuroximium | Zamur 500, tabl. powl., 500 mg | 10 tabl. | 5909990216390 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,32 | 41,04 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 20,52 |
| 585 | Cefuroximium | Zinacef, proszek do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa lub roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 750 mg | 10 fiol. | 5909990069828 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 48,60 | 61,61 | 57,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 32,64 |
| 586 | Cefuroximium | Zinacef, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 1500 mg | 10 fiol. | 5909990069927 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.1, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania pozajelitowego | 95,58 | 115,88 | 115,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 57,94 |
| 587 | Cefuroximium | Zinnat, granulac do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 50 ml (42,20g granulatu) | 5909990051335 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 15,12 | 20,68 | 18,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,42 |
| 588 | Cefuroximium | Zinnat, granulac do sporz dzania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 100 ml (84,40g granulatu) | 5909990051342 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 28,08 | 37,05 | 37,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,53 |
| 589 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powl., 125 mg | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990083213 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,12 | 19,19 | 10,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,06 |
| 590 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powl., 250 mg | 10 tabl. | 5909990083312 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 26,46 | 33,16 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 22,90 |
| 591 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 tabl. | 5909990083411 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 38,88 | 49,13 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 28,61 |
| 592 | Cefuroximium | Zinnat, granulac do sporz dzania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 50 ml (39,98 g granulatu) | 5909990468812 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.3, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 28,08 | 37,05 | 37,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,53 |
| 593 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 tabl. | 5909997196077 | 2012-03-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,21 | 40,92 | 40,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 20,46 |
| 594 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powl., 250 mg | 10 tabl. | 5909997196350 | 2012-03-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,64 | 21,58 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,32 |
| 595 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powl., 500 mg | 10 tabl. | 5909997198378 | 2012-07-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,10 | 40,80 | 40,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 20,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 596 | Cefuroximium | Zinnat, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. | 5909997198606 | 2012-07-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,61 | 21,55 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 11,29 |
| 597 | Cefuroximium | Zinnox, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. | 5909990652907 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,20 | 22,19 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 11,93 |
| 598 | Cefuroximium | Zinnox, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. | 5909990652969 | 2012-01-01 | 2 lata | 90.2, Antybiotyki cefalosporynowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 28,08 | 37,57 | 37,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 18,79 |
| 599 | Cetirizini dihydrochloridum | Alermed, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990910793 | 2012-07-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 15,37 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,61 |
| 600 | Cetirizinum | Alermed, tabl. powł., 10 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991075224 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 7,24 | 10,56 | 10,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,39 |
| 601 | Cetirizinum | Allertec, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990569441 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 15,37 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,61 |
| 602 | Cetirizinum | Allertec, syrop, 5 mg/5 ml | 1 but.a 100 ml | 5909990851119 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 10,08 | 13,45 | 9,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 6,88 |
| 603 | Cetirizinum | Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml | 10 ml w but. z kroplomierzem | 5909991103811 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 6,84 | 9,98 | 9,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,41 |
| 604 | Cetirizinum | Allertec, krople doustne, roztwór, 10 mg/ml | 20 ml w but. z kroplomierzem | 5909991103835 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 12,14 | 17,37 | 17,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,21 |
| 605 | Cetirizinum | Amertil, roztwor doustny, 1 mg/ml | 200 ml (but.) | 5909990215393 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 16,20 | 21,71 | 18,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,56 |
| 606 | Cetirizinum | Amertil, tabl. powł., 10 mg | 20 tabl. | 5909990410729 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,48 | 9,74 | 9,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 2,92 |
| 607 | Cetirizinum | Amertil, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990410736 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 15,37 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,61 |
| 608 | Cetirizinum | CetAlergin, syrop, 1 mg/ml | 75 ml | 5909990857012 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 7,99 | 10,67 | 7,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,74 |
| 609 | Cetirizinum | CetAlergin, syrop, 1 mg/ml | 150 ml | 5909990857029 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 14,90 | 19,60 | 14,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,74 |
| 610 | Cetirizinum | CetAlergin, krople, 10 mg/ml | 10 ml | 5909990857111 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 8,21 | 11,44 | 9,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,87 |
| 611 | Cetirizinum | CetAlergin, tabl. powł., 10 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990872626 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 7,78 | 11,13 | 10,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|---------------------------|-----------|-------|
| 612 | Cetirizinum | Cetigran, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990044559 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,72 | 14,06 | 14,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,22 |
| 613 | Cetirizinum | Letizen, tabl. powł., 10 mg | 20 tabl. | 5909990869725 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 7,37 | 10,70 | 10,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,53 |
| 614 | Cetirizinum | Zyrtec, tabl. powł., 10 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990184620 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,42 | 13,96 | 10,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,79 |
| 615 | Cetirizinum | Zyrtec, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990184637 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,20 | 21,15 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,39 |
| 616 | Cetirizinum | Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml | 10 ml | 5909990184712 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 7,50 | 10,70 | 9,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,13 |
| 617 | Cetirizinum | Zyrtec, krople doustne, 10 mg/ml | 20 ml | 5909990184736 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 13,46 | 18,78 | 18,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,63 |
| 618 | Cetirizinum | Zyrtec, roztwór do stosowania doustnego, 1 mg/ml | 75 ml | 5909990781515 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 9,16 | 11,92 | 7,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,99 |
| 619 | Chloroquinum | Arechin, tabl. , 250 mg | 30 tabl. | 5909990061914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina | 14,58 | 20,21 | 20,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | 30% | 6,06 |
| 620 | Chlorpromazinum | Fenactil, krople doustne, roztwór, 40 mg/g | 10 g | 5909990274314 | 2012-01-01 | 2 lata | 172.2, Leki przeciwpsychotyczne -chloropromazyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 2,95 | 4,43 | 4,43 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 621 | Chlorprothixenum | Chlorprothixen Zentiva, tabl. powł., 15 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990203017 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,42 | 8,41 | 5,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,87 |
| 622 | Chlorprothixenum | Chlorprothixen Zentiva, tabl. powł., 15 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990203017 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,42 | 8,41 | 5,06 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | ryczałt | 6,55 |
| 623 | Chlorprothixenum | Chlorprothixen Zentiva, tabl. powł., 50 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990203116 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,97 | 16,87 | 16,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,06 |
| 624 | Chlorprothixenum | Chlorprothixen Zentiva, tabl. powł., 50 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990203116 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.3, Leki przeciwpsychotyczne - chlorprotyksen do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,97 | 16,87 | 16,87 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | ryczałt | 3,20 |
| 625 | Chlorquinaldolum | Chlorchinaldin, ma , 30 mg/g | 20 g | 5909990297610 | 2012-01-01 | 2 lata | 57.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne - pochodne chinoliny - chlorchinaldol | 6,37 | 9,36 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,68 |
| 626 | Ciclesonidum | Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg | 1 poj.a 120 daw. | 5909990212064 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 136,62 | 161,69 | 161,69 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 12,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|-------|---|---|---------|-------|
| 627 | Ciclesonidum | Alvesco 160, aerozol inhalacyjny, roztwór, 160 mcg | 1 poj.a 60 daw. | 5909990218530 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 68,04 | 84,32 | 84,32 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,40 |
| 628 | Ciclesonidum | Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg | 1 poj.a 120 daw. | 5909990212057 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 118,80 | 138,63 | 85,66 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 59,37 |
| 629 | Ciclesonidum | Alvesco 80, aerozol inhalacyjny, roztwór, 80 mcg | 1 poj.a 60 daw. | 5909990218523 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 59,40 | 71,32 | 42,83 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 31,69 |
| 630 | Ciclosporinum | Cyclaid, kaps. mi kkie, 25 mg | 50 kaps. | 5909990787289 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcineuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 59,08 | 74,27 | 72,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci oporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-------------------------------|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 631 | Ciclosporinum | Cyclaid, kaps. mi kkie, 50 mg | 50 kaps. | 5909990787357 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 120,96 | 144,47 | 144,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--------------------------------|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 632 | Ciclosporinum | Cyclaid, kaps. mi kkie, 100 mg | 50 kaps. | 5909990787463 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 254,34 | 291,18 | 291,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|---|---------|------|
| 633 | Ciclosporinum | Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990946426 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 59,10 | 74,29 | 72,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 634 | Ciclosporinum | Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990946525 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 122,36 | 145,97 | 145,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 635 | Ciclosporinum | Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990946624 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 255,04 | 291,94 | 291,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 636 | Ciclosporinum | Equoral, roztwór doustny , 100 mg/ml | 50 ml | 5909990946716 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 277,61 | 316,97 | 316,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespólów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|-------|--|--|---------|-------|
| 637 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg | 50 kaps. | 5909990336616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 104,72 | 123,10 | 72,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko szyni, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 53,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 638 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg | 50 kaps. | 5909990336715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 210,86 | 240,67 | 145,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko zyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 97,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|--------|
| 639 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg | 50 kaps. | 5909990336814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 408,73 | 456,38 | 291,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 167,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|--------|
| 640 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, roztwór doustny , 100 mg/ml | 50 ml | 5909990336913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne | 398,08 | 445,88 | 316,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 132,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 641 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg | 60 kaps. | 5909990406111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,38 | 61,13 | 35,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granulanych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespólów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytozowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 29,30 |
| 642 | Cilazaprilum | Cazaprol, tabl. powł., 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990678648 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,04 | 11,42 | 2,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,42 |
| 643 | Cilazaprilum | Cazaprol, tabl. powł., 2,5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990678655 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,58 | 17,19 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 14,80 |
| 644 | Cilazaprilum | Cazaprol, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990678679 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 19,90 | 24,18 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 18,97 |
| 645 | Cilazaprilum | Cilan, tabl. powł., 0,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990066636 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,34 | 8,20 | 1,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 8,20 |
| 646 | Cilazaprilum | Cilan, tabl. powł., 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990066667 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,26 | 11,67 | 2,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,67 |
| 647 | Cilazaprilum | Cilan, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990066780 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,80 | 19,69 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 16,90 |
| 648 | Cilazaprilum | Cilan, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990066803 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 29,81 | 34,97 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 29,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 649 | Cilazaprilum | Cilapril, tabl. powł., 1 mg | 30 tabl. | 5909990811939 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 12,24 | 2,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 12,24 |
| 650 | Cilazaprilum | Cilapril, tabl. powł., 0,5 mg | 30 tabl. | 5909990812080 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,34 | 8,20 | 1,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 8,20 |
| 651 | Cilazaprilum | Cilapril, tabl. powł., 2,5 mg | 28 tabl. | 5909990812196 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,90 | 17,53 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 15,14 |
| 652 | Cilazaprilum | Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powł., 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990696857 | 2012-03-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,26 | 5,24 | 2,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 5,24 |
| 653 | Cilazaprilum | Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powł., 2,5 mg | 28 tabl. | 5909990698004 | 2012-03-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,94 | 12,23 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 9,84 |
| 654 | Cilazaprilum | Inhibestril, Cilazaprilum 123ratio, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990698356 | 2012-03-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,28 | 25,83 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 20,25 |
| 655 | Cilazaprilum + Hydrochlorothiazidum | Cazacombi, tabl. powł., 5+12,5 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990781676 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 19,90 | 22,88 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 20,49 |
| 656 | Ciprofibratum | Liponor, kaps., 100 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990376612 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty | 22,27 | 29,74 | 28,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,11 |
| 657 | Ciprofloxacinum | Ciphin 500, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990499113 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,99 | 10,88 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 6,85 |
| 658 | Ciprofloxacinum | Ciprinol, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. | 5909990066216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 13,50 | 16,78 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 12,75 |
| 659 | Ciprofloxacinum | Ciprinol, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. | 5909990066414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 8,64 | 10,46 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 8,44 |
| 660 | Ciprofloxacinum | Cipronex, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990308514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,56 | 9,31 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 7,29 |
| 661 | Ciprofloxacinum | Cipronex, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990334964 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,95 | 10,84 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 6,81 |
| 662 | Ciprofloxacinum | Cipropol, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990308712 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,83 | 9,60 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 7,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 663 | Ciprofloxacinum | Cipropol, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990729012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 11,34 | 14,46 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 10,43 |
| 664 | Ciprofloxacinum | Cyprofloksacyna 500 mg, tabl., 500 mg | 10 tabl. | 5909990338030 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,56 | 10,42 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 6,39 |
| 665 | Ciprofloxacinum | Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991033514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 5,29 | 6,88 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 4,86 |
| 666 | Ciprofloxacinum | Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991033613 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 9,18 | 12,15 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 8,12 |
| 667 | Clarithromycinum | Fromilid, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 60 ml (25 g) | 5909990059522 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 22,10 | 31,55 | 31,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,78 |
| 668 | Clarithromycinum | Fromilid, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 60 ml (25 g) | 5909990818013 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 14,47 | 20,57 | 20,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 10,29 |
| 669 | Clarithromycinum | Fromilid 250, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990773626 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,68 | 23,55 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 17,00 |
| 670 | Clarithromycinum | Fromilid 500, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990781010 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 32,40 | 40,26 | 26,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 27,16 |
| 671 | Clarithromycinum | Klabax, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990045532 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,26 | 26,20 | 26,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,10 |
| 672 | Clarithromycinum | Klabax, tabl. powł., 500 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990045549 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,51 | 36,36 | 36,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 18,18 |
| 673 | Clarithromycinum | Klabax, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) | 5909990081165 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,12 | 19,74 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,19 |
| 674 | Clarithromycinum | Klabax, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 60 ml (but.) | 5909990620647 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 12,50 | 18,48 | 18,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 9,24 |
| 675 | Clarithromycinum | Klabax, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 100 ml | 5909990620654 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 20,83 | 29,29 | 29,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 14,65 |
| 676 | Clarithromycinum | Klabax, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 60 ml (but.) | 5909990620661 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 27,53 | 37,36 | 37,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 18,68 |
| 677 | Clarithromycinum | Klabax, granulát do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml | 5909990620678 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 45,88 | 59,58 | 59,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 29,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|--|-----------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 678 | Clarithromycinum | Klabion, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blis.) | 5909990890927 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,58 | 18,30 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,62 |
| 679 | Clarithromycinum | Klabion, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (2 blis.po 5 szt.) | 5909990890934 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,58 | 18,30 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,62 |
| 680 | Clarithromycinum | Klabion, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990890965 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,52 | 25,52 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 18,97 |
| 681 | Clarithromycinum | Klabion, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (2 blis.po 5 szt.) | 5909990891030 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 21,60 | 27,56 | 18,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 18,21 |
| 682 | Clarithromycinum | Klabion, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990891061 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 33,48 | 41,41 | 26,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 28,31 |
| 683 | Clarithromycinum | Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 60 ml | 5909990331710 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 20,88 | 27,44 | 21,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 16,87 |
| 684 | Clarithromycinum | Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 125 mg/5ml | 100 ml | 5909990331727 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 34,80 | 44,24 | 35,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 26,62 |
| 685 | Clarithromycinum | Klacid, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blis.) | 5909990331819 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 24,06 | 28,44 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 23,76 |
| 686 | Clarithromycinum | Klacid, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. (1 blis.a 14 szt.) | 5909990331826 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 33,77 | 39,69 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 33,14 |
| 687 | Clarithromycinum | Klacid, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990719419 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 66,96 | 77,24 | 26,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 64,14 |
| 688 | Clarithromycinum | Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 60 ml | 5909990780624 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 33,92 | 44,18 | 42,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 23,04 |
| 689 | Clarithromycinum | Klacid, granulaty do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 250 mg/5ml | 100 ml | 5909990780631 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 56,05 | 70,47 | 70,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 35,24 |
| 690 | Clarithromycinum | Klarmin, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. | 5909991030117 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,22 | 26,16 | 26,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,08 |
| 691 | Clarithromycinum | Klarmin, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. | 5909991030223 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,12 | 19,74 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,19 |
| 692 | Clarithromycinum | Lekoklar, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990913428 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,74 | 21,47 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 14,92 |
| 693 | Clarithromycinum | Lekoklar, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990913510 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 30,78 | 38,52 | 26,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 25,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|--|------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|---------|-------|
| 694 | Clarithromycinum | Taclar, tabl. powł., 250 mg | 14 tabl. (blis.) | 5909990898114 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,90 | 19,50 | 13,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 12,95 |
| 695 | Clarithromycinum | Taclar, tabl. powł., 500 mg | 14 tabl. (blis.) | 5909991023416 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 21,38 | 28,48 | 26,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,38 |
| 696 | Clindamycinum | Clindacin, kaps. twarde, 300 mg | 16 kaps. | 5909990790319 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 13,50 | 19,35 | 19,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 9,68 |
| 697 | Clindamycinum | Clindamycin-MIP 150, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 600 mg/4ml | 5 amp.a 4 ml | 5909991003043 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.1, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego | 49,57 | 62,84 | 62,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 698 | Clindamycinum | Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg | 12 tabl. (2 blis. po 6 szt.) | 5909991001421 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 15,61 | 15,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 7,81 |
| 699 | Clindamycinum | Clindamycin-MIP 300, tabl. powł., 300 mg | 16 tabl. (2 blis. po 8 szt.) | 5909991001438 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,43 | 20,35 | 20,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 10,18 |
| 700 | Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg | 12 tabl. (2 blis. po 6 szt.) | 5909991001520 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 23,84 | 31,84 | 31,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,92 |
| 701 | Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg mg | 16 tabl. | 5909991001537 | 2012-05-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 29,24 | 38,89 | 38,89 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 19,45 |
| 702 | Clindamycinum | Clindamycin-MIP 600, tabl. powł., 600 mg | 30 tabl. (5 blis. po 6 szt.) | 5909991001544 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 61,56 | 76,75 | 76,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 38,38 |
| 703 | Clindamycinum | Dalacin C, kaps., 75 mg | 16 kaps. | 5909990071111 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,91 | 9,09 | 5,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 6,44 |
| 704 | Clindamycinum | Dalacin C, kaps., 150 mg | 16 kaps. | 5909990071210 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 8,86 | 12,53 | 10,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 7,23 |
| 705 | Clindamycinum | Dalacin C, kaps., 300 mg | 16 kaps. (2 blis. po 8 szt.) | 5909990306435 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,52 | 22,58 | 21,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 11,97 |
| 706 | Clindamycinum | Klimicin, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 300 mg/2ml | 5 amp.a 2 ml | 5909990067510 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.1, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego | 31,21 | 39,87 | 31,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,65 |
| 707 | Clindamycinum | Klimicin, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 600 mg/4ml | 5 fioł.a 4 ml | 5909990405817 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.1, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania pozajelitowego | 51,84 | 65,27 | 62,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 5,63 |
| 708 | Clindamycinum | Klimicin, kaps. twarde, 300 mg | 16 kaps. | 5909990745814 | 2012-01-01 | 2 lata | 102.2, Antibiotyki linkozamidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 13,39 | 19,23 | 19,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 9,62 |
| 709 | Clobetasolum | Clobederm, krem, 0,5 mg/g | 25 g | 5909990867714 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 8,42 | 11,50 | 9,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 6,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|----------------------------------|-----------|-------|
| 710 | Clobetasolum | Clobederm, ma , 0,5 mg/g | 25 g | 5909990867813 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 8,42 | 11,50 | 9,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,98 |
| 711 | Clobetasolum | Dermovate, krem, 0,5 mg/g | 25 g (tuba) | 5909990004713 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 8,64 | 11,74 | 9,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,22 |
| 712 | Clobetasolum | Dermovate, ma , 0,5 mg/g | 25 g (tuba) | 5909990004812 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 8,64 | 11,74 | 9,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,22 |
| 713 | Clobetasolum | Dermovate, roztwór na skór , 0,5 mg/ml | 25 ml (but.) | 5909990369911 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 8,64 | 11,74 | 9,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,22 |
| 714 | Clobetasolum | Dermovate, roztwór na skór , 0,5 mg/ml | 50 ml (but.) | 5909990369928 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 17,28 | 22,65 | 18,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 13,60 |
| 715 | Clobetasolum | Novate, krem, 0,5 mg/g | 30 g (tuba) | 5909990932023 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 7,45 | 10,86 | 10,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,43 |
| 716 | Clobetasolum | Novate, ma , 0,5 mg/g | 30 g (tuba) | 5909990932122 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o du ej sile działania | 7,45 | 10,86 | 10,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,43 |
| 717 | Clomipraminum | Anafranil, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990294916 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 6,99 | 8,95 | 4,71 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 4,24 |
| 718 | Clomipraminum | Anafranil, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990295012 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 11,01 | 15,04 | 11,77 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,27 |
| 719 | Clomipraminum | Anafranil SR 75, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990295111 | 2012-01-01 | 2 lata | 183.0, Leki przeciwdepresyjne - trójpier cieniowe | 17,17 | 23,54 | 23,54 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 720 | Clonazepamum | Clonazepamum TZF, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990135516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny | 8,10 | 11,77 | 11,77 | Padaczka | Padaczka u dzieci do 1 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 721 | Clonazepamum | Clonazepamum TZF, tabl. , 0,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990135615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny | 4,10 | 5,25 | 2,94 | Padaczka | Padaczka u dzieci do 1 roku ycia | ryczałt | 5,25 |
| 722 | Clonidinum | Iporel, tabl. , 75 mikrogramy | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990282814 | 2012-01-01 | 2 lata | 35.0, Leki antyadrenergiczne działające o rodkowo - klonidyna | 4,86 | 7,25 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,18 |
| 723 | Clopamidum | Clopamid VP, tabl. powl., 20 mg | 20 tabl. (blist.) | 5909990141012 | 2012-01-01 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 3,74 | 8,36 | 8,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 724 | Clopidogrelum | Agregex, tabl. powl., 75 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990754748 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 20,52 | 27,92 | 27,92 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 8,38 |
| 725 | Clopidogrelum | Areplex, tabl. powl., 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991167011 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 33,48 | 41,79 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 21,43 |
| 726 | Clopidogrelum | Carder, tabl. powl., 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990760244 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 23,76 | 31,39 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 11,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|-------------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 727 | Clopidogrelum | Clopidix, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990625826 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 26,24 | 34,05 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 13,69 |
| 728 | Clopidogrelum | Clopidogrel Apotex, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (PVC/PE/PVDC/Alu) | 5909990774401 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 32,48 | 40,72 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 20,36 |
| 729 | Clopidogrelum | Clopidogrel GSK, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.Alu/Alu) | 5909990768776 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 21,60 | 29,08 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 8,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 730 | Clopidogrelum | Clopidogrel Teva , tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (blist.Alu/Alu) | 5909990718245 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 24,84 | 32,55 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 12,19 |
| 731 | Clopidogrelum | Clopigamma, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. | 5909990775750 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 23,76 | 31,39 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 11,03 |
| 732 | Clopidogrelum | Clopinovo, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. | 5909990768141 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 32,94 | 41,22 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 20,86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 733 | Clopidogrelum | Egitromb, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990724536 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 42,12 | 51,04 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 30,68 |
| 734 | Clopidogrelum | Grepid, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (PVC/PVDC/alu) | 5909990727667 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 24,84 | 32,55 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 12,19 |
| 735 | Clopidogrelum | Nivenol, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990764280 | 2012-07-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 23,76 | 31,39 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 11,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 736 | Clopidogrelum | Pegorel, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. | 5909990793730 | 2012-03-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 18,90 | 26,18 | 26,18 | Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale miśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale miśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 7,85 |
| 737 | Clopidogrelum | Plavocorin, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990762729 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 23,76 | 31,39 | 29,08 | Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale miśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale miśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 11,03 |
| 738 | Clopidogrelum | Tessyron, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990764006 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 22,68 | 30,23 | 29,08 | Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale miśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale miśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 9,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 739 | Clopidogrelum | Trogran, tabl., 75 mg | 28 tabl. | 5909990762194 | 2012-03-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 24,68 | 32,37 | 29,08 | Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale miśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale miśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 12,01 |
| 740 | Clopidogrelum | Trombex, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990712793 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 30,24 | 38,32 | 29,08 | Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale miśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale miśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 17,96 |
| 741 | Clopidogrelum | Trombex, tabl. powł., 75 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990712809 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 38,19 | 47,07 | 31,16 | Miażdżycowa choroba naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale miśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale miśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 25,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-----------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|-------|---|----|-----|-------|
| 742 | Clopidogrelum | Trombex, tabl. powł., 75 mg | 90 tabl. (but.) | 5909990712830 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 106,92 | 126,33 | 93,47 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 60,90 |
| 743 | Clopidogrelum | Vixam, tabl. , 75 mg | 30 tabl. | 5909990866533 | 2012-05-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 23,76 | 31,64 | 31,16 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 9,83 |
| 744 | Clopidogrelum | Zyllt, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (blist.OPA/AL/PVC) | 5909991109219 | 2012-01-01 | 2 lata | 23.1. Doustne leki przeciwplatekcyjne - klopidogrel | 32,40 | 40,63 | 29,08 | Mia d yca objawowa naczy wie cowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniaj cymi leki (do 12 miesi cy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, Stan po zawale mi nia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesi cy stosowania, Stan po zawale mi nia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania | | 30% | 20,27 |
| 745 | Clotrimazolum | Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 500 mg | 1 tabl. (blist.) | 5909990148011 | 2012-01-01 | 2 lata | 59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym | 2,14 | 3,12 | 2,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 1,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------------|---|------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|---|-----------|-------|
| 746 | Clotrimazolum | Clotrimazolum GSK, tabl. dopochwowe, 100 mg | 6 tabl. (1 blist.po 6 szt.) | 5909990363711 | 2012-01-01 | 2 lata | 59.0. Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym | 2,33 | 3,49 | 3,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 1,75 |
| 747 | Cloxacillinum | Syntarpen, tabl. powł., 500 mg | 16 tabl. (blist.) | 5909990295715 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.6. Penicyliny półsyntetyczne doustne - kloksacylina | 26,78 | 35,45 | 35,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,73 |
| 748 | Clozapinum | Klozapol, tabl. , 25 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990139422 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.1. Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,72 | 12,90 | 9,32 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 3,58 |
| 749 | Clozapinum | Klozapol, tabl. , 100 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990139521 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.1. Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 25,81 | 34,11 | 34,11 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 750 | Colecalciferolum (vit. D3) | Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ ml | 10 ml | 5909990260218 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 18.2. Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | 2,92 | 4,37 | 4,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,20 |
| 751 | Colecalciferolum (vit. D3) | Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml | 10 ml | 5909991047818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 18.2. Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | 4,05 | 5,99 | 5,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,36 |
| 752 | Colecalciferolum (vit. D3) | Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml | 10 ml (but.) | 5909990178513 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 18.2. Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | 4,01 | 5,95 | 5,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,32 |
| 753 | Colistinum | Colistin TZF, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , infuzji lub inhalacji, 1000000 U | 20 fiol.s.subs. | 5909990366514 | 2012-01-01 | 2 lata | 106.0. Antybiotyki peptydowe - kolistyna | 135,11 | 160,30 | 160,30 | Mukowiscydoza | | ryczałt | 3,20 |
| 754 | Collagenasum | Iruxol Mono, ma , 1,2 j.m./g | 20 g | 5909990015412 | 2012-01-01 | 2 lata | 51.0. Enzymy stosowane w oczyszczeniu ran | 32,40 | 42,37 | 42,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,19 |
| 755 | Cyanocobalaminum (vit. B12) | Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwa , 100 g/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990243914 | 2012-01-01 | 2 lata | 26.0. Witamina B12 - cyjanokobalamina | 8,69 | 9,78 | 1,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,60 |
| 756 | Cyanocobalaminum (vit. B12) | Vitaminum B12 WZF, roztwór do wstrzykiwa , 500 g/ml | 5 amp.a 2 ml | 5909990244010 | 2012-01-01 | 2 lata | 26.0. Witamina B12 - cyjanokobalamina | 5,67 | 8,39 | 8,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,52 |
| 757 | Cyclophosphamidum | Endoxan, dra etki, 50 mg | 50 dra . | 5909990240814 | 2012-03-01 | 2 lata | 117.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkiluj ce - cyklofosfamid | 41,81 | 53,72 | 53,72 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 758 | Cyclophosphamidum | Endoxan, dra etki, 50 mg | 50 dra . | 5909990240814 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkiluj ce - cyklofosfamid | 41,81 | 53,72 | 53,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza; Zespół aktywacji makrofagów (MAS); Zespół hemofagocytowy (HLH); Małopłytkowo ci i anemie hemolityczne odporne na leczenie sterydami; Zespół POEMS | ryczałt | 3,20 |
| 759 | Cyproteronum | Androcur, tabl. , 50 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990657476 | 2012-01-01 | 2 lata | 71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej | 40,88 | 52,20 | 45,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 20,60 |
| 760 | Cyproteronum | Androcur, tabl. , 50 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990657483 | 2012-01-01 | 2 lata | 71.0, Hormony płciowe - antyandrogeny o budowie steroidowej | 92,88 | 112,85 | 112,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 33,86 |
| 761 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Cyprest, tabl. dra owane, 2+0,035 mg | 21 tabl. | 5909990613311 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 10,57 | 13,22 | 6,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,95 |
| 762 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Cyprest, tabl. dra owane, 2+0,035 mg | 63 tabl. | 5909990613328 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 32,91 | 39,56 | 18,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 26,78 |
| 763 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Cyprodiol, tabl. dra owane, 2+0,035 mg | 21 tabl. | 5909990080885 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 9,50 | 12,08 | 6,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,81 |
| 764 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg | 21 tabl. | 5909990222216 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 12,42 | 15,20 | 6,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,93 |
| 765 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Diane-35, tabl. powl., 2+0,035 mg | 63 tabl. | 5909990222230 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 35,32 | 42,14 | 18,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 29,36 |
| 766 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | OC-35 , tabl. powl., 2+0,035 mg | 21 tabl. (blist.) | 5909990046171 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 10,59 | 13,24 | 6,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,97 |
| 767 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | OC-35 , tabl. powl., 2+0,035 mg | 63 tabl. (3 blist.po 21 szt.) | 5909990046188 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 32,91 | 39,56 | 18,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 26,78 |
| 768 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Syndi-35, tabl. dra owane, 2+0,035 mg | 21 tabl. (blist.) | 5909990037773 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 9,86 | 12,46 | 6,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,19 |
| 769 | Cyproteronum + Ethinylestradiolum | Syndi-35, tabl. dra owane, 2+0,035 mg | 63 tabl. (3 blist.po 21 szt.) | 5909990086788 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 31,27 | 37,81 | 18,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 25,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------|--|------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|-------|---|---|---------|--------|
| 770 | Dabigatranum etexilatum | Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg | 10 kaps. (blist.) | 5909990641215 | 2012-01-01 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 72,76 | 82,64 | 18,27 | inne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna | | ryczałt | 67,57 |
| 771 | Dabigatranum etexilatum | Pradaxa, kaps. twarde, 75 mg | 30 kaps. (blist.) | 5909990641222 | 2012-01-01 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 220,42 | 245,29 | 54,81 | inne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna | | ryczałt | 193,68 |
| 772 | Dabigatranum etexilatum | Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg | 10 kaps. (blist.) | 5909990641253 | 2012-01-01 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 72,76 | 83,97 | 26,80 | inne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna | | ryczałt | 60,37 |
| 773 | Dabigatranum etexilatum | Pradaxa, kaps. twarde, 110 mg | 30 kaps. (blist.) | 5909990641260 | 2012-01-01 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 220,42 | 247,60 | 80,39 | inne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna | | ryczałt | 170,41 |
| 774 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml | 10 amp.-strz. a 0,2 ml | 5909990776412 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 44,38 | 56,82 | 53,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowo-zatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 6,43 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|---|---------|------|
| 775 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml | 10 amp.-strz.a 0,2 ml | 5909990776511 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 92,01 | 111,79 | 107,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 7,81 |
| 776 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m. (anty-Xa)/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990776610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 175,13 | 204,72 | 204,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 4,27 |
| 777 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml | 10 amp.a 4 ml | 5909990776719 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 175,13 | 204,72 | 204,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 4,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|---|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|------|
| 778 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml | 10 amp.-strz.a 0,3 ml | 5909990949410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 137,89 | 163,29 | 160,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 5,72 |
| 779 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml | 5 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990949519 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 113,38 | 135,86 | 133,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 5,08 |
| 780 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml | 5 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990949618 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 137,89 | 163,29 | 160,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 5,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|------|
| 781 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml | 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml | 5909990949717 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 156,11 | 183,89 | 183,89 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 3,84 |
| 782 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 0,4 ml | 5 amp.-strz. a 0,4 ml | 5909990958818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 82,95 | 102,10 | 102,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 3,20 |
| 783 | Danazolium | Danazol Jelfa, tabl., 200 mg | 100 tabl. | 5909990282517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol | 102,76 | 123,94 | 123,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS) | ryczałt | 3,73 |
| 784 | Danazolium | Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg | 100 tabl. (fiol.) | 5909990925339 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol | 102,60 | 123,77 | 123,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS) | ryczałt | 3,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|--------|
| 785 | Denosumabum | Prolia, roztwór do wstrzykiwań, 60 mg/ml | 1 amp.-strz. a 1 ml | 5909990761647 | 2012-05-01 | 2 lata | 231.0, Leki stosowane w chorobach kości - przeciwciała monoklonalne - denosumab | 788,40 | 877,18 | 877,18 | Osteoporoza u pacjentek w wieku powyżej 65 lat ze stwierdzonym pierwotnym osteoporozą pomenopauzalną (T-score mniejsze lub równe - 2,5 mierzone metodą DXA), ze złamaniem kręgowym lub złamaniem szyjki kości udowej, po niepowodzeniu leczenia bisfosfonianami lub przeciwwskazaniami (nietolerancja) do stosowania doustnych bisfosfonianów | | 30% | 263,15 |
| 786 | Desmopressinum | Minirin, aerozol do nosa, 10 mcg | 5 ml | 5909990828326 | 2012-01-01 | 2 lata | 78.1, Hormony przysadki i podwzgórza – donosowe postacie farmaceutyczne desmopresyny | 132,84 | 157,75 | 157,75 | Moczówka prosta przysadkowa | | ryczałt | 3,20 |
| 787 | Desmopressinum | Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mcg | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990068494 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny | 87,39 | 106,65 | 101,38 | Moczówka prosta przysadkowa | Choroba von Willebrandta | ryczałt | 8,47 |
| 788 | Desmopressinum | Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mcg | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990068548 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny | 173,47 | 202,75 | 202,75 | Moczówka prosta przysadkowa | Choroba von Willebrandta | ryczałt | 3,20 |
| 789 | Dexamethasonum | Dexapolcort, aerozol na skórę, 0,28 mg/ml | 30 ml (16,25 g) | 5909990303519 | 2012-01-01 | 2 lata | 55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i redniej sile działania | 7,81 | 9,87 | 5,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 7,22 |
| 790 | Dexamethasonum | Dexapolcort, aerozol na skórę, 0,28 mg/ml | 55 ml (32,5 g) | 5909990303526 | 2012-01-01 | 2 lata | 55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o słabej i redniej sile działania | 9,68 | 12,94 | 9,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 8,08 |
| 791 | Dexamethasonum | Pabi-Dexamethason, tabl., 0,5 mg | 20 tabl. | 5909990170418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego | 3,24 | 4,16 | 2,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych; Przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w związku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Postępowanie wspomagające u chorych z objawowymi przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikłań radioterapii u chorych na nowotwory | ryczałt | 4,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 792 | Dexamethasonum | Pabi-Dexamethason, tabl. , 1 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990170517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego | 3,24 | 4,85 | 4,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Premedykacja przed stosowaniem taksonidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych; Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory | ryczałt | 3,20 |
| 793 | Diazepamum | Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990709212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 18,14 | 24,79 | 24,79 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 3,20 |
| 794 | Diazepamum | Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990709311 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 16,74 | 21,32 | 12,40 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 12,12 |
| 795 | Diazepamum | Relanium, zawiesina doustna, 2 mg/5ml | 100 g | 5909990264018 | 2012-01-01 | 2 lata | 181.2, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doustnego | 5,40 | 8,01 | 8,01 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 796 | Diazepamum | Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990751518 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 16,09 | 20,62 | 12,40 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 11,42 |
| 797 | Diazepamum | Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990751617 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 18,58 | 25,26 | 24,79 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 3,67 |
| 798 | Diclofenacum | Diclac, roztwór do wstrzykiwa niowych, 75 mg/3ml | 5 amp.a 3 ml | 5909990753017 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 5,83 | 7,80 | 5,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,13 |
| 799 | Diclofenacum | Diclac, roztwór do wstrzykiwa niowych, 75 mg/3ml | 10 amp.a 3 ml | 5909990753024 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 11,77 | 15,43 | 10,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,08 |
| 800 | Diclofenacum | Diclac 100, czopki doodbytnicze , 100 mg | 10 czop. | 5909990420018 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 3,78 | 5,10 | 3,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,25 |
| 801 | Diclofenacum | Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990957811 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 15,34 | 21,02 | 21,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 802 | Diclofenacum | Diclac 150 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990957828 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 7,67 | 11,04 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,60 |
| 803 | Diclofenacum | Diclac 50, czopki doodbytnicze , 50 mg | 10 czop. (blist.) | 5909990419913 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 2,92 | 3,65 | 1,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 2,73 |
| 804 | Diclofenacum | Diclac 50, tabl. dojel., 50 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990716623 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 5,29 | 9,76 | 9,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,88 |
| 805 | Diclofenacum | Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990957712 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 8,64 | 12,08 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,64 |
| 806 | Diclofenacum | Diclac 75 Duo, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990957729 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 3,94 | 5,78 | 5,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,06 |
| 807 | Diclofenacum | Dicloabak, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml | 10 ml (but.) | 5909990074044 | 2012-01-01 | 2 lata | 210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak | 16,85 | 23,13 | 23,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 808 | Diclofenacum | Dicloduo, kaps., 75 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990752010 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,56 | 16,20 | 16,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,10 |
| 809 | Diclofenacum | Diclofenac GSK, czopki, 50 mg | 10 czop. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990148110 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 1,91 | 2,57 | 1,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 1,65 |
| 810 | Diclofenacum | Diclofenac GSK, czopki, 100 mg | 10 czop. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990148219 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 2,48 | 3,70 | 3,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 1,85 |
| 811 | Diclofenacum | Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990457113 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 6,74 | 10,05 | 10,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,03 |
| 812 | Diclofenacum | Dicloratio UNO, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990457120 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 17,28 | 24,50 | 24,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|-----------|-------|
| 813 | Diclofenacum | Difadol 0,1%, krople do oczu, roztwór, 1 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909991026516 | 2012-01-01 | 2 lata | 210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak | 8,64 | 12,45 | 11,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,08 |
| 814 | Diclofenacum | Majamil prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990033614 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 3,97 | 7,83 | 7,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,92 |
| 815 | Diclofenacum | Naclof, krople do oczu, 1 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990145317 | 2012-01-01 | 2 lata | 210.0, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania do oczu - diklofenak | 11,88 | 15,91 | 11,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 7,54 |
| 816 | Diclofenacum | Naklofen, roztwór do wstrzykiwa , 25 mg/ml | 5 amp.a 3 ml | 5909990241910 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 5,83 | 7,80 | 5,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,13 |
| 817 | Diclofenacum | Naklofen Duo, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg | 20 kaps. | 5909990487714 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 7,61 | 10,98 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,54 |
| 818 | Diclofenacum | Olfen 75 SR, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990974122 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,77 | 16,43 | 16,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,28 |
| 819 | Diclofenacum + Lidocainum | Dicloratio, roztwór do wstrzykiwa , (75+20) (mg +mg)/2ml | 3 amp.a 2 ml | 5909990413829 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 3,65 | 4,85 | 3,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,25 |
| 820 | Diclofenacum + Lidocainum | Olfen 75 , roztwór do wstrzykiwa domi niowych, 75 mg | 5 amp.a 2 ml | 5909990161119 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 10,90 | 13,22 | 5,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,55 |
| 821 | Dienogestum | Visanne, tabl. , 2 mg | 28 tabl. | 5909990776962 | 2012-01-01 | 2 lata | 66.0, Hormony płciowe - progestageny - dienogest | 148,50 | 175,35 | 175,35 | Endometrioza | | ryczałt | 3,20 |
| 822 | Digoxinum | Digoxin Teva, tabl. , 100 mcg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990012114 | 2012-01-01 | 2 lata | 28.0, Glikozydy naparstnicy | 1,02 | 1,29 | 0,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 1,29 |
| 823 | Digoxinum | Digoxin Teva, tabl. , 250 mcg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990221516 | 2012-01-01 | 2 lata | 28.0, Glikozydy naparstnicy | 1,27 | 1,87 | 1,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 1,87 |
| 824 | Digoxinum | Digoxin WZF, tabl. , 250 g | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990037711 | 2012-01-01 | 2 lata | 28.0, Glikozydy naparstnicy | 1,21 | 1,80 | 1,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 1,80 |
| 825 | Dihydrocodeinum | DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg | 60 tabl. | 5909990213856 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.2, Opioidowe leki przeciwbólwe - dihydrokodeina | 86,76 | 104,95 | 92,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 40,05 |
| 826 | Dihydrocodeinum | DHC Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 120 mg | 60 tabl. | 5909990213856 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.2, Opioidowe leki przeciwbólwe - dihydrokodeina | 86,76 | 104,95 | 92,72 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 12,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|-----------|-------|
| 827 | Dihydrocodeinum | DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 60 tabl. | 5909990217045 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina | 35,64 | 46,36 | 46,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,91 |
| 828 | Dihydrocodeinum | DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 60 tabl. | 5909990217045 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina | 35,64 | 46,36 | 46,36 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 829 | Dihydrocodeinum | DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg | 60 tabl. | 5909990217069 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina | 64,80 | 79,56 | 69,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 30,88 |
| 830 | Dihydrocodeinum | DHC Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 90 mg | 60 tabl. | 5909990217069 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - dihydrokodeina | 64,80 | 79,56 | 69,54 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 10,02 |
| 831 | Diltiazemum | Diltiazem Polfarmex, tabl. , 30 mg | 60 tabl. (pojem.) | 5909990464722 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,05 | 9,18 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 6,79 |
| 832 | Diltiazemum | Dilzem, tabl. , 60 mg | 100 tabl. | 5909990205011 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 14,58 | 19,83 | 18,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,41 |
| 833 | Diltiazemum | Dilzem 120 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 120 mg | 30 tabl. | 5909990482917 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,99 | 11,52 | 11,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,55 |
| 834 | Diltiazemum | Dilzem 180 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg | 30 tabl. | 5909990483310 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 11,88 | 16,67 | 16,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 835 | Diltiazemum | Dilzem Retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 90 mg | 30 tabl. | 5909990213214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,02 | 9,85 | 8,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,67 |
| 836 | Diltiazemum | Oxycardil 120, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 120 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990112616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,99 | 11,52 | 11,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,55 |
| 837 | Diltiazemum | Oxycardil 180, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990416318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 11,99 | 16,79 | 16,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 838 | Diltiazemum | Oxycardil 240, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 240 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990416417 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 16,74 | 22,69 | 22,34 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,55 |
| 839 | Diltiazemum | Oxycardil 60, tabl. powl., 60 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990121120 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,67 | 11,17 | 11,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 840 | Dinatrii clodronas | Bonefos, kaps., 400 mg | 100 kaps. (but.) | 5909990029815 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas klodronowy | 270,00 | 308,62 | 306,54 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 5,28 |
| 841 | Dinatrii clodronas | Bonefos, kaps., 400 mg | 100 kaps. (blist.) | 5909990029822 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas klodronowy | 270,00 | 308,62 | 306,54 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 5,28 |
| 842 | Dinatrii clodronas | Sindronat, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990421879 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas klodronowy | 270,00 | 308,62 | 306,54 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 5,28 |
| 843 | Dinatrii clodronas | Sindronat, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990953523 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas klodronowy | 270,00 | 308,62 | 306,54 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 5,28 |
| 844 | Dinatrii clodronas | Sindronat, kaps. twarde, 400 mg | 120 kaps. | 5909990953530 | 2012-01-01 | 2 lata | 146.1, Leki stosowane w chorobach ko ci - bisfosoniany doustne - kwas klodronowy | 324,00 | 367,85 | 367,85 | Nowotwory zło liwe - Przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych | | ryczałt | 3,20 |
| 845 | Donepezilum | Alzdone, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990712847 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 40,64 | 48,58 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 33,21 |
| 846 | Donepezilum | Alzdone, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990713097 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 45,62 | 56,71 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 25,97 |
| 847 | Donepezilum | Alzepezil, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990724369 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 56,16 | 65,19 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 49,82 |
| 848 | Donepezilum | Alzepezil, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990724383 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 86,49 | 100,45 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 69,71 |
| 849 | Donepezilum | Apo-Doperil, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. | 5909990770038 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 28,45 | 35,55 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 20,18 |
| 850 | Donepezilum | Apo-Doperil, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990770045 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 33,66 | 43,92 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 13,18 |
| 851 | Donepezilum | Cogiton 10, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991024413 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 49,68 | 61,06 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 30,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--------------------|----|-----|-------|
| 852 | Donepezilum | Cogiton 5, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991024314 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 37,80 | 45,55 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 30,18 |
| 853 | Donepezilum | Cognezil, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990657339 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 48,06 | 56,52 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 41,15 |
| 854 | Donepezilum | Cognezil, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990657346 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 70,20 | 83,02 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 52,28 |
| 855 | Donepezilum | Cognezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990798964 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 32,40 | 39,77 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 24,40 |
| 856 | Donepezilum | Cognezil ODT, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990799053 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 64,80 | 77,24 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 46,50 |
| 857 | Donepezilum | Donecept, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990689781 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 32,40 | 39,77 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 24,40 |
| 858 | Donepezilum | Donecept, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990689873 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 32,40 | 42,57 | 42,57 | Choroba Alzheimera | | 30% | 12,77 |
| 859 | Donepezilum | DONECTIL, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990683581 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 32,40 | 39,77 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 24,40 |
| 860 | Donepezilum | DONECTIL, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990683666 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 58,32 | 70,31 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 39,57 |
| 861 | Donepezilum | Donectil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 30 tabl. | 5909990851478 | 2012-07-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 31,86 | 39,44 | 23,53 | Choroba Alzheimera | | 30% | 22,97 |
| 862 | Donepezilum | Donectil, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 30 tabl. | 5909990851492 | 2012-07-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 63,72 | 76,47 | 47,06 | Choroba Alzheimera | | 30% | 43,53 |
| 863 | Donepezilum | Donemed, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990739479 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 28,08 | 35,15 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 19,78 |
| 864 | Donepezilum | Donemed, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990739509 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 56,16 | 67,99 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 37,25 |
| 865 | Donepezilum | Donepex, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909991055912 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 37,80 | 45,55 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 30,18 |
| 866 | Donepezilum | Donepex, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909991056018 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 43,20 | 54,13 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 23,39 |
| 867 | Donepezilum | Donepezil Bluefish, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990814077 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 24,84 | 31,68 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 16,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|----------------------|----|-----|-------|
| 868 | Donepezilum | Donepezil Bluefish, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990814138 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 48,60 | 59,90 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 29,16 |
| 869 | Donepezilum | Doneprion, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990776870 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 28,08 | 35,15 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 19,78 |
| 870 | Donepezilum | Doneprion, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990776900 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 33,48 | 43,73 | 43,73 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 13,12 |
| 871 | Donepezilum | Donesyn, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990657353 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 42,12 | 50,17 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 34,80 |
| 872 | Donepezilum | Donesyn, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990657360 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 49,14 | 60,49 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 29,75 |
| 873 | Donepezilum | Mensapex, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990698448 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 68,04 | 77,91 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 62,54 |
| 874 | Donepezilum | Mensapex, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990698578 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 81,00 | 94,57 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 63,83 |
| 875 | Donepezilum | Pamigen, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990726929 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 30,24 | 37,46 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 22,09 |
| 876 | Donepezilum | Pamigen, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990726936 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 44,00 | 54,98 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 24,24 |
| 877 | Donepezilum | Pezilgen, tabl. powł., 5 miligram | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990743940 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 60,48 | 69,82 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 54,45 |
| 878 | Donepezilum | Pezilgen, tabl. powł., 10 miligram | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990744008 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 71,28 | 84,17 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 53,43 |
| 879 | Donepezilum | Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990798933 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 28,45 | 35,55 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 20,18 |
| 880 | Donepezilum | Ricordo, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990798940 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 33,66 | 43,92 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 13,18 |
| 881 | Donepezilum | Symepezil, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990662104 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 28,05 | 35,12 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 19,75 |
| 882 | Donepezilum | Symepezil, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990662203 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 32,40 | 42,57 | 42,57 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 12,77 |
| 883 | Donepezilum | Yasnal, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990993215 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,44 | 54,79 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|-----|--------------------------|---|------------------------------|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|----------------------|----|-----|---------|-------|
| 884 | Donepezilum | Yasnal, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990993314 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 64,80 | 77,24 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 46,50 | |
| 885 | Donepezilum | Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990850075 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 32,40 | 39,77 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 24,40 | |
| 886 | Donepezilum | Yasnal Q-Tab, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990850204 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 64,80 | 77,24 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 46,50 | |
| 887 | Dornasum alfa | Pulmozyme, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml | 30 amp.a 2,5 ml | 5909990375813 | 2012-01-01 | 2 lata | 205.2, Leki mukolityczne - domaza alfa | 2 381,40 | 2 608,45 | 2 608,45 | Mukowiscydoza | | | ryczałt | 3,20 |
| 888 | Dorzolamidum | Adolamid , krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990851430 | 2012-03-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 21,06 | 27,73 | 22,93 | Jaskra | | | ryczałt | 8,00 |
| 889 | Dorzolamidum | Dorzolamid Teva, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990695744 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 17,17 | 23,57 | 22,93 | Jaskra | | | ryczałt | 3,84 |
| 890 | Dorzolamidum | Dropzol, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990838325 | 2012-03-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 19,44 | 26,00 | 22,93 | Jaskra | | | ryczałt | 6,27 |
| 891 | Dorzolamidum | Oftidor, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990849741 | 2012-03-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 22,57 | 29,35 | 22,93 | Jaskra | | | ryczałt | 9,62 |
| 892 | Dorzolamidum | Rozalin, krople do oczu, 20 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990643929 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 25,92 | 32,93 | 22,93 | Jaskra | | | ryczałt | 13,20 |
| 893 | Dorzolamidum | Trusopt, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990661329 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 35,64 | 43,33 | 22,93 | Jaskra | | | ryczałt | 23,60 |
| 894 | Dorzolamidum + Timololum | Cosopt, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990442423 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 35,64 | 44,79 | 34,39 | Jaskra | | | ryczałt | 13,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------------|---|---------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 895 | Dorzolamidum + Timololum | Dotiteva, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml | 1 but. a 5 ml | 5909990799343 | 2012-07-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 20,52 | 28,62 | 28,62 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 896 | Dorzolamidum + Timololum | Rozacom, krople do oczu, 20+5 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990746705 | 2012-01-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 897 | Dorzolamidum + Timololum | Tymolamid, krople do oczu, roztwór, 20+5 mg/ml | 5 ml (but.) | 5909990864225 | 2012-03-01 | 2 lata | 212.2, Leki przeciwjaskrowe - inhibitory anhidrazy w glanowej do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-adrenolitycznymi, leki alfaadrenergiczne do stosowania do oczu | 21,06 | 29,19 | 29,19 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 898 | Doxazosinum | Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg | 30 tabl. | 5909990969517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 15,66 | 18,86 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja pęcherza, nieneurogenna dysfunkcja pęcherza - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,37 |
| 899 | Doxazosinum | Apo-Doxan 1, tabl., 1 mg | 30 tabl. | 5909990969517 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 15,66 | 18,86 | 6,41 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 15,65 |
| 900 | Doxazosinum | Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg | 30 tabl. | 5909990969616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 18,68 | 23,62 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja pęcherza, nieneurogenna dysfunkcja pęcherza - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,65 |
| 901 | Doxazosinum | Apo-Doxan 2, tabl., 2 mg | 30 tabl. | 5909990969616 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 18,68 | 23,62 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 14,00 |
| 902 | Doxazosinum | Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg | 30 tabl. | 5909990969715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 23,35 | 30,67 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,72 |
| 903 | Doxazosinum | Apo-Doxan 4, tabl., 4 mg | 30 tabl. | 5909990969715 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 23,35 | 30,67 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 8,23 |
| 904 | Doxazosinum | Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990431410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 20,31 | 27,42 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,47 |
| 905 | Doxazosinum | Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990431410 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 20,31 | 27,42 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,98 |
| 906 | Doxazosinum | Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg | 30 tabl. | 5909990431519 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokujące receptory alfa-adrenergiczne | 57,24 | 70,00 | 51,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 34,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 907 | Doxazosinum | Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg | 30 tabl. | 5909990431519 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 57,24 | 70,00 | 51,27 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 25,13 |
| 908 | Doxazosinum | Doxagen, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990037957 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,25 | 27,35 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,40 |
| 909 | Doxazosinum | Doxagen, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990037957 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,25 | 27,35 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,91 |
| 910 | Doxazosinum | Doxalong, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990790951 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,09 | 27,19 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,24 |
| 911 | Doxazosinum | Doxalong, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990790951 | 2012-03-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,09 | 27,19 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,75 |
| 912 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,98 | 27,75 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 23,26 |
| 913 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854318 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,98 | 27,75 | 6,41 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 24,54 |
| 914 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854417 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 28,08 | 33,67 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 24,70 |
| 915 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854417 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 28,08 | 33,67 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 24,05 |
| 916 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,40 | 40,36 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 22,41 |
| 917 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854516 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,40 | 40,36 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 17,92 |
| 918 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484911 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,37 | 23,90 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,41 |
| 919 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484911 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,37 | 23,90 | 6,41 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 20,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 920 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990485017 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,98 | 29,29 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 20,32 |
| 921 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990485017 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,98 | 29,29 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 19,67 |
| 922 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990485116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 26,24 | 33,77 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 15,82 |
| 923 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990485116 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 26,24 | 33,77 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 11,33 |
| 924 | Doxazosinum | Doxonex, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991149611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 13,93 | 18,54 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,57 |
| 925 | Doxazosinum | Doxonex, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991149611 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 13,93 | 18,54 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 8,92 |
| 926 | Doxazosinum | Doxonex, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991149710 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,86 | 35,50 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 17,55 |
| 927 | Doxazosinum | Doxonex, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991149710 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,86 | 35,50 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 13,06 |
| 928 | Doxazosinum | Kamiren, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990491315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,00 | 32,52 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 23,55 |
| 929 | Doxazosinum | Kamiren, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990491315 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,00 | 32,52 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 22,90 |
| 930 | Doxazosinum | Kamiren, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990491414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,32 | 34,91 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,96 |
| 931 | Doxazosinum | Kamiren, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990491414 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,32 | 34,91 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 12,47 |
| 932 | Doxazosinum | Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990022571 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,70 | 35,32 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 17,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 933 | Doxazosinum | Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990022571 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,70 | 35,32 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 12,88 |
| 934 | Doxazosinum | Prostatic 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 9,72 | 12,49 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,00 |
| 935 | Doxazosinum | Prostatic 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905416 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 9,72 | 12,49 | 6,41 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 9,28 |
| 936 | Doxazosinum | Prostatic 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 15,66 | 20,39 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 11,42 |
| 937 | Doxazosinum | Prostatic 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905515 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 15,66 | 20,39 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 10,77 |
| 938 | Doxazosinum | Prostatic 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,43 | 35,04 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 17,09 |
| 939 | Doxazosinum | Prostatic 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905614 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,43 | 35,04 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 12,60 |
| 940 | Doxazosinum | Zoxon 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990903320 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,52 | 24,05 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,56 |
| 941 | Doxazosinum | Zoxon 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990903320 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,52 | 24,05 | 6,41 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 20,84 |
| 942 | Doxazosinum | Zoxon 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903429 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 19,98 | 25,01 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,04 |
| 943 | Doxazosinum | Zoxon 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903429 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 19,98 | 25,01 | 12,82 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 15,39 |
| 944 | Doxazosinum | Zoxon 4, tabl. , 4 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990080267 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 62,64 | 77,90 | 76,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 24,06 |
| 945 | Doxazosinum | Zoxon 4, tabl. , 4 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990080267 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 62,64 | 77,90 | 76,91 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 10,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 946 | Doxazosinum | Zoxon 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903511 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 24,30 | 31,69 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 13,74 |
| 947 | Doxazosinum | Zoxon 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903511 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0. Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 24,30 | 31,69 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 9,25 |
| 948 | Doxycyclinum | Doxycyclinum Farma-Projekt, kaps. twarde, 100 mg | 10 kaps. | 5909990958719 | 2012-01-01 | 2 lata | 87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina | 4,95 | 7,40 | 7,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,70 |
| 949 | Doxycyclinum | Doxycyclinum TZF, kaps. twarde, 100 mg | 10 kaps. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990072316 | 2012-01-01 | 2 lata | 87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina | 4,96 | 7,41 | 7,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,71 |
| 950 | Doxycyclinum | Unidox Solutab, tabl. , 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990752713 | 2012-01-01 | 2 lata | 87.0. Antybiotyki tetracyklinowe - doksycyklina | 5,72 | 8,22 | 7,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,52 |
| 951 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014934 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 2,91 | 3,97 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,97 |
| 952 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990014958 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 5,31 | 7,39 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,60 |
| 953 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990015030 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,26 | 6,27 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,48 |
| 954 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990015054 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,37 | 12,03 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,45 |
| 955 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990020829 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,58 | 20,52 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 12,80 |
| 956 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990020836 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,88 | 11,50 | 11,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,40 |
| 957 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990374137 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 2,54 | 3,58 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 958 | Enalaprilum | Mapryl, tabl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990374243 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,29 | 10,86 | 10,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 959 | Enalaprilum | Mapryl, tabl., 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990422364 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,62 | 6,65 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,86 |
| 960 | Enalaprilum | Mapryl, tabl., 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990422371 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,63 | 18,43 | 18,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 961 | Enalaprilum | Mapryl, tabl., 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990422388 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,08 | 10,65 | 10,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 962 | Enalaprilum | Mapryl, tabl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990440535 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,94 | 5,93 | 5,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolność serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 963 | Enoxaparinum natricum | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,2 ml | 5909990048328 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 47,97 | 60,67 | 53,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 10,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 964 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,4 ml | 5909990048427 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 96,41 | 116,50 | 107,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotworowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 12,52 |
| 965 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990774821 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 135,53 | 160,77 | 160,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotworowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|-------|
| 966 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990774920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 265,39 | 302,52 | 267,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 39,90 |
| 967 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990775026 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 175,12 | 204,71 | 204,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 4,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|-----------|-------|
| 968 | Enoxaparinum natricum | Clexane forte, roztwór do wstrzykiwa, 120 mg/0,8ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990891429 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 292,08 | 332,28 | 321,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr. enia w t. tnicach macicznych u kobiet w ci. y, opó nienie wzrostu wewn. trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie. nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ci. y; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 17,14 |
| 969 | Enoxaparinum natricum | Clexane forte, roztwór do wstrzykiwa, 150 mg/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990891528 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 345,84 | 391,62 | 391,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr. enia w t. tnicach macicznych u kobiet w ci. y, opó nienie wzrostu wewn. trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie. nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ci. y; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 8,00 |
| 970 | Enzyma pancreatis | Kreon 25000, kaps. dojel., 25000 J.Ph.Eur.Lipazy | 50 kaps. (but.) | 5909990042579 | 2012-01-01 | 2 lata | 13.0, Enzymy trzustkowe | 44,49 | 55,96 | 48,24 | Mukowiscydoza; Stan po resekcji trzustki | | bezpłatny | 7,72 |
| 971 | Enzyma pancreatis | Lipancrea 16 000, kaps., 16000 j. Ph. Eur. lipazy | 60 kaps. (poj.) | 5909990723164 | 2012-01-01 | 2 lata | 13.0, Enzymy trzustkowe | 28,08 | 37,05 | 37,05 | Mukowiscydoza; Stan po resekcji trzustki | | bezpłatny | 0,00 |
| 972 | Eprosartanum | Teveten, tabl. powl., 600 mg | 14 tabl. | 5909990868414 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci. angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 36,93 | 41,93 | 7,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 36,37 |
| 973 | Ergotaminum | Ergotaminum Filofarm, tabl. dra. owane, 1 mg | 20 tabl. | 5909990211517 | 2012-01-01 | 2 lata | 154.0, Leki przeciwmigrenowe - ergotamina | 3,48 | 5,20 | 5,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 2,60 |
| 974 | Erythromycinum | Davercin, tabl. powl., 250 mg | 16 tabl. (blis.) | 5909990087419 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,70 | 12,62 | 3,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,75 |
| 975 | Erythromycinum | Erythromycinum TZF, tabl. powl., 200 mg | 16 tabl. | 5909990295616 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 7,48 | 8,95 | 2,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|--|----------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 976 | Estradiolum | Climara-50, system transdermalny, 50 g / 24h | 4 szt. | 5909990458318 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 21,60 | 26,63 | 12,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 18,03 |
| 977 | Estradiolum | Divigel 0,1%, el, 0,5 mg/0,5g | 28 szt. | 5909990447619 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 26,70 | 33,59 | 21,51 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 18,53 |
| 978 | Estradiolum | Divigel 0,1%, el, 1 mg/g | 28 szt. | 5909990447718 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 33,49 | 43,62 | 43,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,51 |
| 979 | Estradiolum | Estraderm MX 100, system transdermalny, plaster, 100 g / 24h | 6 szt. | 5909990703012 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 21,04 | 27,03 | 18,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 14,12 |
| 980 | Estradiolum | Estraderm MX 25, system transdermalny, plaster, 25 g / 24h | 6 szt. | 5909990702817 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 13,40 | 15,85 | 4,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,62 |
| 981 | Estradiolum | Estraderm MX 50, system transdermalny, plaster, 50 g / 24h | 6 szt. | 5909990702916 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 15,31 | 19,15 | 9,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,70 |
| 982 | Estradiolum | Estraderm TTS 25, system transdermalny, plaster, 25 g / 24h | 6 szt. | 5909990118410 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 13,40 | 15,85 | 4,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,62 |
| 983 | Estradiolum | Estradot 100, system transdermalny, plaster, 100 g / 24h | 8 szt. | 5909990939510 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 27,72 | 35,18 | 24,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,97 |
| 984 | Estradiolum | Estrofem, tabl. powl., 2 mg | 28 tabl. | 5909990330713 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 11,45 | 15,82 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,07 |
| 985 | Estradiolum | Estrofem mite, tabl. powl., 1 mg | 28 tabl. | 5909990823215 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 10,75 | 13,56 | 6,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,68 |
| 986 | Estradiolum | Fem 7, system transdermalny, 50 g / 24h | 4 szt. (15cm2) | 5909990774616 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 21,60 | 26,63 | 12,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 18,03 |
| 987 | Estradiolum | Oesclim 25, system transdermalny, 25 g / 24h | 6 szt. | 5909990761517 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 18,39 | 21,19 | 4,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,96 |
| 988 | Estradiolum | Oesclim 50, system transdermalny, 50 g / 24h | 6 szt. | 5909990761616 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 18,39 | 22,44 | 9,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 15,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 989 | Estradiolum | Progynova 21, tabl. powł., 2 mg | 21 tabl. | 5909990304110 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 8,48 | 11,90 | 10,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,59 |
| 990 | Estradiolum | System 50, system transdermalny, plaster, 50 g / 24h | 6 szt. | 5909990169214 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 18,25 | 22,29 | 9,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 15,84 |
| 991 | Estradiolum + Drospirenonum | Angeliq, tabl. powł., 1+2 mg | 28 tabl. | 5909990221073 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 43,20 | 49,80 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 40,05 |
| 992 | Estradiolum + Dydrogesteronum | Femoston conti, tabl. powł., 1+5 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990973316 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 21,59 | 26,67 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 16,92 |
| 993 | Estradiolum + Levonorgestrelum | Fem 7 Combi, system transdermalny, faza I: 50, faza II: 50+10 g / 24h | 4 plast. (2szt.I fazy+2szt.II fazy) | 5909991054410 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 27,00 | 36,68 | 36,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,00 |
| 994 | Estradiolum + Levonorgestrelum | Klimonorm, tabl. dra owane, 2 + 0,15 mg | 21 tabl. | 5909990059713 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 10,80 | 15,13 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,38 |
| 995 | Estradiolum + Levonorgestrelum | Klimonorm, tabl. dra owane, 2 + 0,15 mg | 63 tabl. | 5909990059737 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 32,40 | 41,83 | 41,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,58 |
| 996 | Estradiolum + Medroxyprogesteronum | Divina, tabl. , 2, 2+10 mg | 21 tabl. (1 blist.po 21 szt.) | 5909990661411 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 9,68 | 13,93 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,18 |
| 997 | Estradiolum + Medroxyprogesteronum | Indivina, tabl. , 1+2,5 mg | 28 tabl. (1 blist.po 28 tabl.) | 5909991070915 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 28,25 | 33,80 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,05 |
| 998 | Estradiolum + Medroxyprogesteronum | Indivina, tabl. , 1+5 mg | 28 tabl. (1 blist.po 28 tabl.) | 5909991071011 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 28,25 | 33,80 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,05 |
| 999 | Estradiolum + Medroxyprogesteronum | Indivina, tabl. , 2+5 mg | 28 tabl. (1 blist.po 28 tabl.) | 5909991071110 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 28,25 | 33,80 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,05 |
| 1000 | Estradiolum + Norethisteronum | Activelle, tabl. powł., 1+0,5 mg | 28 tabl. | 5909990451210 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 22,17 | 27,29 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,54 |
| 1001 | Estradiolum + Norethisteronum | Cliovelle, tabl. , 1+0,5 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990067794 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 18,41 | 23,27 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 1002 | Estradiolum + Norethisteronum | Estalis, system transdermalny, 0,5+4,8 mg | 8 szt. | 5909990816514 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 31,70 | 41,71 | 41,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,51 |
| 1003 | Estradiolum + Norethisteronum | Estalis, system transdermalny, 0,6+2,7 mg | 8 szt. | 5909990816613 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 31,70 | 41,71 | 41,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,51 |
| 1004 | Estradiolum + Norethisteronum | Kliogest, tabl. powl., 2+1 mg | 28 tabl. | 5909990329717 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 21,70 | 26,79 | 13,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,04 |
| 1005 | Estradiolum + Norethisteronum | System Conti, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) +11,2 mg (170 mcg noretysteronu octanu/24h) | 8 szt. (4 + 4) | 5909990444717 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 36,72 | 47,08 | 43,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 16,95 |
| 1006 | Estradiolum + Norethisteronum | System Sequi, system transdermalny, 3,2 mg (50 mcg estradiolu/24h) oraz 3,2 mg +11,2 mg (50 mcg estradiolu/24h+170 mcg noretysteronu octanu/24h) | 8 szt. (4 + 4) | 5909990444816 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.1, Leki hormonalne do podawania przezskórnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 32,94 | 43,04 | 43,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,91 |
| 1007 | Estradiolum + Norgestrelum | Cyclo Progynova, tabl. powl., 22+0,5 mg | 21 tabl. | 5909990304219 | 2012-01-01 | 2 lata | 68.2, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce estradiol lub estradiol w skojarzeniu z progestagenami | 5,62 | 9,58 | 9,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,87 |
| 1008 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Levomine, tabl. powl., 0,03+0,15 mg | 63 tabl. | 5909990879465 | 2012-03-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 17,28 | 23,80 | 23,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,14 |
| 1009 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg | 21 tabl. | 5909990060016 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 9,72 | 12,81 | 8,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,12 |
| 1010 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg | 63 tabl. | 5909990060023 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 17,82 | 24,39 | 24,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,32 |
| 1011 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg | 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) | 5909997010366 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 8,22 | 11,21 | 8,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,52 |
| 1012 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Microgynon 21, tabl. powl., 0,03+0,15 mg | 63 tabl. (3 blist.po 21 szt.) | 5909997010373 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 21,71 | 28,55 | 24,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,48 |
| 1013 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Rigevidon, tabl. powl., 0,03+0,15 mg | 21 tabl. | 5909990873319 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 8,63 | 11,64 | 8,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,95 |
| 1014 | Ethinylestradiolum + Levonorgestrelum | Stediril 30, tabl. dra owane, 0,03+0,15 mg | 21 tabl. | 5909990072514 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ce cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 5,72 | 8,53 | 8,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|----------|----------|----------|---|---|-----------|-------|
| 1015 | Ethosuximidum | Petinimid, kaps., 250 mg | 100 kaps. | 5909990244911 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid | 31,72 | 41,54 | 41,54 | Padaczka | Padaczka z napadami nie wiadomo ci dla dzieci do 3 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 1016 | Everolimusum | Certican, tabl., 0,5 mg | 60 tabl. | 5909990211357 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunosupresyjne - everolimus | 853,20 | 948,25 | 943,50 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 7,95 |
| 1017 | Everolimusum | Certican, tabl., 0,25 mg | 60 tabl. | 5909990211654 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus | 426,58 | 480,35 | 471,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 11,80 |
| 1018 | Everolimusum | Certican, tabl., 0,75 mg | 60 tabl. | 5909990211845 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus | 1 280,03 | 1 415,25 | 1 415,25 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1019 | Exemestanum | Glandex, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990812202 | 2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 108,00 | 128,39 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 28,89 |
| 1020 | Exemestanum | Symex, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990853090 | 2012-07-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 81,00 | 99,50 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 0,00 |
| 1021 | Ezetimibum | Ezetrol, tabl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990221066 | 2012-01-01 | 2 lata | 48.0, Leki hamujące wchłanianie cholesterolu z przewodu pokarmowego | 122,67 | 146,33 | 146,33 | Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymuj ca si pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wiecowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej | | 30% | 43,90 |
| 1022 | Famotidinum | Famogast, tabl. powł., 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990014729 | 2012-01-01 | 2 lata | 1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 8,67 | 12,40 | 11,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,73 |
| 1023 | Famotidinum | Famogast, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014736 | 2012-01-01 | 2 lata | 1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 4,33 | 6,38 | 5,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,64 |
| 1024 | Famotidinum | Famogast, tabl. powł., 40 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990014828 | 2012-01-01 | 2 lata | 1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 15,87 | 21,98 | 21,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 6,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 1025 | Famotidinum | Famogast, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014835 | 2012-01-01 | 2 lata | 1.0, Leki blokuj ce receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 8,43 | 12,14 | 11,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,47 |
| 1026 | Famotidinum | Ulfamid, tabl. powl., 20 mg | 20 tabl. | 5909990273225 | 2012-01-01 | 2 lata | 1.0, Leki blokuj ce receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 2,40 | 3,74 | 3,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1027 | Famotidinum | Ulfamid, tabl. powl., 40 mg | 20 tabl. | 5909990286225 | 2012-01-01 | 2 lata | 1.0, Leki blokuj ce receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 3,89 | 6,41 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1028 | Felodipinum | Plendil, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. | 5909990344819 | 2012-01-01 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 23,22 | 27,10 | 8,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 21,47 |
| 1029 | Felodipinum | Plendil, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990344918 | 2012-01-01 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 32,40 | 38,50 | 16,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 27,24 |
| 1030 | Fenofibratum | Apo-Feno 100, kaps., 100 mg | 50 kaps. | 5909990909315 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 7,44 | 13,25 | 13,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,98 |
| 1031 | Fenofibratum | Apo-Feno 200 M, kaps., 200 mg | 30 kaps. | 5909990909414 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 15,80 | 22,83 | 22,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,85 |
| 1032 | Fenofibratum | Biofibrat, kaps. twarde, 200 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990754496 | 2012-03-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 16,20 | 23,25 | 23,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,98 |
| 1033 | Fenofibratum | Biofibrat, kaps. twarde, 267 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990754526 | 2012-05-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 21,60 | 30,17 | 30,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 9,05 |
| 1034 | Fenofibratum | Fenardin, kaps. twarde, 267 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990611065 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 24,73 | 33,52 | 33,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,06 |
| 1035 | Fenofibratum | Grofibrat, kaps., 100 mg | 50 kaps. | 5909990109814 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 8,42 | 14,30 | 14,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,29 |
| 1036 | Fenofibratum | Grofibrat 200, kaps., 200 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990492114 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 16,85 | 23,94 | 23,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,18 |
| 1037 | Fenofibratum | Lipanthyl , kaps., 100 mg | 50 kaps. | 5909990258611 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 13,24 | 19,46 | 19,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,84 |
| 1038 | Fenofibratum | Lipanthyl 200M, kaps., 200 mg | 30 kaps. (2 blist.po 15szt.) | 5909990687947 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 22,96 | 30,48 | 28,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,85 |
| 1039 | Fenofibratum | Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg | 30 kaps. (2 blist.po 15szt.) | 5909990492817 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 28,39 | 37,44 | 37,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,23 |
| 1040 | Fenofibratum | Lipanthyl 267M, kaps., 267 mg | 30 kaps. | 5909997069852 | 2012-07-01 | 2 lata | 47.0, Leki wpływajace na gospodarke lipidow - fibraty | 28,29 | 37,33 | 37,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 1041 | Fenofibratum | Lipanthyl Supra 215, tabl. powł., 215 mg | 30 tabl. | 5909990431342 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty | 28,62 | 37,68 | 37,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 11,47 |
| 1042 | Fenofibratum | Lipanthyl Supra 160, tabl. powł., 160 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903917 | 2012-01-01 | 2 lata | 47.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - fibraty | 23,14 | 30,68 | 28,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 11,05 |
| 1043 | Fenoterolum | Berotec N 100, aerozol inhalacyjny, roztwór, 100 g/dawk | 200 daw. (10 ml) | 5909990376414 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 12,20 | 17,16 | 17,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,56 |
| 1044 | Fenoterolum | Fenoterol GSK, tabl., 5 mg | 100 tabl. (pojem.) | 5909990148318 | 2012-01-01 | 2 lata | 61.0. Leki ginekologiczne o działaniu sympatykomimetycznym - hamujące skórze macicy - fenoterol | 12,87 | 18,02 | 18,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1045 | Fenoterolum + Ipratropii bromidum | Berodual, roztwór do nebulizacji, 0,5+0,25 mg/ml | 20 ml (but.) | 5909990101917 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu | 15,66 | 20,29 | 12,90 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 10,59 |
| 1046 | Fentanylum | Dolforin, system transdermalny, 25 g/h | 5 szt. | 5909990674961 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 43,20 | 54,59 | 45,41 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 12,38 |
| 1047 | Fentanylum | Dolforin, system transdermalny, 50 g/h | 5 szt. | 5909990674992 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 75,60 | 93,21 | 90,81 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 5,60 |
| 1048 | Fentanylum | Dolforin, system transdermalny, 75 g/h | 5 szt. | 5909990675074 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 102,03 | 123,53 | 123,53 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1049 | Fentanylum | Dolforin, system transdermalny, 100 g/h | 5 szt. | 5909990675081 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 126,37 | 151,53 | 151,53 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 1050 | Fentanylum | Durogesic, system transdermalny, 12,5 g/h | 5 szt. | 5909990053605 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 21,60 | 28,52 | 22,70 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 9,02 |
| 1051 | Fentanylum | Durogesic, system transdermalny, 25 g/h | 5 szt. | 5909990765416 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 41,04 | 52,28 | 45,41 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 10,07 |
| 1052 | Fentanylum | Durogesic, system transdermalny, 50 g/h | 5 szt. | 5909990765515 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 77,76 | 95,52 | 90,81 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 7,91 |
| 1053 | Fentanylum | Durogesic, system transdermalny, 75 g/h | 5 szt. | 5909990765614 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 116,64 | 139,17 | 136,22 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 6,15 |
| 1054 | Fentanylum | Durogesic, system transdermalny, 100 g/h | 5 szt. | 5909990765713 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 155,52 | 182,72 | 181,63 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 4,29 |
| 1055 | Fentanylum | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 100 mcg | 4 tabl. (blis.PVC/Alu/PA/PVC) | 5909990643004 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego | 102,60 | 123,77 | 123,77 | Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworow , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istnieje udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|--------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 1056 | Fentanylum | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 200 mcg | 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) | 5909990643028 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego | 102,60 | 123,77 | 123,77 | Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworów , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków | | ryczałt | 3,20 |
| 1057 | Fentanylum | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 400 mcg | 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) | 5909990643042 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego | 102,60 | 123,77 | 123,77 | Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworów , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków | | ryczałt | 3,20 |
| 1058 | Fentanylum | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 600 mcg | 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) | 5909990643066 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego | 102,60 | 123,77 | 123,77 | Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworów , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków | | ryczałt | 3,20 |
| 1059 | Fentanylum | Effentora, tabl. podpoliczkowe, 800 mcg | 4 tabl. (blist.PVC/Alu/PA/PVC) | 5909990643080 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania podpoliczkowego | 102,60 | 123,77 | 123,77 | Ból przebijaj cy u dorosłych pacjentów z chorób nowotworów , którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani s opioidowej terapii podtrzymuj cej, a u których istniej udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczno tych leków | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|--------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 1060 | Fentanylum | Fenta MX 100, system transdermalny, 100 g/h | 5 szt. | 5909990054695 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 139,89 | 165,99 | 165,99 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1061 | Fentanylum | Fenta MX 25, system transdermalny, 25 g/h | 5 szt. | 5909990054589 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 43,44 | 54,85 | 45,41 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 12,64 |
| 1062 | Fentanylum | Fenta MX 50, system transdermalny, 50 g/h | 5 szt. | 5909990054626 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 81,04 | 99,03 | 90,81 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 11,42 |
| 1063 | Fentanylum | Fenta MX 75, system transdermalny, 75 g/h | 5 szt. | 5909990054664 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 104,80 | 126,50 | 126,50 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1064 | Fentanylum | Fentanyl Actavis 100 g/h, system transdermalny, 100 g/h | 5 szt. | 5909990000098 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 147,87 | 174,54 | 174,54 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1065 | Fentanylum | Fentanyl Actavis 25 g/h, system transdermalny, 25 g/h | 5 szt. | 5909990000036 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 40,42 | 51,62 | 45,41 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 9,41 |
| 1066 | Fentanylum | Fentanyl Actavis 50 g/h, system transdermalny, 50 g/h | 5 szt. | 5909990000050 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 77,76 | 95,52 | 90,81 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory zło liwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kausalgia | | ryczałt | 7,91 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|------------------|---------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|---|----|---------|-------|
| 1067 | Fentanylum | Fentanyl Actavis 75 g/h, system transdermalny, 75 g/h | 5 szt. | 5909990000081 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 108,93 | 130,93 | 130,93 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1068 | Fentanylum | Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,05 mg/dawk | 1,8 ml (10 daw.) | 5909990699643 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego | 237,60 | 273,09 | 263,34 | Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorob nowotworów, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieje udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków | | ryczałt | 12,95 |
| 1069 | Fentanylum | Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,1 mg/dawk | 2,9 ml (20 daw.) | 5909990699735 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego | 540,00 | 604,75 | 598,49 | Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorob nowotworów, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieje udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków | | ryczałt | 9,46 |
| 1070 | Fentanylum | Instanyl, aerozol do nosa, roztwór, 0,2 mg/dawk | 5 ml (40 daw.) | 5909990699889 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania donosowego | 1 080,00 | 1 196,99 | 1 196,99 | Ból przebijający u dorosłych pacjentów z chorob nowotworów, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieje udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwałe działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków | | ryczałt | 3,20 |
| 1071 | Fentanylum | Matrifen 100, system transdermalny, 100 g/h | 5 sasz. | 5909990043330 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postaci do stosowania przezskórnego | 149,04 | 175,79 | 175,79 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła; Nowotwory złośliwe; Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|----------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 1072 | Fentanylum | Matrifen 12 , system transdermalny, 12 g/h | 5 sas. | 5909990043163 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 21,60 | 28,52 | 22,70 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia | | ryczałt | 9,02 |
| 1073 | Fentanylum | Matrifen 25, system transdermalny, 25 g/h | 5 sas. | 5909990043279 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 43,20 | 54,59 | 45,41 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia | | ryczałt | 12,38 |
| 1074 | Fentanylum | Matrifen 50, system transdermalny, 50 g/h | 5 sas. | 5909990043385 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 75,60 | 93,21 | 90,81 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia | | ryczałt | 5,60 |
| 1075 | Fentanylum | Matrifen 75, system transdermalny, 75 g/h | 5 sas. | 5909990043224 | 2012-01-01 | 2 lata | 152.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - postacie do stosowania przezskórnego | 108,00 | 129,92 | 129,92 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kausalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1076 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 300 mcg/ml | 5 fiol.a 1 ml | 5909990312214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 607,50 | 680,49 | 680,49 | Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 1077 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 600 mcg/ml | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990830510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 121,50 | 145,69 | 145,69 | Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|---------------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|------|
| 1078 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwań, 960 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990830619 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 194,40 | 226,25 | 226,25 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 1079 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml | 1 amp.-strz z osłon zabezpieczającymi | 5909990739387 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 130,13 | 154,93 | 154,93 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 1080 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml | 1 amp.-strz z osłon zabezpieczającymi | 5909990739448 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 214,79 | 248,08 | 248,08 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 1081 | Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln j.m./ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990687763 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 127,44 | 152,04 | 152,04 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|---------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 1082 | Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml | 1 amp.-strza 0,5 ml | 5909990687800 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 215,27 | 248,59 | 248,08 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakłócenie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,71 |
| 1083 | Finasteridum | Androster, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990055470 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 23,76 | 31,91 | 31,91 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1084 | Finasteridum | Antiprost, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990067770 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 23,98 | 32,15 | 32,15 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1085 | Finasteridum | Antiprost, tabl. powł., 5 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990067787 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 88,19 | 107,29 | 107,29 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 10,67 |
| 1086 | Finasteridum | Apo-Fina, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990048670 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 24,84 | 33,07 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1087 | Finasteridum | Finagen, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990692781 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 22,68 | 30,49 | 30,49 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1088 | Finasteridum | Finamef, Finasteryd Mepha, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. | 5909990049929 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 30,10 | 38,69 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 8,82 |
| 1089 | Finasteridum | Finamef, Finasteryd Teva, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990713127 | 2012-03-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 23,76 | 31,91 | 31,91 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1090 | Finasteridum | Finamef, Finasteryd Teva, tabl. powł., 5 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990713141 | 2012-03-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 71,28 | 88,74 | 88,74 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 9,60 |
| 1091 | Finasteridum | Finanorm, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. | 5909990670130 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 31,32 | 40,00 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 10,13 |
| 1092 | Finasteridum | Finaran, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990082391 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 30,24 | 38,84 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 8,97 |
| 1093 | Finasteridum | Finaride, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991069315 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 21,60 | 29,60 | 29,60 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1094 | Finasteridum | Finaster, tabl. powł., 5 mg | 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) | 5909990811045 | 2012-05-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 74,52 | 92,21 | 92,21 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 9,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 1095 | Finasteridum | Finaster, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991151218 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 25,81 | 34,10 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,23 |
| 1096 | Finasteridum | Finasterid Stada, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. | 5909990055098 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 22,68 | 30,75 | 30,75 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1097 | Finasteridum | Finpros 5, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990017973 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 21,59 | 29,59 | 29,59 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1098 | Finasteridum | Finxta, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990050895 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 25,90 | 33,93 | 30,87 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 6,26 |
| 1099 | Finasteridum | Hyplafin, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990017997 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 24,84 | 33,07 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1100 | Finasteridum | Lifin, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990586158 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 42,98 | 52,21 | 30,87 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 24,54 |
| 1101 | Finasteridum | Penester, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990077267 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 34,56 | 43,47 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 13,60 |
| 1102 | Finasteridum | Penester, tabl. powl., 5 mg | 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) | 5909990077274 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 77,76 | 95,68 | 95,68 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 9,60 |
| 1103 | Finasteridum | Proscar, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990362110 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 28,36 | 36,57 | 30,87 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 8,90 |
| 1104 | Finasteridum | Symasteride, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990074105 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 21,39 | 29,37 | 29,37 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 1105 | Finasteridum | Ulgafen, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990057870 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 25,92 | 34,22 | 33,07 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,35 |
| 1106 | Finasteridum | Zasterid, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991053710 | 2012-01-01 | 2 lata | 77.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - inhibitory 5-alfa reduktazy | 23,76 | 31,64 | 30,87 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,97 |
| 1107 | Fluconazolom | Flucocast, kaps., 50 mg | 7 kaps. | 5909990490516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 10,58 | 14,76 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|--------|-------|---|--|-----|-------|
| 1108 | Fluconazolom | Flucofast, kaps., 50 mg | 14 kaps. | 5909990490523 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 21,60 | 28,54 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,62 |
| 1109 | Fluconazolom | Flucofast, kaps., 150 mg | 1 kaps. | 5909990490615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 4,32 | 6,31 | 5,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 3,76 |
| 1110 | Fluconazolom | Flucofast, kaps. twarde, 100 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990662371 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 22,14 | 29,12 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 17,20 |
| 1111 | Fluconazolom | Flucofast, kaps. twarde, 100 mg | 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990662388 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 91,80 | 110,58 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 62,90 |
| 1112 | Fluconazolom | Fluconazin, syrop, 5 mg/ml | 150 ml (but.) | 5909991097219 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 25,14 | 33,44 | 33,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 1113 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg | 1 tabl. (blis.) | 5909990017874 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 3,87 | 5,82 | 5,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 3,27 |
| 1114 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg | 3 tabl. (blis.) | 5909990017881 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 11,62 | 16,46 | 15,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,80 |
| 1115 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg | 28 tabl. | 5909990780181 | 2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 73,44 | 90,94 | 90,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 45,47 |
| 1116 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml | 150 ml (but.) | 5909990859511 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 25,14 | 33,44 | 33,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,72 |
| 1117 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990859610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 21,98 | 28,95 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 17,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--------------------------------------|------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 1118 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl., 50 mg | 7 tabl. (blist.) | 5909990859672 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 9,18 | 13,26 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,30 |
| 1119 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl., 100 mg | 7 tabl. (blist.) | 5909990859719 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 23,61 | 30,69 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 18,77 |
| 1120 | Fluconazolom | Flucorta, syrop, 50 mg/10 ml | 150 ml | 5909990773862 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 25,14 | 33,44 | 33,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,72 |
| 1121 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 50 mg | 14 kaps. | 5909990356010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 24,08 | 31,20 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 19,28 |
| 1122 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 100 mg | 7 kaps. | 5909990356119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 26,67 | 33,97 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 22,05 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--------------------------|------------------|---------------|---|--------|---|-------|--------|-------|--|---|-----|-------|
| 1123 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 100 mg | 28 kaps. | 5909990356126 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 89,92 | 108,56 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 60,88 |
| 1124 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 50 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990652273 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 9,56 | 13,67 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,71 |
| 1125 | Fluconazolom | Flumycon, syrop, 5 mg/ml | 150 ml | 5909990841707 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 24,84 | 33,11 | 33,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,56 |
| 1126 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 150 mg | 1 kaps. (blist.) | 5909991034115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 4,58 | 6,59 | 5,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 4,04 |
| 1127 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 200 mg | 7 kaps. | 5909991034214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 38,20 | 49,26 | 47,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 25,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------|---|-------------------|---------------|---|--------|--|-------|--------|-------|--|---|-----------|-------|
| 1128 | Fluconazolom | Mycosyst, kaps., 100 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990642533 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 23,61 | 30,69 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 18,77 |
| 1129 | Fluconazolom | Mycosyst, kaps., 50 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990980512 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 9,89 | 14,03 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,07 |
| 1130 | Fluconazolom | Mycosyst, kaps., 100 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990980611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 90,72 | 109,43 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 61,75 |
| 1131 | Fluconazolom | Mycosyst, kaps., 200 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909991118914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 36,72 | 47,68 | 47,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 23,84 |
| 1132 | Fludrocortisonum | Cortineff, tabl. , 100 g [mikrogram] | 20 tabl. | 5909990170319 | 2012-01-01 | 2 lata | 80.0, Korykosteroidy do stosowania ogólnego - mineralokortykoidy - fludrokortyzon | 3,89 | 5,82 | 5,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1133 | Fludrocortisonum | Cortineff opthalm. 0,1%, Ma do oczu, 1 mg/g | 3 g | 5909990104918 | 2012-01-01 | 2 lata | 209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,38 | 5,96 | 4,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,71 |
| 1134 | Fluorouracilum | Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 1 fiol. po 20 ml | 5909990477913 | 2012-01-01 | 2 lata | 122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego | 14,57 | 20,21 | 20,21 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------|--|---------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 1135 | Fluorouracilum | Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 1 fiol. po 10 ml | 5909990477814 | 2012-01-01 | 2 lata | 122.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - fluorouracyl do stosowania pozajelitowego | 7,56 | 10,93 | 10,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,82 |
| 1136 | Fluoxetinum | Andepin, kaps. twarde, 20 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991065515 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 14,02 | 18,87 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 8,45 |
| 1137 | Fluoxetinum | Bioxetin, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990372317 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 22,52 | 27,96 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 17,54 |
| 1138 | Fluoxetinum | Deprexetin, kaps., 20 mg | 30 kaps. | 5909990747610 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 23,22 | 28,72 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 18,30 |
| 1139 | Fluoxetinum | Fluoksetyna EGIS, kaps. twarde, 20 mg | 28 kaps. | 5909990776955 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 12,53 | 17,13 | 13,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 7,41 |
| 1140 | Fluoxetinum | Fluoxetin Polpharma, Fluoxetin, kaps. twarde, 20 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990770311 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 15,44 | 20,39 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 9,97 |
| 1141 | Fluoxetinum | Fluxemed, kaps. twarde, 20 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990742509 | 2012-05-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 10,37 | 14,97 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 4,55 |
| 1142 | Fluoxetinum | Seronil, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990374311 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 13,63 | 16,86 | 7,44 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 11,65 |
| 1143 | Fluoxetinum | Seronil, tabl. powl., 10 mg | 10 blist. po 10szt. | 5909990374328 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 40,65 | 48,95 | 24,79 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 31,60 |
| 1144 | Fluoxetinum | Seronil, kaps. twarde, 20 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990374410 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 19,56 | 24,80 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,38 |
| 1145 | Fluoxetinum | Seronil, kaps. twarde, 20 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990374427 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 56,56 | 68,95 | 49,58 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 34,24 |
| 1146 | Flupentixolum | Fluanxol, tabl. dra owane, 0,5 mg | 50 dra . (pojem.) | 5909990127016 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,01 | 13,96 | 6,84 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | ryczałt | 10,32 |
| 1147 | Flupentixolum | Fluanxol, tabl. dra owane, 3 mg | 50 dra . | 5909990127115 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.1, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 31,32 | 41,04 | 41,04 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | ryczałt | 3,20 |
| 1148 | Flupentixolum | Fluanxol Depot, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml | 1 amp.a 1 ml | 5909990127214 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.2, Leki przeciwpsychotyczne - flupentyksol do podawania pozajelitowego | 10,56 | 15,06 | 15,06 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | ryczałt | 3,20 |
| 1149 | Flutamidum | Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg | 30 tabl. | 5909990941612 | 2012-01-01 | 2 lata | 131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej | 17,50 | 23,97 | 21,90 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,07 |
| 1150 | Flutamidum | Apo-Flutam, tabl. powl., 250 mg | 90 tabl. | 5909990941629 | 2012-01-01 | 2 lata | 131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej | 52,77 | 66,57 | 65,71 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,86 |
| 1151 | Flutamidum | Flutamid EGIS, tabl. , 250 mg | 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.) | 5909990139217 | 2012-01-01 | 2 lata | 131.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyandrogeny o budowie niesteroidowej | 58,21 | 73,01 | 73,01 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------------------|--|-------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|-------|
| 1152 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | Seretide 125, aerozol wziewny, zawiesina, 125+25 g | 1 szt. (120 daw.) | 5909990907014 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach | 101,65 | 122,08 | 105,65 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 19,63 |
| 1153 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | Seretide 250, aerozol wziewny, zawiesina, 250+25 g | 1 szt. (120 daw.) | 5909990907113 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach | 155,15 | 182,29 | 172,00 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 13,49 |
| 1154 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | Seretide 50, aerozol wziewny, zawiesina, 50+25 g | 1 poj.a 120 daw. | 5909990906918 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach | 78,00 | 96,14 | 96,14 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1155 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | Seretide Dysk 100, proszek do inhalacji, 100+50 g | 1 szt. (60 daw.) | 5909990832422 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w niskich dawkach | 85,60 | 104,27 | 96,14 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 11,33 |
| 1156 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | Seretide Dysk 250, proszek do inhalacji, 250+50 g | 1 szt. (60 daw.) | 5909990832521 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.2, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w rednich dawkach | 108,82 | 129,75 | 105,65 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 27,30 |
| 1157 | Fluticasoni propionas + Salmeterolum | Seretide Dysk 500, proszek do inhalacji, 500+50 g | 1 szt. (60 daw.) | 5909990832620 | 2012-01-01 | 2 lata | 199.3, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty złożone z kortykosteroidami w wysokich dawkach | 145,52 | 172,00 | 172,00 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1158 | Fluticasonum | Cutivate, krem, 0,5 mg/g | 15 g | 5909990365012 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o dużej sile działania | 8,64 | 10,84 | 5,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,13 |
| 1159 | Fluticasonum | Cutivate, maść, 0,05 mg/g | 15 g | 5909990365111 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o dużej sile działania | 8,64 | 10,84 | 5,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,13 |
| 1160 | Fluticasonum | Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw. | 1 poj.a 120 daw. | 5909990570720 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 17,82 | 21,50 | 8,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha | 50% | 17,20 |
| 1161 | Fluticasonum | Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw. | 1 op.a 120 daw. (10 ml) | 5909990294817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 22,14 | 26,12 | 8,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha | 50% | 21,82 |
| 1162 | Fluticasonum | Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 g | 28 poj. | 5909990933822 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 44,82 | 51,86 | 16,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha | 50% | 43,84 |
| 1163 | Fluticasonum | Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 50 g | 120 daw. (1 poj.) | 5909990851317 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 34,14 | 40,36 | 14,28 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 29,28 |
| 1164 | Fluticasonum | Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 g | 60 daw. (1 poj.) | 5909990851416 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 35,56 | 42,47 | 17,85 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 27,82 |
| 1165 | Fluticasonum | Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 125 g | 120 daw. (1 poj.) | 5909990851423 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 76,68 | 88,93 | 35,69 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 56,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|-------|---|----|---------|-------|
| 1166 | Fluticasonum | Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 g | 60 daw. (1 poj.) | 5909990851515 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 61,82 | 73,03 | 35,69 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 40,54 |
| 1167 | Fluticasonum | Flixotide, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 250 g | 120 daw. (1 poj.) | 5909990851522 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 113,92 | 132,23 | 71,38 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 66,18 |
| 1168 | Fluticasonum | Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 500 g/2ml | 10 poj.a 2 ml | 5909990956517 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w reдных dawkach | 30,24 | 40,71 | 40,71 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1169 | Fluticasonum | Flixotide, zawiesina do inhalacji z nebulizatorem, 2 mg/2ml | 10 poj.a 2 ml | 5909990956616 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w wysokich dawkach | 73,44 | 90,94 | 90,94 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1170 | Fluticasonum | Flixotide, zawiesina do nebulizacji, 500 g/2ml | 10 poj. (5 blist.po2) | 5909997012186 | 2012-03-01 | 2 lata | 200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacię płynne do nebulizacji w reдных dawkach | 30,23 | 40,70 | 40,70 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1171 | Fluticasonum | Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 50 g | 1 poj.a 60 daw. | 5909990484522 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 21,60 | 25,36 | 7,14 | Astma, przewłękła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 21,42 |
| 1172 | Fluticasonum | Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 100 g | 1 poj.a 60 daw. | 5909990484621 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 35,64 | 41,97 | 14,28 | Astma, przewłękła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 30,89 |
| 1173 | Fluticasonum | Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 250 g | 1 poj.a 60 daw. | 5909990484720 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 67,00 | 78,57 | 35,69 | Astma, przewłękła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 46,08 |
| 1174 | Fluticasonum | Flixotide Dysk, proszek do inhalacji, 500 g | 1 poj.a 60 daw. | 5909990484829 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 111,20 | 129,33 | 71,38 | Astma, przewłękła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 63,28 |
| 1175 | Fluticasonum | Flutixon, proszek do inhalacji w kaps., 125 g | 60 kaps. (60 daw.) | 5909990785858 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 51,62 | 62,11 | 35,69 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 29,62 |
| 1176 | Fluticasonum | Flutixon, proszek do inhalacji w kaps., 250 g | 60 kaps. (60 daw.) | 5909990785889 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 84,56 | 100,83 | 71,38 | Astma; Przewłękła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 34,78 |
| 1177 | Fluvastatinum | Lescol, kaps., 20 mg | 28 kaps. | 5909990360314 | 2012-01-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 25,92 | 29,70 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 25,47 |
| 1178 | Fluvastatinum | Lescol, tabl. powl., 40 mg | 28 kaps. | 5909990360413 | 2012-01-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 36,72 | 42,74 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 34,28 |
| 1179 | Fluvastatinum | Lescol XL, tabl. o przedl. uwalnianiu, 80 mg | 28 tabl. | 5909990504244 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 48,60 | 57,44 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 40,52 |
| 1180 | Fluvastatinum | Lescol XL, tabl. o przedl. onym uwalnianiu, 80 mg | 28 tabl. | 5909990887217 | 2012-01-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 52,92 | 62,06 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 45,14 |
| 1181 | Fluvoxaminum | Fevarin, tabl. powl., 50 mg | 60 tabl. | 5909990347728 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 49,73 | 57,08 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 46,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 1182 | Fluvoxaminum | Fevarin, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990347827 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 49,73 | 57,08 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslows | | 30% | 46,66 |
| 1183 | Formoterolum | Atimos, aerozol wziewny, roztwór, 12 mcg | 1 poj.a 120 daw. | 5909990620777 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 101,65 | 122,47 | 122,47 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,40 |
| 1184 | Formoterolum | Diffumax Easyhaler, proszek do inhalacji, 12 mcg | 1 poj. (120 daw.) (+ op.ochr.) | 5909990337446 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 102,60 | 123,48 | 123,40 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,48 |
| 1185 | Formoterolum | Foradil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg | 60 kaps. | 5909990792924 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 58,21 | 71,98 | 61,70 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 13,48 |
| 1186 | Formoterolum | Foramed, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg | 60 kaps. + inhalator | 5909991109523 | 2012-05-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 48,60 | 61,70 | 61,70 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1187 | Formoterolum | Forastmin, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990614400 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 48,60 | 61,70 | 61,70 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1188 | Formoterolum | Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 4,5 mcg/dawk | 1 szt. (60 daw.) | 5909990445219 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 32,83 | 41,53 | 30,85 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 13,88 |
| 1189 | Formoterolum | Oxis Turbuhaler, proszek do inhalacji, 9 mcg/dawk | 1 szt. (60 daw.) | 5909990445318 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 41,90 | 54,53 | 54,53 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1190 | Formoterolum | Oxidil, proszek do inhalacji w kaps., 12 mcg | 60 kaps. (6 blist.po 10 szt.) | 5909991083625 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 48,60 | 61,70 | 61,70 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1191 | Formoterolum | Oxidil PPH, proszek do inhalacji w kaps. twardech, 12 mcg | 60 kaps. + inhalator | 5909990849000 | 2012-05-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 48,60 | 61,70 | 61,70 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1192 | Formoterolum | Zafiron, proszek w kaps., 12 mcg | 60 kaps. | 5909990975914 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 50,49 | 63,72 | 61,70 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc; eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 5,22 |
| 1193 | Furaginum | Furaginum Teva, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990988235 | 2012-01-01 | 2 lata | 108.0, Chemioterapeutyki do stosowania doustnego - pochodne nitrofuranowe | 4,95 | 7,39 | 7,39 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,70 |
| 1194 | Furosemidum | Furosemidum Polfarmex, tabl. , 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990223794 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 37.0, Leki moczop dne - p tlows | 2,46 | 3,69 | 3,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rodkowym ukkladzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 1195 | Furosemidum | Furosemidum Polpharma, Furosemidum, tabl. , 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990135028 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 37.0, Leki moczop dne - p tlows | 2,46 | 3,69 | 3,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rodkowym ukkladzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---------------------------------------|-----------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 1196 | Gabapentinum | Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990714322 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 23,76 | 29,72 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 16,05 |
| 1197 | Gabapentinum | Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990714452 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 70,20 | 83,81 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 36,40 |
| 1198 | Gabapentinum | Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990714605 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 86,40 | 102,54 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 38,26 |
| 1199 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, tabl. powł., 600 mg | 100 tabl. | 5909990338542 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 82,30 | 100,75 | 100,75 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1200 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, tabl. powł., 800 mg | 100 tabl. | 5909990338658 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 113,39 | 135,42 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 5,20 |
| 1201 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990339495 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 21,60 | 27,41 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 13,74 |
| 1202 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990339600 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 53,62 | 67,46 | 67,46 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1203 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990339709 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 39,17 | 50,61 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1204 | Gabapentinum | Gabatem, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990676088 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 21,60 | 27,41 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 13,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|----------------------------------|--------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 1205 | Gabapentinum | Gabatem, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990676170 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 64,80 | 78,03 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 30,62 |
| 1206 | Gabapentinum | Gabatem, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990676248 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 83,16 | 99,07 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 34,79 |
| 1207 | Gabapentinum | Gabatem, tabl. powl., 600 mg | 100 tabl. | 5909990768035 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 81,00 | 99,36 | 99,36 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1208 | Gabapentinum | Gabatem, tabl. powl., 800 mg | 100 tabl. | 5909990768059 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 108,00 | 129,65 | 129,65 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 4,74 |
| 1209 | Gabapentinum | Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990651535 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 21,38 | 27,18 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 13,51 |
| 1210 | Gabapentinum | Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990651566 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 39,10 | 50,53 | 50,53 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1211 | Gabapentinum | Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990651603 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 52,92 | 66,71 | 66,71 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1212 | Gabapentinum | Neuran 600, tabl. powl., 600 mg | 100 tabl. | 5909990055081 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 81,00 | 99,36 | 99,36 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1213 | Gabapentinum | Neuran 800, tabl. powl., 800 mg | 100 tabl. (blist.) | 5909990651696 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 113,40 | 135,43 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 5,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 1214 | Gabapentinum | Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990769216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 42,37 | 49,63 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 35,96 |
| 1215 | Gabapentinum | Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990769315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 89,24 | 104,19 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 56,78 |
| 1216 | Gabapentinum | Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990769414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 119,88 | 138,36 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 74,08 |
| 1217 | Gabapentinum | Neurontin 600, tabl. powl., 600 mg | 100 tabl. | 5909991017422 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 147,84 | 170,88 | 101,22 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 73,22 |
| 1218 | Gabapentinum | Neurontin 800, tabl. powl., 800 mg | 100 tabl. | 5909991017521 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 141,50 | 165,49 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 35,27 |
| 1219 | Gabapentinum | Symleptic, tabl. powl., 600 mg | 100 tabl. | 5909990678747 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 90,48 | 109,50 | 101,22 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 11,84 |
| 1220 | Gabapentinum | Symleptic, tabl. powl., 800 mg | 100 tabl. | 5909990678792 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 126,24 | 149,16 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 18,94 |
| 1221 | Gabapentinum | Symleptic, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990685554 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 26,00 | 32,12 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 18,45 |
| 1222 | Gabapentinum | Symleptic, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990685561 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 63,72 | 76,87 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 29,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|---------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|-------|--|--|---------|-------|
| 1223 | Gabapentinum | Symleptic, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990685660 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 97,84 | 114,78 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 50,50 |
| 1224 | Gentamicinum | Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 40 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990095711 | 2012-01-01 | 2 lata | 103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna | 4,81 | 6,40 | 4,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,26 |
| 1225 | Gentamicinum | Gentamicin KRKA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 40 mg/ml | 10 amp.a 2 ml | 5909990095728 | 2012-01-01 | 2 lata | 103.2, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania pozajelitowego - gentamycyna | 5,80 | 8,57 | 8,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,29 |
| 1226 | Gentamicinum | Gentamicin WZF 0,3%, krople do oczu, roztwór, 3 mg/ml | 5 ml | 5909990092413 | 2012-01-01 | 2 lata | 208.0, Antybiotyki aminoglikozydowe do stosowania do oczu | 2,07 | 3,10 | 3,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 1,55 |
| 1227 | Gliclazidum | Diabrezide, tabl. , 80 mg | 40 tabl. | 5909990359912 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 11,02 | 13,79 | 6,47 | Cukrzyca | | ryczałt | 10,52 |
| 1228 | Gliclazidum | Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990443017 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 27,00 | 31,63 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 25,12 |
| 1229 | Gliclazidum | Diaprel MR, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 30 tabl. | 5909990774746 | 2012-07-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 21,60 | 25,85 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 19,34 |
| 1230 | Gliclazidum | Diazidan, tabl. powl., 80 mg | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | 5909990911127 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 14,58 | 18,34 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 11,83 |
| 1231 | Gliclazidum | Glazide, tabl. , 80 mg | 60 tabl. | 5909991036218 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 14,58 | 18,34 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 11,83 |
| 1232 | Gliclazidum | Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | 5909990647224 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 19,12 | 23,20 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 16,69 |
| 1233 | Gliclazidum | Gliclada, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) | 5909990647231 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 22,39 | 27,71 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 17,94 |
| 1234 | Glimepiridum | Amaryl 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. | 5909990744817 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 4,61 | 6,42 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,76 |
| 1235 | Glimepiridum | Amaryl 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990744916 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 8,08 | 11,39 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,88 |
| 1236 | Glimepiridum | Amaryl 3, tabl. , 3 mg | 30 tabl. | 5909990745012 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,74 | 18,44 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 8,67 |
| 1237 | Glimepiridum | AMARYL 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909997070414 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,86 | 19,32 | 19,32 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1238 | Glimepiridum | Amaryl 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990745111 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,96 | 19,42 | 19,42 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1239 | Glimepiridum | Amaryl 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909997076775 | 2012-07-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,94 | 19,40 | 19,40 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1240 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990674893 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,93 | 19,40 | 19,40 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|----------|----|---------|------|
| 1241 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990674909 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 10,15 | 14,60 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,83 |
| 1242 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990674947 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 6,75 | 9,97 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,46 |
| 1243 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990674954 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,35 | 5,07 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,41 |
| 1244 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991090715 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,97 | 5,75 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,09 |
| 1245 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991090814 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 8,09 | 11,40 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,89 |
| 1246 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991090913 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 12,32 | 16,92 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,15 |
| 1247 | Glimepiridum | Avaron, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991091019 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 16,72 | 22,37 | 19,42 | Cukrzyca | | ryczałt | 9,35 |
| 1248 | Glimepiridum | Diaril, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990566082 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 4,89 | 6,72 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,06 |
| 1249 | Glimepiridum | Diaril, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990566105 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 8,91 | 12,27 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,76 |
| 1250 | Glimepiridum | Diaril, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990566129 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 12,74 | 17,37 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,60 |
| 1251 | Glimepiridum | Diaril, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990566143 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 16,56 | 22,21 | 19,42 | Cukrzyca | | ryczałt | 9,19 |
| 1252 | Glimepiridum | Glibetic 1 mg, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991097615 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,97 | 5,75 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,09 |
| 1253 | Glimepiridum | Glibetic 2 mg, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991097516 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 8,09 | 11,40 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,89 |
| 1254 | Glimepiridum | Glibetic 3 mg, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991097417 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 11,88 | 16,45 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,68 |
| 1255 | Glimepiridum | Glibetic 4 mg, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991097318 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,96 | 19,42 | 19,42 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1256 | Glimepiridum | Glidamid, tabl. powl., 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990430536 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,56 | 5,30 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,64 |
| 1257 | Glimepiridum | Glidamid, tabl. powl., 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990430543 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 7,88 | 11,18 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,67 |
| 1258 | Glimepiridum | Glidamid, tabl. powl., 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990430550 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 12,20 | 16,79 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,02 |
| 1259 | Glimepiridum | Glidamid, tabl. powl., 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990430567 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 16,20 | 21,82 | 19,42 | Cukrzyca | | ryczałt | 8,80 |
| 1260 | Glimepiridum | GlimeHexal 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337453 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,40 | 5,13 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|----------|----|---------|-------|
| 1261 | Glimepiridum | GlimeHexal 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337521 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 7,51 | 10,78 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,27 |
| 1262 | Glimepiridum | GlimeHexal 3, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338078 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 11,56 | 16,11 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,34 |
| 1263 | Glimepiridum | GlimeHexal 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338146 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 15,93 | 21,54 | 19,42 | Cukrzyca | | ryczałt | 8,52 |
| 1264 | Glimepiridum | GlimeHexal 6, tabl. , 6 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338207 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 23,87 | 31,40 | 29,13 | Cukrzyca | | ryczałt | 11,87 |
| 1265 | Glimepiridum | Glipid, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990420179 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,52 | 5,26 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,60 |
| 1266 | Glimepiridum | Glipid, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990420186 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 5,79 | 8,94 | 8,94 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1267 | Glimepiridum | Glipid, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990420193 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 7,78 | 12,06 | 12,06 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,80 |
| 1268 | Glimepiridum | Glipid, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990420209 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,15 | 18,56 | 18,56 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1269 | Glimepiridum | Glitoprel, tabl. , 1 mg | 30 tabl. | 5909990085903 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,13 | 4,84 | 4,84 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1270 | Glimepiridum | Glitoprel, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990085927 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 6,43 | 9,62 | 9,62 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1271 | Glimepiridum | Glitoprel, tabl. , 3 mg | 30 tabl. | 5909990085934 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 9,67 | 14,09 | 14,09 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,80 |
| 1272 | Glimepiridum | Glitoprel, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990085941 | 2012-03-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 12,91 | 18,30 | 18,30 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1273 | Glimepiridum | Pemidal, tabl. , 1 mg | 30 tabl. | 5909990570553 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,46 | 5,19 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,53 |
| 1274 | Glimepiridum | Pemidal, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990570577 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 6,91 | 10,13 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,62 |
| 1275 | Glimepiridum | Pemidal, tabl. , 3 mg | 30 tabl. | 5909990570591 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 10,37 | 14,84 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,07 |
| 1276 | Glimepiridum | Pemidal, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990570614 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 13,82 | 19,27 | 19,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1277 | Glimepiridum | Synglic, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570348 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 3,21 | 4,92 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,26 |
| 1278 | Glimepiridum | Synglic, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570355 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 7,21 | 10,45 | 9,71 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,94 |
| 1279 | Glimepiridum | Synglic, tabl. , 3 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570362 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 11,24 | 15,77 | 14,57 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,00 |
| 1280 | Glimepiridum | Synglic, tabl. , 6 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570379 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 22,14 | 29,56 | 29,13 | Cukrzyca | | ryczałt | 10,03 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|-----------|------|
| 1281 | Glimepiridum | Symglic, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573196 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 12,96 | 18,35 | 18,35 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1282 | Glipizidum | Glipizide BP, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990791712 | 2012-01-01 | 2 lata | 16.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - pochodne sulfonylomocznika | 5,40 | 7,27 | 4,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,61 |
| 1283 | Glucagonum | GlucaGen 1 mg HypoKit, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1 mg | 1 fiol. (+1 rozp.) | 5909990693313 | 2012-01-01 | 2 lata | 85.0, Hormony trzuski - glukagon | 51,82 | 65,49 | 65,49 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1284 | Glyceryli trinitras | Nitromint, aerozol podj zykowy, 0,4 mg/dawk | 11 g (200 daw.) | 5909990156825 | 2012-01-01 | 2 lata | 33.2, Leki rozszerzajace naczyinia krwiono ne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - produkty o natychmiastowym dzialaniu | 12,85 | 18,00 | 18,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,41 |
| 1285 | Glyceryli trinitras | Sustonit, tabl. o przedhu onym uwalnianiu, 6,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990183036 | 2012-01-01 | 2 lata | 33.1, Leki rozszerzaj ce naczyinia krwiono ne - organiczne azotany - trójazotan glicerolu - do podawania doustnego | 2,30 | 3,45 | 3,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,45 |
| 1286 | Gonadotrophinum chorionicum | Pregnyl, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 5000 j.m. | 1 amp. (+ 1 rozp. 1 ml) | 5909990713530 | 2012-01-01 | 2 lata | 69.0, Hormony plciowe - gonadotropiny i inne leki stymulujace owulacj | 18,93 | 25,80 | 25,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,74 |
| 1287 | Goserelinum | Zoladex, implant podskórny, 3,6 mg | 1 amp.-strz. | 5909990082315 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalnij cego gonadotropin | 270,00 | 308,67 | 301,98 | Nowotwory zło liwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 9,89 |
| 1288 | Goserelinum | Zoladex LA, implant podskórny, 10,8 mg | 1 amp.-strz. | 5909990783212 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - analogi hormonu uwalnij cego gonadotropin | 873,72 | 970,75 | 970,66 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 9,69 |
| 1289 | Haloperidolum | Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml | 10 ml | 5909990239412 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.1, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 2,28 | 3,42 | 3,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 1,03 |
| 1290 | Haloperidolum | Haloperidol UNIA, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml | 10 ml | 5909990239412 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.1, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 2,28 | 3,42 | 3,42 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1291 | Haloperidolum | Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg | 40 tabl. (blist.) | 5909990104017 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.2, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stafe postacie farmaceutyczne | 4,16 | 4,92 | 1,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,76 |
| 1292 | Haloperidolum | Haloperidol WZF, tabl. , 1 mg | 40 tabl. (blist.) | 5909990104017 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.2, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stafe postacie farmaceutyczne | 4,16 | 4,92 | 1,66 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslwe | | bezpłatny | 3,26 |
| 1293 | Haloperidolum | Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990722617 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.2, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stafe postacie farmaceutyczne | 4,16 | 6,23 | 6,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 1,87 |
| 1294 | Haloperidolum | Haloperidol WZF, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990722617 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.2, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - stafe postacie farmaceutyczne | 4,16 | 6,23 | 6,23 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1295 | Haloperidolum | Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml | 10 ml | 5909990969319 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.1, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 2,28 | 3,42 | 3,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 1,03 |
| 1296 | Haloperidolum | Haloperidol WZF 0,2%, krople doustne, roztwór, 2 mg/ml | 10 ml | 5909990969319 | 2012-01-01 | 2 lata | 177.1, Leki przeciwpyszotyczne - haloperydol do podawania doustnego - plynne postacie farmaceutyczne | 2,28 | 3,42 | 3,42 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslwe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|-------|--|--|-----------|-------|
| 1297 | Hydrocortisonum | Hydrocortisonum AFP, krem, 0,01 g/1 g | 15 g | 5909990950317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania | 1,77 | 2,65 | 2,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory | 50% | 1,33 |
| 1298 | Hydrocortisonum | Laticort 0,1%, plyn na skór , 1 mg/ml | 20 ml | 5909990229215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania | 4,62 | 5,94 | 3,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory | 50% | 4,18 |
| 1299 | Hydrocortisonum + Oxytetracyclinum + Polymyxinum B | Atecartin, krople do oczu i uszu, zawiesina , (5mg+10000 j.m.+ 15mg) /ml mg/ml, j.m./ml | 5 ml | 5909990124718 | 2012-01-01 | 2 lata | 209.0, Korykosteroidy do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 4,97 | 7,42 | 7,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1300 | Hydroxycarbamidum | Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg | 100 kaps. | 5909990836758 | 2012-03-01 | 2 lata | 126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik | 64,58 | 80,51 | 80,51 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1301 | Hydroxycarbamidum | Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg | 100 kaps. | 5909990944927 | 2012-01-01 | 2 lata | 126.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne - hydroksymocznik | 86,12 | 103,56 | 80,51 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 23,05 |
| 1302 | Ibuprofenum | Ibuprofen AFL, tabl. dra owane, 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990673988 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 4,48 | 6,85 | 6,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1303 | Ibuprofenum | Ibuprofen Hasco, kaps. mi kkie, 200 mg | 60 kaps. | 5909990853540 | 2012-03-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 4,48 | 6,85 | 6,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1304 | Ibuprofenum | Ibuprofen Polfarmex, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990830732 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 5,22 | 7,65 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,60 |
| 1305 | Ibuprofenum | Ibuprofen-Pabi, tabl. dra owane, 200 mg | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | 5909990132928 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 5,25 | 7,67 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,62 |
| 1306 | Imidaprilum | Tanatril, tabl. , 5 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991069810 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 14,96 | 16,80 | 2,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 16,80 |
| 1307 | Imidaprilum | Tanatril, tabl. , 10 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991069919 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 19,22 | 22,17 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 19,78 |
| 1308 | Imidaprilum | Tanatril, tabl. , 20 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991070014 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 32,94 | 38,15 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 32,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|------|
| 1309 | Indapamidum | Apo-Indap, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990988716 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,59 | 10,70 | 10,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,21 |
| 1310 | Indapamidum | Diuresin SR, tabl. powł. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990975815 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,59 | 9,49 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,30 |
| 1311 | Indapamidum | Indap, kaps. twarde, 2,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991162917 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,85 | 10,98 | 10,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,29 |
| 1312 | Indapamidum | Indapamide SR Arrow, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990223077 | 2012-07-01 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,18 | 7,97 | 7,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,39 |
| 1313 | Indapamidum | Indapamidum 123ratio (Indapamidum Farmacom), tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990586806 | 2012-05-01 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,40 | 8,21 | 8,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,46 |
| 1314 | Indapamidum | Indapen, tabl. powł., 2,5 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990863013 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,70 | 9,82 | 9,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,95 |
| 1315 | Indapamidum | Indapen SR, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990665907 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,05 | 8,90 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,71 |
| 1316 | Indapamidum | Indapres, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990223121 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,70 | 10,82 | 10,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,25 |
| 1317 | Indapamidum | Indipam SR, tabl. o przedf. uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990702534 | 2012-07-01 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,38 | 8,19 | 8,19 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,46 |
| 1318 | Indapamidum | Ipres long 1,5, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990012688 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,59 | 9,49 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,30 |
| 1319 | Indapamidum | Opamid, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990770182 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,43 | 9,31 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,12 |
| 1320 | Indapamidum | Rawel SR, tabl. powł. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990424801 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,97 | 9,90 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,71 |
| 1321 | Indapamidum | Rawel SR, tabl. powł. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 60 tabl. | 5909990424849 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 13,93 | 19,00 | 17,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 1322 | Indapamidum | Symapamid SR, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990734993 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,40 | 8,21 | 8,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,46 |
| 1323 | Indapamidum | Tertensif SR, tabl. powl. o przedfu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990738212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 11,88 | 15,15 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,96 |
| 1324 | Insulini c. zinco suspensio compositum | Insulinum Lente Wo-S Alto Depuratum TZF, zawiesina do wstrzykiwa , 80 j.m/ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990339815 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierz ce | 34,73 | 45,24 | 45,24 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1325 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Insuman Comb 25, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990915613 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 85,68 | 104,51 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 9,10 |
| 1326 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Mixtard 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990238323 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 90,94 | 110,14 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 14,73 |
| 1327 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Mixtard 40 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990347124 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 90,94 | 110,14 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 14,73 |
| 1328 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Mixtard 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 x 3 ml | 5909990348121 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 90,94 | 110,14 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 14,73 |
| 1329 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Polhumin Mix - 2, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909991022921 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 80,46 | 98,92 | 98,92 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1330 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Polhumin Mix - 3, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909991023027 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 80,46 | 98,92 | 98,92 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1331 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Polhumin Mix - 4, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909991023126 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 80,46 | 98,92 | 98,92 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1332 | Insulini injectio neutralis + Insulinum isophanum | Polhumin Mix - 5, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909991023324 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 80,46 | 98,92 | 98,92 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1333 | Insulini injectio neutralis | Actrapid Penfill, roztwór do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990237920 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 90,94 | 110,14 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 14,73 |
| 1334 | Insulini injectio neutralis | Insulinum Maxirapid Wo-S Alto Depuratum TZF, roztwór do wstrzykiwa , 80 j.m/ml | 1 fiol. po 10 ml | 5909990292219 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierz ce | 34,73 | 45,24 | 45,24 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1335 | Insulini injectio neutralis | Insulinum Solutio Neutralis Wo-S Alto Depuratum TZF, roztwór do wstrzykiwa , 80 j.m/ml | 1 fiol. po 10 ml | 5909990292318 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.2, Hormony trzuski - insuliny zwierz ce | 34,73 | 45,24 | 45,24 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1336 | Insulini injectio neutralis | Insuman Rapid , roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990914715 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 85,68 | 104,51 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 9,10 |
| 1337 | Insulinum aspartum | NovoMix 30 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990879915 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 117,77 | 138,84 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 43,43 |
| 1338 | Insulinum aspartum | NovoMix 50 Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml | 5 wkł.po 3ml | 5909990614981 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 117,77 | 138,84 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 43,43 |
| 1339 | Insulinum aspartum | NovoRapid Penfill, roztwór do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990451814 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulin ludzkich | 117,77 | 138,84 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 43,43 |
| 1340 | Insulinum detemirum | Levemir, roztwór do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j/ml | 5 wkł.a 3ml (Penfil) | 5909990005741 | 2012-07-01 | 2 lata | 14.3, Hormony trzuski - długodziałaj ce analogi insulin | 229,45 | 263,73 | 247,03 | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzie y i dzieci w wieku od 2 lat i powy ej | | 30% | 90,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|---|---|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 1341 | Insulinum glargine | Lantus, roztwór do wstrzykiwa , 100 j/ml | 5 wstrzykiwaczy SoloStar po 3ml | 5909990617555 | 2012-07-01 | 2 lata | 14.3, Hormony trzuski - długodziałaj ce analogi insulini | 213,84 | 247,03 | 247,03 | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzie y i dzieci od 6 roku ycia | | 30% | 74,11 |
| 1342 | Insulinum glargine | Lantus, roztwór do wstrzykiwa , 100 j/ml | 5 wkładów po 3ml (do wstrzykiwaczy OptiPen/ClickStar) | 5909990895717 | 2012-07-01 | 2 lata | 14.3, Hormony trzuski - długodziałaj ce analogi insulini | 213,84 | 247,03 | 247,03 | Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzie y i dzieci od 6 roku ycia | | 30% | 74,11 |
| 1343 | Insulinum glulisinum | Apidra, roztwór do wstrzykiwa , 100 j/ml | 5 wkł. a 3 ml OPTIPEN | 5909990008575 | 2012-05-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 108,15 | 128,55 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 33,14 |
| 1344 | Insulinum glulisinum | Apidra SoloStar, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m/ml | 5 wstrz.a 3 ml | 5909990617197 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 108,15 | 128,55 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 33,14 |
| 1345 | Insulinum humanum | Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990853014 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 56,73 | 70,97 | 66,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,90 |
| 1346 | Insulinum humanum | Gensulin M30 (30/70), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990853113 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,92 | 99,41 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1347 | Insulinum humanum | Gensulin M40 (40/60), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990853311 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,92 | 99,41 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1348 | Insulinum humanum | Gensulin M50 (50/50), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990853519 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,92 | 99,41 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1349 | Insulinum humanum | Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 1 fiol.a 10 ml | 5909990852314 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 56,73 | 70,97 | 66,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,90 |
| 1350 | Insulinum humanum | Gensulin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990852413 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,92 | 99,41 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1351 | Insulinum humanum | Gensulin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 1 fiol. po 10 ml | 5909990852017 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 56,73 | 70,97 | 66,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,90 |
| 1352 | Insulinum humanum | Gensulin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990852116 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,92 | 99,41 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1353 | Insulinum humanum | Humulin M3 (30/70), zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990246014 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 82,78 | 101,40 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,99 |
| 1354 | Insulinum humanum | Humulin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990246717 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 82,78 | 101,40 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,99 |
| 1355 | Insulinum humanum | Humulin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990247011 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 82,78 | 101,40 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 5,99 |
| 1356 | Insulinum humanum | Insuman Basal SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml | 5909990672448 | 2012-03-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 84,19 | 102,91 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,50 |
| 1357 | Insulinum humanum | Insuman Comb 25 SoloStar 100 j.m./ml zawiesina do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml | 5909990672585 | 2012-03-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 84,19 | 102,91 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,50 |
| 1358 | Insulinum humanum | Insuman Rapid SoloStar 100 j.m./ml roztwór do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, roztwór do wstrzykiw we wstrzykiwaczu, 100 j.m./ml | 5 wstrzykiwaczy SoloStar a 3 ml | 5909990672363 | 2012-03-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 84,19 | 102,91 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 7,50 |
| 1359 | Insulinum humanum | Polhumin N, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909991022525 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,46 | 98,92 | 98,92 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1360 | Insulinum humanum | Polhumin R, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909991022822 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 80,46 | 98,92 | 98,92 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,00 |
| 1361 | Insulinum isophanum | Insulatard Penfill, zawiesina do wstrzykiwa we wkładzie , 100 j.m/ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990348923 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1, Hormony trzuski - insuliny ludzkie i analogi insulini ludzkich | 90,94 | 110,14 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 14,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|-------|---|----|---------|-------|
| 1362 | Insulinum isophanum | Insuman Basal, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990915019 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 85,68 | 104,51 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 9,10 |
| 1363 | Insulinum lisprum | Humalog KwikPen, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wstrz.a 3 ml | 5909990657742 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 115,35 | 136,25 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 40,84 |
| 1364 | Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog, roztwór do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990692422 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 115,35 | 136,25 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 40,84 |
| 1365 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix25, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990455010 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 115,35 | 136,25 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 40,84 |
| 1366 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix25 KwikPen, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wstrz.a 3 ml | 5909990657766 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 115,35 | 136,25 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 40,84 |
| 1367 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix50, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wkł.a 3 ml | 5909990455614 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 115,35 | 136,25 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 40,84 |
| 1368 | Insulinum lisprum zinci protaminati injectio + Insulinum lisprum, injectio neutralis | Humalog Mix50 KwikPen, zawiesina do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 5 wstrz.a 3 ml | 5909990657780 | 2012-01-01 | 2 lata | 14.1. Hormony trzustki - insuliny ludzkie i analogi insuliny ludzkiej | 115,35 | 136,25 | 99,41 | Cukrzyca | | ryczałt | 40,84 |
| 1369 | Ipratropii bromidum | Atrovent, płyn do inhalacji z nebulizatora, 250 mcg/ml | 20 ml | 5909990322114 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu | 8,99 | 13,15 | 12,90 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,45 |
| 1370 | Ipratropii bromidum | Atrovent N, aerozol wziewny, roztwór, 20 mcg | 10 ml (200 daw.) | 5909990999019 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu | 18,93 | 25,80 | 25,80 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,56 |
| 1371 | Ipratropii bromidum | Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml | 20 amp.a 1 ml | 5909990977710 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu | 12,04 | 16,41 | 12,90 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 6,71 |
| 1372 | Ipratropii bromidum | Steri-Neb Ipratropium, roztwór do nebulizacji, 250 mcg/ml | 20 amp.a 2 ml | 5909990977727 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.1. Wziewne leki antycholinergiczne o krótkim działaniu - produkty jednoskładnikowe i złożone z lekami beta-2-adrenergicznymi o krótkim działaniu | 24,06 | 31,28 | 25,80 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 9,04 |
| 1373 | Irbesartanum | Irprestan, tabl. powł., 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990747054 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0. Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,76 | 14,99 | 7,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,43 |
| 1374 | Irbesartanum | Irprestan, tabl. powł., 150 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990747085 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0. Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,66 | 18,67 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,56 |
| 1375 | Irbesartanum | Irprestan, tabl. powł., 300 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990747122 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0. Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 27,65 | 35,91 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 13,69 |
| 1376 | Isosorbidi mononitras | Effox 10, tabl. , 10 mg | 60 tabl. | 5909990368334 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1. Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 3,46 | 5,17 | 4,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 1377 | Isosorbidi mononitras | Effox 20, tabl. , 20 mg | 50 tabl. | 5909990368426 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,72 | 8,46 | 8,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,64 |
| 1378 | Isosorbidi mononitras | Effox long 50, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 50 mg | 30 tabl. | 5909990368624 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,29 | 13,19 | 12,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 5,16 |
| 1379 | Isosorbidi mononitras | Effox long 75, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 30 tabl. | 5909990452118 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 12,88 | 18,04 | 18,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,00 |
| 1380 | Isosorbidi mononitras | Mono Mack Depot, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 14 tabl. | 5909990669011 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,21 | 13,99 | 11,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,50 |
| 1381 | Isosorbidi mononitras | Mono Mack Depot, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 28 tabl. | 5909990669028 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,17 | 25,44 | 22,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 10,46 |
| 1382 | Isosorbidi mononitras | Mononit 10, tabl. powł., 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990010516 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 4,00 | 5,75 | 4,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,14 |
| 1383 | Isosorbidi mononitras | Mononit 100 retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991011727 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,42 | 22,75 | 22,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 8,00 |
| 1384 | Isosorbidi mononitras | Mononit 20 , tabl. powł., 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990010622 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 7,33 | 10,55 | 9,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,13 |
| 1385 | Isosorbidi mononitras | Mononit 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990010714 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,77 | 9,94 | 9,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,52 |
| 1386 | Isosorbidi mononitras | Mononit 60 retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991011529 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,44 | 15,94 | 14,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,31 |
| 1387 | Isosorbidi mononitras | Monosan, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991133511 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwiono ne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 2,75 | 4,41 | 4,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 1388 | Isosorbidi mononitras | Monosan, tabl. , 20 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991133528 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 4,46 | 7,11 | 7,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1389 | Isosorbidi mononitras | Monosan, tabl. , 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991133610 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,89 | 9,00 | 9,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1390 | Isosorbidi mononitras | Monosan, tabl. , 40 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991133627 | 2012-01-01 | 2 lata | 34.1, Leki rozszerzające naczynia krwionośne - organiczne azotany - dwuazotan i monoazotan izosorbidu do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,70 | 15,40 | 15,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 5,33 |
| 1391 | Itraconazolum | Itragen, kaps. twarde, 100 mg | 28 kaps. | 5909990617463 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 79,92 | 97,87 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 50,19 |
| 1392 | Itraconazolum | Itrax, kaps. twarde, 100 mg | 4 kaps. | 5909990858255 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 11,99 | 16,58 | 13,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 9,77 |
| 1393 | Itraconazolum | Itrax, kaps. twarde, 100 mg | 28 kaps. | 5909990858262 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 81,11 | 99,15 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 51,47 |
| 1394 | Itraconazolum | Orungal, kaps., 100 mg | 4 kaps. | 5909990004317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 13,28 | 17,96 | 13,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 11,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|-------|--|--|---------|-------|
| 1395 | Itraconazolum | Orungal, kaps., 100 mg | 28 kaps. | 5909990004331 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 85,32 | 103,65 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 55,97 |
| 1396 | Itraconazolum | Trioxal, kaps., 100 mg | 4 kaps. | 5909991053819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 14,90 | 19,69 | 13,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 12,88 |
| 1397 | Itraconazolum | Trioxal, kaps., 100 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991053826 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 85,32 | 103,65 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 55,97 |
| 1398 | Kalii chloridum | Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 391 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990257515 | 2012-01-01 | 2 lata | 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu | 3,47 | 5,19 | 5,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,34 |
| 1399 | Kalii chloridum | Kalipoz Prolongatum, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 391 mg | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | 5909990257539 | 2012-01-01 | 2 lata | 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu | 6,90 | 10,09 | 10,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1400 | Kalii citras + Kalii hydrocarbonas | Kalium Effervescens Bezcukrowy , granulaty, 0,782 g/3g | 20 sasz. | 5909990269310 | 2012-01-01 | 2 lata | 20.0, Produkty do doustnej suplementacji potasu | 17,66 | 20,87 | 6,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 16,16 |
| 1401 | Kalii citras + Natrii citras + Acidum citricum | Citrolyt, granulaty do sporz dzania roztworu doustnego, 14,5+46,4+39,1 g/100g | 220 g | 5909990210817 | 2012-01-01 | 2 lata | 74.0, Leki urologiczne zmieniające pH moczu - cytryniany do sprz dzania roztworu doustnego | 42,80 | 54,88 | 54,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 16,46 |
| 1402 | Ketoconazolum | Ketoconazole Hasco, tabl. , 200 mg | 10 tabl. | 5909991045418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol | 6,42 | 9,43 | 9,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab | 50% | 4,72 |
| 1403 | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex, tabl. , 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991042615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol | 6,42 | 9,43 | 9,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab | 50% | 4,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 1404 | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991042639 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania do ustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol | 13,85 | 19,07 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab | 50% | 9,64 |
| 1405 | Ketoprofenum | Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990412112 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 10,29 | 14,58 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 7,33 |
| 1406 | Ketoprofenum | Febrofen, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990413317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 14,01 | 19,26 | 19,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 9,63 |
| 1407 | Ketoprofenum | Ketonal, kaps. twarde, 50 mg | 30 kaps. | 5909990046492 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 4,86 | 7,25 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 3,63 |
| 1408 | Ketoprofenum | Ketonal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg | 10 amp.a 2 ml | 5909990659524 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 6,48 | 9,51 | 9,51 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 4,76 |
| 1409 | Ketoprofenum | Ketonal DUO, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990064694 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 17,06 | 22,87 | 21,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 12,00 |
| 1410 | Ketoprofenum | Ketonal forte, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990046485 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,39 | 15,77 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 8,52 |
| 1411 | Ketoprofenum | Ketores, kaps., 100 mg | 14 kaps. | 5909990813315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 7,88 | 10,37 | 6,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 6,99 |
| 1412 | Ketoprofenum | Ketores, kaps., 100 mg | 20 kaps. | 5909990813322 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,23 | 14,60 | 9,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 9,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|
| 1413 | Ketoprofenum | Ketores, kaps., 200 mg | 20 kaps. | 5909990813421 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 13,93 | 19,18 | 19,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 9,59 |
| 1414 | Ketoprofenum | Profenid, czopki, 100 mg | 10 czop. | 5909990098514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doobytniczego | 7,94 | 9,20 | 2,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 7,97 |
| 1415 | Ketoprofenum | Profenid, tabl. powl., 100 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990760718 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 9,54 | 13,78 | 13,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 6,89 |
| 1416 | Ketoprofenum | Profenid, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 200 mg | 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) | 5909990790418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,48 | 13,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 7,72 |
| 1417 | Ketoprofenum | Refastin, tabl. powl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990675593 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,34 | 15,71 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 8,46 |
| 1418 | Lacidipinum | Lacipil, tabl. powl., 6 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990625697 | 2012-01-01 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 25,92 | 30,86 | 12,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 22,41 |
| 1419 | Lacidipinum | Lacipil, tabl. powl., 2 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990650521 | 2012-01-01 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,96 | 15,03 | 4,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,22 |
| 1420 | Lacidipinum | Lacipil, tabl. powl., 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990650620 | 2012-01-01 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 18,90 | 22,47 | 8,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 16,84 |
| 1421 | Lamotryginum | Epitrigine 100 Mg, tabl. powl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334766 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,84 | 33,24 | 33,24 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1422 | Lamotryginum | Epitrigine 100 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334940 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - plynne postacie farmaceutyczne | 24,84 | 32,89 | 31,74 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 4,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|------|
| 1423 | Lamotriginum | Epitrigine 25 Mg, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334742 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 6,21 | 9,22 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,82 |
| 1424 | Lamotriginum | Epitrigine 25 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334933 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 6,21 | 9,05 | 7,94 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 4,31 |
| 1425 | Lamotriginum | Epitrigine 50 Mg, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334759 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,57 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,57 |
| 1426 | Lamotriginum | Epitrigine 50 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334957 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,34 | 15,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 4,67 |
| 1427 | Lamotriginum | Lameptil S, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990224661 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 8,37 | 11,37 | 7,94 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 6,63 |
| 1428 | Lamotriginum | Lameptil S, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 0,1 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990225149 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 23,76 | 31,74 | 31,74 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 1429 | Lamotriginum | Lameptil S, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990225170 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 12,96 | 17,91 | 15,87 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 5,24 |
| 1430 | Lamotriginum | Lamilept, tabl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990038480 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 1431 | Lamotriginum | Lamilept, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990038565 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 18,06 | 23,59 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 9,59 |
| 1432 | Lamotriginum | Lamilept, tabl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990038701 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,62 | 11,80 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 1433 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990346219 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 22,68 | 28,54 | 17,20 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 14,54 |
| 1434 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990346318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerywanymi w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenie u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 1435 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl. , 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990346325 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 52,92 | 66,67 | 66,67 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1436 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990354818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,96 | 16,45 | 8,60 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 11,05 |
| 1437 | Lamotriginum | Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 7,41 | 8,44 | 1,59 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 8,44 |
| 1438 | Lamotriginum | Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 16,20 | 19,74 | 7,94 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 15,00 |
| 1439 | Lamotriginum | Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 64,80 | 75,65 | 31,74 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 47,11 |
| 1440 | Lamotriginum | Lamotrix, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909991006419 | 2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,59 | 11,77 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 6,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|--------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|------|
| 1441 | Lamotriginum | Lamotrix, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909991006518 | 2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 17,98 | 23,50 | 17,14 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 9,56 |
| 1442 | Lamotriginum | Lamotrix, tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 5909991006617 | 2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1443 | Lamotriginum | Lamozor, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 25 mg | 5 blist. po 10szt. | 5909990057382 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 9,89 | 14,20 | 13,23 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 4,17 |
| 1444 | Lamotriginum | Lamozor, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg | 5 blist. po 10szt. | 5909990057566 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 39,59 | 51,09 | 51,09 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1445 | Lamotriginum | Lamozor, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 50 mg | 5 blist. po 10szt. | 5909990057597 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 19,80 | 26,87 | 26,45 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,62 |
| 1446 | Lamotriginum | Plexxo 100, tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 5909990972616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 29,75 | 38,49 | 34,39 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 7,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 1447 | Lamotriginum | Plexxo 25, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909990972418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 17,28 | 21,07 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 15,67 |
| 1448 | Lamotriginum | Plexxo 50, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990972517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 21,60 | 27,39 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 13,39 |
| 1449 | Lamotriginum | Symla 100, tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 5909990045303 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 23,89 | 32,22 | 32,22 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1450 | Lamotriginum | Symla 25, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909990045280 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 6,10 | 9,11 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,71 |
| 1451 | Lamotriginum | Symla 50, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990045266 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,31 | 17,44 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,44 |
| 1452 | Lamotriginum | Trogine, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079292 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 6,21 | 9,22 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|----------|----------|----------|--|--|---------|--------|
| 1453 | Lamotryginum | Trogine, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079339 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,57 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,57 |
| 1454 | Lamotryginum | Trogine , tabl. , 100 mg | 30 tabl. | 5909990079438 | 2012-05-01 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 23,89 | 32,22 | 32,22 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1455 | Lamotryginum | Trogine, tabl. , 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079483 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 54,62 | 68,49 | 68,49 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1456 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg | 1 amp.-strz | 5909991094416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu | 2 703,73 | 2 951,68 | 2 459,90 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 494,98 |
| 1457 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg | 1 amp.-strz | 5909991094515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu | 3 604,62 | 3 930,73 | 3 689,84 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 244,09 |
| 1458 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909991094614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu | 4 514,86 | 4 919,79 | 4 919,79 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,27 |
| 1459 | Lansoprazolum | Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990055135 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,26 | 14,26 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony lużowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 1460 | Lansoprazolum | Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990055173 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,52 | 27,15 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,89 |
| 1461 | Lansoprazolum | Lansoprazolum 123ratio (Lansoprazolum Farmacom), kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. | 5909990079933 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,56 | 11,36 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,73 |
| 1462 | Lansoprazolum | Lansoprazolum 123ratio (Lansoprazolum Farmacom), kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. | 5909990080021 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 15,12 | 21,38 | 21,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,69 |
| 1463 | Lansoprazolum | Lantrea, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990017850 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 25,70 | 32,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 21,43 |
| 1464 | Lansoprazolum | Lantrea, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990017898 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,85 | 17,02 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,39 |
| 1465 | Lansoprazolum | Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. | 5909990339365 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,80 | 14,83 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,20 |
| 1466 | Lansoprazolum | Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 14 kaps. | 5909990339402 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,80 | 14,83 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,20 |
| 1467 | Lansoprazolum | Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. | 5909990609970 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 1468 | Lansoprazolum | Lanzul, kaps., 30 mg | 7 kaps. | 5909990727018 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,71 | 16,52 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 1469 | Lansoprazolum | Lanzul, kaps., 30 mg | 14 kaps. | 5909990727025 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,07 | 22,61 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 16,98 |
| 1470 | Lansoprazolum | Lanzul, kaps., 30 mg | 28 kaps. | 5909990727032 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 23,57 | 30,42 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 19,16 |
| 1471 | Lansoprazolum | Lanzul S, kaps., 15 mg | 28 kaps. | 5909990869817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,85 | 21,30 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,67 |
| 1472 | Lansoprazolum | Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990623358 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,82 | 18,06 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 1473 | Lansoprazolum | Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990623440 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,82 | 18,06 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 1474 | Lansoprazolum | Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990623457 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 27,54 | 34,67 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 23,41 |
| 1475 | Lansoprazolum | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990064045 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,70 | 11,51 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,88 |
| 1476 | Lansoprazolum | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990064069 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,70 | 11,51 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------------------|---|------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|-------|
| 1477 | Lansoprazolum | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990064076 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,05 | 22,37 | 22,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,19 |
| 1478 | Latanoprostum | Apo-Lataprox, krople do oczu, roztwór, 50 mcg/ml | 2,5 ml | 5909990859177 | 2012-03-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 30,24 | 40,80 | 40,80 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1479 | Latanoprostum | Latalux, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml | 1 but. a 2,5 ml | 5909990813582 | 2012-05-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 29,70 | 40,23 | 40,23 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1480 | Latanoprostum | Latanoprost Arrow, krople do oczu, 50 mikrogramów/ml | 2,5 ml (but.) | 5909990713158 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 34,02 | 44,84 | 44,84 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1481 | Latanoprostum | Latanost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml | 2,5 ml (but.) | 5909990859702 | 2012-03-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 29,70 | 40,23 | 40,23 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1482 | Latanoprostum | Rozaprost, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/1 ml | 2,5 ml | 5909990841448 | 2012-05-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 29,65 | 40,18 | 40,18 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1483 | Latanoprostum | Xalatan, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ml (0,005%) | 2,5 ml (but.) | 5909990411818 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 46,44 | 58,14 | 48,08 | Jaskra | | ryczałt | 13,26 |
| 1484 | Latanoprostum | Xaloptic, krople do oczu, roztwór, 0,05 mg/ ml | 2,5 ml (but.) | 5909990741311 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 36,72 | 47,74 | 47,74 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1485 | Latanoprostum + Timololum | Latacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5 mg/1 ml | 2,5 ml (but.) | 5909990879687 | 2012-03-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 37,05 | 48,08 | 48,08 | Jaskra | | ryczałt | 3,20 |
| 1486 | Latanoprostum + Timololum | Xalacom, krople do oczu, roztwór, 0,05+5,0 mg/ml | 2,5 ml (but.) | 5909991057213 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 49,50 | 61,42 | 48,08 | Jaskra | | ryczałt | 16,54 |
| 1487 | Latanoprostum + Timololum | Xaloptic Combi, krople do oczu, roztwór, 50 +5 mcg/ml + mg/ml | 2,5 ml (but.) | 5909990894543 | 2012-03-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 37,29 | 48,34 | 48,08 | Jaskra | | ryczałt | 3,46 |
| 1488 | Leflunomidum | Arava, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990977826 | 2012-01-01 | 2 lata | 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid | 63,10 | 78,91 | 76,59 | Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów | | ryczałt | 5,52 |
| 1489 | Leflunomidum | Arava, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990977925 | 2012-01-01 | 2 lata | 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid | 126,20 | 150,42 | 150,42 | Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów | | ryczałt | 3,20 |
| 1490 | Leflunomidum | Arava, tabl. powl., 100 mg | 3 tabl. (blist.) | 5909990978014 | 2012-01-01 | 2 lata | 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid | 59,71 | 75,28 | 75,28 | Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów | | ryczałt | 3,20 |
| 1491 | Leflunomidum | Leflunomide medac, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. | 4037353010604 | 2012-03-01 | 2 lata | 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid | 64,39 | 80,29 | 76,59 | Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów | | ryczałt | 6,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|---|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|-----------|--------|
| 1492 | Leflunomidum | Leflunomide medac, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 4037353010628 | 2012-03-01 | 2 lata | 136.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - leflunomid | 128,78 | 153,18 | 153,18 | Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów | | ryczałt | 3,20 |
| 1493 | Lenograstimum | Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji do żył, 33,6 MIU | 1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G | 5909990742059 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 121,76 | 145,08 | 135,93 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 12,35 |
| 1494 | Lenograstimum | Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań podskórnych i infuzji do żył, 33,6 MIU | 5 fiol. z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G | 5909990742066 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 608,76 | 679,61 | 679,61 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakażenie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznego gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 1495 | Letrozolum | Apo-Letro, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (blister) | 5909990794492 | 2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 105,84 | 126,08 | 99,50 | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 26,58 |
| 1496 | Letrozolum | Arogen, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990779840 | 2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 86,40 | 105,28 | 99,50 | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 5,78 |
| 1497 | Letrozolum | Aromek, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909991060718 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 106,92 | 127,24 | 99,50 | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 27,74 |
| 1498 | Letrozolum | Clarzole, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990799923 | 2012-03-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 105,84 | 126,08 | 99,50 | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 26,58 |
| 1499 | Letrozolum | Etruzil, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (3 blister po 10 szt.) | 5909990710201 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 105,84 | 126,08 | 99,50 | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 26,58 |
| 1500 | Letrozolum | Femara, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990768516 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 243,00 | 272,84 | 99,50 | Nowotwory złośliwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 173,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|--|----|-----------|--------|
| 1501 | Letrozolum | Lametta, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991061111 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 109,92 | 130,45 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 30,95 |
| 1502 | Letrozolum | Letralan, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990750627 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 108,00 | 128,39 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 28,89 |
| 1503 | Letrozolum | Letromedac, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990891788 | 2012-03-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 97,20 | 116,84 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 17,34 |
| 1504 | Letrozolum | Letrozole Bluefish, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990794683 | 2012-05-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 96,12 | 115,68 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 16,18 |
| 1505 | Letrozolum | Lostar, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990730353 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 111,24 | 131,86 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 32,36 |
| 1506 | Letrozolum | Mionic, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990708772 | 2012-01-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 237,60 | 267,07 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 167,57 |
| 1507 | Letrozolum | Trozobax, tabl. powł., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990924585 | 2012-07-01 | 2 lata | 132.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inhibitory enzymów - doustne inhibitory aromatazy | 81,00 | 99,50 | 99,50 | Nowotwory zło liwe; Rak piersi w II rzucie hormonoterapii | | bezpłatny | 0,00 |
| 1508 | Leuprorelinum | Eligard 22,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 22,5 mg | 1 zest. (tacki) | 5909990075751 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 873,64 | 970,66 | 970,66 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 9,60 |
| 1509 | Leuprorelinum | Eligard 45 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 45 mg | 1 zest. (2 strz.napeł.) | 5909990634057 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 1 757,89 | 1 932,81 | 1 932,81 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 19,20 |
| 1510 | Leuprorelinum | Eligard 7,5 mg , proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 7,5 mg | 1 zest. (tacki) | 5909990075768 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 289,98 | 330,57 | 323,55 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 10,22 |
| 1511 | Leuprorelinum | Leuprostin, implant podskórny, 3,6 mg | 1 szt. (impl.) | 5909990836246 | 2012-05-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 217,49 | 252,48 | 252,48 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 3,20 |
| 1512 | Leuprorelinum | Leuprostin, implant podskórny, 5 mg | 1 szt. (impl.) | 5909990836277 | 2012-05-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 652,47 | 732,46 | 732,46 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 8,96 |
| 1513 | Leuprorelinum | Lucrin Depot, mikrosfery do sporz. dziania zawiesiny do wstrzykiwa , 11,25 mg | 1 zest. | 5909990418015 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 895,48 | 992,48 | 905,95 | Nowotwory zło liwe - Rak piersi i rak trzonu macicy, Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 95,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|---|----------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----------------------------------|--|---------|-------|
| 1514 | Leuprorelinum | Lucrin Depot, mikrosfery do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 3,75 mg | 1 zest. | 5909990686117 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniającego gonadotropin | 297,60 | 338,20 | 301,98 | Nowotwory złośliwe - Rak prostaty | | ryczałt | 39,42 |
| 1515 | Levetiracetamum | Cezarius, roztwór doustny, 100 mg/ml | 300 ml | 5909990928149 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne | 148,96 | 175,90 | 175,90 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1516 | Levetiracetamum | Cezarius, tabl. powł., 250 mg | 50 tabl. | 5909990928200 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 54,16 | 68,36 | 68,36 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1517 | Levetiracetamum | Cezarius, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990928224 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 109,40 | 131,47 | 131,47 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1518 | Levetiracetamum | Cezarius, tabl. powł., 750 mg | 50 tabl. | 5909990928231 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 164,64 | 193,09 | 193,09 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1519 | Levetiracetamum | Cezarius, tabl. powł., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990928248 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 219,88 | 253,68 | 253,68 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |
| 1520 | Levetiracetamum | Keppra, tabl. powł., 750 mg | 50 tabl. | 5909990006649 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 191,92 | 222,28 | 208,56 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 16,92 |
| 1521 | Levetiracetamum | Keppra, tabl. powł., 750 mg | 100 tabl. | 5909990006670 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 396,41 | 445,53 | 417,12 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 33,74 |
| 1522 | Levetiracetamum | Keppra, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml | 300 ml (but.) | 5909990006755 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne | 187,55 | 217,19 | 177,06 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 43,33 |
| 1523 | Levetiracetamum | Keppra, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/ml | 10 fiolek 5 ml | 5909990610891 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - levetiracetam | 595,03 | 665,10 | 665,10 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 1524 | Levetiracetamum | Keppra, tabl. powł., 250 mg | 50 tabl. | 5909990901111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 59,08 | 73,63 | 69,52 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 7,31 |
| 1525 | Levetiracetamum | Keppra, tabl. powł., 250 mg | 100 tabl. | 5909990901128 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 125,14 | 148,31 | 139,04 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymującym cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 12,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|---|-----------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|---|---------|-------|
| 1526 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990901210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 125,14 | 148,31 | 139,04 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 12,47 |
| 1527 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909990901227 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 260,09 | 296,72 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 22,20 |
| 1528 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powł., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990901319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 260,07 | 296,68 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 22,16 |
| 1529 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powł., 1000 mg | 100 tabl. | 5909990901326 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 531,34 | 592,86 | 556,16 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 43,81 |
| 1530 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 250 mg | 50 tabl. | 5909990900695 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 52,90 | 67,01 | 67,01 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1531 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 250 mg | 100 tabl. | 5909990900701 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 111,86 | 134,10 | 134,10 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1532 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990900725 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 111,86 | 134,10 | 134,10 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1533 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909990900732 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 233,51 | 268,27 | 268,27 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |
| 1534 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 750 mg | 50 tabl. | 5909990900749 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 172,21 | 201,19 | 201,19 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1535 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 750 mg | 100 tabl. | 5909990900756 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 356,10 | 402,40 | 402,40 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 5,33 |
| 1536 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990900763 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 233,51 | 268,27 | 268,27 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |
| 1537 | Levetiracetamum | Levetiracetam Actavis, tabl. powł., 1000 mg | 100 tabl. | 5909990900770 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 475,18 | 532,76 | 532,76 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 7,11 |
| 1538 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 250 mg | 50 tabl. | 5909990879076 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 55,24 | 69,52 | 69,52 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|---|-----------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|---|---------|------|
| 1539 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 250 mg | 100 tabl. | 5909990879106 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 116,47 | 139,03 | 139,03 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1540 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990879168 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 116,47 | 139,03 | 139,03 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1541 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909990879199 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 242,67 | 278,08 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1542 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg | 50 tabl. | 5909990879250 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 179,07 | 208,54 | 208,54 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1543 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg | 100 tabl. | 5909990879281 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 369,84 | 417,10 | 417,10 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 5,33 |
| 1544 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990879342 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 242,67 | 278,08 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1545 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg | 100 tabl. | 5909990879373 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 497,03 | 556,15 | 556,15 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 7,11 |
| 1546 | Levetiracetamum | Trund, roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml | 300 ml | 5909990925841 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne | 150,04 | 177,06 | 177,06 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1547 | Levetiracetamum | Trund, tabl. powł., 250 mg | 50 tabl. | 5909990925858 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 55,57 | 69,88 | 69,52 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |
| 1548 | Levetiracetamum | Trund, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990925872 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 111,14 | 133,33 | 133,33 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1549 | Levetiracetamum | Trund, tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909990925889 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 222,30 | 256,27 | 256,27 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |
| 1550 | Levetiracetamum | Trund, tabl. powł., 750 mg | 50 tabl. | 5909990925926 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 166,72 | 195,33 | 195,33 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1551 | Levetiracetamum | Trund, tabl. powł., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990925940 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 222,30 | 256,27 | 256,27 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------------------------|--|------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 1552 | Levetiracetamum | Trund, tabl. powł., 1000 mg | 100 tabl. | 5909990925957 | 2012-05-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 444,58 | 500,02 | 500,02 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 7,11 |
| 1553 | Levetiracetamum | Vetira, roztwór doustny , 100 mg/ml | 300 ml | 5909990935901 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne | 150,03 | 177,04 | 177,04 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1554 | Levetiracetamum | Vetira, tabl. powł., 250 mg | 50 tabletek | 5909990935956 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 55,23 | 69,51 | 69,51 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1555 | Levetiracetamum | Vetira, tabl. powł., 500 mg | 50 tabletek | 5909990936052 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 110,48 | 132,62 | 132,62 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1556 | Levetiracetamum | Vetira, tabl. powł., 750 mg | 50 tabletek | 5909990936151 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 165,67 | 194,20 | 194,20 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 1557 | Levetiracetamum | Vetira, tabl. powł., 1000 mg | 50 tabletek | 5909990936250 | 2012-07-01 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 220,92 | 254,79 | 254,79 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,56 |
| 1558 | Levocetirizini dihydrochloridum | Cezera, tabl. powł., 5 mg | 20 tabl. | 5909990656929 | 2012-05-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 13,39 | 17,14 | 10,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 9,97 |
| 1559 | Levocetirizini dihydrochloridum | Cezera, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. | 5909990656943 | 2012-05-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,65 | 22,70 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,94 |
| 1560 | Levocetirizini dihydrochloridum | Contrahist, roztwór doustny , 0,5 mg/ml | 200 ml | 5909990904099 | 2012-05-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 18,14 | 23,79 | 18,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,64 |
| 1561 | Levocetirizini dihydrochloridum | Contrahist, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990904129 | 2012-05-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,47 | 21,27 | 14,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,23 |
| 1562 | Levocetirizini dihydrochloridum | Xyzal, tabl. powł., 5 mg | 7 tabl. | 5909990918041 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 8,10 | 9,75 | 3,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,24 |
| 1563 | Levocetirizini dihydrochloridum | Xyzal, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990918072 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,43 | 33,01 | 14,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 22,97 |
| 1564 | Levocetirizini dihydrochloridum | Xyzal 0,5 , roztwór do stosowania doustnego, 0,5 mg/ml | 200 ml (but.) | 5909990619627 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 24,19 | 30,26 | 18,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,11 |
| 1565 | Levocetirizini dihydrochloridum | Zenaro, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990781720 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,77 | 23,74 | 14,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,70 |
| 1566 | Levocetirizini dihydrochloridum | Zyx, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990765034 | 2012-05-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,82 | 22,73 | 14,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 12,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|--------|--|--|-----------|-------|
| 1567 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, kaps., 12,5+50 mg | 100 kaps. | 5909990094912 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 25,74 | 33,45 | 26,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 10,65 |
| 1568 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, kaps., 100+25 mg | 100 kaps. | 5909990095018 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 46,08 | 58,36 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 9,56 |
| 1569 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, tabl. , 50+200 mg | 100 tabl. | 5909990095117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 85,00 | 103,99 | 103,99 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1570 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, kaps., 50+200 mg | 100 kaps. | 5909990095216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 85,00 | 103,99 | 103,99 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1571 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 12,5+50 mg | 100 tabl. | 5909990748624 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 25,74 | 33,45 | 26,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 10,65 |
| 1572 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg | 100 tabl. | 5909990748723 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 46,08 | 58,36 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 9,56 |
| 1573 | Levodopum + Benserazidum | Madopar HBS, kaps., 100+25 mg | 100 kaps. | 5909990377510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 46,08 | 58,36 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 9,56 |
| 1574 | Levodopum + Carbidopum | Nakom, tabl. , 250+25 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990175215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 51,84 | 69,65 | 69,65 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,44 |
| 1575 | Levodopum + Carbidopum | Nakom Mite, tabl. , 100+25 mg | 100 tabl. | 5909990175314 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 43,20 | 55,27 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,47 |
| 1576 | Levodopum + Carbidopum | Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg | 100 tabl. (but.) | 5909990020416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 78,24 | 96,77 | 96,77 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 1577 | Levomepromazinum | Lewomezin, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909990896677 | 2012-05-01 | 2 lata | 173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego | 3,69 | 5,53 | 5,39 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,14 |
| 1578 | Levomepromazinum | Lewomezin, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990896691 | 2012-05-01 | 2 lata | 173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego | 7,39 | 10,78 | 10,78 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1579 | Levomepromazinum | Tisercin, roztwór do wstrzykiwa , 25 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990183418 | 2012-01-01 | 2 lata | 173.2, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania pozajelitowego | 8,93 | 12,93 | 12,93 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1580 | Levomepromazinum | Tisercin, tabl. powl., 25 mg | 50 tabl. | 5909990193912 | 2012-01-01 | 2 lata | 173.1, Leki przeciwpsychotyczne - lewomepromazyna do stosowania doustnego | 8,21 | 11,26 | 8,98 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 2,28 |
| 1581 | Levothyroxinum natrium | Eltroxin, tabl. , 50 mcg | 100 tabl. (pojem.) | 5909990001613 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 12,64 | 15,78 | 7,94 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 11,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|----------------------|----|---------|-------|
| 1582 | Levothyroxinum natriicum | Eltroxin, tabl. , 100 mcg | 100 tabl. (pojem.) | 5909990001712 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 13,39 | 18,17 | 15,88 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 9,40 |
| 1583 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 100, tabl. , 100 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051419 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 6,89 | 9,62 | 7,94 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 5,24 |
| 1584 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 100, tabl. , 100 mcg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909991051426 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 12,24 | 16,94 | 15,88 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 8,17 |
| 1585 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 112 , tabl. , 112 mcg | 50 tabl. | 5909990719006 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 6,70 | 9,64 | 8,89 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 4,73 |
| 1586 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 112 , tabl. , 112 mcg | 100 tabl. | 5909990719020 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 12,67 | 17,69 | 17,69 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 7,96 |
| 1587 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 125, tabl. , 125 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051518 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 7,19 | 10,39 | 9,93 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 4,90 |
| 1588 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 125, tabl. , 125 mcg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991051525 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 14,44 | 19,88 | 19,85 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 8,92 |
| 1589 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 137 , tabl. , 137 mcg | 50 tabl. | 5909990719037 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 7,31 | 10,73 | 10,73 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 4,87 |
| 1590 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 137 , tabl. , 137 mcg | 100 tabl. | 5909990719044 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 13,86 | 19,54 | 19,54 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 9,74 |
| 1591 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 150, tabl. , 150 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051617 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 8,21 | 11,91 | 11,91 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 5,33 |
| 1592 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 150, tabl. , 150 mcg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991051624 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 14,73 | 20,77 | 20,77 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 10,67 |
| 1593 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 175, tabl. , 175 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051716 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 9,03 | 13,20 | 13,20 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 6,22 |
| 1594 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 200, tabl. , 200 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051815 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 9,71 | 14,23 | 14,23 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 7,11 |
| 1595 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 25, tabl. , 25 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051112 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 5,65 | 6,63 | 1,99 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 6,63 |
| 1596 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 25, tabl. , 25 mcg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909991051129 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 8,21 | 9,95 | 3,97 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 9,18 |
| 1597 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 50, tabl. , 50 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051211 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 5,92 | 7,50 | 3,97 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 6,73 |
| 1598 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 50, tabl. , 50 mcg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909991051228 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 10,66 | 13,66 | 7,94 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 9,28 |
| 1599 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 75, tabl. , 75 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909991051310 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 6,33 | 8,53 | 5,96 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 5,77 |
| 1600 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 75, tabl. , 75 mcg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991051327 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 11,46 | 15,39 | 11,91 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 8,81 |
| 1601 | Levothyroxinum natriicum | Euthyrox N 88 , tabl. , 88 mcg | 50 tabl. | 5909990718986 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 6,29 | 8,77 | 6,99 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 4,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 1602 | Levothyroxinum natrium | Euthyrox N 88 , tabl. , 88 mcg | 100 tabl. | 5909990718993 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 11,25 | 15,60 | 13,97 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 7,89 |
| 1603 | Levothyroxinum natrium | Letrox 100, tabl. , 100 mcg | 50 tabl. | 5909990168910 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 5,61 | 8,26 | 7,94 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 3,88 |
| 1604 | Levothyroxinum natrium | Letrox 150, tabl. , 150 mcg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990820610 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 8,08 | 11,78 | 11,78 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 5,33 |
| 1605 | Levothyroxinum natrium | Letrox 50, tabl. , 50 mcg | 50 tabl. | 5909990374014 | 2012-01-01 | 2 lata | 83.0, Hormony tarczycy - lewotyroksyna do stosowania doustnego | 5,26 | 6,80 | 3,97 | Niedoczynno tarczycy | | ryczałt | 6,03 |
| 1606 | Lidocaini hydrochloridum + Noradrenalinii tartras | Lignocainum 2% c. noradrenalinio 0,00125% WZF, roztwór do wstrzykiwa , (20+0,025) mg/ml | 10 amp.a 2 ml | 5909990092819 | 2012-01-01 | 2 lata | 148.0, Leki znieczulające miejscowo - lidokaina w poł czeniu z norepinefryn - roztwór do wstrzykiwa | 8,59 | 12,45 | 12,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1607 | Lisinoprilum | LisiHEXAL 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991013417 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 10,26 | 12,69 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,90 |
| 1608 | Lisinoprilum | LisiHEXAL 20, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991013516 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,20 | 20,40 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 14,82 |
| 1609 | Lisinoprilum | LisiHEXAL 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991013318 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 9,18 | 10,67 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 10,67 |
| 1610 | Lisinoprilum | Lisinoratio 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990939817 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 11,07 | 13,55 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 10,76 |
| 1611 | Lisinoprilum | Lisinoratio 20, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990939916 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 18,37 | 22,72 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 17,14 |
| 1612 | Lisinoprilum | Lisinoratio 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990939718 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 7,65 | 9,04 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,04 |
| 1613 | Lisinoprilum | Lisiprol, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990682409 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 8,42 | 9,81 | 2,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,81 |
| 1614 | Lisinoprilum | Lisiprol, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990682447 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 11,66 | 14,08 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 11,69 |
| 1615 | Lisinoprilum | Lisiprol, tabl. , 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990682461 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 17,39 | 21,50 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 16,29 |
| 1616 | Lisinoprilum | Ranopril, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991132927 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 3,78 | 4,84 | 2,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,84 |
| 1617 | Lisinoprilum | Ranopril, tabl. , 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991133023 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 14,04 | 17,92 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 12,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----------|-------|
| 1618 | Lisinoprilum | Ranopril, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991133122 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,56 | 9,68 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 7,29 |
| 1619 | Lisinoprilum + Amlodipinum | Dironorm, tabl. , 10+5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990701803 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 22,65 | 25,95 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 23,16 |
| 1620 | Lisinoprilum + Amlodipinum | Dironorm, tabl. , 0,02+0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990761685 | 2012-03-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 28,49 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 22,91 |
| 1621 | Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT, tabl. , 10+12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990708352 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,96 | 15,58 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 12,79 |
| 1622 | Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT, tabl. , 20+12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990708369 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 20,52 | 25,02 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 19,44 |
| 1623 | Lisinoprilum + Hydrochlorothiazidum | Lisiprol HCT, tabl. , 20+25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991167714 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,50 | 21,62 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 16,41 |
| 1624 | Lithium | Lithium Carbonicum GSK, tabl. , 250 mg | 60 tabl. (pojem.) | 5909990148714 | 2012-01-01 | 2 lata | 180.0, Leki przeciwpyschotyczne - Lit do podawania doustnego w postaci w glanu | 5,78 | 8,53 | 8,53 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1625 | Loperamidi hydrochloridum | Loperamid WZF, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990038220 | 2012-01-01 | 2 lata | 10.0, Leki przeciwbiegunkowe - loperamid | 5,18 | 7,70 | 7,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 3,85 |
| 1626 | Loratadinum | Aleric, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990880836 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,82 | 22,88 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 12,12 |
| 1627 | Loratadinum | Claritine, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990121526 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 31,55 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 20,79 |
| 1628 | Loratadinum | Claritine, syrop, 1 mg/ml | 120 ml | 5909990355419 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 12,96 | 16,96 | 11,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,07 |
| 1629 | Loratadinum | Flonidan, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990223343 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 26,87 | 34,72 | 30,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 13,20 |
| 1630 | Loratadinum | Flonidan, tabl. , 10 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990223350 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 40,31 | 50,84 | 46,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 18,56 |
| 1631 | Loratadinum | Flonidan, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990739233 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,20 | 21,15 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,39 |
| 1632 | Loratadinum | Flonidan, zawiesina doustna, 1 mg/ml | 120 ml | 5909990739318 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 9,72 | 13,49 | 11,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,60 |
| 1633 | Loratadinum | Loratadyna Galena, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990670253 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 26,42 | 34,24 | 30,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 12,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 1634 | Loratadinum | Loratadyna Galena, tabl., 10 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990670260 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 40,31 | 50,84 | 46,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 18,56 |
| 1635 | Loratadinum | Loratadyna Galena, tabl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990795420 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,39 | 22,42 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,66 |
| 1636 | Loratadinum | Loratan, syrop, 5 mg/5ml | 125 ml (but.) | 5909990839018 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.2, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 8,93 | 12,76 | 11,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,54 |
| 1637 | Loratadinum | Loratan, kaps. mi kkie, 10 mg | 30 kaps. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990909049 | 2012-01-01 | 2 lata | 207.1, Leki przeciwhistaminowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,02 | 22,02 | 15,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,26 |
| 1638 | Losartanum | Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990702886 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,04 | 21,20 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,09 |
| 1639 | Losartanum | Cozaar, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990674411 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,35 | 21,53 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,42 |
| 1640 | Losartanum | Cozaar, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073428 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 32,40 | 40,98 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 18,76 |
| 1641 | Losartanum | Lakea, tabl. powl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991108212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 20,52 | 26,18 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 14,28 |
| 1642 | Losartanum | Loreblok, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. | 5909990770601 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 8,52 | 13,16 | 13,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,95 |
| 1643 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990638659 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 32,88 | 41,49 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,27 |
| 1644 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 56 tabl. | 5909990649112 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,52 |
| 1645 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 84 tabl. (6 blist.po 14 szt.) | 5909990649129 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 25,92 | 35,95 | 35,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,79 |
| 1646 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990818914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,20 | 21,38 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,27 |
| 1647 | Losartanum | Losacor, tabl. powl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991055110 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 14,04 | 19,25 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 7,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 1648 | Losartanum | Losagen, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990639885 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,68 |
| 1649 | Losartanum | Losagen, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990639908 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,22 | 31,16 | 31,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,35 |
| 1650 | Losartanum | Losargamma, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. powł. | 5909990947164 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,64 | 13,29 | 13,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,99 |
| 1651 | Losartanum | Losartan Arrow, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990769469 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,04 | 19,25 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,35 |
| 1652 | Losartanum | Losartan Pfizer, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990809790 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,07 | 13,92 | 13,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,18 |
| 1653 | Losartanum | Losartic, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990621439 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 21,38 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,27 |
| 1654 | Losartanum | Lozap 50, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990573905 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,82 | 23,30 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,40 |
| 1655 | Losartanum | Presartan, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990724345 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,12 | 20,40 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,50 |
| 1656 | Losartanum | Presartan, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990724352 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 30,78 | 39,51 | 34,01 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,70 |
| 1657 | Losartanum | Rasoltan 50, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990085644 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,64 | 13,29 | 13,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,99 |
| 1658 | Losartanum | Sarve 50 mg, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990045594 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,82 | 18,83 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,72 |
| 1659 | Losartanum | Sortabax, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990766673 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,53 | 13,17 | 13,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,95 |
| 1660 | Losartanum | Sortabax, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990766680 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,06 | 24,57 | 24,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 1661 | Losartanum | Stadazar, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. | 5909990079575 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,68 |
| 1662 | Losartanum | Xartan, tabl. powl., 50 mg | 30 tabl. (1 blister po 30 szt.) | 5909990481118 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 24,84 | 30,80 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,90 |
| 1663 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Hyzaar Forte, tabl. powl., 100+25 mg | 28 tabl. (2 blister po 14 szt.) | 5909990970513 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 32,40 | 40,98 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 18,76 |
| 1664 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Loreblok HCT, tabl. powl., 50 + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990778843 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,64 |
| 1665 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg | 56 tabl. | 5909990686339 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 1666 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg | 84 tabl. | 5909990686360 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 35,64 | 46,36 | 46,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 13,91 |
| 1667 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Lorista HD, tabl. powl., 100+25 mg | 28 tabl. (4 blister po 7 szt.) | 5909990645565 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 32,88 | 41,49 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 19,27 |
| 1668 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Lorista HL, tabl. powl., 100+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990816484 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 1669 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losacor HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg | 28 tabl. (4 blister po 7 szt.) | 5909990729685 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,77 | 16,64 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,53 |
| 1670 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losagen Combi, tabl. powl., 50 + 12,5 mg | 28 tabl. | 5909990833924 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,96 | 17,91 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 6,80 |
| 1671 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losargamma HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg | 28 tabl. powl. | 5909990857784 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,50 | 18,49 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,38 |
| 1672 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losargamma HCT, tabl. powl., 100+25 mg | 28 tabl. powl. | 5909990858088 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 27,00 | 35,20 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 12,98 |
| 1673 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Losartan+HCT Arrow, tabl. powl., 50+12,5 mg | 30 tabl. | 5909990752461 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,12 | 20,40 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,50 |
| 1674 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Presartan H, tabl. powl., 50+12,5 mg | 30 tabl. (3 blister po 10 szt.) | 5909990721641 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,28 | 22,71 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,81 |
| 1675 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Presartan H, tabl. powl., 100+25 mg | 30 tabl. (3 blister po 10 szt.) | 5909990721894 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 34,56 | 43,56 | 34,01 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 19,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 1676 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Sortabax HCT, tabl. powl., 0,05+0,0125 g | 28 tabl. | 5909990806195 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 1677 | Losartanum + Hydrochlorothiazidum | Sortabax HCT, tabl. powl., 100+25 mg | 28 tabl. | 5909990806201 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,83 |
| 1678 | Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum | Hyzaar, tabl. powl., 50+12,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990433612 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,35 | 21,53 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,42 |
| 1679 | Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum | Lorista H, tabl. powl., 50+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990337392 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,61 | 18,60 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,49 |
| 1680 | Losartanum kalicum + Hydrochlorothiazidum | Lozap HCT, tabl. powl., 50+12,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990611980 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,34 | 20,63 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,73 |
| 1681 | Lovastatinum | Liprox, tabl. , 20 mg | 28 tabl. | 5909990842315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,04 | 17,49 | 8,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,85 |
| 1682 | Lovastatinum | Lovasterol, tabl. , 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990422159 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 21,60 | 25,58 | 8,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 19,94 |
| 1683 | Lovastatinum | Lovasterol, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990828425 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,20 | 18,74 | 4,32 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,72 |
| 1684 | Lovastatinum | Lovastin, tabl. , 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990756629 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 18,65 | 8,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,01 |
| 1685 | Lynestrenolum | Orgametril, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990342617 | 2012-01-01 | 2 lata | 67.0, Hormony płciowe - progestageny - lynestrenol | 5,17 | 7,69 | 7,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 2,31 |
| 1686 | Magnesii valproas | Dipromal, tabl. powl., 200 mg | 40 tabl. | 5909990167111 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 9,94 | 12,94 | 7,58 | Padaczka | | ryczałt | 8,56 |
| 1687 | Mebendazolum | Vermox, tabl. , 100 mg | 6 tabl. | 5909990250615 | 2012-01-01 | 2 lata | 194.1, Leki przeciwwrobacze - mebendazol | 8,42 | 12,21 | 12,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1688 | Mebendazolum | Vermox, tabl. do ucia, 100 mg | 6 tabl. | 5909990500949 | 2012-01-01 | 2 lata | 194.1, Leki przeciwwrobacze - mebendazol | 6,48 | 10,14 | 10,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1689 | Mebendazolum | Vermox, tabl. , 100 mg | 6 tabl. | 5909997012339 | 2012-07-01 | 2 lata | 194.1, Leki przeciwwrobacze - mebendazol | 6,46 | 10,11 | 10,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------------|---|-----------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 1690 | Medroxyprogesteroni acetat | Provera, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990236411 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ę cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 6,73 | 9,75 | 8,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,65 |
| 1691 | Medroxyprogesteronum | Depo-Provera, zawiesina do wstrzykiwa , 150 mg/ml | 1 fiol.a 3,3 ml | 5909990236510 | 2012-01-01 | 2 lata | 127.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - medroksyprogesteron do podawania pozajelitowego | 11,23 | 15,92 | 15,92 | Nowotwory zło liwe - Rak piersi i rak trzonu macicy | | ryczałt | 3,20 |
| 1692 | Medroxyprogesteronum | Provera, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990155514 | 2012-01-01 | 2 lata | 72.0, Leki hormonalne do podawania doustnego, zawieraj ę cyproteron, etynyloestradiol, lewonorgestrel lub medroksyprogesteron | 13,76 | 18,94 | 17,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,75 |
| 1693 | Megestrolu acetat | Cachexan, zawiesina doustna, 40 ml | 240 ml | 5909990614608 | 2012-01-01 | 2 lata | 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postaci plynne | 124,20 | 148,04 | 148,04 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 6,40 |
| 1694 | Megestrolu acetat | Megace, zawiesina doustna, 40 mg/ml | 240 ml | 5909990437627 | 2012-01-01 | 2 lata | 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postaci plynne | 124,20 | 148,04 | 148,04 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 6,40 |
| 1695 | Megestrolu acetat | Megalia, zawiesina doustna, 40 mg/ml | 240 ml | 5909991054519 | 2012-01-01 | 2 lata | 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postaci plynne | 124,20 | 148,04 | 148,04 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 6,40 |
| 1696 | Megestrolu acetat | Megastril, zawiesina doustna, 40 mg/ml | 240 ml | 5909990895977 | 2012-07-01 | 2 lata | 128.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - progestogeny - megestrol do podawania doustnego - postaci plynne | 119,88 | 143,42 | 143,42 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 6,40 |
| 1697 | Meloxicamum | Aglan 15, tabl. , 15 mg | 10 tabl. | 5909990224876 | 2012-07-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postaci postaci farmaceutyczne | 5,40 | 7,84 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,22 |
| 1698 | Meloxicamum | Aglan 15, tabl. , 15 mg | 20 tabl. | 5909990224883 | 2012-07-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postaci postaci farmaceutyczne | 10,26 | 14,56 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,31 |
| 1699 | Meloxicamum | Aglan 15, tabl. , 15 mg | 30 tabl. | 5909990610006 | 2012-07-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postaci postaci farmaceutyczne | 11,33 | 16,73 | 16,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,37 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----------|-------|
| 1700 | Meloxicamum | Aspicam, tabl. , 15 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990997527 | 2012-03-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 12,42 | 16,87 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,62 |
| 1701 | Meloxicamum | Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg | 20 tabl. | 5909990042401 | 2012-07-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 9,94 | 14,22 | 14,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,11 |
| 1702 | Meloxicamum | Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg | 30 tabl. | 5909990042425 | 2012-07-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 14,47 | 20,09 | 20,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,05 |
| 1703 | Meloxicamum | Meloxicam Arrow 15 mg, tabl. , 15 mg | 10 tabl. | 5909990637034 | 2012-07-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 5,18 | 7,60 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 3,98 |
| 1704 | Meloxicamum | Meloxistad, tabl. powl., 15 mg | 10 tabl. | 5909990431151 | 2012-03-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 5,67 | 8,13 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,51 |
| 1705 | Meloxicamum | Meloxistad, tabl. powl., 15 mg | 20 tabl. | 5909990431168 | 2012-03-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 10,80 | 15,13 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,88 |
| 1706 | Meloxicamum | Movalis, tabl. , 15 mg | 20 tabl. | 5909990464418 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 15,23 | 19,88 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,63 |
| 1707 | Meloxicamum | Movalis, tabl. , 15 mg | 10 tabl. | 5909990464425 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 7,88 | 10,49 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,87 |
| 1708 | Mercaptopurinum | Mercaptopurinum VIS, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990186112 | 2012-03-01 | 2 lata | 230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolyty - merkaptopuryna | 21,22 | 28,62 | 28,62 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1709 | Mercaptopurinum | Mercaptopurinum VIS, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990186112 | 2012-03-01 | 2 lata | 230.0, Leki przeciwnowotworowe antymetabolyty - merkaptopuryna | 21,22 | 28,62 | 28,62 | Choroba Lesniowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 1710 | Mesalazinum | Asamax 250, czopki, 250 mg | 30 czop. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991083816 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 44,99 | 57,06 | 50,69 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 9,57 |
| 1711 | Mesalazinum | Asamax 250, czopki, 250 mg | 30 czop. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991083816 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 44,99 | 57,06 | 50,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,57 |
| 1712 | Mesalazinum | Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991084011 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 40,96 | 51,54 | 41,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 22,69 |
| 1713 | Mesalazinum | Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991084011 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 40,96 | 51,54 | 41,21 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 13,53 |
| 1714 | Mesalazinum | Asamax 500, czopki, 500 mg | 30 czop. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991083915 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 93,45 | 112,91 | 101,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 14,74 |
| 1715 | Mesalazinum | Asamax 500, czopki, 500 mg | 30 czop. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991083915 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 93,45 | 112,91 | 101,37 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 14,74 |
| 1716 | Mesalazinum | Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991084110 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 70,73 | 87,12 | 82,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 29,43 |
| 1717 | Mesalazinum | Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991084110 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 70,73 | 87,12 | 82,41 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 8,27 |
| 1718 | Mesalazinum | Crohnax, czopki, 250 mg | 30 czop. (6 blist.po 5 szt.) | 5909991074012 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 23,76 | 34,35 | 34,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1719 | Mesalazinum | Crohnax, czopki, 250 mg | 30 czop. (6 blist.po 5 szt.) | 5909991074012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 23,76 | 34,35 | 34,35 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1720 | Mesalazinum | Pentasa, czopki, 1000 mg | 28 czop. (blis.) | 5909990656813 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 165,24 | 193,43 | 189,22 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 7,41 |
| 1721 | Mesalazinum | Pentasa, czopki, 1000 mg | 28 czop. (blis.) | 5909990656813 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 165,24 | 193,43 | 189,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 7,41 |
| 1722 | Mesalazinum | Pentasa , czopki, 1000 mg | 14 czop. (blis.) | 5909990656820 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 82,62 | 101,03 | 94,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---|------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 1723 | Mesalazinum | Pentasa , czopki, 1000 mg | 14 czop. (blis.) | 5909990656820 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 82,62 | 101,03 | 94,61 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 9,62 |
| 1724 | Mesalazinum | Pentasa , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 100 tabl. (blis.) | 5909990662111 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 133,98 | 154,81 | 82,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 97,12 |
| 1725 | Mesalazinum | Pentasa , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 100 tabl. (blis.) | 5909990662111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 133,98 | 154,81 | 82,41 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 75,96 |
| 1726 | Mesalazinum | Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml | 7 szt.a 100 ml | 5909990818815 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne | 81,00 | 94,12 | 36,80 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 60,52 |
| 1727 | Mesalazinum | Pentasa , zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml | 7 szt.a 100 ml | 5909990818815 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne | 81,00 | 94,12 | 36,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 60,52 |
| 1728 | Mesalazinum | Pentasa, granulot o przedłu onym uwalnianiu, 1 g | 50 sasz. | 5909990855315 | 2012-07-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 133,98 | 154,81 | 82,41 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | | ryczałt | 75,96 |
| 1729 | Mesalazinum | Salofalk , zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml | 7 but.a 60 ml | 5909990970117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.3, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne | 123,47 | 147,21 | 147,21 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1730 | Mesalazinum | Salofalk 1 g, czopki, 1 g | 30 czop. | 5909990806430 | 2012-05-01 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 165,24 | 193,73 | 193,73 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | | ryczałt | 3,20 |
| 1731 | Mesalazinum | Salofalk 250, czopki, 250 mg | 30 czop. | 5909990088829 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 47,73 | 60,00 | 50,69 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 12,51 |
| 1732 | Mesalazinum | Salofalk 250, tabl. dojel., 250 mg | 50 tabl. | 5909990400010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 26,78 | 33,63 | 20,60 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 16,23 |
| 1733 | Mesalazinum | Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990400119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 43,02 | 53,74 | 41,21 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 15,73 |
| 1734 | Mesalazinum | Salofalk 500, czopki, 500 mg | 30 czop. | 5909990422227 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 82,66 | 101,37 | 101,37 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 1735 | Metforminum | Avamina, tabl. powł., 500 mg | 30 tabl. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990765379 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,11 | 4,56 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,49 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|----------|----|---------|------|
| 1736 | Metforminum | Avamina, tabl. powł., 500 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990765386 | 2012-05-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,72 | 8,48 | 8,48 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1737 | Metforminum | Avamina, tabl. powł., 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990765393 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,47 | 6,86 | 6,86 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1738 | Metforminum | Avamina, tabl. powł., 850 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990765409 | 2012-05-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 9,77 | 14,05 | 14,05 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1739 | Metforminum | Avamina, tabl. powł., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990765423 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,50 | 8,24 | 8,24 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1740 | Metforminum | Avamina, tabl. powł., 1000 mg | 60 kaps. (6 blist.po 10) | 5909990765430 | 2012-05-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 11,56 | 16,34 | 16,34 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1741 | Metforminum | Etform 500, tabl. powł., 500 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990698141 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 6,16 | 8,94 | 8,53 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,61 |
| 1742 | Metforminum | Etform 500, tabl. powł., 500 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990698172 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 8,42 | 12,29 | 12,29 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1743 | Metforminum | Etform 850, tabl. powł., 850 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990698257 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 7,99 | 12,15 | 12,15 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1744 | Metforminum | Etform 850, tabl. powł., 850 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990698271 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 12,96 | 18,52 | 18,52 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,08 |
| 1745 | Metforminum | Formetic, tabl. powł., 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078943 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,43 | 4,91 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,84 |
| 1746 | Metforminum | Formetic, tabl. powł., 500 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990078950 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 6,87 | 9,71 | 8,53 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,38 |
| 1747 | Metforminum | Formetic, tabl. powł., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078974 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,78 | 8,53 | 8,53 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1748 | Metforminum | Formetic, tabl. powł., 1000 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990078981 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 11,88 | 16,68 | 16,68 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1749 | Metforminum | Formetic, tabl. powł., 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079001 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,75 | 7,15 | 7,15 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1750 | Metforminum | Formetic, tabl. powł., 850 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990079025 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 9,61 | 13,88 | 13,88 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1751 | Metforminum | Glucophage 1000, tabl. powł., 1000 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990717248 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 6,36 | 9,17 | 8,53 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|------|----------|----|---------|-------|
| 1752 | Metforminum | Glucophage 500, tabl. powł., 500 mg | 30 tabl. | 5909990789276 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,05 | 5,57 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,50 |
| 1753 | Metforminum | Glucophage 850, tabl. powł., 850 mg | 30 tabl. | 5909990789290 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,83 | 8,32 | 7,25 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,27 |
| 1754 | Metforminum | Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 750 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990213429 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 14,04 | 16,88 | 6,40 | Cukrzyca | | ryczałt | 13,68 |
| 1755 | Metforminum | Glucophage XR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990624751 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 10,31 | 12,26 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 11,19 |
| 1756 | Metforminum | Metfogamma 1000, tabl. powł., 1000 mg | 30 tabl. | 5909990654598 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,40 | 8,13 | 8,13 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1757 | Metforminum | Metfogamma 500, tabl. powł., 500 mg | 30 tabl. | 5909991033019 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,02 | 4,46 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,39 |
| 1758 | Metforminum | Metfogamma 850, tabl. powł., 850 mg | 30 tabl. | 5909991032913 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,00 | 6,35 | 6,35 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1759 | Metforminum | Metformax 1000, tabl. powł., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053056 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,72 | 8,48 | 8,48 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1760 | Metforminum | Metformax 500, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990126316 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,43 | 4,91 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,84 |
| 1761 | Metforminum | Metformax 850, tabl. , 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990450718 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,40 | 7,85 | 7,25 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,80 |
| 1762 | Metforminum | Metformax SR 500, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652112 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 9,07 | 10,93 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 9,86 |
| 1763 | Metforminum | Metformin Bluefish, tabl. powł., 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990705474 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 2,48 | 3,88 | 3,88 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1764 | Metforminum | Metformin Bluefish, tabl. powł., 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990705726 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,56 | 5,89 | 5,89 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1765 | Metforminum | Metformin Bluefish, tabl. powł., 1000 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990705894 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,48 | 7,15 | 7,15 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1766 | Metforminum | Metformin Galena, tabl. , 500 mg | 30 tabl. | 5909990462018 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 2,81 | 4,25 | 4,25 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1767 | Metforminum | Metformin Galena, tabl. , 850 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990928019 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,75 | 7,15 | 7,15 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 1768 | Metforminum | Metifor, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990495115 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 4,06 | 5,58 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,51 |
| 1769 | Metforminum | Metral, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991090319 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 2,81 | 4,25 | 4,25 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1770 | Metforminum | Metral, tabl. , 850 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991090418 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,89 | 6,23 | 6,23 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,20 |
| 1771 | Metforminum | Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990220984 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 6,16 | 8,94 | 8,53 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,61 |
| 1772 | Metforminum | Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15 szt.) | 5909990220991 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 12,73 | 17,59 | 17,06 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,73 |
| 1773 | Metforminum | Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg | 90 tabl. (6 blist.po 15 szt.) | 5909990221004 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 19,09 | 25,64 | 25,59 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,85 |
| 1774 | Metforminum | Siofor 1000, tabl. powl., 1000 mg | 120 tabl. (8 blist.po 15 szt.) | 5909990221028 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 25,46 | 33,44 | 33,44 | Cukrzyca | | ryczałt | 6,40 |
| 1775 | Metforminum | Siofor 500, tabl. powl., 500 mg | 30 tabl. | 5909990457212 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 3,35 | 4,81 | 4,27 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,74 |
| 1776 | Metforminum | Siofor 500, tabl. powl., 500 mg | 60 tabl. | 5909990457229 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 6,87 | 9,71 | 8,53 | Cukrzyca | | ryczałt | 4,38 |
| 1777 | Metforminum | Siofor 850, tabl. powl., 850 mg | 30 tabl. | 5909990457311 | 2012-01-01 | 2 lata | 15.0, Doustne leki przeciwcukrzycowe - biguanidy o działaniu przeciwcukrzycowym - metformina | 5,18 | 7,62 | 7,25 | Cukrzyca | | ryczałt | 3,57 |
| 1778 | Methadonum | Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml | 20 ml (but.) | 5909990718917 | 2012-01-01 | 2 lata | 190.0, Leki stosowane w leczeniu uzale nie | 5,18 | 7,15 | 5,13 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 5,22 |
| 1779 | Methadonum | Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml | 10 ml (but.) | 5909990719013 | 2012-01-01 | 2 lata | 190.0, Leki stosowane w leczeniu uzale nie | 4,86 | 6,00 | 2,56 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 6,00 |
| 1780 | Methadonum | Methadone Hydrochloride Molteni, Syrop, 1 mg/ml | 100 ml | 5909990792016 | 2012-01-01 | 2 lata | 190.0, Leki stosowane w leczeniu uzale nie | 18,79 | 25,63 | 25,63 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 3,20 |
| 1781 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp-strzyk. a 0,2 ml | 5909990791309 | 2012-07-01 | 2 lata | 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego | 49,68 | 61,81 | 48,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 16,38 |
| 1782 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp-strzyk. a 0,3 ml | 5909990791361 | 2012-07-01 | 2 lata | 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego | 58,15 | 72,94 | 72,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1783 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp-strzyk. a 0,4 ml | 5909990791446 | 2012-07-01 | 2 lata | 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego | 77,52 | 95,60 | 95,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|--|---------------------------|-----------|-------|
| 1784 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp-strzyk. a 0,5 ml | 5909990791491 | 2012-07-01 | 2 lata | 120.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - inne immunosupresanty - metotreksat do stosowania podskórnego | 89,64 | 109,60 | 109,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1785 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5 mg | 50 tabl. | 5909990453726 | 2012-03-01 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 8,09 | 11,76 | 10,58 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,18 |
| 1786 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5 mg | 50 tabl. | 5909990453726 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 8,09 | 11,76 | 10,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 6,51 |
| 1787 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5 mg | 50 tabl. | 5909990453825 | 2012-03-01 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 16,18 | 22,27 | 21,16 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,11 |
| 1788 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5 mg | 50 tabl. | 5909990453825 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 16,18 | 22,27 | 21,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 11,78 |
| 1789 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg | 50 tabl. | 5909990453924 | 2012-03-01 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 32,36 | 42,32 | 42,32 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1790 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg | 50 tabl. | 5909990453924 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 32,36 | 42,32 | 42,32 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 21,33 |
| 1791 | Methotrexatum | Trexan, tabl. , 2,5 mg | 100 tabl. (but.) | 5909990111619 | 2012-01-01 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 16,19 | 22,29 | 21,16 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,13 |
| 1792 | Methotrexatum | Trexan, tabl. , 2,5 mg | 100 tabl. (but.) | 5909990111619 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 16,19 | 22,29 | 21,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 11,80 |
| 1793 | Methotrexatum | Trexan, tabl. , 10 mg | 100 tabl. (1 poj.po100 szt) | 5909990730346 | 2012-01-01 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 64,80 | 80,76 | 80,76 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1794 | Methotrexatum | Trexan, tabl. , 10 mg | 100 tabl. (1 poj.po100 szt) | 5909990730346 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 64,80 | 80,76 | 80,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 42,67 |
| 1795 | Methoxsalenum | Oxsoralen, kaps. mi kkie, 10 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990244713 | 2012-01-01 | 2 lata | 52.0, Leki przeciwłuszczycowe do stosowania ogólnego - psoraleny - metoksalen | 12,79 | 17,93 | 17,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------|--|---------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 1796 | Methylphenidatum | Concerta, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 18 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990655021 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 85,00 | 103,49 | 89,17 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 17,52 |
| 1797 | Methylphenidatum | Concerta, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 36 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990655038 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 151,20 | 178,33 | 178,33 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,84 |
| 1798 | Methylphenidatum | Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990046652 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 17,71 | 25,95 | 25,95 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1799 | Methylphenidatum | Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990046669 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 43,20 | 58,21 | 58,21 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1800 | Methylphenidatum | Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990046676 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 84,24 | 106,13 | 106,13 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,56 |
| 1801 | Methylphenidatum | Medikinet 10 mg, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652198 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 25,92 | 36,73 | 36,73 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1802 | Methylphenidatum | Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990046683 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 84,24 | 106,13 | 106,13 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,56 |
| 1803 | Methylphenidatum | Medikinet 20 mg, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652204 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 51,84 | 68,46 | 68,46 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 1804 | Methylphenidatum | Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990046638 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 7,56 | 12,59 | 12,59 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1805 | Methylphenidatum | Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990046645 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 21,60 | 31,23 | 31,23 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1806 | Methylphenidatum | Medikinet 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652181 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 12,53 | 19,28 | 19,28 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1807 | Methylphenidatum | Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990047888 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 76,92 | 94,29 | 82,56 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 14,93 |
| 1808 | Methylphenidatum | Medikinet CR 10 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 10 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652235 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 44,56 | 56,68 | 49,54 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 10,34 |
| 1809 | Methylphenidatum | Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990047970 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 161,69 | 189,00 | 165,12 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 27,44 |
| 1810 | Methylphenidatum | Medikinet CR 20 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 20 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652242 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 92,83 | 112,32 | 99,07 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 16,45 |
| 1811 | Methylphenidatum | Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990048052 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 140,42 | 168,37 | 168,37 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej był cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 5,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------------------|--|--|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 1812 | Methylphenidatum | Medikinet CR 30 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 30 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652259 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 81,14 | 102,06 | 102,06 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 3,20 |
| 1813 | Methylphenidatum | Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990048083 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 190,75 | 224,09 | 224,09 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 7,11 |
| 1814 | Methylphenidatum | Medikinet CR 40 mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 40 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990652266 | 2012-01-01 | 2 lata | 185.0, Leki psychoanaleptyczne - metylfenidat, atomoksetyna | 110,24 | 134,95 | 134,95 | Zespół nadpobudliwości ci psychoruchowej wył cznie jako element kompleksowego (zawieraj cego psychoterapi) leczenia u dzieci powy ej 6 roku ycia | | ryczałt | 4,27 |
| 1815 | Methylprednisolonum | Depo-Medrol, zawiesina do wstrzykiwa , 40 mg/ml | 1 fiol.a 1 ml | 5909990154814 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 5,51 | 8,17 | 8,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,09 |
| 1816 | Methylprednisolonum | Medrol, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990683123 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | 7,30 | 10,28 | 8,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 5,31 |
| 1817 | Methylprednisolonum | Medrol, tabl. , 16 mg | 50 tabl. (blist.) | 5909990683215 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | 51,68 | 64,17 | 54,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 21,10 |
| 1818 | Methylprednisolonum | Meprelon, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990834501 | 2012-03-01 | 2 lata | 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | 5,51 | 8,36 | 8,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,39 |
| 1819 | Methylprednisolonum | Meprelon, tabl. , 16 mg | 30 tabl. | 5909990835539 | 2012-03-01 | 2 lata | 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | 22,03 | 30,00 | 30,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,83 |
| 1820 | Methylprednisolonum | Metypred, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990316519 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | 6,46 | 9,38 | 8,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,41 |
| 1821 | Methylprednisolonum | Metypred, tabl. , 16 mg | 30 tabl. | 5909990316618 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.3, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - metyloprednisolon | 24,51 | 32,67 | 32,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,83 |
| 1822 | Methylprednisolonum | Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 500 mg | 1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem | 5909990236718 | 2012-07-01 | 2 lata | 82.1, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon | 35,05 | 45,62 | 45,62 | Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego | | ryczałt | 3,20 |
| 1823 | Methylprednisolonum | Solu-Medrol, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1000 mg | 1 fiolka z proszkiem, 1 fiolka z rozpuszczalnikiem | 5909990236817 | 2012-07-01 | 2 lata | 82.1, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon | 84,49 | 102,40 | 91,24 | Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego | | ryczałt | 14,36 |
| 1824 | Methylprednisolonum + Lidocainum | Depo-Medrol z Lidokain , zawiesina do wstrzykiwa , 40+10 mg/ml | 1 fiol.a 1 ml | 5909990236312 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.2, Kortykosteroidy do stosowania pozajelitowego - glukokortykoidy - metyloprednisolon - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 5,56 | 8,22 | 8,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 1825 | Metildigoxinum | Bemecor, tabl., 0,1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990174614 | 2012-01-01 | 2 lata | 28.0, Glikozydy naparstnicy | 4,47 | 5,04 | 0,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 5,04 |
| 1826 | Metoprololum | Metocard, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990034420 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 2,87 | 3,58 | 1,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadcisnienie tętna oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,58 |
| 1827 | Metoprololum | Metocard, tabl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990034529 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 5,30 | 6,70 | 3,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadcisnienie tętna oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,30 |
| 1828 | Mianserinum | Deprexolet, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909991120948 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 6,59 | 9,88 | 9,74 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 3,06 |
| 1829 | Mianserinum | Deprexolet, tabl. powł., 30 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909991121051 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 22,14 | 29,68 | 29,22 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 9,23 |
| 1830 | Mianserinum | Lerivon, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990157716 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 9,07 | 12,52 | 9,74 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 5,70 |
| 1831 | Mianserinum | Lerivon, tabl. powł., 30 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990157822 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 26,46 | 34,29 | 29,22 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 13,84 |
| 1832 | Mianserinum | Lerivon, tabl. powł., 60 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990157914 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 47,63 | 60,11 | 58,44 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 19,20 |
| 1833 | Mianserinum | Miansec, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990796618 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 7,56 | 10,91 | 9,74 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 4,09 |
| 1834 | Mianserinum | Miansec, tabl. powł., 10 mg | 90 tabl. | 5909990796625 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 21,38 | 28,87 | 28,87 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 8,66 |
| 1835 | Mianserinum | Miansec 30, tabl. powł., 30 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909991124311 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 14,58 | 20,19 | 19,48 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 6,55 |
| 1836 | Mianserinum | Miansegen, tabl. powł., 10 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990713462 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 21,71 | 29,22 | 29,22 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 8,77 |
| 1837 | Mianserinum | Miansegen, tabl. powł., 30 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990764242 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 21,71 | 29,22 | 29,22 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 8,77 |
| 1838 | Mianserinum | Miansegen, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990883813 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 6,75 | 10,05 | 9,74 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 3,23 |
| 1839 | Mianserinum | Miansegen, tabl. powł., 10 mg | 90 tabl. | 5909990883820 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 21,71 | 29,22 | 29,22 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 8,77 |
| 1840 | Mianserinum | Miansegen, tabl. powł., 30 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990883929 | 2012-01-01 | 2 lata | 225.0, Leki przeciwdepresyjne - mianseryna | 14,58 | 20,19 | 19,48 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 6,55 |
| 1841 | Miconazololum | Gyno-Femidazol, tabl. dopochwowe, 100 mg | 15 tabl. | 5909990281312 | 2012-01-01 | 2 lata | 59.0, Leki antyseptyczne i dezynfekcyjne do stosowania dopochwowego - pochodne imidazolu o działaniu przeciwgrzybiczym | 6,05 | 8,84 | 8,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,48 |
| 1842 | Miconazololum + Mazipredonum | Mycosolon, maść, 20+2,5 mg/g | 15 g | 5909990129812 | 2012-01-01 | 2 lata | 49.0, Miconazol w skojarzeniu z mazipredonem - do stosowania na skórę | 7,21 | 10,52 | 10,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,26 |
| 1843 | Mieszanki wyci gów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) | Phostal, zawiesina do wstrzykiwań, stężenie: 0,01 IR/ml; 0,1 IR/ml; 1 IR/ml; 10 IR/ml lub stężenie 0,01 IC/ml; 0,1 IC/ml; 1 IC/ml; 10 IC/ml IR/ml lub IC/ml | 4 fiolek 5 ml | 5909990820511 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.5, Alergeny różno mieszanek - produkty do leczenia podstawowego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--|--|--------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 1844 | Mieszanki wyci gów alergenowych (pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, roztoczy, grzybów) | Phostal, zawiesina do wstrzykiwa, 10 IR/ml | 1 fioła. 5 ml | 5909990820528 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.6, Alergeny różne mieszane - produkty do leczenia podtrzymuj tego | 133,56 | 158,55 | 158,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1845 | Moclobemidum | Aurorix, tabl. powł., 150 mg | 30 tabl. | 5909990094813 | 2012-01-01 | 2 lata | 227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -mocllobemid | 18,68 | 24,15 | 17,45 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 11,94 |
| 1846 | Moclobemidum | Aurorix, tabl. powł., 300 mg | 30 tabl. | 5909990419814 | 2012-01-01 | 2 lata | 227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -mocllobemid | 42,34 | 51,78 | 34,90 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 27,35 |
| 1847 | Moclobemidum | Mobemid, tabl. powł., 150 mg | 30 tabl. (2 blist. po 15 szt.) | 5909990966813 | 2012-01-01 | 2 lata | 227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -mocllobemid | 12,96 | 18,03 | 17,45 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 5,82 |
| 1848 | Moclobemidum | Moklar, tabl. powł., 150 mg | 30 tabl. | 5909990953714 | 2012-01-01 | 2 lata | 227.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory MAO -mocllobemid | 12,42 | 17,45 | 17,45 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | 30% | 5,24 |
| 1849 | Mometasonum | Asmanex Twisthaler, proszek do inhalacji, 400 g/dawk | 1 poj. a 60 daw. | 5909991106638 | 2012-01-01 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 128,52 | 149,03 | 85,66 | Astma; Przewlekła obturacyjna choroba płuc; Eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 69,77 |
| 1850 | Mometasonum | Elosone, krem, 1 mg/g | 15 g | 5909990949816 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania | 8,64 | 10,84 | 5,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 8,13 |
| 1851 | Mometasonum | Elosone, krem, 1 mg/g | 30 g | 5909990949823 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania | 17,06 | 21,14 | 10,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,71 |
| 1852 | Mometasonum | Momederm, maść, 1 mg/g | 15 g | 5909991041014 | 2012-01-01 | 2 lata | 56.0, Kortykosteroidy do stosowania na skórę - o dużej sile działania | 9,29 | 11,53 | 5,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 8,82 |
| 1853 | Montelukastum | Asmenol, tabl. do rozgryzania i uciska, 4 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990670604 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 34,56 | 40,79 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 30,79 |
| 1854 | Montelukastum | Asmenol, tabl. do rozgryzania i uciska, 5 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990670666 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 37,80 | 44,84 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 32,34 |
| 1855 | Montelukastum | Asmenol, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990670758 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 45,36 | 55,37 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 30,37 |
| 1856 | Montelukastum | Astmirex, tabl. do rozgryzania i uciska, 4 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990667703 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 36,00 | 42,33 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 32,33 |
| 1857 | Montelukastum | Astmirex, tabl. do rozgryzania i uciska, 5 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990667734 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 36,00 | 42,91 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 30,41 |
| 1858 | Montelukastum | Astmirex, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990667833 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 41,66 | 51,42 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 26,42 |
| 1859 | Montelukastum | Astmodil, tabl. powł., 10 mg | 28 tabs. | 5909990881734 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 31,86 | 40,92 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 15,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 1860 | Montelukastum | Astmodil, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabs. | 5909990881758 | 2012-07-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 16,85 | 21,84 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 11,84 |
| 1861 | Montelukastum | Astmodil, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabs. | 5909990881772 | 2012-07-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 21,06 | 26,92 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 14,42 |
| 1862 | Montelukastum | Drimon, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990663095 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 32,70 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 22,70 |
| 1863 | Montelukastum | Drimon, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990663149 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 33,28 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 20,78 |
| 1864 | Montelukastum | Drimon, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990663231 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 39,42 | 49,02 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 24,02 |
| 1865 | Montelukastum | Eonic, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990719709 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 32,70 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 22,70 |
| 1866 | Montelukastum | Eonic, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990719754 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 33,28 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 20,78 |
| 1867 | Montelukastum | Eonic, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990719778 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 35,72 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 10,72 |
| 1868 | Montelukastum | Milukante, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990668120 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 20,52 | 26,35 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 13,85 |
| 1869 | Montelukastum | Milukante, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990668137 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 35,72 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 10,72 |
| 1870 | Montelukastum | Milukante, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990668144 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 17,11 | 22,12 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 12,12 |
| 1871 | Montelukastum | Monkasta, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990662647 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 20,47 | 26,29 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 13,79 |
| 1872 | Montelukastum | Monkasta, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990662685 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 17,06 | 22,06 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 12,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 1873 | Montelukastum | Monkasta, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990671243 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 36,72 | 46,12 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 21,12 |
| 1874 | Montelukastum | Montelak, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990690268 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 22,68 | 28,08 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 18,08 |
| 1875 | Montelukastum | Montelak, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990690282 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 23,65 | 29,71 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 17,21 |
| 1876 | Montelukastum | Montelak, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990690305 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 42,12 | 51,90 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 26,90 |
| 1877 | Montelukastum | Montelukast Sandoz, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990780266 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 39,42 | 49,02 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 24,02 |
| 1878 | Montelukastum | Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. | 5909990803743 | 2012-03-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 17,11 | 22,12 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 12,12 |
| 1879 | Montelukastum | Montelukast Sandoz, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. | 5909990803767 | 2012-03-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 21,38 | 27,28 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 14,78 |
| 1880 | Montelukastum | Montelukast STADA, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. | 5909990702206 | 2012-03-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 17,11 | 22,12 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 12,12 |
| 1881 | Montelukastum | Montelukast STADA, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. | 5909990702220 | 2012-03-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 20,52 | 26,35 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 13,85 |
| 1882 | Montelukastum | Montelukast STADA, tabl. do rozgryzania i ucia, 10 mg | 28 tabl. | 5909990702251 | 2012-03-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 35,64 | 44,97 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 19,97 |
| 1883 | Montelukastum | Montespir, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (pojem.HDPE) | 5909990736683 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 27,00 | 33,28 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 20,78 |
| 1884 | Montelukastum | Montespir, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (pojem.HDPE) | 5909990736690 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 24,84 | 30,39 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 20,39 |
| 1885 | Montelukastum | Montespir, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl., (poj. HDPE) | 5909990787487 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 34,56 | 43,81 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 18,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 1886 | Montelukastum | Montessan, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990690336 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 29,16 | 35,01 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 25,01 |
| 1887 | Montelukastum | Montessan, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990690343 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 33,53 | 40,27 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 27,77 |
| 1888 | Montelukastum | Montessan, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990690350 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 48,54 | 58,77 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 33,77 |
| 1889 | Montelukastum | Montest , tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990671182 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 38,23 | 44,72 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 34,72 |
| 1890 | Montelukastum | Montest , tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990671205 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 38,23 | 45,30 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 32,80 |
| 1891 | Montelukastum | Montest , tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990671229 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 42,77 | 52,59 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 27,59 |
| 1892 | Montelukastum | Orilukast, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. | 5909990893188 | 2012-07-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 14,69 | 19,54 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 9,54 |
| 1893 | Montelukastum | Orilukast, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. | 5909990893263 | 2012-07-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 16,42 | 21,96 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 9,46 |
| 1894 | Montelukastum | Orilukast, tabl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990893294 | 2012-07-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 22,68 | 31,10 | 31,10 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 9,33 |
| 1895 | Montelukastum | Promonta, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990671052 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 16,47 | 21,43 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 11,43 |
| 1896 | Montelukastum | Promonta, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990671076 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 16,47 | 22,00 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 9,50 |
| 1897 | Montelukastum | Promonta, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990671090 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 21,60 | 29,95 | 29,95 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 8,99 |
| 1898 | Montelukastum | Spirokast, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990801442 | 2012-05-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoni ci receptorów leukotrienowych | 42,01 | 51,78 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 26,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----------|-------|
| 1899 | Montelukastum | Symlukast 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990697939 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 21,50 | 29,85 | 29,85 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 8,96 |
| 1900 | Montelukastum | Symlukast 4, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990697762 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 16,41 | 21,37 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 11,37 |
| 1901 | Montelukastum | Symlukast 5, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990697892 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 16,41 | 21,95 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 9,45 |
| 1902 | Montelukastum | Vizendo 10 mg, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990760398 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 36,72 | 46,12 | 35,72 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 21,12 |
| 1903 | Montelukastum | Vizendo 4 mg, tabl. do rozgryzania i ucia, 4 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990765737 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 29,16 | 35,01 | 14,29 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 25,01 |
| 1904 | Montelukastum | Vizendo 5 mg, tabl. do rozgryzania i ucia, 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990765751 | 2012-01-01 | 2 lata | 204.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - antagoniści receptorów leukotrienowych | 29,16 | 35,59 | 17,86 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | 30% | 23,09 |
| 1905 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990724819 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 9,90 | 12,79 | 6,68 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 6,11 |
| 1906 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990724819 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 9,90 | 12,79 | 6,68 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 9,31 |
| 1907 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 30 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990724918 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 14,04 | 19,92 | 19,92 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1908 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 30 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990724918 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 14,04 | 19,92 | 19,92 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1909 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990725014 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 25,92 | 35,33 | 35,33 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1910 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990725014 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1, Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 25,92 | 35,33 | 35,33 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|-----------|-------|
| 1911 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990725113 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 52,92 | 66,79 | 66,79 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1912 | Morphinum | Doltard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990725113 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 52,92 | 66,79 | 66,79 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1913 | Morphinum | Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990404919 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego | 10,80 | 13,96 | 8,38 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 5,58 |
| 1914 | Morphinum | Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990404919 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego | 10,80 | 13,96 | 8,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 8,78 |
| 1915 | Morphinum | Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990405015 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego | 11,88 | 16,75 | 16,75 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1916 | Morphinum | Morphini sulfas WZF, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990405015 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania pozajelitowego | 11,88 | 16,75 | 16,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 1917 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg | 60 tabl. | 5909990476237 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 28,08 | 34,94 | 20,04 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 14,90 |
| 1918 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 10 mg | 60 tabl. | 5909990476237 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 28,08 | 34,94 | 20,04 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 18,10 |
| 1919 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. | 5909990476336 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 50,76 | 63,91 | 60,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 3,80 |
| 1920 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 30 mg | 60 tabl. | 5909990476336 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 50,76 | 63,91 | 60,11 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 7,00 |
| 1921 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 60 tabl. | 5909990476435 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 109,62 | 130,88 | 120,22 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 10,66 |
| 1922 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 60 mg | 60 tabl. | 5909990476435 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 109,62 | 130,88 | 120,22 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 14,50 |
| 1923 | Morphinum | MST Continus, tabl. powl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg | 60 tabl. | 5909990476534 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 172,80 | 201,64 | 200,37 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|-----------|-------|
| 1924 | Morphinum | MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 100 mg | 60 tabl. | 5909990476534 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 172,80 | 201,64 | 200,37 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 7,67 |
| 1925 | Morphinum | MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg | 60 tabl. | 5909990476633 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 334,80 | 379,23 | 379,23 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1926 | Morphinum | MST Continus, tabl. powł. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg | 60 tabl. | 5909990476633 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 334,80 | 379,23 | 379,23 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 12,80 |
| 1927 | Morphinum | Sevredol, tabl. powł., 20 mg | 60 tabl. | 5909990336425 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu | 64,80 | 80,77 | 80,77 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1928 | Morphinum | Sevredol, tabl. powł., 20 mg | 60 tabl. | 5909990336425 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o niemodyfikowanym uwalnianiu | 64,80 | 80,77 | 80,77 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1929 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990743827 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 16,20 | 20,38 | 10,02 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 10,36 |
| 1930 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990743827 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 16,20 | 20,38 | 10,02 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 13,56 |
| 1931 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 30 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990743926 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 19,44 | 27,12 | 27,12 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1932 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 30 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990743926 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 19,44 | 27,12 | 27,12 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1933 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990744022 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 30,67 | 42,42 | 42,42 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|-----------|------|
| 1934 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 60 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990744022 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 30,67 | 42,42 | 42,42 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1935 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990744121 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 56,16 | 72,84 | 72,84 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1936 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990744121 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 56,16 | 72,84 | 72,84 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 3,20 |
| 1937 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990744220 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 90,72 | 113,82 | 113,82 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1938 | Morphinum | Vendal retard, tabl. powl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990744220 | 2012-01-01 | 2 lata | 149.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - morfina do podawania doustnego - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 90,72 | 113,82 | 113,82 | Neuralgia popółpa cowa przewlekła, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia | | ryczałt | 6,40 |
| 1939 | Mycophenolas mofetil | CellCept, tabl. , 500 mg | 50 tabl. | 5909990707515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,39 | 370,47 | 370,47 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układuwego oraz twardziny układuwej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 1940 | Mycophenolas mofetil | CellCept, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. | 5909990707614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,39 | 370,47 | 370,47 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1941 | Mycophenolas mofetil | CellCept, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml | 110 g (175 ml) | 5909990980918 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 291,60 | 336,74 | 336,74 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1942 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990752003 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 115,16 | 144,45 | 144,45 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 1943 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, kaps. twarde, 250 mg | 300 kaps. (30 blist.po 10 szt.) | 5909990752034 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 259,33 | 316,18 | 316,18 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,00 |
| 1944 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990752355 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 178,20 | 211,90 | 211,90 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1945 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, tabl. powł., 500 mg | 150 tabl. (15 blist.po 10 szt.) | 5909990752362 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 534,60 | 610,71 | 610,71 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespól nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u doroslych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 1946 | Mycophenolas mofetil | Mofimutral, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990796069 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 167,40 | 200,35 | 200,35 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1947 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg | 100 kaps. | 5909990718375 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 278,10 | 318,80 | 318,80 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1948 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990718405 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 278,10 | 318,80 | 318,80 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 1949 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Sandoz 250, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10) | 5909990074563 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 114,48 | 143,72 | 143,72 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1950 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Sandoz 500, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990715268 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 140,40 | 171,46 | 171,46 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1951 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg | 100 kaps. | 5909990807703 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 162,00 | 194,57 | 194,57 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|--|-----------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 1952 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990807741 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 162,00 | 194,57 | 194,57 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1953 | Mycophenolas mofetil | Myfenax, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. | 5909990638185 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,16 | 370,22 | 370,22 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1954 | Mycophenolas mofetil | Myfenax, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990638208 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,16 | 370,22 | 370,22 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 1955 | Mycophenolas mofetil | Nolfemic, tabl. powl., 250 mg | 100 tabl. | 5909990885091 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 297,00 | 339,02 | 339,02 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1956 | Mycophenolas mofetil | Nolfemic, tabl. powl., 500 mg | 50 tabl. | 5909990885107 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 297,00 | 339,02 | 339,02 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 1957 | Nabumetonom | Nabuton VP, tabl. , 0,5 g | 20 tabl. | 5909990962419 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 16,20 | 19,39 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 15,77 |
| 1958 | Nabumetonom | Nabuton VP, tabl. , 0,5 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990962426 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 44,28 | 52,00 | 21,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 41,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 1959 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml | 10 amp.-strz.a 0,3 ml | 5909990075621 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 47,97 | 60,67 | 53,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 10,28 |
| 1960 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml | 10 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990075720 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 103,47 | 124,04 | 107,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 20,06 |
| 1961 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990075829 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 160,54 | 188,31 | 178,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 13,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 1962 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml | 10 amp.-strz.a 0,4 ml | 5909990716821 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 64,39 | 79,85 | 71,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 11,60 |
| 1963 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990716920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 128,00 | 151,90 | 142,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 12,19 |
| 1964 | Nadroparinum calcicum | Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml | 10 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990836932 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 183,88 | 214,09 | 214,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 4,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 1965 | Nadroparinum calcicum | Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990837038 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 263,00 | 300,35 | 285,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 20,23 |
| 1966 | Nadroparinum calcicum | Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990837137 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 307,17 | 349,22 | 349,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 7,11 |
| 1967 | Naproxenum | Anapran, tabl. powł., 275 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990615438 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 9,72 | 12,61 | 7,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 8,62 |
| 1968 | Naproxenum | Anapran, tabl. powł., 550 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990624515 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 17,82 | 22,86 | 15,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 14,89 |
| 1969 | Naproxenum | Apo-Napro, tabl., 250 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990661404 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 8,55 | 11,98 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 6,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----|-------|
| 1970 | Naproxenum | Apo-Napro, tabl. , 250 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990661435 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 26,21 | 34,04 | 32,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 17,73 |
| 1971 | Naproxenum | Apo-Napro, tabl. , 500 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990661442 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 17,17 | 22,99 | 21,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,12 |
| 1972 | Naproxenum | Naproxen 250 Hasco, tabl. , 250 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991040529 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 8,73 | 12,18 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,74 |
| 1973 | Naproxenum | Naproxen 250 Hasco, tabl. , 250 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991040536 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 14,44 | 19,55 | 18,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,49 |
| 1974 | Naproxenum | Naproxen 500 Hasco, tabl. , 500 mg | 15 tabl. (blist.) | 5909990644179 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 8,56 | 11,99 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,55 |
| 1975 | Naproxenum | Naproxen Hasco, czopki, 250 mg | 10 czop. | 5909990914319 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 6,48 | 7,46 | 1,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,54 |
| 1976 | Naproxenum | Naproxen Hasco, czopki, 500 mg | 10 czop. | 5909990914418 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 9,72 | 11,46 | 3,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,61 |
| 1977 | Naproxenum | Naproxen Polfarmex, tabl. , 250 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990466726 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 14,36 | 19,47 | 18,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,41 |
| 1978 | Naproxenum | Naproxen Polfarmex, tabl. , 500 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990466818 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 12,61 | 17,07 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,82 |
| 1979 | Naproxenum | Pabi-Naproxen, tabl. , 250 mg | 50 tabl. | 5909990133215 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 15,00 | 20,15 | 18,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------|--|--------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|-----------|-------|
| 1980 | Naproxenum | Pabi-Naproxen, tabl. , 500 mg | 20 tabl. | 5909990133314 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 12,61 | 17,07 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,82 |
| 1981 | Naproxenum | Pabi-Naproxen, zawiesina doustna, 125 mg/5ml | 100 ml | 5909990170814 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.4, Niesteroidowe leki przeciwwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 9,72 | 16,51 | 16,51 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,26 |
| 1982 | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwa , 9 mg/ ml | 10 amp.a 10 ml (szkło) | 5909990248421 | 2012-01-01 | 2 lata | 218.1, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - fizjologiczny roztwór chlorku sodu | 7,24 | 8,93 | 3,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,12 |
| 1983 | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwa , 9 mg/ ml | 50 amp.a 10 ml (szkło) | 5909990248438 | 2012-01-01 | 2 lata | 218.1, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - fizjologiczny roztwór chlorku sodu | 32,95 | 39,70 | 18,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 30,64 |
| 1984 | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwa , 9 mg/ ml | 100 amp.a 5 ml (tworz.) | 5909990248452 | 2012-01-01 | 2 lata | 218.1, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - fizjologiczny roztwór chlorku sodu | 22,93 | 28,97 | 18,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,91 |
| 1985 | Natrii chloridum | Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, Injectio Natrii Chlorati Isotonica, roztwór do wstrzykiwa , 9 mg/ ml | 100 amp.a 10 ml (tworz.) | 5909990248469 | 2012-01-01 | 2 lata | 218.1, Płyny i rozcie czalniki do wstrzykiwa - fizjologiczny roztwór chlorku sodu | 27,43 | 36,26 | 36,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,13 |
| 1986 | Natrii cromoglicas | Cromoxal, roztwór do nebulizacji, 0,01 g/ml | 50 amp.a 2 ml | 5909990375318 | 2012-01-01 | 2 lata | 202.0, Wziewne kromony | 33,48 | 43,70 | 43,70 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,20 |
| 1987 | Natrii valproas | Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 100 tabl. | 5909990042364 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 56,16 | 70,95 | 70,95 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1988 | Natrii valproas | Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 500 mg | 100 tabl. | 5909990042364 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 56,16 | 70,95 | 70,95 | Padaczka | | ryczałt | 3,56 |
| 1989 | Natrii valproas | Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 100 tabl. | 5909990042371 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 32,40 | 42,89 | 42,89 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 1990 | Natrii valproas | Absenor, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 100 tabl. | 5909990042371 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłu onym uwalnianiu | 32,40 | 42,89 | 42,89 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 1991 | Natrii valproas | Convulex , syrop, 50 ml | 100 ml | 5909990023912 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 8,59 | 10,69 | 4,74 | Padaczka | | ryczałt | 9,15 |
| 1992 | Natrii valproas | Depakine , syrop, 288,2 mg/5ml | 150 ml | 5909990307418 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 12,84 | 16,18 | 8,19 | Padaczka | | ryczałt | 11,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----------|-------|
| 1993 | Natrii valproas | Orfiril 150, tabl. , 150 mg | 50 tabl. | 5909990414116 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 10,29 | 13,19 | 7,10 | Padaczka | | ryczałt | 9,29 |
| 1994 | Natrii valproas | Orfiril 300, tabl. , 300 mg | 50 tabl. | 5909990414314 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 14,06 | 18,80 | 14,21 | Padaczka | | ryczałt | 7,79 |
| 1995 | Natrii valproas | Orfiril 300 retard, tabl. retard, 300 mg | 50 tabl. | 5909990414413 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu | 25,10 | 32,17 | 24,39 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | bezpłatny | 7,78 |
| 1996 | Natrii valproas | Orfiril 300 retard, tabl. retard, 300 mg | 50 tabl. | 5909990414413 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu | 25,10 | 32,17 | 24,39 | Padaczka | | ryczałt | 10,98 |
| 1997 | Natrii valproas | Orfiril 600, tabl. , 600 mg | 50 tabl. | 5909990414512 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 23,64 | 31,17 | 28,41 | Padaczka | | ryczałt | 5,96 |
| 1998 | Natrii valproas | Orfiril long 1000, minisaszetki, 1000 mg | 50 minisasz. | 5909990987719 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu | 59,08 | 74,08 | 74,08 | Padaczka | | ryczałt | 3,56 |
| 1999 | Natrii valproas | Orfiril long 150, kaps., 150 mg | 50 kaps. | 5909990987412 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu | 12,53 | 16,77 | 12,20 | Padaczka | | ryczałt | 7,77 |
| 2000 | Natrii valproas | Orfiril long 300, kaps., 300 mg | 50 kaps. | 5909990987511 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu | 25,10 | 32,17 | 24,39 | Padaczka | | ryczałt | 10,98 |
| 2001 | Natrii valproas | Orfiril long 500, minisaszetki, 500 mg | 50 minisasz. | 5909990987610 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o przedłużonym uwalnianiu | 35,10 | 44,83 | 40,65 | Padaczka | | ryczałt | 7,38 |
| 2002 | Natrii valproas | Orfiril roztwór doustny , roztwór doustny , 300 mg/5ml | 250 ml | 5909990414215 | 2012-01-01 | 2 lata | 161.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - kwas walproinowy i jego sole - postacie farmaceutyczne o normalnym uwalnianiu | 21,44 | 26,69 | 14,21 | Padaczka | | ryczałt | 15,68 |
| 2003 | Nebivololum | Nebilenin, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990689774 | 2012-05-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 20,73 | 23,62 | 5,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 21,78 |
| 2004 | Nebivololum | Nebispes, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990673865 | 2012-05-01 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,34 | 17,84 | 5,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 16,00 |
| 2005 | Nicotinamidum | Vitaminum PP GSK, tabl. , 200 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990150717 | 2012-01-01 | 2 lata | 19.0, Witaminy - nikotynamid | 1,24 | 1,86 | 1,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 0,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 2006 | Nimesulidum | Aulin, tabl. , 100 mg | 15 tabl. | 5909990411320 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 7,02 | 9,07 | 5,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,35 |
| 2007 | Nimesulidum | Aulin, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990411337 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 13,50 | 17,29 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,85 |
| 2008 | Nimesulidum | Minesulin, tabl. , 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990997114 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 5,05 | 6,44 | 3,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 4,63 |
| 2009 | Nimesulidum | Minesulin, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990997138 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 13,23 | 16,99 | 10,88 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 11,55 |
| 2010 | Nimesulidum | Minesulin, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 100 mg | 30 sasz.a 2g | 5909990997220 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 13,23 | 18,55 | 18,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,28 |
| 2011 | Nimesulidum | Nimesil, granulát do sporz. dzania zawiesiny doustnej, 100 mg | 30 sasz.a 2g | 5909991040338 | 2012-01-01 | 2 lata | 141.4, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 13,50 | 18,84 | 18,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,42 |
| 2012 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990139613 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,66 | 8,43 | 8,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 2013 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990139620 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,34 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 6,40 |
| 2014 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990277216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 3,83 | 5,35 | 4,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,24 |
| 2015 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990277223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 7,69 | 10,60 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 5,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|------------------------------------|---------------|--|--------|---|----------|----------|----------|--|---|---------|------|
| 2016 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | 5909990694754 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,34 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 6,40 |
| 2017 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990694761 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,66 | 8,43 | 8,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 2018 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990694778 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 3,83 | 5,35 | 4,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,24 |
| 2019 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | 5909990694785 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 7,69 | 10,60 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 5,18 |
| 2020 | Norfloxacinum | Nolicin, tabl. powl., 400 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990085323 | 2012-01-01 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 11,40 | 16,14 | 16,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 8,07 |
| 2021 | Norfloxacinum | Norsept, tabl. powl., 400 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991102838 | 2012-01-01 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 10,58 | 15,26 | 15,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 7,63 |
| 2022 | Octreotidum | Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa, 50 g/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990042715 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | 37,80 | 50,72 | 50,72 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2023 | Octreotidum | Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa, 100 g/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990042913 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | 48,60 | 66,28 | 66,28 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2024 | Octreotidum | Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa, 30 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459513 | 2012-07-01 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | 6 480,00 | 7 048,77 | 7 048,77 | Akromegalia | | ryczałt | 4,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|------------------------------------|---------------|--|--------|--|----------|----------|----------|---|--|-----------|-------|
| 2025 | Ocreotidum | Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 20 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459612 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | 4 320,00 | 4 708,68 | 4 708,68 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2026 | Ocreotidum | Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 10 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459711 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | 2 160,00 | 2 368,59 | 2 354,34 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 17,45 |
| 2027 | Ofloxacinum | Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990111213 | 2012-01-01 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 12,95 | 16,19 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 12,16 |
| 2028 | Ofloxacinum | Tarivid 200, tabl. powł., 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990111213 | 2012-01-01 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 12,95 | 16,19 | 8,07 | Grupa, tym również grupa wielolekooporna i inne mykobakteriozy | | bezpłatny | 8,12 |
| 2029 | Olanzapinum | Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990806751 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,22 | 63,87 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,67 |
| 2030 | Olanzapinum | Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990806799 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 100,44 | 121,60 | 121,60 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2031 | Olanzapinum | Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 28 tabl. | 5909990806843 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 156,60 | 184,29 | 184,29 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,48 |
| 2032 | Olanzapinum | Anzolin, tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg | 28 tabl. | 5909990806881 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 216,54 | 249,84 | 249,84 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,97 |
| 2033 | Olanzapinum | Lanzapin, tabl. powł., 5 miligram | 30 tabl. (blist.) | 5909990703302 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,81 | 68,11 | 67,93 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,38 |
| 2034 | Olanzapinum | Lanzapin, tabl. powł., 10 miligram | 30 tabl. (blist.) | 5909990703685 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 107,61 | 129,67 | 129,67 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2035 | Olanzapinum | Olanzapina Mylan, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990697526 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 49,68 | 63,29 | 63,29 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2036 | Olanzapinum | Olanzapina Mylan, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (blist. Alu/Alu) | 5909990697649 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 99,36 | 120,45 | 120,45 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2037 | Olanzapinum | Olanzapine Apotex, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990793341 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 48,60 | 62,14 | 62,14 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|-----------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 2038 | Olanzapinum | Olanzapine Apotex, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990793365 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 97,20 | 118,14 | 118,14 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2039 | Olanzapinum | Olanzapine Apotex, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990793389 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 97,20 | 118,14 | 118,14 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2040 | Olanzapinum | Olanzapine Teva, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (blis.) | 5909990638253 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 47,52 | 60,98 | 60,98 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2041 | Olanzapinum | Olanzapine Teva, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990638338 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 102,60 | 123,92 | 123,92 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2042 | Olanzapinum | Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990638444 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 47,52 | 60,98 | 60,98 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2043 | Olanzapinum | Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990638482 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 102,60 | 123,92 | 123,92 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2044 | Olanzapinum | Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 28 tabl. (blis.) | 5909990638543 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 156,60 | 184,29 | 184,29 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,48 |
| 2045 | Olanzapinum | Olanzapine Teva, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg | 28 tabl. (blis.) | 5909990638581 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 210,60 | 243,48 | 243,48 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,97 |
| 2046 | Olanzapinum | Olanzaran, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990766895 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 43,20 | 56,36 | 56,36 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2047 | Olanzapinum | Olanzaran, tabl. , 10 mg | 28 tabl. | 5909990766901 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 86,40 | 106,58 | 106,58 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2048 | Olanzapinum | Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990767045 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 43,20 | 56,36 | 56,36 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2049 | Olanzapinum | Olanzaran, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990767052 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 86,40 | 106,58 | 106,58 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2050 | Olanzapinum | Olanzin, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990637126 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,76 | 64,45 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,25 |
| 2051 | Olanzapinum | Olanzin, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990637218 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 103,68 | 125,07 | 125,07 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2052 | Olanzapinum | Olasyn 10 mg , tabl. , 10 mg | 28 tabl. | 5909990769094 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 129,69 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,09 |
| 2053 | Olanzapinum | Olasyn 5 mg , tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990768950 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 56,70 | 70,81 | 63,40 | Schizofrenia | | ryczałt | 10,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 2054 | Olanzapinum | Olazax, tabl., 5 mg | 28 tabl. | 5909990782239 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 42,12 | 55,20 | 55,20 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2055 | Olanzapinum | Olazax, tabl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990782246 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 84,24 | 104,27 | 104,27 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2056 | Olanzapinum | Olazax, tabl., 20 mg | 28 tabl. | 5909990925179 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 168,48 | 198,41 | 198,41 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,97 |
| 2057 | Olanzapinum | Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990782253 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 42,12 | 55,20 | 55,20 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2058 | Olanzapinum | Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990782260 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 84,24 | 104,27 | 104,27 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2059 | Olanzapinum | Olazax Disperzi, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg | 28 tabl. | 5909990925186 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 168,48 | 198,41 | 198,41 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,97 |
| 2060 | Olanzapinum | Olpinat, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. | 5909990781782 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,76 | 64,45 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,25 |
| 2061 | Olanzapinum | Olpinat, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990781805 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 129,69 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,09 |
| 2062 | Olanzapinum | Olpinat, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (blis.) | 5909990832774 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 54,00 | 68,32 | 67,93 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,59 |
| 2063 | Olanzapinum | Olpinat, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (blis.) | 5909990832781 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 115,56 | 138,18 | 135,86 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,52 |
| 2064 | Olanzapinum | Olzapin, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990335343 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 54,00 | 67,91 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,71 |
| 2065 | Olanzapinum | Olzapin, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990335367 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 129,69 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,09 |
| 2066 | Olanzapinum | Olzin, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990729081 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 105,84 | 127,38 | 126,80 | Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia | | ryczałt | 3,78 |
| 2067 | Olanzapinum | Olzin, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990729159 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,80 | 64,49 | 63,40 | Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia | | ryczałt | 4,29 |
| 2068 | Olanzapinum | Parnassan, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990743599 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 44,28 | 57,92 | 57,92 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2069 | Olanzapinum | Parnassan, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990743629 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 91,80 | 112,76 | 112,76 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 2070 | Olanzapinum | Ranofren, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990640249 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,80 | 64,49 | 63,40 | Schizofrenia | | ryczałt | 4,29 |
| 2071 | Olanzapinum | Ranofren, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990640287 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 105,84 | 127,38 | 126,80 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,78 |
| 2072 | Olanzapinum | Sanza 10 mg tabletki, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990692668 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 100,44 | 121,60 | 121,60 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2073 | Olanzapinum | Sanza 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990692590 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,22 | 63,87 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,67 |
| 2074 | Olanzapinum | Synza 10 mg, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990704866 | 2012-01-01/2012-07-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 105,30 | 126,80 | 126,80 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2075 | Olanzapinum | Synza 5 mg, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990704750 | 2012-01-01/2012-07-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,21 | 63,85 | 63,40 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,65 |
| 2076 | Olanzapinum | Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. (blist.Alu-OPA) | 5909990069705 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 54,00 | 67,91 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,71 |
| 2077 | Olanzapinum | Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. (blist.Alu-OPA) | 5909990069866 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 129,69 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,09 |
| 2078 | Olanzapinum | Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990069958 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 162,00 | 190,06 | 190,06 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,48 |
| 2079 | Olanzapinum | Zalasta, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990070008 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 216,00 | 249,25 | 249,25 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,97 |
| 2080 | Olanzapinum | Zalasta, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991081812 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 54,00 | 67,91 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,71 |
| 2081 | Olanzapinum | Zalasta, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991081911 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 129,69 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,09 |
| 2082 | Olanzapinum | Zapilux, tabl. powl., 5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990647804 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 48,60 | 62,14 | 62,14 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2083 | Olanzapinum | Zapilux, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990647835 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 54,00 | 68,32 | 67,93 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,59 |
| 2084 | Olanzapinum | Zapilux, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990648139 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 97,20 | 118,14 | 118,14 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2085 | Olanzapinum | Zapilux, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990648160 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 130,10 | 130,10 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 2086 | Olanzapinum | Zolafren, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990916917 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 59,40 | 74,09 | 67,93 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 9,36 |
| 2087 | Olanzapinum | Zolafren, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990917013 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 119,88 | 142,81 | 135,86 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 10,15 |
| 2088 | Olanzapinum | Zolafren, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991064518 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 59,40 | 74,09 | 67,93 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 9,36 |
| 2089 | Olanzapinum | Zolafren, kaps. twarde, 7,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991064617 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 89,91 | 109,22 | 101,89 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 10,53 |
| 2090 | Olanzapinum | Zolafren, kaps. twarde, 10 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991064716 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 119,88 | 142,81 | 135,86 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 10,15 |
| 2091 | Olanzapinum | Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990775675 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 54,00 | 67,91 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,71 |
| 2092 | Olanzapinum | Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990775682 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 108,00 | 129,69 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,09 |
| 2093 | Olanzapinum | Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 28 tabl. | 5909990775712 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 162,00 | 190,06 | 190,06 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,48 |
| 2094 | Olanzapinum | Zolafren - Swift, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg | 28 tabl. | 5909990775729 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 216,00 | 249,25 | 249,25 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,97 |
| 2095 | Olanzapinum | Zolaxa, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991096816 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 56,16 | 70,63 | 67,93 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,90 |
| 2096 | Olanzapinum | Zolaxa, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991097011 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 115,71 | 138,35 | 135,86 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,69 |
| 2097 | Olanzapinum | Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 5 mg | 28 tabl. | 5909990892082 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 52,35 | 66,14 | 63,40 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,94 |
| 2098 | Olanzapinum | Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 10 mg | 28 tabl. | 5909990892129 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 110,70 | 132,59 | 126,80 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 8,99 |
| 2099 | Olanzapinum | Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 15 mg | 28 tabl. | 5909990892150 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 170,45 | 199,10 | 190,20 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 13,38 |
| 2100 | Olanzapinum | Zolaxa Rapid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 20 mg | 28 tabl. | 5909990892303 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 231,15 | 265,46 | 253,60 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 17,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|--------------------------------------|---------------|--|--------|---|----------|----------|----------|--|---|---------|-------|
| 2101 | Olanzapinum | ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesziny do wstrzykiwa o przedłu onym uwalnianiu, 210 mg | 1 fiol.pr.a 0,21g (+1 fiol.roz.3 ml) | 5909990686803 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 583,20 | 652,12 | 652,12 | Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni stabilizację podczas leczenia olanzapin w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | | ryczałt | 3,20 |
| 2102 | Olanzapinum | ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesziny do wstrzykiwa o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 1 fiol.pr.a 0,3g (+1 fiol.roz.3 ml) | 5909990686827 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 885,84 | 982,64 | 931,60 | Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni stabilizację podczas leczenia olanzapin w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | | ryczałt | 54,24 |
| 2103 | Olanzapinum | ZypAdhera, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania zawiesziny do wstrzykiwa o przedłu onym uwalnianiu, 405 mg | 1 fiol.pr.a 0,405g (+1fiol.roz.3 ml) | 5909990686834 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.4, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 1 177,44 | 1 302,45 | 1 257,66 | Schizofrenia u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiedni stabilizację podczas leczenia olanzapin w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | | ryczałt | 49,11 |
| 2104 | Olanzapinum | Zyprexa, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. | 5909990743117 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 85,19 | 101,29 | 63,40 | Schizofrenia | | ryczałt | 41,09 |
| 2105 | Olanzapinum | Zyprexa, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990743315 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.2, Leki przeciwpsychotyczne - olanzapina do stosowania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 170,39 | 196,45 | 126,80 | Schizofrenia | | ryczałt | 72,85 |
| 2106 | Omeprazolom | Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990068401 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,70 | 11,51 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,88 |
| 2107 | Omeprazolom | Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990068425 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,05 | 22,37 | 22,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|-------------------------------------|-------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2108 | Omeprazolom | Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg | 14 kaps. (pojem.) | 5909990880218 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,26 | 14,26 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,63 |
| 2109 | Omeprazolom | Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg | 28 kaps. (pojem.) | 5909990880225 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 2110 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 7 kaps. | 5909990420513 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 14,90 | 17,79 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 14,98 |
| 2111 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 14 kaps. | 5909990420520 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,63 | 25,35 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 19,72 |
| 2112 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 28 kaps. | 5909990420537 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,84 | 26,43 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,17 |
| 2113 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 56 kaps. | 5909990420544 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 28,84 | 38,90 | 38,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,45 |
| 2114 | Omeprazolom | Helicid 10, kaps., 10 mg | 14 kaps. | 5909990877317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,72 | 12,25 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,44 |
| 2115 | Omeprazolom | Helicid 10, kaps., 10 mg | 28 kaps. | 5909990877324 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,36 | 22,92 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 17,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---|-----------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2116 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps., 20 mg | 14 kaps. (but.) | 5909990420612 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,20 | 20,61 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 14,98 |
| 2117 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps., 20 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990420629 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,36 | 24,84 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,58 |
| 2118 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps., 20 mg | 90 kaps. (but.) | 5909990422654 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 57,24 | 71,69 | 71,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 35,85 |
| 2119 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. | 5909997014555 | 2012-07-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,43 |
| 2120 | Omeprazolom | Helicid Forte, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 kaps. | 5909990921324 | 2012-07-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 27,43 | 37,40 | 37,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 18,70 |
| 2121 | Omeprazolom | Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 tabl. | 5909990889600 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,69 | 18,77 | 18,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,39 |
| 2122 | Omeprazolom | Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 tabl. | 5909990891351 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 25,38 | 35,21 | 35,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 17,61 |
| 2123 | Omeprazolom | Losec, kaps., 20 mg | 14 kaps. | 5909990193721 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 29,51 | 34,85 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 29,22 |
| 2124 | Omeprazolom | Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. | 5909991100926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,58 | 18,65 | 18,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---|------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2125 | Omeprazolom | Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990613205 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,36 | 24,84 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,58 |
| 2126 | Omeprazolom | Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg | 56 kaps. (8 blist.po 7 szt.) | 5909990615230 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 32,40 | 42,71 | 42,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 21,36 |
| 2127 | Omeprazolom | Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990613359 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 32,40 | 42,71 | 42,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 21,36 |
| 2128 | Omeprazolom | Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990772629 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 21,06 | 25,80 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 20,17 |
| 2129 | Omeprazolom | Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990772667 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 23,22 | 30,05 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 18,79 |
| 2130 | Omeprazolom | Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990077731 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 34,56 | 45,03 | 45,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 22,52 |
| 2131 | Omeprazolom | Prazol, kaps., 20 mg | 14 kaps. | 5909990772919 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,96 | 17,14 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,51 |
| 2132 | Omeprazolom | Prazol, kaps., 20 mg | 7 kaps. | 5909990772926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,48 | 8,78 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 2133 | Omeprazolom | Prazol, kaps., 20 mg | 28 kaps. | 5909990772933 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 2134 | Omeprazolom | Progastim, kaps. dojel., 20 mg | 14 kaps. (but.) | 5909990635443 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,94 | 13,91 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,28 |
| 2135 | Omeprazolom | Progastim, kaps. dojel., 20 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990635450 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,28 | 19,41 | 19,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,71 |
| 2136 | Omeprazolom | Tulzol, Omeprazolom 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 14 kaps. | 5909990659449 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,69 | 11,50 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,87 |
| 2137 | Omeprazolom | Tulzol, Omeprazolom 123ratio, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. | 5909990659456 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 15,38 | 21,66 | 21,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,83 |
| 2138 | Omeprazolom | Ultop, kaps. dojel. twarde, 10 mg | 28 kaps. | 5909990796205 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,64 | 12,52 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 6,89 |
| 2139 | Omeprazolom | Ultop, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. | 5909990796298 | 2012-05-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,95 | 20,12 | 20,12 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 10,06 |
| 2140 | Ondansetronum | Atossa, tabl. powl., 8 mg | 10 tabl. | 5909990744510 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 39,96 | 51,38 | 49,85 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 4,73 |
| 2141 | Ondansetronum | Emetron, tabl. powl., 8 mg | 10 tabl. | 5909990902811 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 42,21 | 53,78 | 49,85 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 7,13 |
| 2142 | Ondansetronum | OndaLEK 8, tabl. powl., 8 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990573219 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 59,40 | 72,18 | 49,85 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 25,53 |
| 2143 | Ondansetronum | Ondansetron Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg | 10 tabl. | 5909990777044 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 15,12 | 21,77 | 21,77 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 3,20 |
| 2144 | Ondansetronum | Ondansetron Bluefish, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 8 mg | 10 tabl. | 5909990777150 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 20,52 | 30,58 | 30,58 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 3,20 |
| 2145 | Ondansetronum | Setronon, tabl. powl., 8 mg | 10 tabl. | 5909990994717 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoni ci receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 38,52 | 49,85 | 49,85 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 2146 | Ondansetronum | Zofran, tabl. powł., 4 mg | 10 tabl. | 5909990001811 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 31,86 | 39,68 | 24,93 | Nowotwory złośliwe | | ryczałt | 17,95 |
| 2147 | Ondansetronum | Zofran, tabl. powł., 8 mg | 10 tabl. | 5909990001910 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 64,80 | 77,96 | 49,85 | Nowotwory złośliwe | | ryczałt | 31,31 |
| 2148 | Ondansetronum | Zofran, czopki, 16 mg | 2 czop. | 5909990810529 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.2, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doodbytniczego | 55,08 | 69,33 | 69,33 | Nowotwory złośliwe | | ryczałt | 3,20 |
| 2149 | Ondansetronum | Zofran, syrop, 4 mg/5ml | 50 ml | 5909990810611 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 72,65 | 83,33 | 24,93 | Nowotwory złośliwe | | ryczałt | 61,60 |
| 2150 | Ondansetronum | Zofran Zydis, liofilizat doustny, 4 mg | 10 szt. | 5909990887910 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 31,86 | 39,68 | 24,93 | Nowotwory złośliwe | | ryczałt | 17,95 |
| 2151 | Ondansetronum | Zofran Zydis, liofilizat doustny, 8 mg | 10 szt. | 5909990888016 | 2012-01-01 | 2 lata | 7.1, Leki przeciwwymiotne - antagoniści receptora serotoninowego - postacie do podawania doustnego | 64,80 | 77,96 | 49,85 | Nowotwory złośliwe | | ryczałt | 31,31 |
| 2152 | Oxcarbazepinum | Karbagen, tabl. powł., 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990048809 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,90 | 33,65 | 33,65 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2153 | Oxcarbazepinum | Karbagen, tabl. powł., 300 mg | 50 tabl. | 5909990048823 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 49,68 | 63,67 | 63,67 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2154 | Oxcarbazepinum | Karbagen, tabl. powł., 600 mg | 50 tabl. | 5909990048854 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 98,28 | 119,67 | 119,67 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2155 | Oxcarbazepinum | Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml | 250 ml | 5909990747115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 86,63 | 105,82 | 105,82 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2156 | Oxcarbazepinum | Trileptal, tabl., 150 mg | 50 tabl. | 5909990825516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 29,80 | 38,90 | 33,67 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 8,43 |
| 2157 | Oxcarbazepinum | Trileptal, tabl., 300 mg | 50 tabl. | 5909990825615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 57,24 | 71,76 | 67,35 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 7,61 |
| 2158 | Oxcarbazepinum | Trileptal, tabl., 600 mg | 50 tabl. | 5909990825714 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykabazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 112,32 | 134,69 | 134,69 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2159 | Oxybutyninum | Ditropan, tabl., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990163519 | 2012-01-01 | 2 lata | 75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina | 11,34 | 15,89 | 14,23 | Stwardnienie rozsiane | | 30% | 5,93 |
| 2160 | Oxybutyninum | Driptane, tabl., 5 mg | 60 tabl. | 5909990783816 | 2012-01-01 | 2 lata | 75.1, Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - oksybutynina | 21,09 | 28,46 | 28,46 | Stwardnienie rozsiane | | 30% | 8,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 2161 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990643905 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 46,44 | 58,31 | 42,98 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 18,53 |
| 2162 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990643905 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 46,44 | 58,31 | 42,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 18,53 |
| 2163 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990643943 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 92,88 | 112,00 | 85,96 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 29,24 |
| 2164 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990643943 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 92,88 | 112,00 | 85,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 29,24 |
| 2165 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990644001 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 169,06 | 197,51 | 171,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 28,79 |
| 2166 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990644001 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 169,06 | 197,51 | 171,92 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 28,79 |
| 2167 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 40 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990644025 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 324,00 | 367,41 | 343,83 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 26,99 |
| 2168 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 40 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990644025 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 324,00 | 367,41 | 343,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 26,99 |
| 2169 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 80 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990644049 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 615,60 | 687,66 | 687,66 | Neuralgia popólpa cowa przewlekła, Nowotwory zło liwe, Wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I - odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia | | ryczałt | 6,83 |
| 2170 | Oxycodonum | OxyContin, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 80 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990644049 | 2012-01-01 | 2 lata | 150.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - oksykodon | 615,60 | 687,66 | 687,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 6,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2171 | Pantoprazolum | Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990621026 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 11,34 | 15,40 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,77 |
| 2172 | Pantoprazolum | Anesteloc, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990621040 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,30 | 26,92 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,66 |
| 2173 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909991128418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,30 | 14,29 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,66 |
| 2174 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991128432 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,67 | 26,25 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 14,99 |
| 2175 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909991128814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 5,16 | 7,37 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 4,56 |
| 2176 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991128838 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,69 | 14,71 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,08 |
| 2177 | Pantoprazolum | Contracid, tabl. powl. dojelitowe, 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990736706 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,16 | 13,07 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 7,44 |
| 2178 | Pantoprazolum | Contracid, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990736720 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,34 | 24,82 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2179 | Pantoprazolum | Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990478767 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,02 | 9,35 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 6,54 |
| 2180 | Pantoprazolum | Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990478774 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 14,04 | 18,30 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,67 |
| 2181 | Pantoprazolum | Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990689842 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,72 | 13,67 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,04 |
| 2182 | Pantoprazolum | Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990689859 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,44 | 26,00 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 14,74 |
| 2183 | Pantoprazolum | Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. | 5909990653409 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,56 | 11,36 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,73 |
| 2184 | Pantoprazolum | Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. | 5909990653508 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,56 | 11,36 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,73 |
| 2185 | Pantoprazolum | Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. | 5909990653539 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,50 | 19,65 | 19,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,83 |
| 2186 | Pantoprazolum | IPP 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990085033 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,37 | 14,38 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2187 | Pantoprazolum | IPP 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990082643 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,69 | 26,27 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,01 |
| 2188 | Pantoprazolum | Noacid, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990645640 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 11,60 | 15,68 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 10,05 |
| 2189 | Pantoprazolum | Noacid, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990645732 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,50 | 27,13 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,87 |
| 2190 | Pantoprazolum | Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990075003 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,82 | 14,85 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,22 |
| 2191 | Pantoprazolum | Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg | 56 tabl. | 5909990075041 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,65 | 19,81 | 19,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,91 |
| 2192 | Pantoprazolum | Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990075089 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,68 | 26,26 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,00 |
| 2193 | Pantoprazolum | Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg | 56 tabl. | 5909990075126 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 27,54 | 37,52 | 37,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 18,76 |
| 2194 | Pantoprazolum | Panogastin, tabl. dojel., 20 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990646210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 11,34 | 15,40 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2195 | Pantoprazolum | Panogastin, tabl. dojel., 40 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990646272 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 21,06 | 27,73 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 16,47 |
| 2196 | Pantoprazolum | Panrazol, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990698974 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,18 | 10,95 | 10,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,48 |
| 2197 | Pantoprazolum | Panrazol, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990699209 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 14,42 | 20,63 | 20,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 10,32 |
| 2198 | Pantoprazolum | Pantogen 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (blist.Alu/Alu) | 5909990780549 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,35 | 11,14 | 11,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,57 |
| 2199 | Pantoprazolum | Pantogen 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (blist.Alu/Alu) | 5909990780587 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 15,66 | 21,96 | 21,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 10,98 |
| 2200 | Pantoprazolum | Pantopraz 40 mg, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990889167 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,09 | 22,41 | 22,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,21 |
| 2201 | Pantoprazolum | Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. | 5909990866793 | 2012-07-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,70 | 10,44 | 10,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 5,22 |
| 2202 | Pantoprazolum | Pantoprazole Arrow, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. | 5909990867066 | 2012-07-01 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,07 | 19,17 | 19,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 9,59 |
| 2203 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. | 5909990652303 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 4,35 | 6,50 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 3,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2204 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. | 5909990652334 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,82 | 12,71 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 7,08 |
| 2205 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. | 5909990652358 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,69 | 12,57 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 6,94 |
| 2206 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. | 5909990652372 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,77 | 24,21 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,95 |
| 2207 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. | 5909990730094 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 3,46 | 5,55 | 5,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 2,78 |
| 2208 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990730100 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,91 | 10,66 | 10,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,33 |
| 2209 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. | 5909990730162 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,91 | 10,66 | 10,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,33 |
| 2210 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990730179 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,82 | 19,98 | 19,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,99 |
| 2211 | Pantoprazolum | Xotepic, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990059546 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,86 | 12,76 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 7,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|--|--------|--|----------|----------|----------|--|--|-----------|-------|
| 2212 | Pantoprazolum | Xotepic, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990059591 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,93 | 24,39 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,13 |
| 2213 | Paroxetinum | Arketis tabletki 20 mg, tabl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990047109 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 18,90 | 24,09 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 13,67 |
| 2214 | Paroxetinum | Parogen, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990425877 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 19,44 | 24,67 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,25 |
| 2215 | Paroxetinum | Parogen, tabl. powł., 20 mg | 60 tabl. | 5909990425884 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 38,88 | 47,66 | 29,75 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 26,84 |
| 2216 | Paroxetinum | Paroxinor, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990798346 | 2012-05-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 9,18 | 13,69 | 13,69 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 4,11 |
| 2217 | Paroxetinum | Paxtin 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990010189 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 19,22 | 24,44 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,02 |
| 2218 | Paroxetinum | Paxtin 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990010202 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 37,80 | 46,50 | 29,75 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 25,68 |
| 2219 | Paroxetinum | Rexetin, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991006310 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 19,85 | 25,11 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,69 |
| 2220 | Paroxetinum | Seroxat, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990640515 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 49,82 | 57,18 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 46,76 |
| 2221 | Paroxetinum | Xetanor 20 mg, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990570515 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny | 22,14 | 27,56 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 17,14 |
| 2222 | Pegfilgrastinum | Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml | 1 amp.-strz.a 0,6 ml (z zab.igly) | 5909990007523 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 3 286,98 | 3 587,47 | 3 587,47 | Nowotwory zło liwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych | Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropeniczej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem, w szczegóno ci u chorych poddawanych chemioterapii o zało eniu radykalnym | ryczałt | 3,20 |
| 2223 | Perazinum | Peragal, tabl., 25 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990826018 | 2012-01-01 | 2 lata | 176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyina | 1,43 | 1,87 | 1,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,69 |
| 2224 | Perazinum | Peragal, tabl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990826117 | 2012-01-01 | 2 lata | 176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyina | 4,75 | 7,10 | 7,10 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2225 | Perazinum | Perazin 100 mg, tabl., 100 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990858514 | 2012-01-01 | 2 lata | 176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyina | 4,75 | 7,10 | 7,10 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2226 | Perazinum | Perazin 25 mg, tabl., 25 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990858415 | 2012-01-01 | 2 lata | 176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyina | 1,43 | 1,87 | 1,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,69 |
| 2227 | Perazinum | Pernazinum, tabl., 100 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990199518 | 2012-01-01 | 2 lata | 176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyina | 4,89 | 7,25 | 7,10 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,15 |
| 2228 | Perazinum | Pernazinum, tabl., 25 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990202614 | 2012-01-01 | 2 lata | 176.0. Leki przeciwpsychotyczne - perazyina | 1,44 | 1,89 | 1,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,71 |
| 2229 | Perindoprilum | Coverex, tabl., 4 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990836710 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0. Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 18,61 | 21,63 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 18,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 2230 | Perindoprilum | Lextril, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990675128 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 12,31 | 14,88 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 12,09 |
| 2231 | Perindoprilum | Lextril, tabl. , 8 mg | 30 tabl. | 5909990675180 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 20,52 | 25,02 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 19,44 |
| 2232 | Perindoprilum | Prenessa, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990569311 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 12,20 | 14,76 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 11,97 |
| 2233 | Perindoprilum | Prenessa, tabl. , 8 mg | 30 tabl. | 5909990662494 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 22,03 | 26,63 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 21,05 |
| 2234 | Perindoprilum | Prestarium 10mg, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. | 5909990336081 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 35,32 | 41,43 | 14,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 34,45 |
| 2235 | Perindoprilum | Prestarium 5mg, tabl. powl., 5 mg | 30 tabl. | 5909990337774 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 24,30 | 28,10 | 7,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 24,61 |
| 2236 | Perindoprilum | Vidotin, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990653614 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 10,26 | 12,69 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,90 |
| 2237 | Perindoprilum | Vidotin, tabl. , 8 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990653621 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 17,71 | 22,02 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 16,44 |
| 2238 | Perindoprilum + Amlodipinum | Amlessa, tabl. , 4+5 mg | 30 tabl. | 5909990908134 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 15,55 | 18,35 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 15,56 |
| 2239 | Perindoprilum + Amlodipinum | Amlessa, tabl. , 4+10 mg | 30 tabl. | 5909990908165 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 15,55 | 18,35 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 15,56 |
| 2240 | Perindoprilum + Amlodipinum | Amlessa, tabl. , 8+5 mg | 30 tabl. | 5909990908196 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 24,49 | 29,27 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 23,69 |
| 2241 | Perindoprilum + Amlodipinum | Amlessa, tabl. , 8+10 mg | 30 tabl. | 5909990908240 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 24,49 | 29,27 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 23,69 |
| 2242 | Perindoprilum + Amlodipinum | Co-Prestarium, tabl. , 5+5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990669301 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 24,30 | 28,10 | 7,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 24,61 |
| 2243 | Perindoprilum + Amlodipinum | Co-Prestarium, tabl. , 10+5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990669332 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 38,88 | 45,24 | 14,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 38,26 |
| 2244 | Perindoprilum + Amlodipinum | Co-Prestarium, tabl. , 5+10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990669387 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 24,30 | 28,10 | 7,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 24,61 |
| 2245 | Perindoprilum + Amlodipinum | Co-Prestarium, tabl. , 10+10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990669400 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 38,88 | 45,24 | 14,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 38,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|----------------------------------|-----------|-------|
| 2246 | Perindoprilum + Indapamidum | Co-Prenessa , tabl. , 8+2,5 mg | 30 tabl. | 5909990850167 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 22,01 | 26,62 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 21,04 |
| 2247 | Perindoprilum + Indapamidum | Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg, tabl. , 4+1,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990641086 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 19,04 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 16,25 |
| 2248 | Perindoprilum + Indapamidum | Co-Prenessa 4 mg / 1,25 mg, tabl. , 4+1,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990746569 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 19,04 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 16,25 |
| 2249 | Perindoprilum + Indapamidum | Noliprel Bi-Forte, tabl. powł., 10+2,5 mg | 30 tabl. (pojem.) | 5909990707782 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 38,88 | 45,24 | 14,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 38,26 |
| 2250 | Perindoprilum + Indapamidum | Noliprel Forte, tabl. powł., 5+1,25 mg | 30 tabl. (pojem.) | 5909990055029 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 24,30 | 28,10 | 7,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 24,61 |
| 2251 | Perindoprilum + Indapamidum | Tertensif Bi-Kombi, tabl. powł., 10+2,5 mg | 30 tabl. (pojem.) | 5909990715206 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 38,88 | 45,24 | 14,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 38,26 |
| 2252 | Perindoprilum + Indapamidum | Tertensif Kombi, tabl. powł., 5+1,25 mg | 30 tabl. (pojem.) | 5909990055678 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 24,30 | 28,10 | 7,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 24,61 |
| 2253 | Perphenazinum | Trilafon, tabl. powł., 2 mg | 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.) | 5909990661206 | 2012-01-01 | 2 lata | 174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyne do podawania doustnego | 16,08 | 19,32 | 6,75 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | bezpłatny | 12,57 |
| 2254 | Perphenazinum | Trilafon, tabl. powł., 4 mg | 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.) | 5909990661237 | 2012-01-01 | 2 lata | 174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyne do podawania doustnego | 17,91 | 22,79 | 13,50 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | bezpłatny | 9,29 |
| 2255 | Perphenazinum | Trilafon, tabl. powł., 8 mg | 100 tabl. (5 blist.po 20 szt.) | 5909990661244 | 2012-01-01 | 2 lata | 174.1, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyne do podawania doustnego | 19,92 | 27,00 | 27,00 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2256 | Perphenazinum | Trilafon Enanthate, roztwór do wstrzykiwa, 100 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990122516 | 2012-01-01 | 2 lata | 174.2, Leki przeciwpsychotyczne - perfenazyne do podawania pozajelitowego | 104,64 | 126,06 | 126,06 | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2257 | Phenobarbitalum | Luminalum, czopki, 15 mg | 10 czop. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990148813 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 155.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doodbytniczego | 2,15 | 3,22 | 3,22 | Padaczka | Padaczka u dzieci do 30 miesięcy | ryczałt | 3,20 |
| 2258 | Phenobarbitalum | Luminalum, tabl. , 100 mg | 10 tabl. | 5909990260614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego | 4,40 | 6,58 | 6,56 | Padaczka | Padaczka u dzieci | ryczałt | 3,22 |
| 2259 | Phenobarbitalum | Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg | 10 tabl. | 5909990812615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 155.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postacie do podawania doustnego | 4,38 | 6,56 | 6,56 | Padaczka | Padaczka u dzieci | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|-----------|------|
| 2260 | Phenoxymethylpenicillinum | Ospen 1000, tabl. powł., 1000000 U | 12 tabl. | 5909990070916 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne | 4,54 | 6,56 | 5,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | ryczałt | 3,91 |
| 2261 | Phenoxymethylpenicillinum | Ospen 1500, tabl. powł., 1500000 j.m. | 12 tabl. | 5909990071012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 88.3, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postacie farmaceutyczne | 5,94 | 8,77 | 8,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | ryczałt | 3,20 |
| 2262 | Phenoxymethylpenicillinum | Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml | 60 ml (but.) | 5909990363216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 88.4, Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postacie farmaceutyczne | 7,02 | 10,26 | 10,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | ryczałt | 3,20 |
| 2263 | Phenytoinum | Phenytoinum WZF, tabl., 100 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | 5909990093519 | 2012-01-01 | 2 lata | 156.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenytoina | 10,80 | 15,37 | 15,37 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 2264 | Phytomenadionum (vit. K1) | Vitacon, tabl. dra owane, 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990772810 | 2012-01-01 | 2 lata | 25.0, Witamina K i inne leki hemostatyczne - fytomenadion | 13,37 | 18,67 | 18,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 2265 | Pilocarpinum | Pilocarpinum WZF 2%, krople do oczu, roztwór, 20 mg/ml | 10 ml (2x5 ml) | 5909990237524 | 2012-01-01 | 2 lata | 211.0, Leki przeciwiąskrowe - parasympatykomimetyki - pilokarpina | 6,06 | 8,92 | 8,92 | Jaskra | | 30% | 2,68 |
| 2266 | Piribedilum | Pronoran, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 50 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990846320 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 24,84 | 33,07 | 33,07 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 9,92 |
| 2267 | Prednisolonum | Encortolon, tabl., 5 mg | 20 tabl. | 5909990170715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.4, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon | 3,93 | 5,90 | 5,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2268 | Prednisonum | Encorton, tabl., 1 mg | 20 tabl. | 5909990170616 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 3,24 | 3,68 | 0,71 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,97 |
| 2269 | Prednisonum | Encorton, tabl., 1 mg | 20 tabl. | 5909990170616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 3,24 | 3,68 | 0,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,68 |
| 2270 | Prednisonum | Encorton, tabl., 5 mg | 20 tabl. | 5909990297016 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.5, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 4,15 | 5,49 | 3,54 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----------|------|
| 2271 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 5 mg | 20 tabl. | 5909990297016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 4,15 | 5,49 | 3,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 5,15 |
| 2272 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 5 mg | 100 tabl. | 5909990297023 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 13,50 | 18,59 | 17,71 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,88 |
| 2273 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 5 mg | 100 tabl. | 5909990297023 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 13,50 | 18,59 | 17,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,21 |
| 2274 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 10 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990405329 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 7,33 | 9,93 | 7,09 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,84 |
| 2275 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 10 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990405329 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 7,33 | 9,93 | 7,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,04 |
| 2276 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 20 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990405428 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 9,87 | 14,17 | 14,17 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2277 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 20 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990405428 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 9,87 | 14,17 | 14,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,27 |
| 2278 | Primidonum | Mizodin, tabl. , 250 mg | 60 tabl. | 5909990274413 | 2012-01-01 | 2 lata | 155.3. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - primidon | 15,88 | 21,89 | 21,89 | Padaczka | | ryczałt | 3,20 |
| 2279 | Progesteronum | Luteina, tabl. dopochwowe, 50 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990569380 | 2012-01-01 | 2 lata | 65.1. Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo | 21,60 | 29,08 | 29,08 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 2280 | Progesteronum | Luteina 50, tabl. podj zykowe, 50 mg | 30 tabl. | 5909990267422 | 2012-01-01 | 2 lata | 65.1. Hormony płciowe - progestageny - progesteron stosowane doustnie i dopochwowo | 11,58 | 14,97 | 8,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,45 |
| 2281 | Propafenonum | Polfenon, tabl. powl., 150 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990034123 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 30.0. Leki przeciwyrytmiczne klasy IC - propafenon | 5,29 | 7,70 | 6,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburze rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadcni nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|---|---|-----------|-------|
| 2282 | Propafenonum | Polfenon, tabl. powł., 300 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990034215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon | 9,61 | 13,84 | 13,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie doraźne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburze rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadciśnienia tętniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2283 | Propranololum | Propranolol WZF, tabl., 10 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990112111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 2,17 | 2,65 | 1,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolności serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 2,65 |
| 2284 | Propranololum | Propranolol WZF, tabl., 40 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990112210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 3,03 | 4,54 | 4,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadciśnienia tętniczego, kardiomiopatii przerostowej z zawężeniem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolności serca oraz leczenie naczynek wczesnoniemowlęcych - u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2285 | Pyrantelum | Pyrantelum Medana, Pyrantelum, zawiesina doustna, 250 mg/5ml | 15 ml | 5909990276417 | 2012-01-01 | 2 lata | 194.3, Leki przeciwbaczące - pyrantel - płynne postaci farmaceutyczne | 3,18 | 4,76 | 4,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 2286 | Pyrantelum | Pyrantelum Polpharma, Pyrantelum, tabl., 250 mg | 3 tabl. (blist.) | 5909990206414 | 2012-01-01 | 2 lata | 194.2, Leki przeciwbaczące - pyrantel - stałe postaci farmaceutyczne | 2,67 | 4,01 | 4,01 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 2287 | Pyrazinamidum | Pyrazinamid Farmapol, tabl., 500 mg | 250 tabl. | 5909990263516 | 2012-01-01 | 2 lata | 113.0, Leki przeciwprężenne - pyrazinamid | 62,10 | 77,60 | 77,60 | Grupa I, tym również grupa II wielolekooporna i inne mykobakteriozy | | bezpłatny | 0,00 |
| 2288 | Pyridostigmini bromidum | Mestinon, tabl. drażetki, 60 mg | 150 tabl. | 5909991014421 | 2012-01-01 | 2 lata | 188.0, Leki parasympatykominetyczne - bromek pirydostygminy | 108,54 | 130,45 | 130,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 39,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 2289 | Pyridostigmini bromidum | Mestinon, tabl. dra owane, 60 mg | 150 tabl. | 5909991014421 | 2012-01-01 | 2 lata | 188.0, Leki parasympatykomimetyczne - bromek pirydostygminy | 108,54 | 130,45 | 130,45 | Miastenia | | ryczałt | 5,33 |
| 2290 | Quetiapinum | Bonogren, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990719389 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 8,53 | 11,62 | 7,87 | Schizofrenia | | ryczałt | 6,95 |
| 2291 | Quetiapinum | Bonogren, tabl. powl., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990719853 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 48,92 | 62,15 | 62,15 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2292 | Quetiapinum | Bonogren, tabl. powl., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990720163 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 101,52 | 122,44 | 122,44 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2293 | Quetiapinum | Bonogren, tabl. powl., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990720309 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 152,28 | 179,41 | 179,41 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2294 | Quetiapinum | Etiagen, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. | 5909990806355 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,91 | 9,88 | 7,87 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,21 |
| 2295 | Quetiapinum | Etiagen, tabl. powl., 100 mg | 60 tabl. | 5909990806362 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,24 | 66,79 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,02 |
| 2296 | Quetiapinum | Etiagen, tabl. powl., 200 mg | 60 tabl. | 5909990806386 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 106,49 | 127,76 | 125,94 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,02 |
| 2297 | Quetiapinum | Gentiapin, tabl. powl., 25 miligram | 30 tabl. | 5909990713646 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,29 | 12,43 | 7,87 | Schizofrenia | | ryczałt | 7,76 |
| 2298 | Quetiapinum | Gentiapin, tabl. powl., 100 miligram | 60 tabl. | 5909990713653 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 51,03 | 64,42 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,65 |
| 2299 | Quetiapinum | Gentiapin, tabl. powl., 300 miligram | 60 tabl. | 5909990713929 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 194,40 | 224,48 | 188,91 | Schizofrenia | | ryczałt | 40,37 |
| 2300 | Quetiapinum | Gentiapin, tabl. powl., 200 miligram | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990730636 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 102,06 | 123,01 | 123,01 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2301 | Quetiapinum | Kefrenex, tabl. powl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990722198 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,67 | 9,63 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,96 |
| 2302 | Quetiapinum | Kefrenex, tabl. powl., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990722327 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 145,80 | 172,48 | 172,48 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2303 | Quetiapinum | Kefrenex, tabl. powl., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990722365 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 48,60 | 61,82 | 61,82 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2304 | Quetiapinum | Kefrenex, tabl. powl., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990722426 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 97,20 | 117,82 | 117,82 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 2305 | Quetiapinum | Ketilept, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990055531 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,72 | 12,89 | 7,87 | Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia | | ryczałt | 8,22 |
| 2306 | Quetiapinum | Ketilept, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990055562 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 46,55 | 59,63 | 59,63 | Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2307 | Quetiapinum | Ketilept, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990055593 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 98,82 | 119,56 | 119,56 | Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2308 | Quetiapinum | Ketilept, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990055630 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 152,28 | 179,41 | 179,41 | Choroba afektywna dwubiegunowa; Schizofrenia | | ryczałt | 4,80 |
| 2309 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990058754 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,22 | 63,56 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,79 |
| 2310 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 200 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990058761 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 167,40 | 196,05 | 196,05 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,33 |
| 2311 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990058778 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 25,11 | 33,36 | 31,49 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,07 |
| 2312 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 100 mg | 10 blist. po 10szt. | 5909990058785 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 83,70 | 102,49 | 102,49 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2313 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 25 mg | 10 blist. po 10szt. | 5909990058808 | 2012-01-01/2012-07-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 21,11 | 28,42 | 26,24 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,38 |
| 2314 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990081196 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 106,60 | 127,87 | 125,94 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,13 |
| 2315 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990081233 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,30 | 66,85 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,08 |
| 2316 | Quetiapinum | Ketipinor, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990779062 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 150,66 | 177,69 | 177,69 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2317 | Quetiapinum | Ketrel, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (pojem.) | 5909990430840 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 8,64 | 11,74 | 7,87 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 7,07 |
| 2318 | Quetiapinum | Ketrel, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (pojem.) | 5909990430857 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,76 | 64,13 | 62,97 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 4,36 |
| 2319 | Quetiapinum | Ketrel, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (pojem.) | 5909990430888 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 102,60 | 123,60 | 123,60 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2320 | Quetiapinum | Kventiax 100, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990074143 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 52,92 | 66,44 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|---------|-------|
| 2321 | Quetiapinum | Kventiax 200, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990074235 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 105,84 | 127,06 | 125,94 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,32 |
| 2322 | Quetiapinum | Kventiax 25, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990074068 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,64 | 9,59 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,92 |
| 2323 | Quetiapinum | Kventiax 300, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. | 5909990074280 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 158,76 | 186,35 | 186,35 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2324 | Quetiapinum | Kwetaplex, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990688234 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,28 | 66,83 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,06 |
| 2325 | Quetiapinum | Kwetaplex, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990688241 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,65 | 9,61 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,94 |
| 2326 | Quetiapinum | Kwetaplex, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990688265 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 159,84 | 187,50 | 187,50 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2327 | Quetiapinum | Kwetaplex, tabl. powł., 150 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990688272 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 79,92 | 97,99 | 94,46 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,73 |
| 2328 | Quetiapinum | Kwetaplex, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990688296 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 106,55 | 127,82 | 125,94 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,08 |
| 2329 | Quetiapinum | Kwetax, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990692804 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,62 | 8,50 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,83 |
| 2330 | Quetiapinum | Kwetax, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990692873 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 48,96 | 62,21 | 62,21 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2331 | Quetiapinum | Kwetax, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990692996 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 101,52 | 122,44 | 122,44 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2332 | Quetiapinum | Kwetax, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990693061 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 152,28 | 179,41 | 179,41 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2333 | Quetiapinum | Nantarid, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634873 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,15 | 13,36 | 7,87 | Schizofrenia | | ryczałt | 8,69 |
| 2334 | Quetiapinum | Nantarid, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990634903 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 64,80 | 79,15 | 62,97 | Schizofrenia | | ryczałt | 19,38 |
| 2335 | Quetiapinum | Nantarid, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990634941 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 147,96 | 172,13 | 125,94 | Schizofrenia | | ryczałt | 49,39 |
| 2336 | Quetiapinum | Nantarid, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990634965 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 201,96 | 232,57 | 188,91 | Schizofrenia | | ryczałt | 48,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|-----------------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 2337 | Quetiapinum | Pinexet 100 mg, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990788590 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,28 | 66,83 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,06 |
| 2338 | Quetiapinum | Pinexet 200 mg, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990788651 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 106,56 | 127,83 | 125,94 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,09 |
| 2339 | Quetiapinum | Pinexet 25 mg, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990788583 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,64 | 8,52 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,85 |
| 2340 | Quetiapinum | Pinexet 300 mg, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. | 5909990788675 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 159,84 | 187,50 | 187,50 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2341 | Quetiapinum | Poetra, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990742547 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,53 | 8,41 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,74 |
| 2342 | Quetiapinum | Poetra, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990742752 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 51,30 | 64,70 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,93 |
| 2343 | Quetiapinum | Poetra, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (10 blist.po 6 szt.) | 5909990743063 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 103,74 | 124,82 | 124,82 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2344 | Quetiapinum | Quentapil , tabl. powł., 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990717606 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 39,96 | 51,24 | 47,23 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 7,21 |
| 2345 | Quetiapinum | Quentapil , tabl. powł., 150 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990717651 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 78,30 | 96,25 | 94,46 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,99 |
| 2346 | Quetiapinum | Quentapil , tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990717705 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,66 | 9,62 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,95 |
| 2347 | Quetiapinum | Quentapil , tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990717903 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 100,44 | 121,29 | 121,29 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2348 | Quetiapinum | Quentapil, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990718009 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 49,68 | 62,97 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2349 | Quetiapinum | Quentapil , tabl. powł., 100 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990718047 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 79,92 | 97,99 | 94,46 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,73 |
| 2350 | Quetiapinum | Quentapil , tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990718108 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 150,12 | 177,10 | 177,10 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2351 | Quetiapinum | Quetiser, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990763238 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,94 | 8,85 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,18 |
| 2352 | Quetiapinum | Quetiser, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990763269 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kwiapiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,76 | 64,13 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 2353 | Quetiapinum | Quetiser, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990763306 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 101,52 | 122,44 | 122,44 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2354 | Quetiapinum | Quetiser, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. | 5909990763337 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 158,76 | 186,35 | 186,35 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2355 | Quetiapinum | Setinin, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990736393 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 49,68 | 62,97 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2356 | Quetiapinum | Setinin, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990736461 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 101,95 | 122,91 | 122,91 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2357 | Quetiapinum | Setinin, tabl. powł., 300 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990736492 | 2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 149,04 | 175,95 | 175,95 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,80 |
| 2358 | Quetiapinum | Stadaquel, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990727056 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,97 | 9,96 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 5,29 |
| 2359 | Quetiapinum | Stadaquel, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990727094 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 51,03 | 64,42 | 62,97 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,65 |
| 2360 | Quetiapinum | Stadaquel, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990727261 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 102,06 | 123,01 | 123,01 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2361 | Quetiapinum | Symquel, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990635368 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 48,60 | 61,82 | 61,82 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2362 | Quetiapinum | Symquel, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990635382 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,56 | 8,44 | 7,87 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,77 |
| 2363 | Quetiapinum | Symquel, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990635429 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 97,20 | 117,82 | 117,82 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,20 |
| 2364 | Quetiapinum | Vorta, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (5 blist.po 6 szt.) | 5909990778072 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,63 | 8,51 | 7,87 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 3,84 |
| 2365 | Quetiapinum | Vorta, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990778096 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 52,92 | 66,44 | 62,97 | Schizofrenia, Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 6,67 |
| 2366 | Quetiapinum | Vorta, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990778157 | 2012-01-01/2012-05-01 | 2 lata | 178.3, Leki przeciwpsychotyczne - kветiapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 105,84 | 127,06 | 125,94 | Schizofrenia; Choroba afektywna dwubiegunowa | | ryczałt | 4,32 |
| 2367 | Quinaprilum | Accupro 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990707010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zlo one | 18,36 | 20,79 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t nnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 20,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 2368 | Quinaprilum | Accupro 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990707119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 22,68 | 26,48 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 22,76 |
| 2369 | Quinaprilum | Accupro 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909991080129 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 35,64 | 41,76 | 14,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 34,81 |
| 2370 | Quinaprilum | Accupro 5, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. | 5909990706914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,80 | 16,41 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 16,41 |
| 2371 | Quinaprilum | Acurenal, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991125417 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,34 | 12,70 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,70 |
| 2372 | Quinaprilum | Acurenal, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991125516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,58 | 16,74 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,95 |
| 2373 | Quinaprilum | Acurenal, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991125615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 19,43 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,71 |
| 2374 | Quinaprilum | Aprilgen 10mg, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014439 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 13,85 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 13,06 |
| 2375 | Quinaprilum | Aprilgen 20mg, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990014460 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 19,54 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,82 |
| 2376 | Quinaprilum | Aprilgen 40mg, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014507 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 33,83 | 15,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 26,39 |
| 2377 | Quinaprilum | Aprilgen 5mg, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990014354 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,72 | 10,97 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 10,97 |
| 2378 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215737 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,72 | 10,97 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 10,97 |
| 2379 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215805 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 13,85 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 13,06 |
| 2380 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215898 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 19,43 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 2381 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215980 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 33,83 | 15,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 26,39 |
| 2382 | Ramiprilum | Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg | 30 tabl. | 5909990571468 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,66 | 21,68 | 21,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 2383 | Ramiprilum | Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg | 60 tabl. | 5909990571475 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 24,84 | 34,21 | 34,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 25,60 |
| 2384 | Ramiprilum | Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg | 30 tabl. | 5909990571499 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,64 | 12,31 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,73 |
| 2385 | Ramiprilum | Ampril 5 mg tabletki, tabl., 5 mg | 60 tabl. | 5909990571505 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,77 | 19,65 | 19,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 2386 | Ramiprilum | Apo-Rami, tabl., 2,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990653355 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,60 | 5,44 | 5,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2387 | Ramiprilum | Apo-Rami, tabl., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990653362 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,60 | 11,03 | 11,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,97 |
| 2388 | Ramiprilum | Apo-Rami, tabl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990653379 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,03 | 20,78 | 20,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 2389 | Ramiprilum | Axtil, tabl., 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337958 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,36 | 6,38 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,59 |
| 2390 | Ramiprilum | Axtil, tabl., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337972 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,69 | 12,36 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,78 |
| 2391 | Ramiprilum | Axtil, tabl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337989 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,28 | 23,41 | 23,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 2392 | Ramiprilum | Mitrip, tabl., 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990770397 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 16,25 | 16,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,95 |
| 2393 | Ramiprilum | Mitrip, tabl., 2,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909991110611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,89 | 5,87 | 5,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 2394 | Ramiprilum | Mitrip, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909991110710 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,78 | 11,38 | 11,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 2395 | Ramiprilum | Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990661756 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,36 | 20,06 | 20,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 2396 | Ramiprilum | Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990212170 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 6,48 | 8,64 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,85 |
| 2397 | Ramiprilum | Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990212248 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,61 | 13,35 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 7,77 |
| 2398 | Ramiprilum | Polpril, kaps. twarde, 5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990694631 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,88 | 11,33 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,12 |
| 2399 | Ramiprilum | Polpril, kaps. twarde, 10 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990694655 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 21,91 | 21,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 2400 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 10 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990052653 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 20,98 | 27,37 | 23,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 16,21 |
| 2401 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990644551 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 6,49 | 8,66 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,87 |
| 2402 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990644575 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,88 | 16,85 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,27 |
| 2403 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990763542 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 5,35 | 8,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 5,97 |
| 2404 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 10 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990763559 | 2012-05-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,69 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,95 |
| 2405 | Ramiprilum | Ramipril Pfizer, tabl., 5 mg | 28 tabl. | 5909990796601 | 2012-07-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,34 | 10,75 | 10,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 5,97 |
| 2406 | Ramiprilum | Ramipril Pfizer, tabl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990796649 | 2012-07-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,70 | 20,42 | 20,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 2407 | Ramiprilum | Ramistad 10, tabl. , 10 mg | 28 tabl. | 5909990017461 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 16,25 | 16,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 2408 | Ramiprilum | Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg | 28 tabl. | 5909990017447 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,24 | 5,06 | 5,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2409 | Ramiprilum | Ramistad 5, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990017454 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 6,48 | 9,83 | 9,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,97 |
| 2410 | Ramiprilum | Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047987 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,34 | 21,10 | 21,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 2411 | Ramiprilum | Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047949 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,46 | 5,30 | 5,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2412 | Ramiprilum | Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047963 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,78 | 11,21 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,00 |
| 2413 | Ramiprilum | Tritace 10, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990916016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 19,76 | 25,83 | 22,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,42 |
| 2414 | Ramiprilum | Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990478217 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,85 | 15,34 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,95 |
| 2415 | Ramiprilum | Tritace 5, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990478316 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,52 | 20,57 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,36 |
| 2416 | Ramiprilum | Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990610532 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 22,14 | 22,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 2417 | Ramiprilum | Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990610440 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,00 | 5,99 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2418 | Ramiprilum | Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990610495 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,88 | 11,50 | 11,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 2419 | Ramiprilum + Felodipinum | Delmuno 2,5, tabl. powł., 2,5+2,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990973118 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,59 | 16,13 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 13,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--|---|-----------|-------|
| 2420 | Ramiprilum + Felodipinum | Delmuno 5, tabl. powł., 5+5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990973217 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,44 | 21,56 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 16,35 |
| 2421 | Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum | Ampril HD, tabl. , 5+25 mg | 30 tabl. | 5909990573233 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,96 | 16,93 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,35 |
| 2422 | Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum | Ampril HL, tabl. , 2,5+12,5 mg | 30 tabl. | 5909990573226 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 13,27 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 10,48 |
| 2423 | Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum | Tritace 2,5 Comb, tabl. , 2,5+12,5 mg + mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990885312 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,85 | 15,34 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 12,95 |
| 2424 | Ramiprilum + Hydrochlorothiazidum | Tritace 5 Comb, tabl. , 5+25 mg+mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990885411 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,52 | 20,57 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 15,36 |
| 2425 | Ranitidinum | Ranigast, tabl. powł., 150 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990206728 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H2 - stosowane doustnie | 8,18 | 11,87 | 11,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapalenie błony łożowej dziecka u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 2426 | Rifampicinum | Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990084913 | 2012-01-01 | 2 lata | 111.1, Leki przeciwpródkowe - antybiotyki - ryfampicyna | 47,06 | 59,88 | 59,88 | Grupe leków, tym również grupe leków wielolekoopornych i inne mykobakteriozy | | bezpłatny | 0,00 |
| 2427 | Rifampicinum | Rifampicyna TZF, kaps. twarde, 150 mg | 100 kaps. | 5909990085019 | 2012-01-01 | 2 lata | 111.1, Leki przeciwpródkowe - antybiotyki - ryfampicyna | 23,86 | 31,81 | 29,94 | Grupe leków, tym również grupe leków wielolekoopornych i inne mykobakteriozy | | bezpłatny | 1,87 |
| 2428 | Rifampicinum + Isoniazidum | Rifamazid, kaps. twarde, 0,15+0,1 g | 100 kaps. | 5909990086115 | 2012-01-01 | 2 lata | 111.2, Leki przeciwpródkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną | 22,14 | 29,62 | 27,40 | Grupe leków, tym również grupe leków wielolekoopornych i inne mykobakteriozy | | bezpłatny | 2,22 |
| 2429 | Rifampicinum + Isoniazidum | Rifamazid, kaps. twarde, 0,3+0,15 g | 100 kaps. | 5909990086214 | 2012-01-01 | 2 lata | 111.2, Leki przeciwpródkowe - produkty złożone - izoniazyd z ryfampicyną | 42,74 | 54,80 | 54,80 | Grupe leków, tym również grupe leków wielolekoopornych i inne mykobakteriozy | | bezpłatny | 0,00 |
| 2430 | Riluzolum | Rilutek, tabl. powł., 50 mg | 56 tabl. | 5909990760619 | 2012-01-01 | 2 lata | 191.0, Leki stosowane w leczeniu stwardnienia zanikowego-bocznego - riluzol | 878,28 | 975,76 | 975,76 | Stwardnienie zanikowe boczne | | ryczałt | 3,20 |
| 2431 | Risedronatum natrium | Risendros 35, tabl. powł., 35 mg | 4 tabl. | 5909990082599 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 14,68 | 19,40 | 13,39 | Osteoporoza | Profilaktyka osteoporozy posterydowej | 30% | 10,03 |
| 2432 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990637515 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,71 | 11,14 | 10,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,49 |
| 2433 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 1 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990637522 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 21,48 | 29,06 | 29,06 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2434 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990637577 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 13,86 | 19,51 | 19,51 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2435 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 2 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990637584 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 42,12 | 54,34 | 54,34 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2436 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990637690 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 28,19 | 37,44 | 37,44 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2437 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 4 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990637706 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 84,24 | 103,41 | 103,41 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--------------|----|---------|------|
| 2438 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990637713 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 23,13 | 30,84 | 30,84 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2439 | Risperidonum | Apo-Risperid, tabl. powł., 3 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990637720 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 69,34 | 85,85 | 85,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,84 |
| 2440 | Risperidonum | Apo-Risperid, roztwór doustny , 1 mg/ml | 100 ml (but.) | 5909990637850 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 38,50 | 49,67 | 49,67 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2441 | Risperidonum | Disaperid, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. | 5909990023660 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 27,76 | 35,78 | 32,55 | Schizofrenia | | ryczałt | 6,43 |
| 2442 | Risperidonum | Disaperid, tabl. powł., 1 miligram | 20 tabl. | 5909990023677 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,40 | 10,80 | 10,80 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2443 | Risperidonum | Disaperid, tabl. powł., 4 miligram | 20 tabl. | 5909990023684 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 38,02 | 47,96 | 43,40 | Schizofrenia | | ryczałt | 7,76 |
| 2444 | Risperidonum | Disaperid, tabl. powł., 2 miligram | 20 tabl. | 5909990023691 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 16,20 | 22,02 | 21,70 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,52 |
| 2445 | Risperidonum | Orizon, roztwór doustny , 1 mg/ml | 100 ml (but.) | 5909990690138 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 32,40 | 43,14 | 43,14 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2446 | Risperidonum | Orizon, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. | 5909990831258 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 6,48 | 9,82 | 9,82 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2447 | Risperidonum | Orizon, tabl. powł., 1 mg | 60 tabl. | 5909990831265 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 16,20 | 23,42 | 23,42 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2448 | Risperidonum | Orizon, tabl. powł., 2 mg | 60 tabl. | 5909990831272 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 32,40 | 43,94 | 43,94 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2449 | Risperidonum | Orizon, tabl. powł., 3 mg | 60 tabl. | 5909990831289 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 48,60 | 63,67 | 63,67 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,84 |
| 2450 | Risperidonum | Orizon, tabl. powł., 4 mg | 60 tabl. | 5909990831296 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 64,80 | 82,61 | 82,61 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,12 |
| 2451 | Risperidonum | Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg | 30 tabl. | 5909990075157 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 10,80 | 15,44 | 15,44 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2452 | Risperidonum | Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg | 30 tabl. | 5909990075164 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 21,60 | 29,19 | 29,19 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2453 | Risperidonum | Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg | 30 tabl. | 5909990075171 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 32,40 | 42,54 | 42,54 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2454 | Risperidonum | Ranperidon, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4 mg | 30 tabl. | 5909990075188 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 43,20 | 55,50 | 55,50 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2455 | Risperidonum | Risperidon Vipham, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990044146 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 31,32 | 40,79 | 40,79 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2456 | Risperidonum | Risperidon Vipham , tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990044252 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 23,04 | 30,73 | 30,73 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2457 | Risperidonum | Risperidon Vipham, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990044344 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 14,85 | 20,57 | 20,57 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|---|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 2458 | Risperidonum | Risperidon Vipham, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990044481 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,13 | 10,51 | 10,51 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2459 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990336487 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 15,66 | 21,45 | 21,45 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2460 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 2 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990336500 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 46,98 | 59,55 | 59,55 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2461 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990336524 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,44 | 10,85 | 10,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2462 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 1 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990336548 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 22,32 | 29,96 | 29,96 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2463 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990336555 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 24,30 | 32,08 | 32,08 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2464 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 3 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990336579 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 80,30 | 97,59 | 97,59 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,84 |
| 2465 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990336586 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 33,05 | 42,63 | 42,63 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2466 | Risperidonum | Risperon, tabl. powł., 4 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990336609 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 108,22 | 129,07 | 129,07 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,12 |
| 2467 | Risperidonum | Rispolept, roztwór doustny , 1 mg/ml | 30 ml | 5909990423811 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 12,31 | 17,05 | 16,28 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,97 |
| 2468 | Risperidonum | Rispolept, roztwór doustny , 1 mg/ml | 100 ml | 5909990423828 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 41,04 | 52,38 | 52,38 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2469 | Risperidonum | Rispolept, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990670413 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 8,26 | 11,73 | 10,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 4,08 |
| 2470 | Risperidonum | Rispolept, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990670512 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 16,52 | 22,36 | 21,70 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,86 |
| 2471 | Risperidonum | Rispolept, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990670611 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 24,73 | 32,54 | 32,54 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2472 | Risperidonum | Rispolept, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990670710 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 32,94 | 42,53 | 42,53 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2473 | Risperidonum | Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłu onym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol. + 1 strzykawka + 1 urz dzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykni cia domi niowego (1-calowa do wstrzykni cia do mi nia naramiennego, 2-calowa do wstrzykni cia do mi nia po ladowego) | 5909991058029 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.6, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 577,80 | 646,20 | 646,20 | Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|--|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|---------|------|
| 2474 | Risperidonum | Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłu onym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporz dzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 37,5 mg | 1 fiol. + 1 strzykawka + 1 urz dzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwa ciadomi niowego (1-calowa do wstrzykiwa ciadomi nianaramiennego, 2-calowa do wstrzykiwa ciadomi nia po ladowego) | 5909991058128 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.6. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 433,35 | 487,77 | 487,77 | Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | | ryczałt | 3,20 |
| 2475 | Risperidonum | Rispolept Consta, mikrokaps. o przedłu onym uwalnianiu i rozpuszczalnik do sporz dzenia zawiesiny do wstrzykiwa , 25 mg | 1 fiol. + 1 strzykawka + 1 urz dzenie do przygotowania zawiesiny + 2 igły do wstrzykiwa ciadomi niowych (1-calowa do wstrzykiwa ciadomi nianaramiennego, 2-calowa do wstrzykiwa ciadomi nia po ladowego) | 5909991058227 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.6. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania pozajelitowego - postaci o przedłu onym uwalnianiu | 288,90 | 329,35 | 325,18 | Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego | | ryczałt | 7,37 |
| 2476 | Risperidonum | Rispolux, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990334438 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 15,01 | 20,74 | 20,74 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2477 | Risperidonum | Rispolux, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990334568 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 22,68 | 30,35 | 30,35 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2478 | Risperidonum | Rispolux, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990334599 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 27,00 | 36,17 | 36,17 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2479 | Risperidonum | Rispolux, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990335121 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 6,91 | 10,28 | 10,28 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2480 | Risperidonum | Risset 1, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990996414 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,07 | 10,45 | 10,45 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2481 | Risperidonum | Risset 1, tabl. powł., 1 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990996421 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 22,27 | 29,91 | 29,91 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2482 | Risperidonum | Risset 2, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990996513 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 15,43 | 21,20 | 21,20 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2483 | Risperidonum | Risset 2, tabl. powł., 2 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990996520 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 47,71 | 60,33 | 60,33 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2484 | Risperidonum | Risset 3, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990996612 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 24,08 | 31,85 | 31,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2485 | Risperidonum | Risset 3, tabl. powł., 3 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990996629 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 78,51 | 95,68 | 95,68 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,84 |
| 2486 | Risperidonum | Risset 4, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990996711 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 32,89 | 42,46 | 42,46 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2487 | Risperidonum | Risset 4 , tabl. powł., 4 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990996728 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 106,98 | 127,74 | 127,74 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,12 |
| 2488 | Risperidonum | Ryspolit, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990567683 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,18 | 10,57 | 10,57 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2489 | Risperidonum | Ryspolit, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990567737 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5. Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 15,43 | 21,20 | 21,20 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|-------|---|----|---------|--------|
| 2490 | Risperidonum | Ryspolit, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990567935 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 24,08 | 31,85 | 31,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2491 | Risperidonum | Ryspolit, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990568031 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 32,89 | 42,46 | 42,46 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2492 | Risperidonum | Ryspolit, roztwór doustny , 1 mg/ ml | 30 ml (but.) | 5909990721399 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 10,69 | 15,33 | 15,33 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2493 | Risperidonum | Ryspolit, roztwór doustny , 1 mg/ ml | 100 ml (but.) | 5909990721405 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 36,86 | 47,91 | 47,91 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2494 | Risperidonum | Speridan, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990567836 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 6,80 | 10,17 | 10,17 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2495 | Risperidonum | Speridan, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990567881 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 14,04 | 19,71 | 19,71 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2496 | Risperidonum | Speridan, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990567980 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 20,52 | 28,04 | 28,04 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2497 | Risperidonum | Speridan, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990568147 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 25,92 | 35,01 | 35,01 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2498 | Risperidonum | Torendo Q-Tab 1, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990034932 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 6,47 | 9,81 | 9,81 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2499 | Risperidonum | Torendo Q-Tab 1 mg, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990680849 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 13,49 | 19,91 | 19,91 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2500 | Risperidonum | Torendo Q-Tab 2, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990034994 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 13,85 | 19,50 | 19,50 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2501 | Risperidonum | Torendo Q-Tab 2 mg, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 2 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990680863 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 26,99 | 37,35 | 37,35 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2502 | Risperidonum | Ziperid, tabl. powł., 1 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990016952 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 7,45 | 10,86 | 10,85 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,21 |
| 2503 | Risperidonum | Ziperid, tabl. powł., 2 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990016983 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 16,20 | 22,02 | 21,70 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,52 |
| 2504 | Risperidonum | Ziperid, tabl. powł., 3 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990017003 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 27,76 | 35,78 | 32,55 | Schizofrenia | | ryczałt | 6,43 |
| 2505 | Risperidonum | Ziperid, tabl. powł., 4 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990017041 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.5, Leki przeciwpsychotyczne - rysperydon do stosowania doustnego | 38,02 | 47,96 | 43,40 | Schizofrenia | | ryczałt | 7,76 |
| 2506 | Rivaroxabanum | Xarelto, tabl. , 10 mg | 10 tabl. (PP/alu.) | 5909990658145 | 2012-01-01 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych | 167,40 | 188,45 | 53,59 | ylne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) - prewencja pierwotna | | ryczałt | 138,06 |
| 2507 | Rivastigminum | Exelon, system transdermalny, 4,6 mg/24h | 30 sasz. | 5909990066704 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 267,65 | 290,70 | 17,10 | Choroba Alzheimer | | 30% | 278,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|-------|-------------------|----|-----|--------|
| 2508 | Rivastigminum | Exelon, system transdermalny, 9,5 mg/24h | 30 sas. | 5909990066766 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 267,65 | 293,24 | 35,33 | Choroba Alzheimer | | 30% | 268,51 |
| 2509 | Rivastigminum | Exelon, roztwór doustny, 2 mg/ml | 120 ml | 5909990454310 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 343,86 | 374,29 | 31,37 | Choroba Alzheimer | | 30% | 352,33 |
| 2510 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 1,5 mg | 28 kaps. (blis.) | 5909990781119 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 114,66 | 124,49 | 5,49 | Choroba Alzheimer | | 30% | 120,65 |
| 2511 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 3 mg | 28 kaps. (blis.) | 5909990781218 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 119,19 | 130,73 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 123,04 |
| 2512 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 3 mg | 56 kaps. (blis.) | 5909990781225 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 239,72 | 261,60 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 246,23 |
| 2513 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 4,5 mg | 28 kaps. (blis.) | 5909990781317 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 119,19 | 131,73 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 120,20 |
| 2514 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 4,5 mg | 56 kaps. (blis.) | 5909990781324 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 239,72 | 263,05 | 32,94 | Choroba Alzheimer | | 30% | 239,99 |
| 2515 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 6 mg | 28 kaps. (blis.) | 5909990781416 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 119,19 | 132,63 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 117,26 |
| 2516 | Rivastigminum | Exelon, kaps., 6 mg | 56 kaps. (blis.) | 5909990781423 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 239,72 | 264,40 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 233,66 |
| 2517 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. | 5909990700646 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 30,81 | 34,77 | 5,49 | Choroba Alzheimer | | 30% | 30,93 |
| 2518 | Rivastigminum | Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 1,5 mg | 28 tabl. (4 blis. po 7 szt.) | 5909990700660 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 30,81 | 34,77 | 5,49 | Choroba Alzheimer | | 30% | 30,93 |
| 2519 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. | 5909990700684 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 39,41 | 45,37 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 37,68 |
| 2520 | Rivastigminum | Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 3 mg | 28 tabl. | 5909990700691 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 35,67 | 41,37 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 33,68 |
| 2521 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990700707 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 80,90 | 91,66 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 76,29 |
| 2522 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990700738 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 44,67 | 52,00 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 40,47 |
| 2523 | Rivastigminum | Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 4,5 mg | 28 tabl. | 5909990700745 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 40,93 | 48,01 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 36,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|----------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|-------|----------------------|----|-----|-------|
| 2524 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990700752 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 92,25 | 105,26 | 32,94 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 82,20 |
| 2525 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990700790 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,32 | 54,66 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,29 |
| 2526 | Rivastigminum | Nimvastid, tabl. ulegaj ce rozpadowi w jamie ustnej, 6 mg | 28 tabl. | 5909990700806 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,32 | 54,66 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,29 |
| 2527 | Rivastigminum | Nimvastid, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990700844 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 103,84 | 119,01 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 88,27 |
| 2528 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. | 5909990782048 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 11,58 | 14,19 | 5,49 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 10,35 |
| 2529 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 1,5 mg | 56 kaps. | 5909990782055 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 23,16 | 27,97 | 10,98 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 20,28 |
| 2530 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. | 5909990782079 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 23,16 | 27,97 | 10,98 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 20,28 |
| 2531 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990782086 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,32 | 54,66 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,29 |
| 2532 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990782147 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 34,74 | 41,38 | 16,47 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 29,85 |
| 2533 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990782154 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 69,48 | 80,89 | 32,94 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 57,83 |
| 2534 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990782178 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,32 | 54,66 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,29 |
| 2535 | Rivastigminum | Ristidic, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990782185 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 92,64 | 107,03 | 43,92 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 76,29 |
| 2536 | Rivastigminum | Rivaldo, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990816255 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,31 | 54,65 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,28 |
| 2537 | Rivastigminum | Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990816262 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 34,73 | 41,36 | 16,47 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 29,83 |
| 2538 | Rivastigminum | Rivaldo, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990816279 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 69,47 | 80,88 | 32,94 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 57,82 |
| 2539 | Rivastigminum | Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990816286 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 46,32 | 54,66 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 39,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|----------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|-------|--------------------|----|-----|-------|
| 2540 | Rivastigminum | Rivaldo, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990816293 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 92,62 | 107,00 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 76,26 |
| 2541 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. | 5909990778898 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 11,56 | 14,17 | 5,49 | Choroba Alzheimera | | 30% | 10,33 |
| 2542 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. | 5909990778935 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 23,13 | 27,95 | 10,98 | Choroba Alzheimera | | 30% | 20,26 |
| 2543 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990778942 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 46,27 | 54,61 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 39,24 |
| 2544 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990778966 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 34,71 | 41,34 | 16,47 | Choroba Alzheimera | | 30% | 29,81 |
| 2545 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990778973 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 69,42 | 80,83 | 32,94 | Choroba Alzheimera | | 30% | 57,77 |
| 2546 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990778997 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 46,27 | 54,61 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 39,24 |
| 2547 | Rivastigminum | Rivastigmin Orion, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990779000 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 92,53 | 106,92 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 76,18 |
| 2548 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. | 5909990768202 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 18,63 | 21,73 | 5,49 | Choroba Alzheimera | | 30% | 17,89 |
| 2549 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. | 5909990768264 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 34,56 | 40,18 | 10,98 | Choroba Alzheimera | | 30% | 32,49 |
| 2550 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990768288 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 56,16 | 65,19 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 49,82 |
| 2551 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990768301 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 42,12 | 49,27 | 16,47 | Choroba Alzheimera | | 30% | 37,74 |
| 2552 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990768332 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 84,24 | 96,69 | 32,94 | Choroba Alzheimera | | 30% | 73,63 |
| 2553 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990768363 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 56,16 | 65,19 | 21,96 | Choroba Alzheimera | | 30% | 49,82 |
| 2554 | Rivastigminum | Rivastigmin STADA, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990768370 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 112,32 | 128,09 | 43,92 | Choroba Alzheimera | | 30% | 97,35 |
| 2555 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. | 5909990886258 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimera | 11,56 | 14,17 | 5,49 | Choroba Alzheimera | | 30% | 10,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------|---------------|------------|--------|---|-------|--------|-------|-------------------|----|-----|-------|
| 2556 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. | 5909990886296 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 23,11 | 27,93 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 20,24 |
| 2557 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990886302 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 46,33 | 54,67 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 39,30 |
| 2558 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990886364 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 34,67 | 41,30 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 29,77 |
| 2559 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990886371 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 69,34 | 80,74 | 32,94 | Choroba Alzheimer | | 30% | 57,68 |
| 2560 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990886401 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 46,22 | 54,57 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 39,20 |
| 2561 | Rivastigminum | Rivastigmine Actavis, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990886425 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 95,80 | 110,42 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 79,68 |
| 2562 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990803156 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 11,51 | 14,12 | 5,49 | Choroba Alzheimer | | 30% | 10,28 |
| 2563 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990803545 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 22,68 | 27,47 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 19,78 |
| 2564 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. (blist.) | 5909990803569 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 45,36 | 53,64 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 38,27 |
| 2565 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990803781 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 34,56 | 41,18 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 29,65 |
| 2566 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. (blist.) | 5909990803804 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 69,12 | 80,51 | 32,94 | Choroba Alzheimer | | 30% | 57,45 |
| 2567 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990804085 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 45,36 | 53,64 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 38,27 |
| 2568 | Rivastigminum | Rivastigmine Mylan, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. (blist.) | 5909990804108 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 91,80 | 106,13 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 75,39 |
| 2569 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva, roztwór doustny, 2 mg/ml | 120 ml (but.) | 5909990764143 | 2012-01-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 79,53 | 91,46 | 31,37 | Choroba Alzheimer | | 30% | 69,50 |
| 2570 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. | 5909990866250 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 18,63 | 21,73 | 5,49 | Choroba Alzheimer | | 30% | 17,89 |
| 2571 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. | 5909990866304 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 32,23 | 37,69 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 30,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|-------|-------------------|----|-----|--------|
| 2572 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990866366 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 65,67 | 75,37 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 60,00 |
| 2573 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. | 5909990866397 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 36,44 | 43,19 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 31,66 |
| 2574 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990866427 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 71,51 | 83,07 | 32,94 | Choroba Alzheimer | | 30% | 60,01 |
| 2575 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. | 5909990866458 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 43,74 | 51,90 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 36,53 |
| 2576 | Rivastigminum | Rivastigmine Teva Pharma, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990866472 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 86,51 | 100,47 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 69,73 |
| 2577 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 kaps. twardych | 5909990795307 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 11,57 | 14,18 | 5,49 | Choroba Alzheimer | | 30% | 10,34 |
| 2578 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg | 28 kaps. twardych | 5909990795376 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 23,13 | 27,95 | 10,98 | Choroba Alzheimer | | 30% | 20,26 |
| 2579 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 3 mg | 56 kaps. | 5909990795383 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 46,27 | 54,61 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 39,24 |
| 2580 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. twardych | 5909990795567 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 34,70 | 41,33 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 29,80 |
| 2581 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. | 5909990795574 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 69,40 | 80,81 | 32,94 | Choroba Alzheimer | | 30% | 57,75 |
| 2582 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. twardych | 5909990795598 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 46,27 | 54,61 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 39,24 |
| 2583 | Rivastigminum | Rivaxon, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. | 5909990795604 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 92,53 | 106,92 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 76,18 |
| 2584 | Rivastigminum | Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860883 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 55,89 | 64,00 | 16,47 | Choroba Alzheimer | | 30% | 52,47 |
| 2585 | Rivastigminum | Signelon, kaps. twarde, 4,5 mg | 56 kaps. (4 blist.po 14 szt.) | 5909990860890 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 108,00 | 122,11 | 32,94 | Choroba Alzheimer | | 30% | 99,05 |
| 2586 | Rivastigminum | Signelon, kaps. twarde, 6 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860937 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 74,52 | 84,84 | 21,96 | Choroba Alzheimer | | 30% | 69,47 |
| 2587 | Rivastigminum | Signelon, kaps. twarde, 6 mg | 56 kaps. (4 blist.po 14 szt.) | 5909990860944 | 2012-03-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimer | 144,72 | 162,75 | 43,92 | Choroba Alzheimer | | 30% | 132,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|--------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|----|-----|-------|
| 2588 | Rivastigminum | Symelon, kaps. twarde, 1,5 mg | 28 tabl. | 5909990808199 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 14,23 | 17,03 | 5,49 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 13,19 |
| 2589 | Rivastigminum | Symelon, kaps. twarde, 3 mg | 28 tabl. | 5909990808397 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 14,23 | 18,43 | 10,98 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 10,74 |
| 2590 | Rivastigminum | Symelon, kaps. twarde, 4,5 mg | 28 tabl. | 5909990808427 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 22,32 | 28,08 | 16,47 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 16,55 |
| 2591 | Rivastigminum | Symelon, kaps. twarde, 6 mg | 28 tabl. | 5909990808441 | 2012-05-01 | 2 lata | 186.0, Leki psychoanaleptyczne - Inhibitory acetylocholinoesterazy stosowane w leczeniu choroby Alzheimerera | 29,81 | 37,01 | 21,96 | Choroba Alzheimerera | | 30% | 21,64 |
| 2592 | Ropinirolum | Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg | 21 tabl. | 5909990877676 | 2012-05-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 27,54 | 35,69 | 30,87 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 14,08 |
| 2593 | Ropinirolum | Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg | 28 tabl. | 5909990877683 | 2012-05-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 36,72 | 46,75 | 41,15 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 17,95 |
| 2594 | Ropinirolum | Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 28 tabl. | 5909990878000 | 2012-05-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 73,44 | 89,70 | 82,31 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 32,08 |
| 2595 | Ropinirolum | Aparxon PR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg | 28 tabl. | 5909990878086 | 2012-05-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 146,88 | 172,28 | 164,62 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 57,05 |
| 2596 | Ropinirolum | Aropilo , tabl. powł., 0,25 mg | 210 tabl. (10 blist.po 21szt.) | 5909990731954 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 35,10 | 44,71 | 38,58 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 17,70 |
| 2597 | Ropinirolum | Aropilo , tabl. powł., 0,5 mg | 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) | 5909990731985 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 8,10 | 11,03 | 7,72 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 5,63 |
| 2598 | Ropinirolum | Aropilo , tabl. powł., 1 mg | 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) | 5909990732074 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 13,93 | 18,89 | 15,43 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 8,09 |
| 2599 | Ropinirolum | Aropilo , tabl. powł., 2 mg | 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) | 5909990732227 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 27,92 | 36,09 | 30,87 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 14,48 |
| 2600 | Ropinirolum | Aropilo , tabl. powł., 5 mg | 21 tabl. (1 blist.a 21 szt.) | 5909990732333 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 69,82 | 85,42 | 77,16 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 31,41 |
| 2601 | Ropinirolum | Ceuronex, tabl. powł., 0,25 mg | 1 poj. po 21 szt. | 5909990734078 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 4,43 | 5,98 | 3,86 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 3,28 |
| 2602 | Ropinirolum | Ceuronex, tabl. powł., 0,5 mg | 21 tabl. | 5909990734092 | 2012-05-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 6,80 | 9,64 | 7,72 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 4,24 |
| 2603 | Ropinirolum | Ceuronex, tabl. powł., 1 mg | 21 tabl. | 5909990734115 | 2012-05-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 13,61 | 18,54 | 15,43 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 7,74 |
| 2604 | Ropinirolum | Ceuronex, tabl. powł., 2 mg | 1 poj. po 21 szt. | 5909990734139 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 29,16 | 37,42 | 30,87 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 15,81 |
| 2605 | Ropinirolum | Ceuronex, tabl. powł., 5 mg | 1 poj. po 21 szt. | 5909990734153 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 69,66 | 85,24 | 77,16 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 31,23 |
| 2606 | Ropinirolum | Parnirol, tabl. powł., 0,25 mg | 21 tabl. | 5909990775033 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 4,43 | 5,98 | 3,86 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 3,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|----------------|---|------------------------------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|--|----|-----|-------|
| 2607 | Ropinirolum | Parnirol, tabl. powł., 0,5 mg | 21 tabl. | 5909990775095 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 8,64 | 11,60 | 7,72 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 6,20 |
| 2608 | Ropinirolum | Parnirol, tabl. powł., 1 mg | 21 tabl. | 5909990775170 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 14,69 | 19,70 | 15,43 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 8,90 |
| 2609 | Ropinirolum | Parnirol, tabl. powł., 2 mg | 21 tabl. (blis.) | 5909990775231 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 29,38 | 37,66 | 30,87 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 16,05 |
| 2610 | Ropinirolum | Parnirol, tabl. powł., 5 mg | 21 tabl. | 5909990775262 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 73,44 | 89,28 | 77,16 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 35,27 |
| 2611 | Ropinirolum | Requip, tabl. powł., 2 mg | 21 tabl. (blis.) | 5909990013586 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 37,80 | 46,67 | 30,87 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 25,06 |
| 2612 | Ropinirolum | Requip, tabl. powł., 0,5 mg | 21 tabl. (blis.) | 5909990013685 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 8,96 | 11,95 | 7,72 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 6,55 |
| 2613 | Ropinirolum | Requip, tabl. powł., 1 mg | 21 tabl. (blis.) | 5909990013890 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 18,22 | 23,48 | 15,43 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 12,68 |
| 2614 | Ropinirolum | Requip, tabl. powł., 5 mg | 21 tabl. (1 blis.a 21 szt.) | 5909990013968 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 99,79 | 117,48 | 77,16 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 63,47 |
| 2615 | Ropinirolum | Requip Modutab, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990644612 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 92,30 | 109,87 | 82,31 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 52,25 |
| 2616 | Ropinirolum | Requip Modutab, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990644636 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 184,58 | 212,61 | 164,62 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 97,38 |
| 2617 | Ropinirolum | Requip Modutab, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990644728 | 2012-01-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 46,82 | 57,56 | 41,15 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 28,76 |
| 2618 | Ropinirolum | Rolpryna SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 2 mg | 28 tabl. | 5909990855766 | 2012-03-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 36,72 | 46,75 | 41,15 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 17,95 |
| 2619 | Ropinirolum | Rolpryna SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 4 mg | 28 tabl. | 5909990855773 | 2012-03-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 73,44 | 89,70 | 82,31 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 32,08 |
| 2620 | Ropinirolum | Rolpryna SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 8 mg | 28 tabl. | 5909990855780 | 2012-03-01 | 2 lata | 170.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - agoni ci receptorów dopaminowych | 146,88 | 172,28 | 164,62 | Choroba i zespół Parkinsona | | 30% | 57,05 |
| 2621 | Rosuvastatinum | Roswera, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990895106 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,75 | 13,15 | 9,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,80 |
| 2622 | Rosuvastatinum | Roswera, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990895250 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,10 | 22,75 | 18,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,06 |
| 2623 | Rosuvastatinum | Roswera, tabl. , 15 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990895380 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 24,31 | 24,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,29 |
| 2624 | Rosuvastatinum | Roswera, tabl. , 20 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990895533 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 25,00 | 33,68 | 33,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,10 |
| 2625 | Rosuvastatinum | Roswera, tabl. , 30 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990895663 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 27,00 | 37,82 | 37,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|--|---------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---------------------------------------|---------|-------|
| 2626 | Rosuvastatinum | Roswera, tabl., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990895786 | 2012-03-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 41,90 | 55,23 | 55,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 16,57 |
| 2627 | Roxithromycinum | Renicin, tabl. powł., 0,15 g | 10 tabl. (1 blist.po 10) | 5909990467419 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,98 | 19,80 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,12 |
| 2628 | Roxithromycinum | Rolicyn, tabl. powł., 50 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990847815 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 13,56 | 15,50 | 3,12 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 13,94 |
| 2629 | Roxithromycinum | Rolicyn, tabl. powł., 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990847914 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,02 | 19,11 | 6,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 15,99 |
| 2630 | Roxithromycinum | Rolicyn, tabl. powł., 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990848010 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,52 | 22,52 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 17,84 |
| 2631 | Roxithromycinum | Roxitron, tabl. powł., 0,15 g | 10 tabl. | 5909991032319 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,44 | 19,23 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 14,55 |
| 2632 | Roxithromycinum | Rulid, tabl. powł., 150 mg | 10 tabl. | 5909990085910 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 24,30 | 28,70 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 24,02 |
| 2633 | Roxithromycinum | Rulid, tabl. powł., 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990354115 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 16,76 | 19,89 | 6,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 16,77 |
| 2634 | Roxithromycinum | Rulid, tabl. do sporz. dziania zawiesiny doustnej, 50 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990785919 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.1. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 12,42 | 16,80 | 11,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 10,93 |
| 2635 | Roxithromycinum | Xitrocyn, tabl. powł., 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990971619 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 12,42 | 15,26 | 6,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 12,14 |
| 2636 | Roxithromycinum | Xitrocyn, tabl. powł., 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990971718 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2. Antibiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,50 | 21,43 | 9,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 16,75 |
| 2637 | Salbutamololum | Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+poj.ochron.) | 5909991106928 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 22,24 | 27,24 | 12,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 17,57 |
| 2638 | Salbutamololum | Buventol Easyhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+poj.ochron.) | 5909991107826 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 37,30 | 45,32 | 25,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 24,91 |
| 2639 | Salbutamololum | Sabumalin, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mcg | 1 poj. (200 dawek) | 5909990764150 | 2012-05-01 | 2 lata | 197.1. Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 8,86 | 12,92 | 12,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,25 |
| 2640 | Salbutamololum | Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml | 100 ml | 5909990317516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 197.2. Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego | 3,00 | 4,49 | 4,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|---------|-------|
| 2641 | Salbutamolom | Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji, 1 mg/ml | 20 amp.a 2,5 ml | 5909990727414 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 22,66 | 25,03 | 2,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 25,03 |
| 2642 | Salbutamolom | Steri-Neb Salamol, roztwór do nebulizacji, 2 mg/ml | 20 amp.a 2,5 ml | 5909990727513 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 33,49 | 37,40 | 5,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 35,45 |
| 2643 | Salbutamolom | Velaspir, aerozol inhalacyjny, zawiesina, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 op. (2 poj.po 200 daw.) | 5909990917211 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 46,60 | 55,28 | 25,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 34,87 |
| 2644 | Salbutamolom | Ventolin, aerozol wziewny, zawiesina, 100 g/dawk | 1 poj.a 200 daw. | 5909990442010 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 9,94 | 14,07 | 12,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 4,40 |
| 2645 | Salbutamolom | Ventolin, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 1 mg/ml | 20 amp.a 2,5 ml | 5909990454013 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 14,04 | 15,80 | 2,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 15,80 |
| 2646 | Salbutamolom | Ventolin, Płyn do inhalacji z nebulizatora, 2 mg/ml | 20 amp.a 2,5 ml | 5909990454112 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 17,25 | 20,02 | 5,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 18,07 |
| 2647 | Salbutamolom | Ventolin Dysk, proszek do inhalacji, 200 g | 1 poj.a 60 daw. | 5909990911912 | 2012-01-01 | 2 lata | 197.1, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o krótkim działaniu | 16,30 | 19,70 | 7,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 15,18 |
| 2648 | Salmeterolum | Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909991109424 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 49,14 | 62,29 | 61,70 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 3,79 |
| 2649 | Salmeterolum | Pulmoterol, proszek do inhalacji w kaps., 0,05 mg | 90 kaps. (+ inh.) | 5909991109431 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 75,60 | 93,19 | 92,55 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 5,44 |
| 2650 | Salmeterolum | Serevent, aerozol wziewny, zawiesina, 25 g | 120 daw. (1 poj.) | 5909990623099 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 69,36 | 83,92 | 61,70 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 25,42 |
| 2651 | Salmeterolum | Serevent Dysk, proszek do inhalacji, 50 g | 1 szt. (60 daw.) | 5909990437825 | 2012-01-01 | 2 lata | 198.0, Wziewne leki beta-2-adrenergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 71,32 | 86,01 | 61,70 | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli | | ryczałt | 27,51 |
| 2652 | Selegilinum | Segan, tabl. , 5 mg | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | 5909990746026 | 2012-01-01 | 2 lata | 171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina | 15,99 | 22,03 | 22,03 | Choroba i zespół Parkinsona | | ryczałt | 6,40 |
| 2653 | Selegilinum | Selgres, tabl. powl., 5 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990404315 | 2012-01-01 | 2 lata | 171.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - selegilina | 13,82 | 19,14 | 18,36 | Choroba i zespół Parkinsona | | ryczałt | 6,11 |
| 2654 | Sertindolum | Serdolect, tabl. powl., 4 mg | 30 tabl. | 5909991089214 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol | 90,67 | 110,37 | 110,37 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2655 | Sertindolum | Serdolect, tabl. powl., 0,012 g | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991089313 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol | 271,45 | 309,75 | 309,04 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,91 |
| 2656 | Sertindolum | Serdolect, tabl. powl., 16 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991089412 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.8, Leki przeciwpsychotyczne - sertindol | 361,91 | 408,80 | 408,80 | Schizofrenia | | ryczałt | 3,20 |
| 2657 | Sertralinum | Asentra, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. | 5909990963218 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 25,92 | 31,45 | 13,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 21,73 |
| 2658 | Sertralinum | Asentra, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. | 5909990963317 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 46,44 | 55,51 | 27,77 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 36,07 |
| 2659 | Sertralinum | Asertin 100, tabl. powl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990422685 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0, Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 22,14 | 29,75 | 29,75 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 8,93 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 2660 | Sertralinum | Asertin 50, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990422692 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 11,88 | 16,58 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 6,16 |
| 2661 | Sertralinum | Miravil, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990804344 | 2012-05-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 9,18 | 13,69 | 13,69 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 4,11 |
| 2662 | Sertralinum | Miravil, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990804368 | 2012-05-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 18,36 | 25,70 | 25,70 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 7,71 |
| 2663 | Sertralinum | Sertagen, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990046621 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 21,60 | 28,93 | 27,77 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 9,49 |
| 2664 | Sertralinum | Sertagen, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990046690 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 10,80 | 15,27 | 13,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 5,55 |
| 2665 | Sertralinum | Sertralinum 123ratio, Luxeta, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990049943 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 11,34 | 16,00 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 5,58 |
| 2666 | Sertralinum | Sertralinum 123ratio (Luxeta 100 mg), tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990049981 | 2012-05-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 18,36 | 25,70 | 25,70 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 7,71 |
| 2667 | Sertralinum | Sertranorm, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990663040 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 10,04 | 14,60 | 14,60 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 4,38 |
| 2668 | Sertralinum | Sertranorm, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990663163 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 21,06 | 28,58 | 28,58 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 8,57 |
| 2669 | Sertralinum | Setalof, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990571925 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 9,72 | 14,27 | 14,27 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 4,28 |
| 2670 | Sertralinum | Setalof, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990571963 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 22,14 | 29,75 | 29,75 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 8,93 |
| 2671 | Sertralinum | Setraline Arrow, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990641925 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 7,56 | 11,80 | 11,80 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 3,54 |
| 2672 | Sertralinum | Stimuloton, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990994816 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 27,00 | 32,76 | 14,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 22,34 |
| 2673 | Sertralinum | Zolof, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990753116 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 29,16 | 34,91 | 13,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 25,19 |
| 2674 | Sertralinum | Zolof, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. | 5909990753215 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 58,32 | 68,22 | 27,77 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 48,78 |
| 2675 | Sertralinum | Zotral, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990013982 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 16,20 | 21,05 | 13,88 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 11,33 |
| 2676 | Sertralinum | Zotral, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990569472 | 2012-01-01 | 2 lata | 184.0. Leki przeciwdepresyjne - inhibitory wychwyty zwrotnego serotoniny | 30,24 | 38,17 | 27,77 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 18,73 |
| 2677 | Simvastatinum | Angiolip, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990673742 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,94 | 14,09 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 5,63 |
| 2678 | Simvastatinum | Angiolip, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909990673759 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,76 | 26,57 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 2679 | Simvastatinum | Apo-Simva 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618279 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,01 | 9,58 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,04 |
| 2680 | Simvastatinum | Apo-Simva 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618286 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,80 | 16,23 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,17 |
| 2681 | Simvastatinum | Apo-Simva 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618293 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 22,36 | 29,59 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,46 |
| 2682 | Simvastatinum | Egilipid, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990023608 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,32 | 10,87 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,64 |
| 2683 | Simvastatinum | Egilipid, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990023646 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,85 | 21,47 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,01 |
| 2684 | Simvastatinum | Egilipid, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990023653 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,81 | 39,47 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,55 |
| 2685 | Simvastatinum | Simcovas, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990649532 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,99 | 12,00 | 12,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,60 |
| 2686 | Simvastatinum | Simcovas, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990649655 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,06 | 23,69 | 23,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,11 |
| 2687 | Simvastatinum | Simgal, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,23 | 13,99 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,76 |
| 2688 | Simvastatinum | Simgal, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,74 | 21,35 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,89 |
| 2689 | Simvastatinum | Simgal, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 30,78 | 38,36 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 21,44 |
| 2690 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (blister) | 5909990793853 | 2012-07-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 3,62 | 5,84 | 5,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 1,75 |
| 2691 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 10 mg | 98 tabl. | 5909990793860 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 12,69 | 18,52 | 18,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|---|---|-----|-------|
| 2692 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909990794089 | 2012-05-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,47 | 20,91 | 20,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 6,27 |
| 2693 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 40 mg | 98 tabl. | 5909990794096 | 2012-05-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 50,76 | 65,70 | 65,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 19,71 |
| 2694 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. | 5909990794102 | 2012-05-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,03 | 39,46 | 39,46 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 11,84 |
| 2695 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 80 mg | 98 tabl. | 5909990794133 | 2012-05-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 101,52 | 124,01 | 124,01 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 37,20 |
| 2696 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990794140 | 2012-05-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,26 | 11,21 | 11,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,36 |
| 2697 | Simvastatinum | Simorion, tabl. powł., 20 mg | 98 tabl. | 5909990794157 | 2012-05-01 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 25,38 | 34,82 | 34,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 10,45 |
| 2698 | Simvastatinum | Simratio 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019723 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,77 | 13,49 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,26 |
| 2699 | Simvastatinum | Simratio 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019822 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,20 | 20,78 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,32 |
| 2700 | Simvastatinum | Simratio 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019945 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,32 | 38,95 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,03 |
| 2701 | Simvastatinum | Simvacard 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940110 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,72 | 12,37 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,14 |
| 2702 | Simvastatinum | Simvacard 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940219 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,55 | 20,09 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,63 |
| 2703 | Simvastatinum | Simvacard 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 27,00 | 34,32 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 17,40 |
| 2704 | Simvastatinum | Simvachol, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941025 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,40 | 7,75 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,52 |
| 2705 | Simvastatinum | Simvachol, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,18 | 13,27 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|------|
| 2706 | Simvastatinum | Simvachol, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 23,92 | 23,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,18 |
| 2707 | Simvastatinum | Simvacor, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990336623 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,40 | 10,00 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,46 |
| 2708 | Simvastatinum | Simvacor, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990336630 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 13,39 | 17,94 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,88 |
| 2709 | Simvastatinum | Simvacor, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990675227 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 20,52 | 27,62 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,49 |
| 2710 | Simvastatinum | Simvagama 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909991146016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 4,10 | 6,47 | 6,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 1,94 |
| 2711 | Simvastatinum | Simvagama 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909991146115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,10 | 12,28 | 12,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,68 |
| 2712 | Simvastatinum | Simvagama 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909991146214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,82 | 24,73 | 24,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,42 |
| 2713 | Simvastatinum | Simvagen 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743575 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 3,63 | 5,85 | 5,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 1,76 |
| 2714 | Simvastatinum | Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990037940 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,23 | 13,49 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,43 |
| 2715 | Simvastatinum | Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743650 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,24 | 11,20 | 11,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,36 |
| 2716 | Simvastatinum | Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990037964 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,93 | 26,99 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,86 |
| 2717 | Simvastatinum | Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743667 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 21,61 | 21,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,48 |
| 2718 | Simvastatinum | SimvaHEXAL 10, tabl. powł., 0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623273 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,10 | 10,75 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 2719 | Simvastatinum | SimvaHEXAL 20, tabl. powł., 0,02 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623297 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 22,10 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,04 |
| 2720 | Simvastatinum | SimvaHEXAL 40, tabl. powł., 0,04 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623334 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 25,92 | 33,40 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,27 |
| 2721 | Simvastatinum | Simvalip, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623082 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,40 | 7,86 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,32 |
| 2722 | Simvastatinum | Simvalip, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623105 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,83 | 14,13 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,07 |
| 2723 | Simvastatinum | Simvalip, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623136 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,82 | 24,73 | 24,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,42 |
| 2724 | Simvastatinum | Simvastatin 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990037698 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 6,91 | 10,84 | 10,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,25 |
| 2725 | Simvastatinum | Simvastatin 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990037704 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,88 | 12,04 | 12,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,61 |
| 2726 | Simvastatinum | Simvastatin 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990037582 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,66 | 22,42 | 22,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,73 |
| 2727 | Simvastatinum | Simvastatin 40 mg tabletki powlekane, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909990037575 | 2012-07-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,26 | 20,69 | 20,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 6,21 |
| 2728 | Simvastatinum | Simvastatin Pfizer, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990810871 | 2012-07-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 3,62 | 5,84 | 5,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 1,75 |
| 2729 | Simvastatinum | Simvastatin Pfizer, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990810895 | 2012-07-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,23 | 11,19 | 11,19 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,36 |
| 2730 | Simvastatinum | Simvastatin Pfizer, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909990810949 | 2012-07-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,46 | 20,90 | 20,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 6,27 |
| 2731 | Simvastatinum | Simvastatinum 123ratio (SimvaTeva), tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990635597 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,31 | 11,27 | 11,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 3,38 |
| 2732 | Simvastatinum | Simvastatinum 123ratio (SimvaTeva), tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990635658 | 2012-05-01 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,62 | 21,07 | 21,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 6,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 2733 | Simvastatinum | Simvastazol, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990927616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 13,50 | 16,42 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,19 |
| 2734 | Simvastatinum | Simvastazol, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990927715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 21,94 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,48 |
| 2735 | Simvastatinum | Simvastazol, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990927838 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,32 | 38,95 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,03 |
| 2736 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990436316 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,72 | 12,37 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,14 |
| 2737 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990436415 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 19,63 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,17 |
| 2738 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. | 5909990914012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,72 | 12,37 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,14 |
| 2739 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990914111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 19,63 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,17 |
| 2740 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990982714 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 22,46 | 29,46 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,54 |
| 2741 | Simvastatinum | Vastan, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073114 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 8,33 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,10 |
| 2742 | Simvastatinum | Vastan, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 12,10 | 16,40 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,94 |
| 2743 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990055722 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,34 | 15,58 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,12 |
| 2744 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 8,44 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,90 |
| 2745 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,77 | 16,20 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|----------|----------|--|---|---------|-------|
| 2746 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935314 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,44 | 26,46 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,33 |
| 2747 | Simvastatinum | Zifam 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (pojem.) | 5909990736621 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 4,80 | 7,11 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,88 |
| 2748 | Simvastatinum | Zifam 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (pojem.) | 5909990736638 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,54 | 13,65 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,19 |
| 2749 | Simvastatinum | Zifam 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (pojem.) | 5909990736645 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,38 | 26,17 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,25 |
| 2750 | Simvastatinum | Zocor 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990365913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,53 | 22,87 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,64 |
| 2751 | Simvastatinum | Zocor 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990366026 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,53 | 24,35 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,89 |
| 2752 | Simvastatinum | Zocor 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990769124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,86 | 39,52 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,60 |
| 2753 | Simvastatinum | Zocor 80, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990846627 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 71,38 | 84,78 | 48,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 50,94 |
| 2754 | Sirolimusum | Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml | 60 ml (but.+30 strzyk.) | 5909990893645 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus | 986,50 | 1 094,05 | 1 090,50 | Stan po przeszczepie narz. du. unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz. du. unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko. czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 6,75 |
| 2755 | Sirolimusum | Rapamune, tabl. powł., 1 mg | 30 tabl. | 5909990985210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.1. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus | 485,76 | 545,25 | 545,25 | Stan po przeszczepie narz. du. unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz. du. unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie ko. czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2756 | sole rehydracyjne | Gastrolit, proszek do sporządzenia roztworu, | 15 sasz. | 5909990012312 | 2012-01-01 | 2 lata | 9.0. Elektrolity do podawania doustnego | 6,65 | 9,75 | 9,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 2757 | Solifenacinum | Vesicare 10 mg, tabl. powł., 10 miligram | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215584 | 2012-01-01 | 2 lata | 75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna | 112,75 | 133,55 | 112,29 | Zespół p. cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym | | 30% | 54,95 |
| 2758 | Solifenacinum | Vesicare 5 mg, tabl. powł., 5 miligram | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215553 | 2012-01-01 | 2 lata | 75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna | 112,75 | 129,55 | 56,14 | Zespół p. cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym | | 30% | 90,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2759 | Sotalolum | Biosotal 160, tabl. , 160 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990365814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 13,91 | 17,72 | 10,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,09 |
| 2760 | Sotalolum | Biosotal 40, tabl. , 40 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990365715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 7,58 | 9,67 | 5,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 5,86 |
| 2761 | Sotalolum | Biosotal 80, tabl. , 80 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990365616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 7,27 | 9,33 | 5,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 5,52 |
| 2762 | Sotalolum | SotaHEXAL 160, tabl. , 160 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990309115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 12,96 | 15,92 | 7,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,84 |
| 2763 | Sotalolum | SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991014711 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 2,43 | 3,12 | 1,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 1,85 |
| 2764 | Sotalolum | SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990309016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 7,02 | 8,54 | 3,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,00 |
| 2765 | Spiramycinum | Rovamycine, tabl. powl., 1,5 mln j.m. | 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.) | 5909990098613 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 15,09 | 20,00 | 14,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 12,52 |
| 2766 | Spiramycinum | Rovamycine, tabl. powl., 3 mln j.m. | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990692118 | 2012-01-01 | 2 lata | 101.2, Antybiotyki makrolidowe do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,47 | 24,21 | 18,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 14,86 |
| 2767 | Spironolactonum | Spironol, tabl. , 25 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990110216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 4,81 | 6,21 | 3,56 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,72 |
| 2768 | Spironolactonum | Spironol, tabl. , 25 mg | 100 tabl. | 5909990110223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 17,82 | 23,23 | 17,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,76 |
| 2769 | Spironolactonum | Spironol, tabl. , 100 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990673124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 9,93 | 14,25 | 14,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 4,28 |
| 2770 | Spironolactonum | Verospiron, tabl. , 25 mg | 20 tabl. | 5909990117215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 5,89 | 7,36 | 3,56 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 4,87 |
| 2771 | Spironolactonum | Verospiron, kaps. twarde, 50 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990488414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 10,90 | 14,56 | 10,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 7,08 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 2772 | Spironolactonum | Verospiron, kaps. twarde, 100 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990488513 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 16,38 | 22,22 | 21,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 7,25 |
| 2773 | Sucralfatum | Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml | 250 ml | 5909990164615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 3.2, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - plynne postacie farmaceutyczne | 10,89 | 15,48 | 15,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci | 50% | 7,74 |
| 2774 | Sucralfatum | Ulgastran, tabl. , 1 g | 50 tabl. | 5909990223619 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 3.1, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne | 10,89 | 15,48 | 15,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci | 50% | 7,74 |
| 2775 | Sucralfatum | Venter, tabl. powl., 1 g | 50 tabl. | 5909990242818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 3.1, Leki działaj ce ochronnie na luzówk oł dka - sukralfat - stałe postacie farmaceutyczne | 15,57 | 20,50 | 15,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci | 50% | 12,76 |
| 2776 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml | 100 ml | 5909990312610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne | 9,80 | 13,85 | 12,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,39 |
| 2777 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Bactrim, zawiesina doustna, (0,2 g+0,04 g)/5 ml ml | 100 ml | 5909997198927 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne | 9,72 | 13,77 | 12,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,31 |
| 2778 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 g/5ml | 100 ml | 5909990117819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne | 8,93 | 12,93 | 12,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 6,47 |
| 2779 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol 120, tabl. , 100+20 mg | 20 tabl. (blist.) | 5909990117529 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.1, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | 8,64 | 10,86 | 5,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------------------------|--|-------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 2780 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol 480, tabl. , 400+80 mg | 20 tabl. | 5909990117611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | 15,12 | 20,91 | 20,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 10,46 |
| 2781 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol 960, tabl. , 800+160 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990117710 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.1, Sulfametoksazol w połączeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | 15,12 | 20,91 | 20,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 10,46 |
| 2782 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990864416 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 25,92 | 34,14 | 30,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 12,50 |
| 2783 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990864416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 25,92 | 34,14 | 30,91 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 6,43 |
| 2784 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909990864423 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 49,68 | 62,87 | 61,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 19,60 |
| 2785 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909990864423 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 49,68 | 62,87 | 61,81 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 4,26 |
| 2786 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909997012001 | 2012-03-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 44,82 | 57,67 | 57,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 17,30 |
| 2787 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909997012001 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 44,82 | 57,67 | 57,67 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 2788 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990283316 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 27,15 | 35,46 | 30,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 13,82 |
| 2789 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990283316 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 27,15 | 35,46 | 30,91 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 7,75 |
| 2790 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909990283323 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 48,69 | 61,81 | 61,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 18,54 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-----------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|----------|--------|---|---|-----------|--------|
| 2791 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909990283323 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 48,69 | 61,81 | 61,81 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 2792 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990283217 | 2012-01-01 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 23,05 | 31,06 | 30,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 9,42 |
| 2793 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin Krka, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990283217 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 23,05 | 31,06 | 30,91 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 3,35 |
| 2794 | Sulpiridum | Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 100 mg | 24 kaps. (blis.) | 5909990159314 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 4,48 | 6,71 | 6,71 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2795 | Sulpiridum | Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg | 12 tabl. (1 blis. a 12 szt.) | 5909990159413 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 3,89 | 6,08 | 6,08 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2796 | Sulpiridum | Sulpiryd Teva, tabl., 200 mg | 30 tabl. (2 blis. po 15 szt.) | 5909990159437 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 8,32 | 12,80 | 12,80 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2797 | Sulpiridum | Sulpiryd Teva, kaps. twarde, 50 mg | 24 kaps. (blis.) | 5909990159512 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.1, Leki przeciwpsychotyczne - klozapina do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 3,46 | 4,66 | 3,36 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 1,30 |
| 2798 | Sultamicillinum | Unasyn, tabl. powł., 375 mg | 12 tabl. | 5909990065110 | 2012-01-01 | 2 lata | 89.1, Penicyliny doustne z inhibitorami betalaktamaz - stałe postacie farmaceutyczne | 34,56 | 39,43 | 8,08 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 35,39 |
| 2799 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 0,5 miligram | 30 kaps. | 5909990051052 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 100,20 | 119,53 | 86,38 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 36,35 |
| 2800 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 1 miligram | 30 kaps. | 5909990051076 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 146,20 | 172,75 | 172,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2801 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 5 miligram | 30 kaps. | 5909990051137 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 995,16 | 1 096,87 | 863,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 236,32 |
| 2802 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedtu onym uwalnianiu, twarde, 3 miligram | 30 kaps. | 5909990699957 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 592,73 | 658,45 | 518,25 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 143,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|---|---------|------|
| 2803 | Tacrolimusum | Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg | 30 kaps. | 5909990783489 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 74,41 | 91,94 | 86,38 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 8,76 |
| 2804 | Tacrolimusum | Cidimus, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. | 5909990783533 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 729,00 | 812,08 | 812,08 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2805 | Tacrolimusum | Cidimus, kaps. twarde, 1 mg | 30 kaps. | 5909990783571 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 140,40 | 166,55 | 166,55 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2806 | Tacrolimusum | Prograf, kaps. twarde, 1 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990447213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 146,20 | 172,75 | 172,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2807 | Tacrolimusum | Prograf, kaps. twarde, 5 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990447312 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 743,64 | 827,74 | 827,74 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2808 | Tacrolimusum | Prograf, kaps. twarde, 0,5 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991148713 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 74,41 | 91,94 | 86,38 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 8,76 |
| 2809 | Tacrolimusum | Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg | 30 kaps. | 5909990821006 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 66,96 | 83,97 | 83,97 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2810 | Tacrolimusum | Tacni, kaps. twarde, 1 mg | 30 kaps. | 5909990821228 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 146,20 | 172,75 | 172,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2811 | Tacrolimusum | Tacni, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. | 5909990821280 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 669,60 | 748,53 | 748,53 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 2812 | Tacrolimusum | Tacrolimus Intas, kaps., 0,5 mg | 30 kaps. | 5909990881352 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 68,85 | 85,99 | 85,99 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2813 | Tacrolimusum | Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg | 30 kaps. | 5909990881406 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 140,40 | 166,55 | 166,55 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2814 | Tacrolimusum | Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg | 90 kaps. | 5909990881475 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 421,20 | 474,92 | 474,92 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2815 | Tacrolimusum | Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990836857 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 59,40 | 75,88 | 75,88 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2816 | Tacrolimusum | Taliximun, kaps. twarde, 1 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990836888 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 112,32 | 136,50 | 136,50 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 2817 | Tacrolimusum | Taliximun, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990836949 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 540,00 | 609,85 | 609,85 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|--------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 2818 | Tafluprostum | Taflotan, krople do oczu, roztwór, 0,015 mg/ml | 30 szt. (3sasz. po 10pojem.) | 5909990675944 | 2012-07-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i złożone | 55,73 | 68,88 | 57,70 | Obniżyć ciśnienie podwójne ciśnień nacuci nienia ródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesłania lub nacuci nienia ocznego: 1) w monoterapii u pacjentów, którzy: a) mogą odnie korzyść ze stosowania kropli do oczu bez roduka konserwujcego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania; 2) jako leczenie wspomagające do terapii beta-adrenolitykami u pacjentów, którzy: a) mogą odnie korzyść ze stosowania kropli do oczu bez roduka konserwujcego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania. | | 30% | 28,49 |
| 2819 | Tamoxifenum | Nolvadex D, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990127412 | 2012-01-01 | 2 lata | 130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen | 17,28 | 22,13 | 14,34 | Nowotwory złośliwe | | bezpłatny | 7,79 |
| 2820 | Tamoxifenum | Tamoxifen Sandoz, tabl. powł., 0,02 g | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990331017 | 2012-01-01 | 2 lata | 130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen | 12,42 | 16,94 | 14,34 | Nowotwory złośliwe | | bezpłatny | 2,60 |
| 2821 | Tamoxifenum | Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg | 30 tabl. | 5909990722419 | 2012-03-01 | 2 lata | 130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen | 10,00 | 14,34 | 14,34 | Nowotwory złośliwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2822 | Tamoxifenum | Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990775316 | 2012-01-01 | 2 lata | 130.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antyestrogeny - tamoksyfen | 10,00 | 14,34 | 14,34 | Nowotwory złośliwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 2823 | Tamsulosinum | Apo-Tamis, kaps., 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990045006 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują receptory alfa-adrenergiczne | 20,30 | 27,41 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,97 |
| 2824 | Tamsulosinum | Bazetham, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990565894 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują receptory alfa-adrenergiczne | 19,70 | 26,77 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,33 |
| 2825 | Tamsulosinum | Bazetham Retard, tabl. o przedłużonym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 tabl. | 5909990894598 | 2012-05-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują receptory alfa-adrenergiczne | 20,30 | 27,41 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,97 |
| 2826 | Tamsulosinum | Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990573585 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokują receptory alfa-adrenergiczne | 20,29 | 27,40 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|----|---------|-------|
| 2827 | Tamsulosinum | Fokusin, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 90 kaps. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990573592 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 63,18 | 78,48 | 76,91 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 11,17 |
| 2828 | Tamsulosinum | Omnis 0,4, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990716418 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 34,56 | 42,67 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 20,23 |
| 2829 | Tamsulosinum | Omnis Ocas 0,4, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 miligram | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990219070 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 36,72 | 44,98 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 22,54 |
| 2830 | Tamsulosinum | Omsal 0,4 mg , kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990586196 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 18,36 | 25,33 | 25,33 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 2831 | Tamsulosinum | Prostaminic, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573257 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,28 | 27,39 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,95 |
| 2832 | Tamsulosinum | Ranlosin, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990048007 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 19,33 | 26,37 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,93 |
| 2833 | Tamsulosinum | Symlosin SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990044382 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 18,00 | 24,95 | 24,95 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 2834 | Tamsulosinum | Tamsudil, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990565948 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 19,71 | 26,78 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,34 |
| 2835 | Tamsulosinum | Tamsudil, kaps. twarde o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg | 90 kaps. (9 blist.po 10) | 5909990565962 | 2012-03-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 56,65 | 71,50 | 71,50 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 9,60 |
| 2836 | Tamsulosinum | Tamsugen 0,4mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 kaps. | 5909990570690 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 19,87 | 26,95 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 4,51 |
| 2837 | Tamsulosinum | Tamsugen 0,4mg, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg | 60 kaps. | 5909990570706 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 39,74 | 51,27 | 51,27 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 6,40 |
| 2838 | Tamsulosinum | TamsuLEK, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570386 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,52 | 27,65 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 5,21 |
| 2839 | Tamsulosinum | Tamsunorm, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 kaps. | 5909990843602 | 2012-03-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 18,90 | 25,91 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,47 |
| 2840 | Tamsulosinum | Tanyz, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 kaps. | 5909990430895 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 31,71 | 39,62 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 17,18 |
| 2841 | Tamsulosinum | Tanyz ERAS, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 tabl. | 5909990847808 | 2012-05-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 18,36 | 25,33 | 25,33 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 3,20 |
| 2842 | Tamsulosinum | Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990566068 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,93 | 28,09 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 5,65 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|
| 2843 | Tamsulosinum | Uprox, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 0,4 mg | 60 kaps. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990566075 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 40,95 | 52,57 | 51,27 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 7,70 |
| 2844 | Tamsulosinum | Urostat, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 0,4 mg | 30 tabl. | 5909990566280 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 21,60 | 28,80 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 6,36 |
| 2845 | Telmisartanum | Micardis, tabl. , 40 mg | 28 tabl. | 5909990440726 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 40,48 | 47,35 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 36,24 |
| 2846 | Telmisartanum | Micardis, tabl. , 80 mg | 14 tabl. | 5909990440818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 26,18 | 32,06 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 20,95 |
| 2847 | Telmisartanum | Micardis, tabl. , 80 mg | 28 tabl. | 5909990440825 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 54,02 | 64,12 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 41,90 |
| 2848 | Telmisartanum | Pritor, tabl. , 40 mg | 28 tabl. | 5909990463428 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 47,43 | 54,79 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 43,68 |
| 2849 | Telmisartanum | Pritor, tabl. , 80 mg | 14 tabl. | 5909990463510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 32,70 | 39,03 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 27,92 |
| 2850 | Telmisartanum | Pritor, tabl. , 80 mg | 28 tabl. | 5909990463527 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 56,16 | 66,40 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 44,18 |
| 2851 | Telmisartanum | Tezeo , tabl. , 40 mg | 28 tabl. | 5909990818082 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 19,63 | 25,04 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,93 |
| 2852 | Telmisartanum | Tezeo , tabl. , 80 mg | 28 tabl. | 5909990818150 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 39,27 | 48,34 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 26,12 |
| 2853 | Telmisartanum | Tolura 40 mg tabletki, tabl. powl., 40 mg | 28 tabl. | 5909997077604 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 19,63 | 25,04 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,93 |
| 2854 | Telmisartanum | Tolura 80 mg tabletki, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. | 5909997077673 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 29,16 | 37,51 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 15,29 |
| 2855 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | MicardisPlus, tabl. , 80+25 mg | 14 tabl. (blist.PA/ALU/PVC) | 5909990653010 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 34,56 | 41,02 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 29,91 |
| 2856 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | MicardisPlus, tabl. , 80+25 mg | 28 tabl. (blist.PA/ALU/PVC) | 5909990653027 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 70,85 | 82,12 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 59,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|---|----|---------|-------|
| 2857 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | MicardisPlus, tabl. , 80+12,5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991020026 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 63,18 | 73,91 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 51,69 |
| 2858 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | PritorPlus, tabl. , 80/25 mg | 14 tabl. | 5909990644827 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 32,08 | 38,38 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 27,27 |
| 2859 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | PritorPlus, tabl. , 80/25 mg | 28 tabl. | 5909990644834 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 63,72 | 74,49 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 52,27 |
| 2860 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | PritorPlus, tabl. , 40/12,5 mg | 28 tabl. | 5909991068325 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 52,92 | 60,67 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 49,56 |
| 2861 | Telmisartanum + Hydrochlorothiazidum | PritorPlus, tabl. , 80/12,5 mg | 28 tabl. | 5909991068424 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anataconi ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 63,72 | 74,49 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 52,27 |
| 2862 | Terazosinum | Hytrin, tabl. , 2 mg | 28 tabl. | 5909990767816 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,09 | 37,23 | 9,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 30,53 |
| 2863 | Terazosinum | Hytrin, tabl. , 2 mg | 28 tabl. | 5909990767816 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,09 | 37,23 | 9,57 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 30,86 |
| 2864 | Terazosinum | Hytrin, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990767915 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 35,64 | 43,60 | 23,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 26,85 |
| 2865 | Terazosinum | Hytrin, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990767915 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 35,64 | 43,60 | 23,93 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 22,87 |
| 2866 | Terazosinum | Hytrin, tabl. , 10 mg | 28 tabl. | 5909990768011 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 66,96 | 80,10 | 47,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 46,61 |
| 2867 | Terazosinum | Hytrin, tabl. , 10 mg | 28 tabl. | 5909990768011 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 66,96 | 80,10 | 47,85 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 38,22 |
| 2868 | Terazosinum | Kornam, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484119 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,76 | 28,47 | 10,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 21,30 |
| 2869 | Terazosinum | Kornam, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484119 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,76 | 28,47 | 10,25 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 21,42 |
| 2870 | Terazosinum | Kornam, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484317 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,94 | 40,94 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 22,99 |
| 2871 | Terazosinum | Kornam, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484317 | 2012-01-01 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,94 | 40,94 | 25,64 | Przerost gruczołu krokowego | | ryczałt | 18,50 |
| 2872 | Terbinafinum | Erfin, tabl. , 250 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990621057 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 32,27 | 41,98 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 50% | 22,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|--------------------------------------|---------|-------|
| 2873 | Terbinafinum | Erfin, tabl. , 250 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990621064 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 61,68 | 77,10 | 77,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 38,55 |
| 2874 | Terbinafinum | Lamisil, tabl. , 125 mg | 14 tabl. | 5909990173112 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 29,98 | 36,88 | 19,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 27,24 |
| 2875 | Terbinafinum | Lamisil, tabl. , 250 mg | 14 tabl. | 5909990173211 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 55,49 | 66,82 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 47,55 |
| 2876 | Terbinafinum | Myconafine, tabl. , 250 mg | 14 tabl. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990419036 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 31,64 | 41,30 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 22,03 |
| 2877 | Terbinafinum | Myconafine, tabl. , 250 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990419050 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 63,29 | 78,82 | 77,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 40,27 |
| 2878 | Terbinafinum | Terbigen, tabl. , 250 mg | 14 tabl. | 5909990224845 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 29,42 | 38,93 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 19,66 |
| 2879 | Terbinafinum | Terbinafina 250, tabl. , 250 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990623051 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 31,21 | 40,84 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,57 |
| 2880 | Terbinafinum | Terbinafina 250, tabl. , 250 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990623068 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 62,64 | 78,12 | 77,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 39,57 |
| 2881 | Terbinafinum | Terbisil, tabl. , 250 mg | 14 tabl. | 5909990950515 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 31,32 | 40,96 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 21,69 |
| 2882 | Terbinafinum | Zelefion, tabl. , 250 mg | 14 tabl. | 5909990645497 | 2012-01-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 31,86 | 41,54 | 38,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 22,27 |
| 2883 | Terbinafinum | Zelefion, tabl. , 250 mg | 28 tabl. | 5909990645503 | 2012-03-01 | 2 lata | 50.0, Dermatologiczne leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego - terbinafina | 62,64 | 78,12 | 77,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 50% | 39,57 |
| 2884 | Testosteronum | Undestor Testocaps, kaps., 40 mg | 60 kaps. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990665082 | 2012-01-01 | 2 lata | 63.0, Hormony płciowe - androgeny - testosteron | 34,56 | 45,03 | 45,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,51 |
| 2885 | Theophyllinum | Euphyllin CR retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 250 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990665419 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 5,94 | 8,12 | 5,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 5,34 |
| 2886 | Theophyllinum | Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990450114 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 7,02 | 8,92 | 4,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 7,34 |
| 2887 | Theophyllinum | Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990450213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 9,18 | 11,90 | 7,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 7,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 2888 | Theophyllum | Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. | 5909990261215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 8,23 | 11,96 | 11,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,00 |
| 2889 | Theophyllum | Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990803910 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 6,31 | 8,51 | 5,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 5,73 |
| 2890 | Theophyllum | Theovent 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990149926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 8,51 | 12,26 | 11,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,30 |
| 2891 | Thiethylperazinum | Torecan, tabl. powł., 6,5 mg | 50 tabl. | 5909990242511 | 2012-01-01 | 2 lata | 206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego | 9,99 | 14,33 | 14,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,30 |
| 2892 | Thiethylperazinum | Torecan, tabl. powł., 6,5 mg | 50 tabl. | 5909990242511 | 2012-01-01 | 2 lata | 206.2, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doustnego | 9,99 | 14,33 | 14,33 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 3,20 |
| 2893 | Thiethylperazinum | Torecan, czopki, 6,5 mg | 6 czop. | 5909990242610 | 2012-01-01 | 2 lata | 206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego | 6,17 | 9,08 | 9,08 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,72 |
| 2894 | Thiethylperazinum | Torecan, czopki, 6,5 mg | 6 czop. | 5909990242610 | 2012-01-01 | 2 lata | 206.1, Leki przeciwhistaminowe o działaniu przeciwwymiotnym - tietyloperazyna - postacie do podawania doodbytniczego | 6,17 | 9,08 | 9,08 | Nowotwory zło liwe | | ryczałt | 3,20 |
| 2895 | Tiagabinum | Gabitril, tabl. powł., 5 mg | 50 tabl. | 5909990058822 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne | 79,03 | 97,29 | 97,29 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2896 | Tiagabinum | Gabitril, tabl. powł., 10 mg | 50 tabl. | 5909990058839 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne | 163,57 | 191,75 | 191,75 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2897 | Tiagabinum | Gabitril, tabl. powł., 15 mg | 50 tabl. | 5909990058846 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne | 248,35 | 284,58 | 284,58 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2898 | Tianeptinum | Coaxil, tabl. powł., 12,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990370214 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 21,92 | 26,98 | 12,90 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 17,95 |
| 2899 | Tianeptinum | Tianesal, tabl. powł., 12,5 mg | 30 tabl. | 5909990875245 | 2012-05-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 16,44 | 21,13 | 12,90 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 12,10 |
| 2900 | Ticlopidinum | Aclotin, tabl. powł., 0,25 g | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | 5909990334971 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 31,32 | 41,04 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 12,31 |
| 2901 | Ticlopidinum | Aclotin, tabl. powł., 0,25 g | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990667116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 16,20 | 21,07 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,49 |
| 2902 | Ticlopidinum | Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (but.) | 5909990646616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 27,27 | 36,71 | 36,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 2903 | Ticlopidinum | Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990938315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 18,76 | 24,92 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 10,56 |
| 2904 | Ticlopidinum | Iclopilid, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990044986 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 29,70 | 39,31 | 39,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,79 |
| 2905 | Ticlopidinum | Iclopilid, tabl. powł., 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991029333 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 11,45 | 15,98 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 6,40 |
| 2906 | Ticlopidinum | Ifapidin, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990694846 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 32,18 | 41,96 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 13,23 |
| 2907 | Ticlopidinum | Ifapidin, tabl. powł., 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990694853 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 16,63 | 21,52 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,94 |
| 2908 | Ticlopidinum | Ticlo, tabl. powł., 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990450510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 17,82 | 22,81 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 13,23 |
| 2909 | Ticlopidinum | Ticlo, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990450534 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 37,80 | 47,97 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 19,24 |
| 2910 | Timololum | Cusimolol 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml | 1 fl.a 5 ml | 5909990187713 | 2012-01-01 | 2 lata | 213.0. Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu | 4,91 | 6,65 | 4,91 | Jaskra | | 30% | 3,21 |
| 2911 | Timololum | Oftensin, krople do oczu, roztwór, 2,5 mg/ml | 5 ml (flakon) | 5909990073610 | 2012-01-01 | 2 lata | 213.0. Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu | 3,49 | 5,13 | 4,91 | Jaskra | | 30% | 1,69 |
| 2912 | Timololum | Oftensin, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml | 1 fl.a 5 ml | 5909990073719 | 2012-01-01 | 2 lata | 213.0. Leki przeciwjaskrowe - beta-adrenolityki do stosowania do oczu | 3,28 | 4,91 | 4,91 | Jaskra | | 30% | 1,47 |
| 2913 | Tiotropii bromidum | Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjnych | 30 kaps. (blist.) | 5909990985111 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 119,84 | 143,14 | 143,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 42,94 |
| 2914 | Tiotropii bromidum | Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjnych | 30 kaps. (blist.) | 5909990985111 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 119,84 | 143,14 | 143,14 | Ci ka posta POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z warto ci wska nika FEV1<50% oraz ujemn prób rozkurczow | | ryczałt | 3,20 |
| 2915 | Tiotropii bromidum | Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjnych | 30 kaps. (blist. + Handihaler) | 5909990985128 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 125,19 | 148,86 | 143,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 48,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 2916 | Tiotropii bromidum | Spiriva, proszek do inhalacji w kaps., 18 g/dawk inhalacyjn | 30 kaps. (blis. + Handihaler) | 5909990985128 | 2012-01-01 | 2 lata | 201.2. Wziewne leki antycholinergiczne o długim działaniu - produkty jednoskładnikowe | 125,19 | 148,86 | 143,14 | Ci ka posta POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z warto ci wska nika FEV1<50% oraz ujemn prób rozkurczow | | ryczałt | 8,92 |
| 2917 | Tizanidinum | Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg | 30 kaps. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990671410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 144.0. Leki działające rozkurczowo na mi nie szkieletowe - tizanidyna | 44,24 | 55,16 | 44,58 | Stwardnienie rozsiane | Stany spastyczne ci zwi zane z chorobami demielinizacyjnymi i neurozwyrodnieniowymi u dzieci | 30% | 23,95 |
| 2918 | Tizanidinum | Tizanor, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990784486 | 2012-05-01 | 2 lata | 144.0. Leki działające rozkurczowo na mi nie szkieletowe - tizanidyna | 22,12 | 29,72 | 29,72 | Stwardnienie rozsiane | | 30% | 8,92 |
| 2919 | Tolterodinum | Uroflow 1, tabl. powl., 1 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990648559 | 2012-01-01 | 2 lata | 75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna | 16,05 | 20,73 | 13,10 | Zespół p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym | | 30% | 11,56 |
| 2920 | Tolterodinum | Uroflow 2, tabl. powl., 2 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990648641 | 2012-01-01 | 2 lata | 75.2. Leki urologiczne stosowane w nietrzymaniu moczu - solifenacyna, tolterodyna | 19,26 | 26,20 | 26,20 | Zespół p cherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym | | 30% | 7,86 |
| 2921 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powl., 25 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990017652 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 10,63 | 15,10 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,56 |
| 2922 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. | 5909990017669 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 18,14 | 25,25 | 25,25 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2923 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. (2 blis.po 14 szt.) | 5909990017676 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 32,26 | 43,47 | 43,47 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2924 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powl., 200 mg | 28 tabl. (4 blis.po 7 szt.) | 5909990017751 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,45 | 77,63 | 77,63 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2925 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powl., 25 mg | 28 tabl. | 5909990649556 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 10,68 | 15,15 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,61 |
| 2926 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. | 5909990649570 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 19,70 | 26,92 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 4,64 |
| 2927 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. | 5909990649594 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 30,46 | 41,54 | 41,54 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2928 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powl., 200 mg | 28 tabl. | 5909990649617 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,99 | 78,21 | 78,21 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|------|
| 2929 | Topiramatum | Erudan, tabl. powl., 25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,56 | 16,09 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,55 |
| 2930 | Topiramatum | Erudan, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644148 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 20,52 | 27,79 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,51 |
| 2931 | Topiramatum | Erudan, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644155 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 41,47 | 53,31 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,54 |
| 2932 | Topiramatum | Erudan, tabl. powl., 200 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644162 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 81,65 | 100,32 | 100,32 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2933 | Topiramatum | Etopro, tabl. powl., 200 mg | 28 tabl. | 5909990061464 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 83,16 | 101,93 | 101,93 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2934 | Topiramatum | Etopro, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. | 5909990061471 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 22,68 | 30,10 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,82 |
| 2935 | Topiramatum | Etopro, tabl. powl., 25 mg | 28 tabl. | 5909990061488 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,34 | 15,85 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,31 |
| 2936 | Topiramatum | Etopro, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. | 5909990061495 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 44,28 | 56,33 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 8,56 |
| 2937 | Topiramatum | Oritop, tabl. powl., 25 mg | 1 but. po 60szt. | 5909990715084 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 16,20 | 23,41 | 23,41 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2938 | Topiramatum | Oritop, tabl. powl., 50 mg | 1 but. po 60szt. | 5909990715145 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 30,24 | 41,62 | 41,62 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2939 | Topiramatum | Oritop, tabl. powl., 100 mg | 1 but. po 60szt. | 5909990715169 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 56,70 | 73,94 | 73,94 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2940 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powl., 200 mg | 28 tabl. | 5909990644056 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,45 | 77,63 | 77,63 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2941 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. | 5909990644070 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 32,26 | 43,47 | 43,47 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 2942 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990644094 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 18,14 | 25,24 | 25,24 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2943 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. | 5909990644124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 10,63 | 15,10 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,56 |
| 2944 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990758814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,72 | 16,26 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,72 |
| 2945 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990758913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 23,44 | 30,91 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 8,63 |
| 2946 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990759019 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 46,87 | 59,10 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 11,33 |
| 2947 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990759118 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 93,64 | 113,14 | 101,93 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 14,41 |
| 2948 | Topiramatum | Topamax, kaps., 15 mg | 60 kaps. (poj.) | 5909990861514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 15,67 | 21,13 | 16,38 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,95 |
| 2949 | Topiramatum | Topamax, kaps., 25 mg | 60 kaps. (poj.) | 5909990861613 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 26,13 | 34,03 | 27,30 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 9,93 |
| 2950 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 25 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743377 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 10,63 | 15,10 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,56 |
| 2951 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 50 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743384 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 18,14 | 25,24 | 25,24 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2952 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 100 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743391 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 32,26 | 43,47 | 43,47 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2953 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 200 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743407 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,45 | 77,63 | 77,63 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2954 | Topiramatum | TopiLEK 100, tabl. powł., 0,1 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740802 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 25,92 | 36,68 | 36,68 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|-----------------------------|--|---------|------|
| 2955 | Topiramatum | TopiLEK 200, tabl. powł., 0,2 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 51,84 | 68,42 | 68,42 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2956 | Topiramatum | TopiLEK 25, tabl. powł., 0,025 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740789 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 6,48 | 10,66 | 10,66 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2957 | Topiramatum | TopiLEK 50, tabl. powł., 0,05 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740796 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 12,96 | 19,70 | 19,70 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2958 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990676545 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 12,85 | 17,47 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,93 |
| 2959 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990676552 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 23,54 | 31,02 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 8,74 |
| 2960 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990676569 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 43,18 | 55,15 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,38 |
| 2961 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990676576 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 80,46 | 99,04 | 99,04 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2962 | Topiramatum | Topiramat Bluefish, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. | 5909990779925 | 2012-05-01 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 6,43 | 10,60 | 10,60 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 2963 | Topiramatum | Topiramat Bluefish, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990779970 | 2012-05-01 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 12,91 | 19,65 | 19,65 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 2964 | Topiramatum | Topiramat Bluefish, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. | 5909990780068 | 2012-05-01 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 25,87 | 36,63 | 36,63 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 2965 | Topiramatum | Topiramat Bluefish, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. | 5909990780136 | 2012-05-01 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 51,79 | 68,36 | 68,36 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 2966 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 25 mg | 60 tabl. | 5909990744978 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 12,96 | 19,94 | 19,94 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2967 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 50 mg | 60 tabl. | 5909990744985 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 25,92 | 37,00 | 37,00 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2968 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990744992 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 51,84 | 68,74 | 68,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|-----------|-------|
| 2969 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990745005 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 103,68 | 128,20 | 128,20 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 4,27 |
| 2970 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 200 mg | 30 tabl. | 5909990763344 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 51,84 | 68,74 | 68,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2971 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990763351 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 12,96 | 19,94 | 19,94 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2972 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990763368 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 25,92 | 37,00 | 37,00 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2973 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990763375 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 6,48 | 10,82 | 10,82 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2974 | Topiramatum | Toramat, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671472 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,88 | 16,60 | 13,65 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,15 |
| 2975 | Topiramatum | Toramat, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671489 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 19,44 | 26,87 | 26,87 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2976 | Topiramatum | Toramat, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671496 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 34,56 | 46,25 | 46,25 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2977 | Topiramatum | Toramat, tabl. , 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671502 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 64,80 | 82,60 | 82,60 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 2978 | Torasemidum | Trifas 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990471324 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 37.0, Leki moczop dne - p tlowe | 18,47 | 20,47 | 2,46 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poni ej 12 roku ycia | 30% | 18,75 |
| 2979 | Tramadolom | Adamon SR 100, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936137 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 35,86 | 45,60 | 40,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,34 |
| 2980 | Tramadolom | Adamon SR 100, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936137 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 35,86 | 45,60 | 40,37 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 5,23 |
| 2981 | Tramadolom | Adamon SR 150, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936236 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 52,97 | 65,91 | 60,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 23,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 2982 | Tramadolum | Adamon SR 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936236 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 52,97 | 65,91 | 60,55 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 5,36 |
| 2983 | Tramadolum | Adamon SR 200, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936335 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 67,99 | 83,56 | 80,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 27,05 |
| 2984 | Tramadolum | Adamon SR 200, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936335 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 67,99 | 83,56 | 80,73 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,83 |
| 2985 | Tramadolum | Adamon SR 50, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 50 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936038 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,74 | 24,70 | 20,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,57 |
| 2986 | Tramadolum | Adamon SR 50, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 50 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990936038 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 18,74 | 24,70 | 20,18 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 4,52 |
| 2987 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 10 tabl. | 5909990570799 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,48 | 27,20 | 24,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,25 |
| 2988 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 10 tabl. | 5909990570799 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 20,48 | 27,20 | 24,22 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,98 |
| 2989 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570812 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 61,43 | 75,91 | 72,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 25,05 |
| 2990 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990570812 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 61,43 | 75,91 | 72,66 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 3,25 |
| 2991 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990571086 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,33 | 25,97 | 24,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 9,02 |
| 2992 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990571086 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 19,33 | 25,97 | 24,22 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,75 |
| 2993 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. | 5909990571314 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,04 | 19,05 | 16,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,75 |
| 2994 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. | 5909990571314 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 14,04 | 19,05 | 16,15 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,90 |
| 2995 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990571338 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 37,80 | 48,63 | 48,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 14,72 |
| 2996 | Tramadolum | Noax Uno , tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990571338 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 37,80 | 48,63 | 48,44 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,19 |
| 2997 | Tramadolum | Oratram 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990634354 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,56 | 8,34 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 2998 | Tramadolum | Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990634354 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,56 | 8,34 | 8,07 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,27 |
| 2999 | Tramadolum | Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634378 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,17 | 23,66 | 23,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,10 |
| 3000 | Tramadolum | Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634378 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,17 | 23,66 | 23,66 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3001 | Tramadolum | Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990634392 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 28,62 | 37,85 | 37,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,36 |
| 3002 | Tramadolum | Oratram 100, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990634392 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 28,62 | 37,85 | 37,85 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3003 | Tramadolum | Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990634231 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,18 | 13,16 | 12,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 3004 | Tramadolum | Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990634231 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 9,18 | 13,16 | 12,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,05 |
| 3005 | Tramadolum | Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634255 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,32 | 35,99 | 35,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 10,80 |
| 3006 | Tramadolum | Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634255 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,32 | 35,99 | 35,99 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3007 | Tramadolum | Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990634279 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 45,36 | 57,77 | 57,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 17,33 |
| 3008 | Tramadolum | Oratram 150, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990634279 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 45,36 | 57,77 | 57,77 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3009 | Tramadolum | Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990634293 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,34 | 16,15 | 16,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,85 |
| 3010 | Tramadolum | Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990634293 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 11,34 | 16,15 | 16,15 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3011 | Tramadolum | Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634316 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 34,02 | 44,58 | 44,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,37 |
| 3012 | Tramadolum | Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990634316 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 34,02 | 44,58 | 44,58 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3013 | Tramadolum | Oratram 200, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. | 5909990634330 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólne - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 56,16 | 70,90 | 70,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 21,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 3014 | Tramadolum | Oratram 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. | 5909990634330 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 56,16 | 70,90 | 70,90 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3015 | Tramadolum | Poltram, kaps., 50 mg | 20 kaps. (blis.) | 5909990968718 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 6,84 | 9,71 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,06 |
| 3016 | Tramadolum | Poltram, kaps., 50 mg | 20 kaps. (blis.) | 5909990968718 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 6,84 | 9,71 | 8,07 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,64 |
| 3017 | Tramadolum | Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml | 10 ml | 5909990969012 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - plynne postaci farmaceutyczne | 8,37 | 11,65 | 8,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,72 |
| 3018 | Tramadolum | Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml | 10 ml | 5909990969012 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - plynne postaci farmaceutyczne | 8,37 | 11,65 | 8,47 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 3,18 |
| 3019 | Tramadolum | Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml | 96 ml | 5909990969029 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - plynne postaci farmaceutyczne | 65,28 | 81,34 | 81,34 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,40 |
| 3020 | Tramadolum | Poltram, krople doustne, roztwór, 100 mg/ml | 96 ml | 5909990969029 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - plynne postaci farmaceutyczne | 65,28 | 81,34 | 81,34 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3021 | Tramadolum | Poltram 100, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 2 ml | 5909990968916 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego | 6,08 | 8,97 | 8,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,69 |
| 3022 | Tramadolum | Poltram 100, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 2 ml | 5909990968916 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego | 6,08 | 8,97 | 8,97 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3023 | Tramadolum | Poltram 50, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990968817 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego | 4,17 | 5,77 | 4,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,63 |
| 3024 | Tramadolum | Poltram 50, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990968817 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania pozajelitowego | 4,17 | 5,77 | 4,49 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,28 |
| 3025 | Tramadolum | Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 10 tabl. | 5909990967612 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 5,95 | 8,76 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,11 |
| 3026 | Tramadolum | Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 10 tabl. | 5909990967612 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 5,95 | 8,76 | 8,07 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,69 |
| 3027 | Tramadolum | Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990967629 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 17,68 | 24,21 | 24,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,26 |
| 3028 | Tramadolum | Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990967629 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 17,68 | 24,21 | 24,21 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3029 | Tramadolum | Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 tabl. (5 blis.po 10 szt.) | 5909990967636 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 33,33 | 42,89 | 40,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 14,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 3030 | Tramadolum | Poltram Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990967636 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 33,33 | 42,89 | 40,37 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,52 |
| 3031 | Tramadolum | Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990967711 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 10,11 | 14,16 | 12,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,68 |
| 3032 | Tramadolum | Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990967711 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 10,11 | 14,16 | 12,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,05 |
| 3033 | Tramadolum | Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990967728 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 28,07 | 36,80 | 36,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,37 |
| 3034 | Tramadolum | Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990967728 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 28,07 | 36,80 | 36,33 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,47 |
| 3035 | Tramadolum | Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990967735 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 53,43 | 66,41 | 60,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,03 |
| 3036 | Tramadolum | Poltram Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990967735 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 53,43 | 66,41 | 60,55 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 5,86 |
| 3037 | Tramadolum | Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990967810 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 12,53 | 17,44 | 16,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,14 |
| 3038 | Tramadolum | Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990967810 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 12,53 | 17,44 | 16,15 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,29 |
| 3039 | Tramadolum | Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990967827 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 35,00 | 45,63 | 45,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,69 |
| 3040 | Tramadolum | Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990967827 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 35,00 | 45,63 | 45,63 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3041 | Tramadolum | Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990967834 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 60,36 | 75,41 | 75,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 22,62 |
| 3042 | Tramadolum | Poltram Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990967834 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 60,36 | 75,41 | 75,41 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3043 | Tramadolum | Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990294619 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 8,10 | 11,06 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,41 |
| 3044 | Tramadolum | Tramadol SYNTEZA, kaps. twarde, 50 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990294619 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 8,10 | 11,06 | 8,07 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,99 |
| 3045 | Tramadolum | Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml | 10 ml | 5909990294718 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne | 10,11 | 13,51 | 8,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 3046 | Tramadolum | Tramadol SYNTEZA, krople doustne, 100 mg/ml | 10 ml | 5909990294718 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 10,11 | 13,51 | 8,47 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 5,04 |
| 3047 | Tramadolum | Tramal, kaps. twarde, 50 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990253616 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,85 | 9,73 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,08 |
| 3048 | Tramadolum | Tramal, kaps. twarde, 50 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990253616 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 6,85 | 9,73 | 8,07 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,66 |
| 3049 | Tramadolum | Tramal, czopki, 100 mg | 5 czop. | 5909990253715 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego | 5,16 | 7,67 | 7,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,30 |
| 3050 | Tramadolum | Tramal, czopki, 100 mg | 5 czop. | 5909990253715 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.1. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doodbytniczego | 5,16 | 7,67 | 7,67 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3051 | Tramadolum | Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990253814 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego | 4,17 | 5,77 | 4,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,63 |
| 3052 | Tramadolum | Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990253814 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego | 4,17 | 5,77 | 4,49 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,28 |
| 3053 | Tramadolum | Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 2 ml | 5909990253821 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego | 6,08 | 8,97 | 8,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,69 |
| 3054 | Tramadolum | Tramal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 5 amp.a 2 ml | 5909990253821 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.2. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania pozajelitowego | 6,08 | 8,97 | 8,97 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3055 | Tramadolum | Tramal, krople doustne, 100 mg/ml | 10 ml | 5909990253913 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 8,38 | 11,66 | 8,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,73 |
| 3056 | Tramadolum | Tramal, krople doustne, 100 mg/ml | 10 ml | 5909990253913 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 8,38 | 11,66 | 8,47 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 3,19 |
| 3057 | Tramadolum | Tramal, krople doustne, 100 mg/ml | 96 ml | 5909990253920 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 65,29 | 81,35 | 81,34 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,41 |
| 3058 | Tramadolum | Tramal, krople doustne, 100 mg/ml | 96 ml | 5909990253920 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.4. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 65,29 | 81,35 | 81,34 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,01 |
| 3059 | Tramadolum | Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990786213 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,96 | 8,77 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 3,12 |
| 3060 | Tramadolum | Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990786213 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 5,96 | 8,77 | 8,07 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,70 |
| 3061 | Tramadolum | Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990786220 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3. Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postacie do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,69 | 24,22 | 24,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 7,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 3062 | Tramadolum | Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990786220 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 17,69 | 24,22 | 24,22 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3063 | Tramadolum | Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990786237 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 33,34 | 42,90 | 40,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 14,64 |
| 3064 | Tramadolum | Tramal Retard 100, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990786237 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 33,34 | 42,90 | 40,37 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,53 |
| 3065 | Tramadolum | Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990786312 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,12 | 14,17 | 12,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 5,69 |
| 3066 | Tramadolum | Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990786312 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 10,12 | 14,17 | 12,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 2,06 |
| 3067 | Tramadolum | Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990786329 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 28,08 | 36,81 | 36,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 11,38 |
| 3068 | Tramadolum | Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990786329 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 28,08 | 36,81 | 36,33 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,48 |
| 3069 | Tramadolum | Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990786336 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,44 | 66,41 | 60,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 24,03 |
| 3070 | Tramadolum | Tramal Retard 150, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990786336 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 53,44 | 66,41 | 60,55 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 5,86 |
| 3071 | Tramadolum | Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990786411 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 12,54 | 17,45 | 16,15 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,15 |
| 3072 | Tramadolum | Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990786411 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 12,54 | 17,45 | 16,15 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 1,30 |
| 3073 | Tramadolum | Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990786428 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 35,01 | 45,64 | 45,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,69 |
| 3074 | Tramadolum | Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990786428 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 35,01 | 45,64 | 45,64 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3075 | Tramadolum | Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990786435 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 60,37 | 75,41 | 75,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 22,62 |
| 3076 | Tramadolum | Tramal Retard 200, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990786435 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 60,37 | 75,41 | 75,41 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3077 | Tramadolum | Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg | 10 tabl. | 5909990780303 | 2012-03-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 3,18 | 4,67 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 1,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------------------|--|---|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|--|----|-----------|-------|
| 3078 | Tramadolium | Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg | 10 tabl. | 5909990780303 | 2012-03-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 3,18 | 4,67 | 4,04 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,63 |
| 3079 | Tramadolium | Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg | 30 tabl. | 5909990780334 | 2012-03-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 8,75 | 12,71 | 12,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,23 |
| 3080 | Tramadolium | Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg | 30 tabl. | 5909990780334 | 2012-03-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 8,75 | 12,71 | 12,11 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,60 |
| 3081 | Tramadolium | Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg | 50 tabl. | 5909990780341 | 2012-03-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 14,58 | 20,25 | 20,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 6,12 |
| 3082 | Tramadolium | Tramal Retard 50, tabl. powł. o przedłu onym działaniu, 50 mg | 50 tabl. | 5909990780341 | 2012-03-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 14,58 | 20,25 | 20,18 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 0,07 |
| 3083 | Tramadolium | Tramundin, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. | 5909990947416 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 23,76 | 30,71 | 24,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 13,76 |
| 3084 | Tramadolium | Tramundin, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 100 mg | 30 tabl. | 5909990947416 | 2012-01-01 | 2 lata | 153.3, Opioidowe leki przeciwbólowe - tramadol - postaci do podawania doustnego - stałe postaci farmaceutyczne | 23,76 | 30,71 | 24,22 | Nowotwory zło liwe | | bezpłatny | 6,49 |
| 3085 | Trandolaprilum | Trandolapril Arrow, kaps. twarde, 2 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990641123 | 2012-01-01 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i zło one | 9,55 | 11,81 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 9,42 |
| 3086 | Travoprostum | Travatan, krople do oczu, roztwór, 0,04 mg/ml | 2,5 ml (but.) | 5909990942619 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 46,01 | 57,67 | 48,08 | Jaskra | | ryczałt | 12,79 |
| 3087 | Travoprostum + Timololum | DuoTrav, krople do oczu, roztwór, 0,04+5 mg/ml | 2,5 ml (but.) | 5909990586172 | 2012-01-01 | 2 lata | 214.0, Leki przeciwjaskrowe - analogi prostaglandyn do stosowania do oczu - produkty jednoskładnikowe i zło one | 46,01 | 57,67 | 48,08 | Jaskra | | ryczałt | 12,79 |
| 3088 | Trazodonum | Trittico CR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990715497 | 2012-03-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 54,00 | 64,86 | 38,70 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 37,77 |
| 3089 | Trazodonum | Trittico CR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990918621 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 14,15 | 17,93 | 9,68 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 11,15 |
| 3090 | Trazodonum | Trittico CR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990918720 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 18,90 | 23,75 | 12,90 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,72 |
| 3091 | Triamcinolonum | Polcortolon, tabl. , 4 mg | 20 tabl. | 5909990171316 | 2012-01-01 | 2 lata | 82.6, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - triamcynolon | 6,42 | 9,43 | 9,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 2,83 |
| 3092 | Triptorelinum | Diphereline SR 11,25, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesziny o przedłu onym uwalnianiu do wstrzykiwa , 11,25 mg | 1 fiol. proz. + 1 amp. rozp. + 1 strzyk. + 2 igły | 5909990894413 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin | 873,64 | 970,66 | 970,66 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 9,60 |
| 3093 | Triptorelinum | Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesziny o przedłu onym uwalnianiu do wstrzykiwa , 3,75 mg | Pudełko zawieraj ce 1 fiolk , i 1 ampulk z 1 strzykawk (z polipropylenu) i 2 igłami | 5909990486915 | 2012-01-01 | 2 lata | 129.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - analogi hormonu uwalniaj cego gonadotropin | 289,98 | 330,05 | 301,98 | Nowotwory zło liwe - Rak prostaty | | ryczałt | 31,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|----------|----------|----------|--|--|---------|-------|
| 3094 | Tropicamidum | Tropicamidum WZF 0,5%, krople do oczu, roztwór, 5 mg/ml | 10 ml (2x5 ml) | 5909990125524 | 2012-01-01 | 2 lata | 226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu | 4,57 | 7,92 | 7,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 3095 | Tropicamidum | Tropicamidum WZF 1%, krople do oczu, roztwór, 10 mg/ml | 10 ml (2x5 ml) | 5909990125623 | 2012-01-01 | 2 lata | 226.0, Leki antycholinergiczne do stosowania do oczu | 7,88 | 11,47 | 11,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | ryczałt | 3,20 |
| 3096 | Valganciclovirum | Valcyte, tabl. powl., 450 mg | 60 tabl. (but.) | 5909990727407 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postaci do stosowania doustnego | 5 562,00 | 6 054,23 | 6 054,23 | Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narz dów mi szowych - profilaktyka po zaku czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 110 dni po przeszczepie, Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zaku czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 200 dni po przeszczepie | Zapobieganie i leczenie zaka enia wirusem cytomegalii po transplantacji narz dów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku ycia; Zaka enie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom ko czyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zaku czeniu hospitalizacji zwi zanej z transplantacj do 110 dni po przeszczepie | ryczałt | 3,20 |
| 3097 | Valsartanum | Avasart, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990773695 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 3098 | Valsartanum | Avasart, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990773763 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | | 30% | 8,83 |
| 3099 | Valsartanum | Axudan, tabl. powl., 0,08 g | 28 tabl. | 5909990830961 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 11,58 | 16,43 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 5,32 |
| 3100 | Valsartanum | Axudan, tabl. powl., 0,16 g | 28 tabl. | 5909990831067 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,52 |
| 3101 | Valsartanum | Bespres, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990751594 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 5,64 |
| 3102 | Valsartanum | Bespres, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990751877 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 23,50 | 31,47 | 31,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,44 |
| 3103 | Valsartanum | Diovan, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. | 5909990929115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 43,20 | 50,27 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 39,16 |
| 3104 | Valsartanum | Diovan, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. | 5909990929214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 46,44 | 56,00 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 33,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 3105 | Valsartanum | Diovan, tabl. powl., 160 mg | 14 tabl. | 5909990929238 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 29,47 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,36 |
| 3106 | Valsartanum | Nortivan, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990726776 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,82 | 18,83 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,72 |
| 3107 | Valsartanum | Nortivan, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990726844 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 26,46 | 34,62 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,40 |
| 3108 | Valsartanum | Tensart, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990681877 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,82 | 19,91 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,80 |
| 3109 | Valsartanum | Tensart, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990682065 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 30,15 | 38,57 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 16,35 |
| 3110 | Valsartanum | Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990074969 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,52 |
| 3111 | Valsartanum | Valsacor 160, tabl. powl., 160 mg | 60 tabl. | 5909990818983 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 47,52 | 60,79 | 60,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,24 |
| 3112 | Valsartanum | Valsacor 320, tabl. powl., 320 mg | 28 tabl. | 5909990779147 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 47,00 | 59,87 | 59,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 17,96 |
| 3113 | Valsartanum | Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990074945 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,28 | 22,53 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,42 |
| 3114 | Valsartanum | Valsacor 80, tabl. powl., 80 mg | 60 tabl. | 5909990818853 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 25,16 | 33,51 | 33,51 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,05 |
| 3115 | Valsartanum | Valsargen, kaps. twarde, 80 mg | 28 kaps. | 5909990856954 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,68 |
| 3116 | Valsartanum | Valsargen, kaps. twarde, 160 mg | 28 kaps. | 5909990857081 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,83 |
| 3117 | Valsartanum | Valsotens, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990693276 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 18,36 | 25,96 | 25,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 3118 | Valsartanum | Valtap, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. | 5909990804542 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 3119 | Valsartanum | Valtap, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. | 5909990804580 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,83 |
| 3120 | Valsartanum | Valzek, tabl., 80 mg | 28 tabl. | 5909990681761 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,64 |
| 3121 | Valsartanum | Valzek, tabl., 160 mg | 28 tabl. | 5909990681785 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,52 |
| 3122 | Valsartanum | Vanatex, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. | 5909990827459 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 3123 | Valsartanum | Vanatex, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. | 5909990827480 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,83 |
| 3124 | Valsartanum | Zelvartan, tabl. powl., 80 mg | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990688531 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 27,76 | 33,74 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,63 |
| 3125 | Valsartanum | Zelvartan, tabl. powl., 160 mg | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990688722 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,84 | 37,17 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,95 |
| 3126 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Axudan HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990829927 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,58 | 16,43 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,32 |
| 3127 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Axudan HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990829989 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 3128 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Axudan HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. | 5909990830107 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 3129 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Bespres, tabl. powl., 80 + 12,5 mg | 28 tabl. (2 blistry po 14szt.) | 5909990740833 | 2012-07-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 3130 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg | 14 tabl. (2 blist. po 7 szt.) | 5909990740857 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,64 |
| 3131 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Bespres, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. | 5909990740864 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,50 | 31,47 | 31,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,44 |
| 3132 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Bespres, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990874255 | 2012-03-01 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 25,60 | 33,70 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 11,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 3133 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Diovan, tabl. powl., 160+25 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909991062927 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 34,09 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 22,98 |
| 3134 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Nortivan, tabl. powl., 80+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990772292 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,04 | 19,07 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 7,96 |
| 3135 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Nortivan, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990772452 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 36,36 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 14,14 |
| 3136 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Nortivan, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. | 5909990772506 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 36,36 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 14,14 |
| 3137 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Valsacor, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990740246 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 3138 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-Valsacor, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. | 5909990740277 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 3139 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-valsacor, tabl. powl., 320+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990847464 | 2012-05-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 47,00 | 59,87 | 59,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 17,96 |
| 3140 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Co-valsacor, tabl. powl., 320+25 mg | 28 tabl. | 5909990847501 | 2012-05-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 47,00 | 59,87 | 59,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 17,96 |
| 3141 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Tensart HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990704132 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 30,15 | 38,57 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 16,35 |
| 3142 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Tensart HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990704262 | 2012-01-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 30,15 | 38,57 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 16,35 |
| 3143 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valsotens HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. powl. | 5909990877201 | 2012-07-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,55 | 29,37 | 29,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,81 |
| 3144 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valsotens HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. powl. | 5909990877386 | 2012-07-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,55 | 29,37 | 29,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,81 |
| 3145 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990801961 | 2012-05-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,83 |
| 3146 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 28 tabl. | 5909990802005 | 2012-05-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 8,83 |
| 3147 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Valtap HCT, tabl. powl., 160+25 mg | 14 tabl. | 5909990813995 | 2012-05-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 4,68 |
| 3148 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Vanatex HCT, tabl. powl., 80+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990862351 | 2012-05-01 | 2 lata | 45,0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 5,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------------------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|-----|-------|
| 3149 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Vanatex HCT, tabl. powł., 160+12,5 mg | 28 tabl. | 5909990862375 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 3150 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Vanatex HCT, tabl. powł., 160+25 mg | 28 tabl. | 5909990862399 | 2012-05-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 9,52 |
| 3151 | Valsartanum + Hydrochlorothiazidum | Zelvartancombo, tabl. powł., 160/25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990761302 | 2012-01-01 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,30 | 36,60 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | 30% | 14,38 |
| 3152 | Venlafaxinum | Alventa, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047895 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 25,92 | 33,44 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,48 |
| 3153 | Venlafaxinum | Alventa, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047956 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 49,68 | 61,93 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 24,00 |
| 3154 | Venlafaxinum | Axyven, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990660636 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 10,69 | 15,08 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 5,60 |
| 3155 | Venlafaxinum | Axyven, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990660643 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 21,71 | 28,94 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 9,98 |
| 3156 | Venlafaxinum | Axyven, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990660650 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 36,94 | 48,30 | 48,30 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,49 |
| 3157 | Venlafaxinum | Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 28 kaps. | 5909990715299 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 9,72 | 14,04 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 4,56 |
| 3158 | Venlafaxinum | Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. | 5909990715350 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 18,90 | 25,93 | 25,93 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 7,78 |
| 3159 | Venlafaxinum | Efevelon SR, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990715374 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 39,25 | 50,78 | 50,78 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 15,23 |
| 3160 | Venlafaxinum | Effectin ER 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990494019 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 75,60 | 89,67 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 51,74 |
| 3161 | Venlafaxinum | Effectin ER 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990493913 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 50,98 | 60,26 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 41,30 |
| 3162 | Venlafaxinum | Faxigen XL 150 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990721528 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 37,80 | 49,22 | 49,22 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 14,77 |
| 3163 | Venlafaxinum | Faxigen XL 37,5 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990721498 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 11,88 | 16,35 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 6,87 |
| 3164 | Venlafaxinum | Faxigen XL 75 mg, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990721504 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 22,68 | 29,98 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 11,02 |
| 3165 | Venlafaxinum | Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 28 kaps. | 5909990691760 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 11,88 | 16,35 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 6,87 |
| 3166 | Venlafaxinum | Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. | 5909990691883 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 48,60 | 60,78 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 22,85 |
| 3167 | Venlafaxinum | Faxolet ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. | 5909990691906 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 23,76 | 31,13 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 12,17 |
| 3168 | Venlafaxinum | Jarvis 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990075522 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 41,96 | 53,98 | 53,98 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 16,19 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|-------------------------------|---------------|------------|--------|--------------------------------------|-------|--------|--------|---|----|-----|-------|
| 3169 | Venlafaxinum | Jarvis 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990077359 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 22,68 | 30,20 | 29,03 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 9,88 |
| 3170 | Venlafaxinum | Lafactin, kaps., 37,5 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990673728 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 19,76 | 24,77 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 15,29 |
| 3171 | Venlafaxinum | Lafactin, kaps., 75 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990673766 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 31,18 | 39,07 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 20,11 |
| 3172 | Venlafaxinum | Lafactin, kaps., 150 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990673803 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 58,35 | 71,21 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 33,28 |
| 3173 | Venlafaxinum | Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. | 5909990795789 | 2012-05-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 12,96 | 19,57 | 19,57 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 5,87 |
| 3174 | Venlafaxinum | Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 98 kaps. | 5909990795796 | 2012-05-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 43,20 | 58,21 | 58,21 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 17,46 |
| 3175 | Venlafaxinum | Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 28 kaps. | 5909990795802 | 2012-05-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 6,48 | 10,57 | 10,57 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 3,17 |
| 3176 | Venlafaxinum | Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 98 kaps. | 5909990795819 | 2012-07-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 22,14 | 31,81 | 31,81 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 9,54 |
| 3177 | Venlafaxinum | Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. | 5909990795826 | 2012-05-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 22,68 | 33,04 | 33,04 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 9,91 |
| 3178 | Venlafaxinum | Oriven, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 98 kaps. | 5909990795833 | 2012-05-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 78,84 | 100,34 | 100,34 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 30,10 |
| 3179 | Venlafaxinum | Prefaxine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990727490 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 11,34 | 15,77 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 6,29 |
| 3180 | Venlafaxinum | Prefaxine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990727506 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 22,68 | 29,98 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 11,02 |
| 3181 | Venlafaxinum | Prefaxine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990727520 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 45,36 | 57,31 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 19,38 |
| 3182 | Venlafaxinum | Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990048106 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 54,00 | 66,56 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 28,63 |
| 3183 | Venlafaxinum | Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990048397 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 21,06 | 28,24 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 9,28 |
| 3184 | Venlafaxinum | Symfaksin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 37,5 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990048403 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 16,41 | 20,35 | 9,68 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 13,57 |
| 3185 | Venlafaxinum | Velafax, tabl. , 37,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991093815 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 17,60 | 22,47 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 12,99 |
| 3186 | Venlafaxinum | Velafax, tabl. , 37,5 mg | 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) | 5909991093822 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 36,02 | 44,25 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 25,29 |
| 3187 | Venlafaxinum | Velafax, tabl. , 75 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991093914 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 32,62 | 40,60 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 21,64 |
| 3188 | Venlafaxinum | Velafax, tabl. , 75 mg | 56 tabl. (4 blist.po 14 szt.) | 5909991093921 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 67,77 | 81,29 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 43,36 |
| 3189 | Venlafaxinum | Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 75 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990626670 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 30,51 | 38,36 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 19,40 |
| 3190 | Venlafaxinum | Velafax XL, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 28 kaps. (blist.) | 5909990626724 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 58,61 | 71,48 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umyslowne | | 30% | 33,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|--------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 3191 | Venlafaxinum | Velaxin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990055982 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 19,54 | 24,55 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 15,07 |
| 3192 | Venlafaxinum | Velaxin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990056279 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 29,44 | 37,21 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 18,25 |
| 3193 | Venlafaxinum | Velaxin ER, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990056293 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 59,86 | 72,83 | 54,18 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 34,90 |
| 3194 | Venlafaxinum | Venlabax MR 150, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990719327 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 30,00 | 40,87 | 40,87 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 12,26 |
| 3195 | Venlafaxinum | Venlabax MR 75, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990719259 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 15,00 | 21,76 | 21,76 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 6,53 |
| 3196 | Venlafaxinum | Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 75 mg | 28 kaps. | 5909990767601 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 14,58 | 21,30 | 21,30 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 6,39 |
| 3197 | Venlafaxinum | Venlafaxine Bluefish XL, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 28 kaps. | 5909990767625 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 25,92 | 36,51 | 36,51 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 10,95 |
| 3198 | Venlafaxinum | Venlectine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 37,5 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990040971 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 10,26 | 14,62 | 13,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 5,14 |
| 3199 | Venlafaxinum | Venlectine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 75 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990040995 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 19,98 | 27,09 | 27,09 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 8,13 |
| 3200 | Venlafaxinum | Venlectine, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 28 kaps. | 5909990424672 | 2012-01-01 | 2 lata | 187.0, Leki przeciwdepresyjne - inne | 39,96 | 51,53 | 51,53 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | 30% | 15,46 |
| 3201 | Verapamilum | Staveran 120, tabl. powł., 120 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990045419 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenoloalkiloaminy - werapamil | 2,08 | 3,11 | 3,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,11 |
| 3202 | Verapamilum | Staveran 40, tabl. powł., 40 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990045211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenoloalkiloaminy - werapamil | 2,08 | 2,52 | 1,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 2,52 |
| 3203 | Verapamilum | Staveran 80, tabl. powł., 80 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990045310 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenoloalkiloaminy - werapamil | 2,08 | 2,82 | 2,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 2,82 |
| 3204 | Vigabatrinum | Sabril, tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909990312818 | 2012-01-01 | 2 lata | 162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - stałe postacie farmaceutyczne | 221,40 | 255,32 | 255,32 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 3205 | Vigabatrinum | Sabril, granulat do sporz dzania roztworu doustnego, 500 mg | 50 sasz. | 5909990832712 | 2012-01-01 | 2 lata | 162.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - płynne postacie farmaceutyczne | 120,96 | 144,40 | 144,40 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |
| 3206 | Vigabatrinum | Sabril, tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909997198040 | 2012-03-01 | 2 lata | 162.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - wigbatryna - stałe postacie farmaceutyczne | 203,04 | 235,68 | 235,68 | Padaczka oporna na leczenie | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|------|------------------|---|-------------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---|----|-----------|-------|
| 3207 | Warfarinum | Warfin, tabl. , 3 mg | 100 tabl. (słoik) | 5909990622368 | 2012-01-01 | 2 lata | 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K | 14,02 | 17,73 | 10,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 11,94 |
| 3208 | Warfarinum | Warfin, tabl. , 5 mg | 100 tabl. (słoik) | 5909990622382 | 2012-01-01 | 2 lata | 21.0, Leki przeciwzakrzepowe z grupy antagonistów witaminy K | 22,47 | 28,01 | 16,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | | ryczałt | 18,36 |
| 3209 | Ziprasidonum | Zipragen, kaps. twarde, 80 mg | 56 kaps. twardych | 5909990773350 | 2012-03-01 | 2 lata | 178.9, Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon | 230,93 | 265,78 | 265,78 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,97 |
| 3210 | Ziprasidonum | Zypsila, kaps. twarde, 80 mg | 56 kaps. (4 blist.po 14 szt.) | 5909990681228 | 2012-01-01 | 2 lata | 178.9, Leki przeciwpsychotyczne - zyprasydon | 216,00 | 249,80 | 249,80 | Schizofrenia | | ryczałt | 5,97 |
| 3211 | Zuclopenthixolum | Clopixol, tabl. powl., 10 mg | 100 tabl. | 5909990126729 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 27,44 | 34,38 | 21,12 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 13,26 |
| 3212 | Zuclopenthixolum | Clopixol, tabl. powl., 25 mg | 100 tabl. | 5909990126828 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.4, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 41,04 | 52,80 | 52,80 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |
| 3213 | Zuclopenthixolum | Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwa , 200 mg/ml | 1 amp.a 1 ml | 5909990189212 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego | 14,40 | 19,56 | 14,76 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 4,80 |
| 3214 | Zuclopenthixolum | Clopixol Depot, roztwór do wstrzykiwa , 200 mg/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990189229 | 2012-01-01 | 2 lata | 179.5, Leki przeciwpsychotyczne - zuklopentyksol do podawania pozajelitowego | 123,77 | 147,55 | 147,55 | Choroby psychiczne lub upo ledzenia umysłowe | | bezpłatny | 0,00 |

A 1a. Leki refundowane dostępne w aptece na receptę we wskazaniach pozarejestacyjnych

| lp. | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin wejścia w życie decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena detaliczna | Wysokość limitu finansowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Zakres wskazań pozarejestacyjnych objętych refundacją | Poziomota opłatności | Wysokość dopłaty wliczenia -biory |
|-----|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---|---|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|---|---|----------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Acebutololum | Sectral 200, tabl. powł., 200 mg | 30 tabl. | 5909990109920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,36 | 9,73 | 2,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 9,73 |
| 2 | Acebutololum | Sectral 400, tabl. powł., 400 mg | 30 tabl. | 5909990110018 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,74 | 18,38 | 5,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 16,18 |
| 3 | Aciclovirum | Hascovir, tabl., 800 mg | 30 tabl. (2 blist. po 15 szt.) | 5909990835782 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2, Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 32,40 | 43,33 | 43,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 21,67 |
| 4 | Aciclovirum | Hascovir, tabl., 200 mg | 30 tabl. (2 blist. po 15 szt.) | 5909991049515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2, Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 9,90 | 14,17 | 12,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfocytarnej; Leczenie i profilaktyka zakażeń EBV i CMV - u dzieci do 18 roku życia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zakażenia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 7,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 5 | Aciclovirum | Hascovir, tabl., 400 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991052218 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 16,76 | 23,55 | 23,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 11,78 |
| 6 | Aciclovirum | Heviran, tabl. powl., 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990840014 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 12,10 | 16,53 | 12,57 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 10,25 |
| 7 | Aciclovirum | Heviran, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990840113 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2. Leki przeciwvirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 21,60 | 28,73 | 25,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej; Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 16,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 8 | Aciclovirum | Heviran, tabl. powł., 800 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990840229 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 115.2, Leki przeciwwirusowe - acyklowir - postaci do stosowania doustnego | 38,88 | 50,26 | 50,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e wirusowych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej.Leczenie i profilaktyka zaka e EBV i CMV - u dzieci do 18 roku ycia; Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego; Profilaktyka zaka enia wirusami Herpes u biorców przeszczepów | 50% | 25,13 |
| 9 | Acidum folicum | Acidum Folicum Richter, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990109210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 1,57 | 1,97 | 1,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 1,97 |
| 10 | Acidum folicum | Acidum Folicum Richter, tabl. , 15 mg | 30 tabl. | 5909990109319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 2,00 | 2,99 | 2,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 2,99 |
| 11 | Acidum folicum | Folacid , tabl. , 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990960811 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 1,57 | 1,97 | 1,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 1,97 |
| 12 | Acidum folicum | Folacid , tabl. , 15 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990960910 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 27.0, Kwas foliowy i pochodne - kwas foliowy | 2,01 | 3,00 | 2,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | U chorych przyjmuj cych metotreksat w schorzeniach reumatycznych - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,00 |
| 13 | Acidum mycophenolicum | Myfortic, tabl. , 360 mg | 120 tabl. | 5909990219209 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 821,66 | 912,64 | 889,13 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 26,71 |
| 14 | Acidum mycophenolicum | Myfortic, tabl. , 180 mg | 120 tabl. | 5909990219797 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujace - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 397,87 | 448,70 | 444,56 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 7,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 15 | Allopurinolum | Allupol, tabl. , 100 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990109418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol | 5,00 | 7,75 | 7,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 16 | Allopurinolum | Milurit, tabl. , 100 mg | 50 tabl. | 5909990163212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol | 5,94 | 8,77 | 8,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 17 | Allopurinolum | Milurit, tabl. , 300 mg | 30 tabl. | 5909990414819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 145.0, Leki stosowane w leczeniu dny - allopurynol | 10,80 | 15,35 | 15,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Hiperurykemia; Zespół zaburze biochemicznych w przebiegu ostrego rozpadu nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 18 | Amiloridum + Hydrochlorothiazidum | Tialorid, tabl. , 5+50 mg | 50 tabl. (poj.plast.w pudeł.) | 5909990206025 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,59 | 9,17 | 9,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,75 |
| 19 | Amiloridum + Hydrochlorothiazidum | Tialorid mite, tabl. , 2,5+25 mg | 50 tabl. (poj.plast.w pudeł.) | 5909990373819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,19 | 7,34 | 6,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze oraz przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,04 |
| 20 | Amiodaronum | Opacorden, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990086818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 31.0, Leki przeciwyrtmiczne klasy III - amiodaron | 14,69 | 20,37 | 20,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia rytmu serca w przebiegu WPW, migotanie i trzepotanie przedsionków, napadowe tachyarytmie nadkomorowe, cz stoskurcz komorowy oraz migotanie komór u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,40 |
| 21 | Amlodipinum | Adipine, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990642267 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 22 | Amlodipinum | Adipine, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990642311 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,51 | 8,27 | 8,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,48 |
| 23 | Amlodipinum | Agen 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991099022 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,10 | 16,95 | 16,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,09 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|------|
| 24 | Amlodipinum | Agen 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991098926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,94 | 8,73 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,70 |
| 25 | Amlodipinum | Aldan, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991008635 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 8,10 | 11,05 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,02 |
| 26 | Amlodipinum | Aldan, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991008734 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,88 | 17,78 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,71 |
| 27 | Amlodipinum | Amlodipine Arrow 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990057399 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 9,72 | 14,40 | 14,40 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,32 |
| 28 | Amlodipinum | Amlodipine Arrow 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990057351 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,97 | 7,70 | 7,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,31 |
| 29 | Amlodipinum | Amlodipine Teva, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990721580 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,97 | 7,70 | 7,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,31 |
| 30 | Amlodipinum | Amlodipine Teva, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990721603 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 31 | Amlodipinum | Amlomyl, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990842476 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,08 | 7,82 | 7,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 32 | Amlodipinum | Amlomyl, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990842698 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 33 | Amlodipinum | Amlonor, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990642618 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,18 | 7,91 | 7,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,37 |
| 34 | Amlodipinum | Amlonor, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990642625 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 10,80 | 15,55 | 15,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,67 |
| 35 | Amlodipinum | Amlopin 10 mg, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990048977 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 15,12 | 20,18 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 8,11 |
| 36 | Amlodipinum | Amlopin 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990048939 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 8,64 | 11,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,59 |
| 37 | Amlodipinum | Amlozek, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990799718 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,96 | 16,24 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 10,21 |
| 38 | Amlodipinum | Amlozek, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990799817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 17,82 | 23,07 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 11,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|------|
| 39 | Amlodipinum | Apo-Amlo 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990565993 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,80 | 16,62 | 16,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,99 |
| 40 | Amlodipinum | Apo-Amlo 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990565986 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,96 | 8,76 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,73 |
| 41 | Amlodipinum | Cardilopin, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990907311 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 4,95 | 6,55 | 4,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 3,53 |
| 42 | Amlodipinum | Cardilopin, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990907410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 9,94 | 13,01 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 6,98 |
| 43 | Amlodipinum | Cardilopin, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990907519 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 16,46 | 21,61 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 9,54 |
| 44 | Amlodipinum | Finamlox, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990794461 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,23 | 16,02 | 16,02 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,81 |
| 45 | Amlodipinum | Lofral 10, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990636075 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 12,54 | 17,42 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 46 | Amlodipinum | Lofral 5, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990636068 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,94 | 8,73 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,70 |
| 47 | Amlodipinum | Normodipine, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990993017 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 6,24 | 9,06 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 3,03 |
| 48 | Amlodipinum | Normodipine, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990993116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,34 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 4,84 |
| 49 | Amlodipinum | Tenox, tabl. , 5 mg | 90 tabl. | 5909990421824 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 26,46 | 33,55 | 25,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 15,45 |
| 50 | Amlodipinum | Tenox, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990963010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 9,18 | 12,19 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 6,16 |
| 51 | Amlodipinum | Tenox, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990963119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 16,74 | 21,90 | 17,24 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 9,83 |
| 52 | Amlodipinum | Vilpin, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990621217 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,83 | 8,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 2,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------|--|----------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 53 | Amlodipinum | Vilpin, tabl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991042912 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,99 | 16,83 | 16,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia; W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | 30% | 5,05 |
| 54 | Aprepitantum | Emend, kaps., 0,125 g ;0,08 g (1+2 tabl.) mg | 3 kaps. (1 x 0,125g + 2 x 0,08g) | 5909990007387 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 8.0, Leki przeciwwymiotne - inne - aprepitant | 210,60 | 243,48 | 243,48 | Wczesne albo opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem cisplatyny w dawce >70 mg/m ² – profilaktyka | Wczesne lub opó nione wymioty u osób dorosłych zwi zane z silnie emetogenn chemioterapi z zastosowaniem doksorubicyny i cyklofosfamidu - profilaktyka | ryczałt | 3,20 |
| 55 | Atenololum | Atenolol Sanofi 25, tabl., 25 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990370610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 2,40 | 3,60 | 3,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 56 | Atenololum | Atenolol Sanofi 50, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990011414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 2,15 | 3,33 | 3,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 57 | Atorvastatinum | Apo-Atorva, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787586 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,13 | 11,57 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 4,77 |
| 58 | Atorvastatinum | Apo-Atorva, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787609 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,28 | 22,08 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,48 |
| 59 | Atorvastatinum | Apo-Atorva, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787647 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 32,54 | 42,06 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 14,87 |
| 60 | Atorvastatinum | Atorgamma, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. | 5909990792290 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 9,23 | 9,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,77 |
| 61 | Atorvastatinum | Atorgamma, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. | 5909990792573 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,88 | 17,37 | 17,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 5,21 |
| 62 | Atorvastatinum | Atorgamma, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. | 5909990792887 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 23,76 | 32,66 | 32,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,80 |
| 63 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powl., 10 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990336647 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływajace na gospodark lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 30,24 | 38,41 | 29,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 18,01 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 64 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powl., 20 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990419173 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 45,36 | 57,78 | 57,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 17,33 |
| 65 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. | 5909990623464 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,70 | 39,03 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,84 |
| 66 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990991815 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,34 | 15,00 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,20 |
| 67 | Atorvastatinum | Atoris, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990991914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,66 | 21,42 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,82 |
| 68 | Atorvastatinum | Atorvasterol, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990077847 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,18 | 14,82 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,02 |
| 69 | Atorvastatinum | Atorvasterol, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990077939 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,82 | 23,74 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,14 |
| 70 | Atorvastatinum | Atorvasterol, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078028 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 35,64 | 45,38 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,19 |
| 71 | Atorvastatinum | ATORVOX, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573547 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 32,18 | 41,67 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,48 |
| 72 | Atorvastatinum | Atorvox, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573400 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,04 | 13,60 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,80 |
| 73 | Atorvastatinum | Atorvox, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990573530 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,29 | 21,02 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,42 |
| 74 | Atorvastatinum | Atorvox, tabl. powl., 80 mg | 30 tabl. | 5909990849390 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 67,61 | 83,16 | 77,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 28,77 |
| 75 | Atorvastatinum | Atractin, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078141 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,75 | 12,23 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,43 |
| 76 | Atorvastatinum | Atractin, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078264 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,66 | 21,42 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 77 | Atorvastatinum | Atractin, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (blisł.) | 5909990078356 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,70 | 39,03 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,84 |
| 78 | Atorvastatinum | Atrox 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909991124618 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,64 | 12,11 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,31 |
| 79 | Atorvastatinum | Atrox 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909991124717 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,42 | 22,23 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,63 |
| 80 | Atorvastatinum | Atrox 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909991124816 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 30,24 | 39,60 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,41 |
| 81 | Atorvastatinum | Corator, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (2 blisł.po 15 szt.) | 5909991150914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,80 | 14,42 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,62 |
| 82 | Atorvastatinum | Corator, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909991151010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,23 | 23,10 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,50 |
| 83 | Atorvastatinum | Corator, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909991151119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,27 | 40,70 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,51 |
| 84 | Atorvastatinum | Lambrinex, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990905508 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,38 | 8,62 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,59 |
| 85 | Atorvastatinum | Lambrinex, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990905638 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,80 | 16,22 | 16,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,87 |
| 86 | Atorvastatinum | Lambrinex, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990905782 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 21,60 | 30,35 | 30,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,11 |
| 87 | Atorvastatinum | Larus, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909990078530 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,18 | 12,69 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,89 |
| 88 | Atorvastatinum | Larus, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909990078707 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,20 | 22,00 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,40 |
| 89 | Atorvastatinum | Larus, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blisł.po 10 szt.) | 5909990078790 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 37,80 | 47,69 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 20,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 90 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755547 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,62 | 8,87 | 8,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,66 |
| 91 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powł., 80 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755554 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 44,93 | 58,90 | 58,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 17,67 |
| 92 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755561 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,23 | 16,68 | 16,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,00 |
| 93 | Atorvastatinum | Storvas, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990755578 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 22,46 | 31,27 | 31,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,38 |
| 94 | Atorvastatinum | Torvacard 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338290 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 12,42 | 16,16 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,36 |
| 95 | Atorvastatinum | Torvacard 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338368 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 20,84 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,24 |
| 96 | Atorvastatinum | Torvacard 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338436 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,70 | 39,03 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,84 |
| 97 | Atorvastatinum | Torvacard 40, tabl. powł., 40 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990338443 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 80,83 | 99,73 | 99,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 29,92 |
| 98 | Atorvastatinum | Torvalipin, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053179 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,80 | 14,42 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,62 |
| 99 | Atorvastatinum | Torvalipin, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053230 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 13,74 | 19,36 | 19,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,81 |
| 100 | Atorvastatinum | Torvalipin, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990053278 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 29,54 | 38,85 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,66 |
| 101 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990998814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,04 | 17,89 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,09 |
| 102 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powł., 0,01 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990998821 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 28,08 | 34,71 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 21,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 103 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powl., 0,01 g | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990998838 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 42,12 | 51,12 | 29,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 30,72 |
| 104 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powl., 0,02 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990998913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 18,36 | 24,31 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,71 |
| 105 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powl., 0,02 g | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990998920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 36,72 | 46,53 | 38,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 19,34 |
| 106 | Atorvastatinum | Tulip, tabl. powl., 0,02 g | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990998937 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 57,24 | 70,49 | 58,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 29,69 |
| 107 | Atorvastatinum | Xavitor, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078448 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,78 | 13,33 | 9,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,53 |
| 108 | Atorvastatinum | Xavitor, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990078622 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 18,61 | 24,58 | 19,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,98 |
| 109 | Azathioprinum | Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg | 50 tabl. | 5909990232819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 22,68 | 30,41 | 30,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, płamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 110 | Azathioprinum | Azathioprine VIS, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990232826 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140,0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 17,28 | 22,90 | 18,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, płamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczyń - u dzieci do 18 roku życia; Choroby autoimmunizacyjne inne niż wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 7,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 111 | Azathioprinum | Imuran, tabl. powł., 25 mg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909990144211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 31,21 | 39,53 | 30,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 12,32 |
| 112 | Azathioprinum | Imuran, tabl. powł., 50 mg | 100 tabl. (4 blist.po 25 szt.) | 5909990277810 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 140.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - azatiopryna | 50,22 | 63,09 | 60,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nieswoiste zapalenie jelit, nefropatia IgA, plamica Henocha-Schoenleina, nefropatia toczniowa oraz zapalenie naczy - u dzieci do 18 roku ycia; Choroby autoimmunizacyjne inne ni wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 5,83 |
| 113 | Benazeprilum | Lotensin, tabl. powł., 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990118816 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 18,40 | 3,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 17,87 |
| 114 | Benazeprilum | Lotensin, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990118915 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,76 | 25,38 | 7,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 21,91 |
| 115 | Benazeprilum | Lotensin, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990119011 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,76 | 34,40 | 14,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 27,45 |
| 116 | Budesonidum | Budiair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (z ustnikiem) | 5909990335169 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 58,58 | 73,03 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 23,06 |
| 117 | Budesonidum | Budiair, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+kom.inh.) | 5909990335176 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 60,48 | 75,06 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 25,09 |
| 118 | Budesonidum | Entocort, kaps. o przedfu onym uwalnianiu, twarde, 3 mg | 100 kaps. | 5909990430314 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 11.0, Kortykosteroidy do stosowania doustnego o działaniu miejscowym na przewód pokarmowy - budesonid | 246,24 | 282,56 | 282,56 | Choroba Le niowskiego-Crohna | Choroba Le niowskiego-Crohna u dzieci do 8 roku ycia; Posta jelitowa choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi | ryczałt | 3,56 |
| 119 | Budesonidum | Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 200 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990926213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 19,19 | 25,54 | 21,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 10,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|--|-------------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|-------|--|------------------------------------|---------|-------|
| 120 | Budesonidum | Miflonide, proszek do inhalacji w kaps., 400 mcg | 60 kaps. (+ inh.) | 5909990926312 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 32,78 | 42,83 | 42,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 12,85 |
| 121 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 100, proszek do inhalacji, 100 mcg | 1 poj.a 200 daw. (zest. startowy) | 5909990337354 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 42,12 | 51,95 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 26,97 |
| 122 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 200, proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (zest. startowy) | 5909990337323 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 63,72 | 78,53 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 28,56 |
| 123 | Budesonidum | Neplit Easyhaler 400, proszek do inhalacji, 400 mcg | 1 poj.a 100 daw. (zest. startowy) | 5909990337286 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 51,84 | 65,81 | 65,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 19,74 |
| 124 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,125 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.2, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w niskich dawkach | 72,34 | 89,64 | 89,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 125 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445714 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.3, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w rednich dawkach | 72,90 | 90,30 | 90,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 126 | Budesonidum | Pulmicort, zawiesina do nebulizacji, 0,5 mg/ml | 20 poj.a 2 ml | 5909990445813 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.4, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - postacie płynne do nebulizacji w wysokich dawkach | 94,85 | 113,85 | 90,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 50,19 |
| 127 | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 100 mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 200 daw. | 5909990677313 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 35,89 | 45,29 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 20,31 |
| 128 | Budesonidum | Pulmicort Turbuhaler, proszek do inhalacji, 200 mcg/dawk inhalacyjn | 1 poj.a 100 daw. | 5909990677412 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 32,25 | 41,39 | 35,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 16,41 |
| 129 | Budesonidum | Ribupspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj. (z ustnik.) | 5909990335183 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 58,58 | 73,03 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 23,06 |
| 130 | Budesonidum | Ribupspir, aerozol wziewny, roztwór, 200 mcg | 1 poj. (z komor inhal.) | 5909990335190 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 60,48 | 75,06 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 25,09 |
| 131 | Budesonidum | Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. (+inhal.Novolizer) | 5909991033224 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 64,26 | 79,11 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 29,14 |
| 132 | Budesonidum | Tafen Novolizer 200 (Budelin Novolizer 200), proszek do inhalacji, 200 mcg | 1 poj.a 200 daw. | 5909991033248 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 200.1, Wziewne kortykosteroidy - produkty jednoskładnikowe - proszki i aerozole | 61,02 | 75,63 | 71,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Wirusowe zapalenie krtani u dzieci | 30% | 25,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 133 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 8 mg | 14 tabl. (blis.) | 5909990430017 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,17 | 25,06 | 7,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 19,50 |
| 134 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 8 mg | 28 tabl. (blis.) | 5909990430024 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 40,48 | 47,35 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 36,24 |
| 135 | Candesartanum | Atacand, tabl. , 16 mg | 28 tabl. (2 blis. po 14 szt.) | 5909990430123 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 40,24 | 49,37 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 27,15 |
| 136 | Candesartanum | Karbis, tabl. , 8 mg | 28 tabl. | 5909990772162 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 27,15 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 16,04 |
| 137 | Candesartanum | Karbis, tabl. , 16 mg | 28 tabl. | 5909990772193 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 29,16 | 37,51 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,29 |
| 138 | Captoprilum | Captopril Polfarmex, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blis. po 10 szt.) | 5909990495238 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 2,53 | 3,57 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,57 |
| 139 | Captoprilum | Captopril Polfarmex, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blis. po 10 szt.) | 5909990495337 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,97 | 7,04 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 4,25 |
| 140 | Captoprilum | Captopril Polfarmex, tabl. , 12,5 mg | 30 tabl. (3 blis. po 10 szt.) | 5909990830817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 1,87 | 2,43 | 1,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne oraz niewydolność serca - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 2,43 |
| 141 | Carbamazepinum | Amizepin, tabl. , 200 mg | 50 tabl. (5 blis. po 10 szt.) | 5909990043910 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,80 | 14,59 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie ośrodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 7,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|------|
| 142 | Carbamazepinum | Finlepsin, tabl. , 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991014117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,10 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,76 |
| 143 | Carbamazepinum | Finlepsin 200 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991030315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,10 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,76 |
| 144 | Carbamazepinum | Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991014216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 11,80 | 16,15 | 12,64 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,71 |
| 145 | Carbamazepinum | Finlepsin 400 retard, tabl. o przedfu onym uwalnianiu, 400 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909991014223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 20,43 | 26,74 | 21,07 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 8,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|---|---------|------|
| 146 | Carbamazepinum | Neurotop retard 300, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990244515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,96 | 17,90 | 15,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 5,29 |
| 147 | Carbamazepinum | Neurotop retard 600, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 600 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990244614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 23,65 | 31,61 | 31,61 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 3,20 |
| 148 | Carbamazepinum | Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml | 100 ml | 5909990341917 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 6,83 | 9,83 | 8,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 4,34 |
| 149 | Carbamazepinum | Tegretol , zawiesina doustna, 20 mg/ml | 250 ml | 5909990341924 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - płynne postacie farmaceutyczne | 15,76 | 21,73 | 21,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerzutach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|----------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 150 | Carbamazepinum | Tegretol CR 200, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg | 50 tabl. | 5909990120215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 11,99 | 15,86 | 10,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 8,52 |
| 151 | Carbamazepinum | Tegretol CR 400, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 400 mg | 30 tabl. | 5909990120116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,12 | 16,50 | 12,64 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 7,06 |
| 152 | Carbamazepinum | Timonil 150 retard, tabl. , 150 mg | 50 tabl. | 5909990751013 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,64 | 11,64 | 7,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 6,94 |
| 153 | Carbamazepinum | Timonil 300 retard, tabl. , 300 mg | 50 tabl. | 5909990751211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 13,18 | 18,14 | 15,81 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego ukadu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 5,53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 154 | Carbamazepinum | Timonil 600 retard, tabl., 600 mg | 50 tabl. | 5909990751310 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 159.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - karbamazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,27 | 32,27 | 31,61 | Padaczka | Stan po epizodzie padaczkowym indukowanym przerytami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Zapobieganie napadom padaczkowym w bezobjawowych przerytach do kory ruchowej mózgu; Wspomaganie leczenia bólu u chorych z rozpoznaniem nowotworu | ryczałt | 3,86 |
| 155 | Carbocisteinum | Mukolina, syrop, 50 mg/ml | 120 ml | 5909990032211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 205.1, Leki mukolityczne - acetylocysteina | 4,42 | 6,62 | 6,62 | Mukowiscydoza, Pierwotna dyskineza rz sek | Mukowiscydoza oraz zapalenie oskrzeli - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 1,99 |
| 156 | Carvedilolum | Atram 6,25, tabl., 6,25 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990570454 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,80 | 7,53 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,90 |
| 157 | Carvedilolum | Avedol, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074051 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,80 | 7,53 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,90 |
| 158 | Carvedilolum | Carvedigamma 6,25 mg, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990419685 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,37 | 7,07 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,44 |
| 159 | Carvedilolum | Carvedilol Teva, tabl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990338788 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,37 | 7,07 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,44 |
| 160 | Carvedilolum | Carvedilol-ratiopharm, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990727100 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,43 | 7,13 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,50 |
| 161 | Carvedilolum | Carvetrend, tabl., 3,125 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991016814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 8,31 | 9,02 | 0,45 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,71 |
| 162 | Carvedilolum | Carvetrend, tabl., 6,25 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909991016913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 9,34 | 10,24 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,61 |
| 163 | Carvedilolum | Coryol, tabl., 6,25 mg | 30 tabl. (blist.) | 5909990983315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,54 | 16,89 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,26 |
| 164 | Carvedilolum | Coryol 3,125, tabl., 3,125 mg | 30 tabl. | 5909990216604 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 11,80 | 12,75 | 0,45 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 12,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 165 | Carvedilolum | Dilatrend, tabl. , 6,25 mg | 30 tabl. | 5909990716111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,82 | 17,19 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,56 |
| 166 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. | 5909990048465 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,85 | 7,59 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,96 |
| 167 | Carvedilolum | Hypoten, tabl. powl., 6,25 mg | 100 tabl. | 5909990048472 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 22,81 | 25,26 | 3,00 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 23,16 |
| 168 | Carvedilolum | Symtrend, tabl. powl., 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990074792 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 6,80 | 7,53 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,90 |
| 169 | Carvedilolum | Vivacor , tabl. , 6,25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990687886 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 15,03 | 16,34 | 0,90 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 15,71 |
| 170 | Carvedilolum | Vivacor , tabl. , 6,25 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990687893 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 30,07 | 32,69 | 1,80 | Udokumentowana niewydolno serca w klasach NYHA II – NYHA IV | Zastoinowa niewydolno serca u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 31,43 |
| 171 | Chloroquinum | Arechin, tabl. , 250 mg | 30 tabl. | 5909990061914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 192.0, Leki przeciwmalaryczne - chlorochina | 14,58 | 20,21 | 20,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | 30% | 6,06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-------------------------------|----------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 172 | Ciclosporinum | Cyclaid, kaps. mi kkie, 25 mg | 50 kaps. | 5909990787289 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 59,08 | 74,27 | 72,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-------------------------------|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 173 | Ciclosporinum | Cyclaid, kaps. mi kkie, 50 mg | 50 kaps. | 5909990787357 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 120,96 | 144,47 | 144,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwińkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--------------------------------|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 174 | Ciclosporinum | Cyclaid, kaps. mi kkie, 100 mg | 50 kaps. | 5909990787463 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 254,34 | 291,18 | 291,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z du ych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespótów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 175 | Ciclosporinum | Equoral, kaps. elastyczne, 25 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990946426 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 59,10 | 74,29 | 72,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 176 | Ciclosporinum | Equoral, kaps. elastyczne, 50 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990946525 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 122,36 | 145,97 | 145,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytowej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|------|
| 177 | Ciclosporinum | Equoral, kaps. elastyczne, 100 mg | 50 kaps. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990946624 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 255,04 | 291,94 | 291,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 178 | Ciclosporinum | Equoral, roztwór doustny , 100 mg/ml | 50 ml | 5909990946716 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postacie farmaceutyczne | 277,61 | 316,97 | 316,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwonokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespólów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|-------|---|---|---------|-------|
| 179 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 25 mg | 50 kaps. | 5909990336616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 104,72 | 123,10 | 72,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepieniu kości, tkanek lub komórek | ryczałt | 53,31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 180 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 50 mg | 50 kaps. | 5909990336715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 210,86 | 240,67 | 145,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie kośćczyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 97,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|----------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|--------|
| 181 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 100 mg | 50 kaps. | 5909990336814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 408,73 | 456,38 | 291,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 167,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|--------|
| 182 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, roztwór doustny , 100 mg/ml | 50 ml | 5909990336913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 138.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - płynne postaci farmaceutyczne | 398,08 | 445,88 | 316,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku ycia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybiórca aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowo ci odporne na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 132,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|-------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|
| 183 | Ciclosporinum | Sandimmun Neoral, kaps. elastyczne, 10 mg | 60 kaps. | 5909990406111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 137.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - cyklosporyna do stosowania doustnego - stałe postacie farmaceutyczne | 50,38 | 61,13 | 35,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Zespół Alporta z białkomoczem, nefropatia toczniowa, anemia aplastyczna oraz nieswoiste zapalenia jelit - u dzieci do 18 roku życia; 3. Aplazja lub hipoplazja szpiku kostnego; 4. LGL Leukemia (białaczka z dużych granularnych limfocytów T; Large granular lymphocytic leukemia); 5. PRCA (wybórcza aplazja układu czerwokrwinkowego; pure red cell aplasia); 6. Zespół aktywacji makrofagów (MAS); 7. Zespół hemofagocytowy (HLH); 8. Małopłytkowość oporna na leczenie; 9. Paliatywne leczenie zespołów mielodysplastycznych (MDS); 10. Paliatywne leczenie przewlekłej białaczki mielomonocytovej (CMML); 11. Stan po przeszczepie ko szpiny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 29,30 |
| 184 | Ciprofloxacinum | Ciphin 500, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990499113 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,99 | 10,88 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią | 50% | 6,85 |
| 185 | Ciprofloxacinum | Ciprinol, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. | 5909990066216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 13,50 | 16,78 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią | 50% | 12,75 |
| 186 | Ciprofloxacinum | Ciprinol, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. | 5909990066414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 8,64 | 10,46 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią | 50% | 8,44 |
| 187 | Ciprofloxacinum | Cipronex, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990308514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,56 | 9,31 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią | 50% | 7,29 |
| 188 | Ciprofloxacinum | Cipronex, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990334964 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,95 | 10,84 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią | 50% | 6,81 |
| 189 | Ciprofloxacinum | Cipropol, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990308712 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,83 | 9,60 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią | 50% | 7,58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 190 | Ciprofloxacynum | Cipropol, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990729012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 11,34 | 14,46 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 10,43 |
| 191 | Ciprofloxacynum | Cyprofloksacyna 500 mg, tabl., 500 mg | 10 tabl. | 5909990338030 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 7,56 | 10,42 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 6,39 |
| 192 | Ciprofloxacynum | Proxacin 250, tabl. powł., 250 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991033514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 5,29 | 6,88 | 4,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 4,86 |
| 193 | Ciprofloxacynum | Proxacin 500, tabl. powł., 500 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991033613 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 105.0, Chinolonowe leki przeciwbakteryjne - fluorochinolony do stosowania doustnego | 9,18 | 12,15 | 8,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zapobieganie zaka eniom u pacjentów z neutropeni | 50% | 8,12 |
| 194 | Clonazepamum | Clonazepamum TZF, tabl., 2 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990135516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny | 8,10 | 11,77 | 11,77 | Padaczka | Padaczka u dzieci do 1 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 195 | Clonazepamum | Clonazepamum TZF, tabl., 0,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990135615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 158.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - benzodiazepiny | 4,10 | 5,25 | 2,94 | Padaczka | Padaczka u dzieci do 1 roku ycia | ryczałt | 5,25 |
| 196 | Colecalciferolum (vit. D3) | Devikap, płyn doustny, 15000 j.m./ ml | 10 ml | 5909990260218 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | 2,92 | 4,37 | 4,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,20 |
| 197 | Colecalciferolum (vit. D3) | Juvit D3, krople doustne, roztwór, 20000 j.m./ ml | 10 ml | 5909991047818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | 4,05 | 5,99 | 5,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Osteoporoza, profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,36 |
| 198 | Colecalciferolum (vit. D3) | Vigantol, krople doustne, 20000 j.m./ ml | 10 ml (but.) | 5909990178513 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 18.2, Witamina D i jej metabolity - colekalcyferol i kalcyfediol | 4,01 | 5,95 | 5,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Przewlekła choroba nerek, profilaktyka osteoporozy przy steroidoterapii - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka osteoporozy posterydowej - zgodnie z zaleceniami EULAR i polskimi | ryczałt | 3,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|-------|--------|--------|--|---|---------|------|
| 199 | Cyclophosphamidum | Endoxan, dra etki, 50 mg | 50 dra . | 5909990240814 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 117.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki alkiluj ce - cyklofosfamid | 41,81 | 53,72 | 53,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne i amyloidoza; Zespół aktywacji makrofagów (MAS); Zespół hemofagocytowy (HLH); Małopłytkowo ci i anemie hemolityczne odporne na leczenie sterydami; Zespół POEMS | ryczałt | 3,20 |
| 200 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 2500 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml | 10 amp.-strz.a 0,2 ml | 5909990776412 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych | 44,38 | 56,82 | 53,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 6,43 |
| 201 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m. (anty-Xa) / 0,2ml | 10 amp.-strz.a 0,2 ml | 5909990776511 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych | 92,01 | 111,79 | 107,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Zaburzenia kr enia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 7,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|------|
| 202 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ml | 10 amp.a 1 ml | 5909990776610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 175,13 | 204,72 | 204,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 4,27 |
| 203 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa) / 4ml | 10 amp.a 4 ml | 5909990776719 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 175,13 | 204,72 | 204,72 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 4,27 |
| 204 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 7500 j.m. (anty-Xa) / 0,3ml | 10 amp.-strz.a 0,3 ml | 5909990949410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 137,89 | 163,29 | 160,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 5,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|------|
| 205 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 12500 j.m. (anty-Xa) / 0,5ml | 5 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990949519 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 113,38 | 135,86 | 133,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 5,08 |
| 206 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 15000 j.m. (anty-Xa) / 0,6ml | 5 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990949618 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 137,89 | 163,29 | 160,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 5,72 |
| 207 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 18000 j.m. (anty-Xa) / 0,72ml | 5 amp.-strz z igłą po 0,72 ml | 5909990949717 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 156,11 | 183,89 | 183,89 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 3,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|---|---------|------|
| 208 | Dalteparinum natricum | Fragmin, roztwór do wstrzykiwań, 10000 j.m. (anty-Xa)/ 0,4 ml | 5 amp.-strz.a 0,4 ml | 5909990958818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 82,95 | 102,10 | 102,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronnie nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 3,20 |
| 209 | Danazolium | Danazol Jelfa, tabl., 200 mg | 100 tabl. | 5909990282517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol | 102,76 | 123,94 | 123,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS) | ryczałt | 3,73 |
| 210 | Danazolium | Danazol Polfarmex, tabl., 200 mg | 100 tabl. (fiol.) | 5909990925339 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 73.0, Hormony płciowe - antygonadotropiny - danazol | 102,60 | 123,77 | 123,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Małopłytkowo autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS) | ryczałt | 3,56 |
| 211 | Desmopressinum | Minirin Melt, liofilizat doustny, 60 mcg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990068494 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny | 87,39 | 106,65 | 101,38 | Moczówka prosta przysadkowa | Choroba von Willebrandta | ryczałt | 8,47 |
| 212 | Desmopressinum | Minirin Melt, liofilizat doustny, 120 mcg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990068548 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 78.2, Hormony przysadki i podwzgórza – doustne postacie farmaceutyczne desmopresyny | 173,47 | 202,75 | 202,75 | Moczówka prosta przysadkowa | Choroba von Willebrandta | ryczałt | 3,20 |
| 213 | Dexamethasonum | Pabi-Dexamethason, tabl., 0,5 mg | 20 tabl. | 5909990170418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego | 3,24 | 4,16 | 2,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Premedykacja przed stosowaniem taksoidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów złośliwych; Przeciwdziałanie nudnościom i wymiotom w związku z chemioterapią lub radioterapią w nowotworach złośliwych (skorzarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Postępowanie wspomagające u chorych z objawowymi przerzutami w ośrodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikłań radioterapii u chorych na nowotwory | ryczałt | 4,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|-------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 214 | Dexamethasonum | Pabi-Dexamethason, tabl. , 1 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990170517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 81.2, Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego | 3,24 | 4,85 | 4,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Premedykacja przed stosowaniem taksonidów (docetaksel i paklitaksel) oraz pemetreksedu w ramach chemioterapii nowotworów zło liwych; Przeciwdziałanie nudno ciom i wymiotom w zawi zku z chemioterapii lub radioterapii w nowotworach zło liwych (skojarzenie z innymi lekami przeciwwymiotnymi); Post powanie wspomagaj ce u chorych z objawowymi przerzutami w o rodkowym układzie nerwowym; Wspomaganie leczenia bólu oraz powikła radioterapii u chorych na nowotwory | ryczałt | 3,20 |
| 215 | Diazepamum | Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 10 mg | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990709212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 18,14 | 24,79 | 24,79 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 3,20 |
| 216 | Diazepamum | Diazepam Desitin, roztwór doodbytniczy, 5 mg | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990709311 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 16,74 | 21,32 | 12,40 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 12,12 |
| 217 | Diazepamum | Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 2 mg/ml | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990751518 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 16,09 | 20,62 | 12,40 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 11,42 |
| 218 | Diazepamum | Relsed, mikrowlewka doodbytnicza, roztwór, 4 mg/ml | 5 wlew.a 2,5 ml | 5909990751617 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 181.1, Leki przeciwl kowe - diazepam do podawania doodbytniczego (wlewki) | 18,58 | 25,26 | 24,79 | Padaczka | Leczenie dora ne drgawek i napadów padaczkowych u dzieci o wadze poni ej 10 kg | ryczałt | 3,67 |
| 219 | Diltiazemum | Diltiazem Polfarmex, tabl. , 30 mg | 60 tabl. (pojem.) | 5909990464722 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,05 | 9,18 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 6,79 |
| 220 | Diltiazemum | Dilzem, tabl. , 60 mg | 100 tabl. | 5909990205011 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 14,58 | 19,83 | 18,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,41 |
| 221 | Diltiazemum | Dilzem 120 retard, tabl. o przedlu onym uwalnianiu, 120 mg | 30 tabl. | 5909990482917 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,99 | 11,52 | 11,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 222 | Diltiazemum | Dilzem 180 retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg | 30 tabl. | 5909990483310 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 11,88 | 16,67 | 16,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 223 | Diltiazemum | Dilzem Retard, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 90 mg | 30 tabl. | 5909990213214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,02 | 9,85 | 8,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,67 |
| 224 | Diltiazemum | Oxycardil 120, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 120 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990112616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,99 | 11,52 | 11,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,55 |
| 225 | Diltiazemum | Oxycardil 180, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 180 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990416318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 11,99 | 16,79 | 16,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,23 |
| 226 | Diltiazemum | Oxycardil 240, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 240 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990416417 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 16,74 | 22,69 | 22,34 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,55 |
| 227 | Diltiazemum | Oxycardil 60, tabl. powł., 60 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990121120 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 43.0, Antagoni ci wapnia - pochodne benzotiazepiny - diltiazem | 7,67 | 11,17 | 11,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin układow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 228 | Doxazosinum | Apo-Doxan 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. | 5909990969517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 15,66 | 18,86 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 14,37 |
| 229 | Doxazosinum | Apo-Doxan 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990969616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 18,68 | 23,62 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 14,65 |
| 230 | Doxazosinum | Apo-Doxan 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990969715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,35 | 30,67 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 12,72 |
| 231 | Doxazosinum | Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990431410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,31 | 27,42 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,47 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 232 | Doxazosinum | Cardura XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 8 mg | 30 tabl. | 5909990431519 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 57,24 | 70,00 | 51,27 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 34,11 |
| 233 | Doxazosinum | Doxagen, tabl. o przedtym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990037957 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,25 | 27,35 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,40 |
| 234 | Doxazosinum | Doxalong, tabl. o przedtym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. | 5909990790951 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,09 | 27,19 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,24 |
| 235 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,98 | 27,75 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 23,26 |
| 236 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854417 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 28,08 | 33,67 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 24,70 |
| 237 | Doxazosinum | Doxanorm, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990854516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 32,40 | 40,36 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 22,41 |
| 238 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990484911 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,37 | 23,90 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,41 |
| 239 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990485017 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 23,98 | 29,29 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 20,32 |
| 240 | Doxazosinum | Doxar, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990485116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 26,24 | 33,77 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 15,82 |
| 241 | Doxazosinum | Doxonex, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991149611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 13,93 | 18,54 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,57 |
| 242 | Doxazosinum | Doxonex, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991149710 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,86 | 35,50 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 17,55 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|---------|-------|
| 243 | Doxazosinum | Kamiren, tabl. , 2 mg | 30 tabl. | 5909990491315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,00 | 32,52 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 23,55 |
| 244 | Doxazosinum | Kamiren, tabl. , 4 mg | 30 tabl. | 5909990491414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,32 | 34,91 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,96 |
| 245 | Doxazosinum | Kamiren XL, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990022571 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,70 | 35,32 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 17,37 |
| 246 | Doxazosinum | Prostatic 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 9,72 | 12,49 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,00 |
| 247 | Doxazosinum | Prostatic 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 15,66 | 20,39 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 11,42 |
| 248 | Doxazosinum | Prostatic 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990905614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 27,43 | 35,04 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 17,09 |
| 249 | Doxazosinum | Zoxon 1, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990903320 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 20,52 | 24,05 | 6,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,56 |
| 250 | Doxazosinum | Zoxon 2, tabl. , 2 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903429 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 19,98 | 25,01 | 12,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, neurogenna dysfunkcja p cherza, nieneurogenna dysfunkcja p cherza - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 16,04 |
| 251 | Doxazosinum | Zoxon 4, tabl. , 4 mg | 90 tabl. (9 blist.po 10 szt.) | 5909990080267 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 62,64 | 77,90 | 76,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 24,06 |
| 252 | Doxazosinum | Zoxon 4, tabl. , 4 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990903511 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 76.0, Leki stosowane w leczeniu łagodnego przerostu gruczołu krokowego - blokuj ce receptory alfa-adrenergiczne | 24,30 | 31,69 | 25,64 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 13,74 |
| 253 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014934 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 2,91 | 3,97 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadci nienie t tnicze - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|-------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 254 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990014958 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 5,31 | 7,39 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 4,60 |
| 255 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990015030 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,26 | 6,27 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,48 |
| 256 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990015054 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,37 | 12,03 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,45 |
| 257 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990020829 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,58 | 20,52 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 258 | Enalaprilum | Enarenal, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990020836 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,88 | 11,50 | 11,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 259 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990374137 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 2,54 | 3,58 | 3,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,58 |
| 260 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990374243 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,29 | 10,86 | 10,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 261 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 5 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990422364 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,62 | 6,65 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,86 |
| 262 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 20 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990422371 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,63 | 18,43 | 18,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 263 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990422388 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,08 | 10,65 | 10,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 264 | Enalaprilum | Mapryl, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990440535 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,94 | 5,93 | 5,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Niewydolno serca, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne i nadciśnienie tętnicze - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 265 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,2 ml | 5909990048328 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 47,97 | 60,67 | 53,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 10,28 |
| 266 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,4 ml | 5909990048427 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 96,41 | 116,50 | 107,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 12,52 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|--|-----------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 267 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990774821 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 135,53 | 160,77 | 160,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 3,20 |
| 268 | Enoxaparinum natrium | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990774920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz. steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz. steczkowych | 265,39 | 302,52 | 267,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 39,90 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|---|-----------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 269 | Enoxaparinum natriicum | Clexane, roztwór do wstrzykiwań, 100 mg/ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990775026 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 175,12 | 204,71 | 204,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 4,27 |
| 270 | Enoxaparinum natriicum | Clexane forte, roztwór do wstrzykiwań, 120 mg/0,8ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990891429 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 292,08 | 332,28 | 321,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowotrombotycznych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ciąży; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 17,14 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|---|---------------------|---------------|--|--------|--|----------|----------|----------|---|--|---------|-------|
| 271 | Enoxaparinum natricum | Clexane forte, roztwór do wstrzykiwa, 150 mg/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990891528 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocz steczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocz steczkowych | 345,84 | 391,62 | 391,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia kręenia w t tnicach macicznych u kobiet w ci y, opó nienie wzrostu wewn trzmacicznego płodu, w leczeniu poronie nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Zespół antyfosfolipidowy w ci y; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 8,00 |
| 272 | Ethosuximidum | Petinimid, kaps., 250 mg | 100 kaps. | 5909990244911 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 157.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - etosuksymid | 31,72 | 41,54 | 41,54 | Padaczka | Padaczka z napadami nie wiadomo ci dla dzieci do 3 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 273 | Everolimusum | Certican, tabl., 0,5 mg | 60 tabl. | 5909990211357 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus | 853,20 | 948,25 | 943,50 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 7,95 |
| 274 | Everolimusum | Certican, tabl., 0,25 mg | 60 tabl. | 5909990211654 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus | 426,58 | 480,35 | 471,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 11,80 |
| 275 | Everolimusum | Certican, tabl., 0,75 mg | 60 tabl. | 5909990211845 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135.2, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - everolimus | 1 280,03 | 1 415,25 | 1 415,25 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 276 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa, 300 mcg/ml | 5 fioł.a 1 ml | 5909990312214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 607,50 | 680,49 | 680,49 | Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|---------------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|------|
| 277 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa, 600 mcg/ml | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990830510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 121,50 | 145,69 | 145,69 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorczyca neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczyki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 278 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa, 960 mcg/ml | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990830619 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 194,40 | 226,25 | 226,25 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorczyca neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczyki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 279 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml | 1 amp.-strz z osłon zabezpieczającymi | 5909990739387 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 130,13 | 154,93 | 154,93 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorczyca neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczyki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 280 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml | 1 amp.-strz z osłon zabezpieczającymi | 5909990739448 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 214,79 | 248,08 | 248,08 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorczyca neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorczyki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niskim ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|----------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 281 | Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 60 mln. j/ml | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990687763 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 127,44 | 152,04 | 152,04 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niższym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 282 | Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 96 mln. j/ml | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909990687800 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymulujące wzrost granulocytów | 215,27 | 248,59 | 248,08 | Nowotwory złośliwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gorączka neutropeniczna (zakazanie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gorączki powyżej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z niższym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poniżej 18 roku życia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,71 |
| 283 | Fluconazolom | Flucostat, kaps., 50 mg | 7 kaps. | 5909990490516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 10,58 | 14,76 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakazanie grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,80 |
| 284 | Fluconazolom | Flucostat, kaps., 50 mg | 14 kaps. | 5909990490523 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 21,60 | 28,54 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakazanie grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymanych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|-------|--------|-------|---|--|-----|-------|
| 285 | Fluconazolom | Flucofast, kaps., 150 mg | 1 kaps. | 5909990490615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 4,32 | 6,31 | 5,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 3,76 |
| 286 | Fluconazolom | Flucofast, kaps. twarde, 100 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990662371 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 22,14 | 29,12 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 17,20 |
| 287 | Fluconazolom | Flucofast, kaps. twarde, 100 mg | 28 kaps. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990662388 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 91,80 | 110,58 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 62,90 |
| 288 | Fluconazolom | Fluconazin, syrop, 5 mg/ml | 150 ml (but.) | 5909991097219 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 25,14 | 33,44 | 33,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,72 |
| 289 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl., 150 mg | 1 tabl. (blist.) | 5909990017874 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 3,87 | 5,82 | 5,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 3,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 290 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 150 mg | 3 tabl. (blis.) | 5909990017881 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 11,62 | 16,46 | 15,33 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,80 |
| 291 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg | 28 tabl. | 5909990780181 | 2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 73,44 | 90,94 | 90,94 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 45,47 |
| 292 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, syrop, 5 mg/ml | 150 ml (but.) | 5909990859511 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 25,14 | 33,44 | 33,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,72 |
| 293 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg | 14 tabl. (2 blis.po 7 szt.) | 5909990859610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 21,98 | 28,95 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 17,03 |
| 294 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 50 mg | 7 tabl. (blis.) | 5909990859672 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 9,18 | 13,26 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---------------------------------------|------------------|---------------|---|--------|---|-------|--------|-------|--|---|-----|-------|
| 295 | Fluconazolom | Fluconazole Polfarmex, tabl. , 100 mg | 7 tabl. (blist.) | 5909990859719 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 23,61 | 30,69 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 18,77 |
| 296 | Fluconazolom | Flucorta, syrop, 50 mg/10 ml | 150 ml | 5909990773862 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 25,14 | 33,44 | 33,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,72 |
| 297 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 50 mg | 14 kaps. | 5909990356010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 24,08 | 31,20 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 19,28 |
| 298 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 100 mg | 7 kaps. | 5909990356119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 26,67 | 33,97 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 22,05 |
| 299 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 100 mg | 28 kaps. | 5909990356126 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 89,92 | 108,56 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 60,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--------------------------|------------------|---------------|---|--------|---|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 300 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 50 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990652273 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 9,56 | 13,67 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,71 |
| 301 | Fluconazolom | Flumycon, syrop, 5 mg/ml | 150 ml | 5909990841707 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.2, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - płynne postacie farmaceutyczne | 24,84 | 33,11 | 33,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 16,56 |
| 302 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 150 mg | 1 kaps. (blist.) | 5909991034115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 4,58 | 6,59 | 5,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 4,04 |
| 303 | Fluconazolom | Flumycon, kaps., 200 mg | 7 kaps. | 5909991034214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 38,20 | 49,26 | 47,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 25,42 |
| 304 | Fluconazolom | Mycosyst, kaps., 100 mg | 7 kaps. (blist.) | 5909990642533 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 23,61 | 30,69 | 23,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 18,77 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|--------|-------|--|---|---------|-------|
| 305 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 50 mg | 7 kaps. (blis.) | 5909990980512 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 9,89 | 14,03 | 11,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,07 |
| 306 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 100 mg | 28 kaps. (blis.) | 5909990980611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 90,72 | 109,43 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 61,75 |
| 307 | Fluconazolum | Mycosyst, kaps., 200 mg | 7 kaps. (blis.) | 5909991118914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 36,72 | 47,68 | 47,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zaka e grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymuj cych analogi puryn lub alemtuzumab; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 23,84 |
| 308 | Fluticasonum | Fanipos, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw. | 1 poj.a 120 daw. | 5909990570720 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 17,82 | 21,50 | 8,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha | 50% | 17,20 |
| 309 | Fluticasonum | Flixonase, aerozol do nosa, zawiesina, 50 g/daw. | 1 op.a 120 daw. (10 ml) | 5909990294817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 22,14 | 26,12 | 8,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha | 50% | 21,82 |
| 310 | Fluticasonum | Flixonase Nasule, krople do nosa, zawiesina, 400 g | 28 poj. | 5909990933822 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 196.0, Kortykosteroidy do stosowania do nosa | 44,82 | 51,86 | 16,05 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nie yt infekcyjny lub alergiczny nosa; Nie yt tr bki słuchowej powikłany wysi kowym zapaleniem ucha | 50% | 43,84 |
| 311 | Furosemidum | Furosemidum Polfarmex, tabl., 40 mg | 30 tabl. (3 blis.po 10 szt.) | 5909990223794 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 37.0, Leki moczop dne - p łowe | 2,46 | 3,69 | 3,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Post powanie wspomagaj ce przy objawowych przerzutach w o rodkowym układzie nerwowym; Leczenie nadci nienia t tniczego i niewydolno ci serca u dzieci | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|--------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 312 | Furosemidum | Furosemidum Polpharma, Furosemidum, tabl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist. po 10 szt.) | 5909990135028 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 37,0, Leki moczop. dne - p. tlowe | 2,46 | 3,69 | 3,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Post powanie wspomagaj. ce przy objawowych przerzutach w o. rdokowym układzie nerwowym; Leczenie nadci. nienia t. tniczego i niewydolno. ci serca u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 313 | Gabapentinum | Gabagamma 100, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990714322 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 23,76 | 29,72 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 16,05 |
| 314 | Gabapentinum | Gabagamma 300, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990714452 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 70,20 | 83,81 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 36,40 |
| 315 | Gabapentinum | Gabagamma 400, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990714605 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 86,40 | 102,54 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 38,26 |
| 316 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, tabl. powl., 600 mg | 100 tabl. | 5909990338542 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 82,30 | 100,75 | 100,75 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 317 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, tabl. powl., 800 mg | 100 tabl. | 5909990338658 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 113,39 | 135,42 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 5,20 |
| 318 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990339495 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 21,60 | 27,41 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 13,74 |
| 319 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990339600 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 53,62 | 67,46 | 67,46 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 320 | Gabapentinum | Gabapentin Teva, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990339709 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165,0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 39,17 | 50,61 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj. ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|----------------------------------|-----------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 321 | Gabapentinum | Gabatem, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990676088 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 21,60 | 27,41 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 13,74 |
| 322 | Gabapentinum | Gabatem, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990676170 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 64,80 | 78,03 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 30,62 |
| 323 | Gabapentinum | Gabatem, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990676248 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 83,16 | 99,07 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 34,79 |
| 324 | Gabapentinum | Gabatem, tabl. powł., 600 mg | 100 tabl. | 5909990768035 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 81,00 | 99,36 | 99,36 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 325 | Gabapentinum | Gabatem, tabl. powł., 800 mg | 100 tabl. | 5909990768059 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 108,00 | 129,65 | 129,65 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 4,74 |
| 326 | Gabapentinum | Neuran 100, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990651535 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 21,38 | 27,18 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 13,51 |
| 327 | Gabapentinum | Neuran 300, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990651566 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 39,10 | 50,53 | 50,53 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 328 | Gabapentinum | Neuran 400, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990651603 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 52,92 | 66,71 | 66,71 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 329 | Gabapentinum | Neuran 600, tabl. powł., 600 mg | 100 tabl. | 5909990055081 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 81,00 | 99,36 | 99,36 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 330 | Gabapentinum | Neuran 800, tabl. powł., 800 mg | 100 tabl. (blist.) | 5909990651696 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 113,40 | 135,43 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 5,21 |
| 331 | Gabapentinum | Neurontin 100, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. | 5909990769216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 42,37 | 49,63 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 35,96 |
| 332 | Gabapentinum | Neurontin 300, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. | 5909990769315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 89,24 | 104,19 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 56,78 |
| 333 | Gabapentinum | Neurontin 400, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. | 5909990769414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 119,88 | 138,36 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 74,08 |
| 334 | Gabapentinum | Neurontin 600, tabl. powł., 600 mg | 100 tabl. | 5909991017422 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 147,84 | 170,88 | 101,22 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 73,22 |
| 335 | Gabapentinum | Neurontin 800, tabl. powł., 800 mg | 100 tabl. | 5909991017521 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 141,50 | 165,49 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 35,27 |
| 336 | Gabapentinum | Symleptic, tabl. powł., 600 mg | 100 tabl. | 5909990678747 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 90,48 | 109,50 | 101,22 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 11,84 |
| 337 | Gabapentinum | Symleptic, tabl. powł., 800 mg | 100 tabl. | 5909990678792 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 126,24 | 149,16 | 134,96 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 18,94 |
| 338 | Gabapentinum | Symleptic, kaps. twarde, 100 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990685554 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 26,00 | 32,12 | 16,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 18,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|--|---------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|-------|--|--|---------|-------|
| 339 | Gabapentinum | Symleptic, kaps. twarde, 300 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990685561 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 63,72 | 76,87 | 50,61 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 29,46 |
| 340 | Gabapentinum | Symleptic, kaps. twarde, 400 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990685660 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 165.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - gabapentyna | 97,84 | 114,78 | 67,48 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce w leczeniu bólu u chorych na nowotwory; Lekooporne napady odogniskowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 50,50 |
| 341 | Hydrocortisonum | Hydrocortisonum AFP, krem, 0,01 g/1 g | 15 g | 5909990950317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania | 1,77 | 2,65 | 2,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory | 50% | 1,33 |
| 342 | Hydrocortisonum | Laticort 0,1%, plyn na skór , 1 mg/ml | 20 ml | 5909990229215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 55.0, Kortykosteroidy do stosowania na skór - o słabej i redniej sile działania | 4,62 | 5,94 | 3,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie skórnych powikła u chorych na nowotwory | 50% | 4,18 |
| 343 | Indapamidum | Apo-Indap, tabl. powl., 2,5 mg | 30 tabl. | 5909990988716 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,59 | 10,70 | 10,70 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,21 |
| 344 | Indapamidum | Diuresin SR, tabl. powl. o przedtu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990975815 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,59 | 9,49 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,30 |
| 345 | Indapamidum | Indap, kaps. twarde, 2,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991162917 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,85 | 10,98 | 10,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,29 |
| 346 | Indapamidum | Indapen, tabl. powl., 2,5 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990863013 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,70 | 9,82 | 9,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,95 |
| 347 | Indapamidum | Indapen SR, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990665907 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,05 | 8,90 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,71 |
| 348 | Indapamidum | Indapres, tabl. powl., 2,5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990223121 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,70 | 10,82 | 10,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,25 |
| 349 | Indapamidum | Ipres long 1,5, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990012688 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,59 | 9,49 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,30 |
| 350 | Indapamidum | Opamid, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990770182 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0, Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,43 | 9,31 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,12 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 351 | Indapamidum | Rawel SR, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. | 5909990424801 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0. Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 6,97 | 9,90 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,71 |
| 352 | Indapamidum | Rawel SR, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 60 tabl. | 5909990424849 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0. Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 13,93 | 19,00 | 17,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,62 |
| 353 | Indapamidum | Symapamid SR, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990734993 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0. Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 5,40 | 8,21 | 8,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 2,46 |
| 354 | Indapamidum | Tertensif SR, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 1,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990738212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 36.0. Leki moczop dne - tiazydowe i sulfonamidowe | 11,88 | 15,15 | 8,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 8,96 |
| 355 | Itraconazolum | Itragen, kaps. twarde, 100 mg | 28 kaps. | 5909990617463 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1. Leki przeciwwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne | 79,92 | 97,87 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 50,19 |
| 356 | Itraconazolum | Itrax, kaps. twarde, 100 mg | 4 kaps. | 5909990858255 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1. Leki przeciwwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne | 11,99 | 16,58 | 13,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 9,77 |
| 357 | Itraconazolum | Itrax, kaps. twarde, 100 mg | 28 kaps. | 5909990858262 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1. Leki przeciwwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne | 81,11 | 99,15 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 51,47 |
| 358 | Itraconazolum | Orungal, kaps., 100 mg | 4 kaps. | 5909990004317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1. Leki przeciwwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stale postacie farmaceutyczne | 13,28 | 17,96 | 13,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 11,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|-------|---|--|-----|-------|
| 359 | Itraconazolum | Orungal, kaps., 100 mg | 28 kaps. | 5909990004331 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 85,32 | 103,65 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 55,97 |
| 360 | Itraconazolum | Trioxal, kaps., 100 mg | 4 kaps. | 5909991053819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 14,90 | 19,69 | 13,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 12,88 |
| 361 | Itraconazolum | Trioxal, kaps., 100 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909991053826 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 110.1, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne triazolu - stałe postacie farmaceutyczne | 85,32 | 103,65 | 95,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 55,97 |
| 362 | Ketoconazolum | Ketoconazole Hasco, tabl., 200 mg | 10 tabl. | 5909991045418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol | 6,42 | 9,43 | 9,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab | 50% | 4,72 |
| 363 | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909991042615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol | 6,42 | 9,43 | 9,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab | 50% | 4,72 |
| 364 | Ketoconazolum | Ketokonazol Polfarmex, tabl., 200 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991042639 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 109.0, Leki przeciwgrzybicze do stosowania doustnego - pochodne imidazolu - ketokonazol | 13,85 | 19,07 | 18,86 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakażeń grzybiczych u chorych z rozpoznaniem przewlekłej białaczki limfatycznej otrzymujących analogi puryn lub alemtuzumab | 50% | 9,64 |
| 365 | Ketoprofenum | Bi-Profenid, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 150 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990412112 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie farmaceutyczne | 10,29 | 14,58 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 7,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|--|-----|-------|
| 366 | Ketoprofenum | Febrofen, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 20 kaps. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990413317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 14,01 | 19,26 | 19,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 9,63 |
| 367 | Ketoprofenum | Ketonal, kaps. twarde, 50 mg | 30 kaps. | 5909990046492 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 4,86 | 7,25 | 7,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 3,63 |
| 368 | Ketoprofenum | Ketonal, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg | 10 amp.a 2 ml | 5909990659524 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.3, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania pozajelitowego | 6,48 | 9,51 | 9,51 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 4,76 |
| 369 | Ketoprofenum | Ketonal DUO, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 150 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990064694 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 17,06 | 22,87 | 21,75 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 12,00 |
| 370 | Ketoprofenum | Ketonal forte, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990046485 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,39 | 15,77 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 8,52 |
| 371 | Ketoprofenum | Ketores, kaps., 100 mg | 14 kaps. | 5909990813315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 7,88 | 10,37 | 6,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 6,99 |
| 372 | Ketoprofenum | Ketores, kaps., 100 mg | 20 kaps. | 5909990813322 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,23 | 14,60 | 9,67 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 9,77 |
| 373 | Ketoprofenum | Ketores, kaps., 200 mg | 20 kaps. | 5909990813421 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 13,93 | 19,18 | 19,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 9,59 |
| 374 | Ketoprofenum | Profenid, czopki, 100 mg | 10 czop. | 5909990098514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.2, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doodbytniczego | 7,94 | 9,20 | 2,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 7,97 |
| 375 | Ketoprofenum | Profenid, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990760718 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 9,54 | 13,78 | 13,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólwe u chorych na nowotwory | 50% | 6,89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 376 | Ketoprofenum | Profenid, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 200 mg | 14 tabl. (1 blist.a 14 szt.) | 5909990790418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 10,35 | 14,48 | 13,53 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 7,72 |
| 377 | Ketoprofenum | Refastin, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990675593 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 141.1, Niesteroidowe leki przeciwzapalne do stosowania doustnego - produkty jednoskładnikowe i skojarzone z inhibitorami pompy protonowej - stałe postacie postacie farmaceutyczne | 11,34 | 15,71 | 14,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie przeciwbólowe u chorych na nowotwory | 50% | 8,46 |
| 378 | Lamotryginum | Epitrigine 100 Mg, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334766 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,84 | 33,24 | 33,24 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 379 | Lamotryginum | Epitrigine 100 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334940 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 24,84 | 32,89 | 31,74 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 4,35 |
| 380 | Lamotryginum | Epitrigine 25 Mg, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334742 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 6,21 | 9,22 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,82 |
| 381 | Lamotryginum | Epitrigine 25 Mg, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334933 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 6,21 | 9,05 | 7,94 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 4,31 |
| 382 | Lamotryginum | Epitrigine 50 Mg, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334759 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,57 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|------|
| 383 | Lamotriginum | Epitrigine 50 Mg, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990334957 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,34 | 15,87 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 4,67 |
| 384 | Lamotriginum | Lameptil S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,025 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990224661 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 8,37 | 11,37 | 7,94 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 6,63 |
| 385 | Lamotriginum | Lameptil S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,1 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990225149 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 23,76 | 31,74 | 31,74 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 386 | Lamotriginum | Lameptil S, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 0,05 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990225170 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 12,96 | 17,91 | 15,87 | Padaczka oporna na leczenie, Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 5,24 |
| 387 | Lamotriginum | Lamilept, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990038480 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 388 | Lamotriginum | Lamilept, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990038565 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 18,06 | 23,59 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 9,59 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 389 | Lamotriginum | Lamilept, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990038701 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,62 | 11,80 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 6,40 |
| 390 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990346219 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 22,68 | 28,54 | 17,20 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 14,54 |
| 391 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990346318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 392 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl. , 100 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990346325 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 52,92 | 66,67 | 66,67 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 393 | Lamotriginum | Lamitrin, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990354818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,96 | 16,45 | 8,60 | Choroba afektywna dwubiegunowa, Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 11,05 |
| 394 | Lamotriginum | Lamitrin S, tabl. do sporz dzania zawiesiny/do rozgryzania i ucia , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 7,41 | 8,44 | 1,59 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rdkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 8,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 395 | Lamotriginum | Lamitrin S, tabl. do sporządzenia zawiesiny/do rozgrzania i ucia, 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 16,20 | 19,74 | 7,94 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 15,00 |
| 396 | Lamotriginum | Lamitrin S, tabl. do sporządzenia zawiesiny/do rozgrzania i ucia, 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990787319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 64,80 | 75,65 | 31,74 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 47,11 |
| 397 | Lamotriginum | Lamotrix, tabl., 25 mg | 30 tabl. | 5909991006419 | 2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 8,59 | 11,77 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 6,37 |
| 398 | Lamotriginum | Lamotrix, tabl., 50 mg | 30 tabl. | 5909991006518 | 2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 17,98 | 23,50 | 17,14 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 9,56 |
| 399 | Lamotriginum | Lamotrix, tabl., 100 mg | 30 tabl. | 5909991006617 | 2012-01-01/2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 25,92 | 34,39 | 34,39 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 400 | Lamotriginum | Lamozor, tabl. do sporządzenia zawiesiny doustnej, 25 mg | 5 blist. po 10szt. | 5909990057382 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 9,89 | 14,20 | 13,23 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdokowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 4,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|--------------------|---------------|---|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 401 | Lamotriginum | Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 100 mg | 5 blist. po 10szt. | 5909990057566 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 39,59 | 51,09 | 51,09 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 402 | Lamotriginum | Lamozor, tabl. do sporządzania zawiesiny doustnej, 50 mg | 5 blist. po 10szt. | 5909990057597 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - płynne postacie farmaceutyczne | 19,80 | 26,87 | 26,45 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,62 |
| 403 | Lamotriginum | Plexxo 100, tabl., 100 mg | 30 tabl. | 5909990972616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 29,75 | 38,49 | 34,39 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 7,30 |
| 404 | Lamotriginum | Plexxo 25, tabl., 25 mg | 30 tabl. | 5909990972418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 17,28 | 21,07 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 15,67 |
| 405 | Lamotriginum | Plexxo 50, tabl., 50 mg | 30 tabl. | 5909990972517 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 21,60 | 27,39 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 13,39 |
| 406 | Lamotriginum | Symla 100, tabl., 100 mg | 30 tabl. | 5909990045303 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 23,89 | 32,22 | 32,22 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagające u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obrębie o rdzowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku życia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|---|----------|----------|----------|---|--|---------|--------|
| 407 | Lamotriginum | Symla 25, tabl. , 25 mg | 30 tabl. | 5909990045280 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 6,10 | 9,11 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,71 |
| 408 | Lamotriginum | Symla 50, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990045266 | 2012-01-01/2012-07-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,31 | 17,44 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie; Choroba afektywna dwubiegunowa | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,44 |
| 409 | Lamotriginum | Trogine, tabl. , 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079292 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 6,21 | 9,22 | 8,60 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,82 |
| 410 | Lamotriginum | Trogine, tabl. , 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079339 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 12,42 | 17,57 | 17,20 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,57 |
| 411 | Lamotriginum | Trogine, tabl. , 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990079483 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 163.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lamotrygina - stałe postacie farmaceutyczne | 54,62 | 68,49 | 68,49 | Padaczka oporna na leczenie | Post powanie wspomagaj ce u chorych po epizodzie padaczkowym indukowanym przerzutami w obr bie o rodkowego układu nerwowego; Padaczka oporna na leczenia u dzieci do 2 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 412 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg | 1 amp.-strz | 5909991094416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.0. Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu | 2 703,73 | 2 951,68 | 2 459,90 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst pujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 494,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|------------------------------|---------------|--|--------|---|----------|----------|----------|---|--|---------|--------|
| 413 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg | 1 amp.-strz | 5909991094515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu | 3 604,62 | 3 930,73 | 3 689,84 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 244,09 |
| 414 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg | 1 amp.-strz.a 0,5 ml | 5909991094614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12 , 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.0, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu | 4 514,86 | 4 919,79 | 4 919,79 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekrecji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 4,27 |
| 415 | Lansoprazolum | Lanbax, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990055135 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,26 | 14,26 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 8,63 |
| 416 | Lansoprazolum | Lanbax, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990055173 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,52 | 27,15 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 15,89 |
| 417 | Lansoprazolum | Lantrea, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990017850 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 25,70 | 32,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 21,43 |
| 418 | Lansoprazolum | Lantrea, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990017898 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,85 | 17,02 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 11,39 |
| 419 | Lansoprazolum | Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. | 5909990339365 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,80 | 14,83 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 9,20 |
| 420 | Lansoprazolum | Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 14 kaps. | 5909990339402 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03- 01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,80 | 14,83 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej ośdka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 9,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 421 | Lansoprazolum | Lanzostad, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. | 5909990609970 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 422 | Lansoprazolum | Lanzul, kaps., 30 mg | 7 kaps. | 5909990727018 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,71 | 16,52 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,71 |
| 423 | Lansoprazolum | Lanzul, kaps., 30 mg | 14 kaps. | 5909990727025 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,07 | 22,61 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 16,98 |
| 424 | Lansoprazolum | Lanzul, kaps., 30 mg | 28 kaps. | 5909990727032 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 23,57 | 30,42 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 19,16 |
| 425 | Lansoprazolum | Lanzul S, kaps., 15 mg | 28 kaps. | 5909990869817 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,85 | 21,30 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,67 |
| 426 | Lansoprazolum | Renazol, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990623358 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,82 | 18,06 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 427 | Lansoprazolum | Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990623440 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,82 | 18,06 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 428 | Lansoprazolum | Renazol, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990623457 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 27,54 | 34,67 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 23,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|---|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 429 | Lansoprazolum | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 15 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990064045 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,70 | 11,51 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,88 |
| 430 | Lansoprazolum | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990064069 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,70 | 11,51 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,88 |
| 431 | Lansoprazolum | Zalanzo, kaps. dojel. twarde, 30 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990064076 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,05 | 22,37 | 22,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,19 |
| 432 | Lenograstimum | Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU | 1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G | 5909990742059 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 121,76 | 145,08 | 135,93 | Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznym gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 12,35 |
| 433 | Lenograstimum | Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzenia roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU | 5 fiol. z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G | 5909990742066 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 608,76 | 679,61 | 679,61 | Nowotwory zło liwe - Neutropenia w chorobach nowotworowych | Gor czka neutropeniczna (zaka enie w przebiegu neutropenii); Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznym gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem; Neutropenia wrodzona, neutropenia nabyta u pacjenta poni ej 18 roku ycia; Anemia aplastyczna | ryczałt | 3,20 |
| 434 | Levetiracetamum | Kepra , tabl. powl., 750 mg | 50 tabl. | 5909990006649 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postace farmaceutyczne | 191,92 | 222,28 | 208,56 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 16,92 |
| 435 | Levetiracetamum | Kepra , tabl. powl., 750 mg | 100 tabl. | 5909990006670 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postace farmaceutyczne | 396,41 | 445,53 | 417,12 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 33,74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|----------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|---|---------|-------|
| 436 | Levetiracetamum | Keppra , roztwór do stosowania doustnego, 100 mg/ml | 300 ml (but.) | 5909990006755 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - płynne postacie farmaceutyczne | 187,55 | 217,19 | 177,06 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 43,33 |
| 437 | Levetiracetamum | Keppra , koncentrat do sporz dziania roztworu do infuzji, 100 mg/ml | 10 fiol.a 5 ml | 5909990610891 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania pozajelitowego - levetiracetam | 595,03 | 665,10 | 665,10 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 438 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powl., 250 mg | 50 tabl. | 5909990901111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 59,08 | 73,63 | 69,52 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 7,31 |
| 439 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powl., 250 mg | 100 tabl. | 5909990901128 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 125,14 | 148,31 | 139,04 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 12,47 |
| 440 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powl., 500 mg | 50 tabl. | 5909990901210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 125,14 | 148,31 | 139,04 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 12,47 |
| 441 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powl., 500 mg | 100 tabl. | 5909990901227 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 260,09 | 296,72 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 22,20 |
| 442 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powl., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990901319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 260,07 | 296,68 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 22,16 |
| 443 | Levetiracetamum | Keppra , tabl. powl., 1000 mg | 100 tabl. | 5909990901326 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 531,34 | 592,86 | 556,16 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 43,81 |
| 444 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg | 50 tabl. | 5909990879076 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 55,24 | 69,52 | 69,52 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 445 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powl., 250 mg | 100 tabl. | 5909990879106 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 116,47 | 139,03 | 139,03 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 446 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powl., 500 mg | 50 tabl. | 5909990879168 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - levetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 116,47 | 139,03 | 139,03 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------------------|---|-----------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 447 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 500 mg | 100 tabl. | 5909990879199 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 242,67 | 278,08 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 3,56 |
| 448 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg | 50 tabl. | 5909990879250 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 179,07 | 208,54 | 208,54 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 449 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 750 mg | 100 tabl. | 5909990879281 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 369,84 | 417,10 | 417,10 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 5,33 |
| 450 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg | 50 tabl. | 5909990879342 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 242,67 | 278,08 | 278,08 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 3,56 |
| 451 | Levetiracetamum | Levetiracetam Teva, tabl. powł., 1000 mg | 100 tabl. | 5909990879373 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 166.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - lewetiracetam - stałe postacie farmaceutyczne | 497,03 | 556,15 | 556,15 | Padaczka oporna na leczenie | Napady miokloniczne w padaczce opornej na leczenie w leczeniu podtrzymuj cym w monoterapii u dzieci do 12 roku życia | ryczałt | 7,11 |
| 452 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, kaps., 12,5+50 mg | 100 kaps. | 5909990094912 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 25,74 | 33,45 | 26,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 10,65 |
| 453 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, kaps., 100+25 mg | 100 kaps. | 5909990095018 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 46,08 | 58,36 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 9,56 |
| 454 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, tabl. , 50+200 mg | 100 tabl. | 5909990095117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 85,00 | 103,99 | 103,99 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,56 |
| 455 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, kaps., 50+200 mg | 100 kaps. | 5909990095216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 85,00 | 103,99 | 103,99 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,56 |
| 456 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 12,5+50 mg | 100 tabl. | 5909990748624 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 25,74 | 33,45 | 26,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 10,65 |
| 457 | Levodopum + Benserazidum | Madopar, tabl. do sporz dzania zawiesiny doustnej, 100+25 mg | 100 tabl. | 5909990748723 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 46,08 | 58,36 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 9,56 |
| 458 | Levodopum + Benserazidum | Madopar HBS, kaps., 100+25 mg | 100 kaps. | 5909990377510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 46,08 | 58,36 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 9,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|--|--|---------|-------|
| 459 | Levodopum + Carbidopum | Nakom, tabl. , 250+25 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990175215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 51,84 | 69,65 | 69,65 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,44 |
| 460 | Levodopum + Carbidopum | Nakom Mite, tabl. , 100+25 mg | 100 tabl. | 5909990175314 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 43,20 | 55,27 | 52,00 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,47 |
| 461 | Levodopum + Carbidopum | Sinemet CR 200/50, tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200+50 mg | 100 tabl. (but.) | 5909990020416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 168.0, Leki stosowane w chorobie Parkinsona - leki doustne zawieraj ce lewodopa z inhibitorem dekarboksylazy | 78,24 | 96,77 | 96,77 | Choroba i zespół Parkinsona | Leczenie dystonii wra liwej na levodop oraz niedoboru hydroksylazy tyrozyny u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,56 |
| 462 | Losartanum | Apo-Lozart, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990702886 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,04 | 21,20 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,09 |
| 463 | Losartanum | Cozaar, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990674411 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,35 | 21,53 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,42 |
| 464 | Losartanum | Cozaar, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073428 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 32,40 | 40,98 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 18,76 |
| 465 | Losartanum | Lakea, tabl. powl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991108212 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 20,52 | 26,18 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 14,28 |
| 466 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 100 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990638659 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 32,88 | 41,49 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 19,27 |
| 467 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 56 tabl. | 5909990649112 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 9,52 |
| 468 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 84 tabl. (6 blist.po 14 szt.) | 5909990649129 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 25,92 | 35,95 | 35,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,79 |
| 469 | Losartanum | Lorista, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990818914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 16,20 | 21,38 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,27 |
| 470 | Losartanum | Losacor, tabl. powl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991055110 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 14,04 | 19,25 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 7,35 |
| 471 | Losartanum | Losagen, tabl. powl., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990639885 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 4,68 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 472 | Losartanum | Losagen, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990639908 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,22 | 31,16 | 31,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,35 |
| 473 | Losartanum | Losargamma, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. powł. | 5909990947164 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,64 | 13,29 | 13,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,99 |
| 474 | Losartanum | Losartan Arrow, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990769469 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,04 | 19,25 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,35 |
| 475 | Losartanum | Losartic, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990621439 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 21,38 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,27 |
| 476 | Losartanum | Lozap 50, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990573905 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,82 | 23,30 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,40 |
| 477 | Losartanum | Presartan, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990724345 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,12 | 20,40 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,50 |
| 478 | Losartanum | Presartan, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990724352 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 30,78 | 39,51 | 34,01 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,70 |
| 479 | Losartanum | Rasoltan 50, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990085644 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,64 | 13,29 | 13,29 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,99 |
| 480 | Losartanum | Sarve 50 mg, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990045594 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,82 | 18,83 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,72 |
| 481 | Losartanum | Stadazar, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990079575 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,68 |
| 482 | Losartanum | Xartan, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990481118 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 24,84 | 30,80 | 17,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,90 |
| 483 | Lovastatinum | Liprox, tabl., 20 mg | 28 tabl. | 5909990842315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 14,04 | 17,49 | 8,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,85 |
| 484 | Lovastatinum | Lovasterol, tabl., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990422159 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 21,60 | 25,58 | 8,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 19,94 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|---------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|---|---|---------|-------|
| 485 | Lovastatinum | Lovasterol, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990828425 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,20 | 18,74 | 4,32 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,72 |
| 486 | Lovastatinum | Lovastin, tabl. , 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990756629 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 18,65 | 8,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,01 |
| 487 | Mesalazinum | Asamax 250, czopki, 250 mg | 30 czop. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991083816 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 44,99 | 57,06 | 50,69 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 9,57 |
| 488 | Mesalazinum | Asamax 250, tabl. dojel., 250 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991084011 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 40,96 | 51,54 | 41,21 | Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 13,53 |
| 489 | Mesalazinum | Asamax 500, czopki, 500 mg | 30 czop. (5 blist.po 6 szt.) | 5909991083915 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 93,45 | 112,91 | 101,37 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 14,74 |
| 490 | Mesalazinum | Asamax 500, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. (10 blist.po 10 szt.) | 5909991084110 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 70,73 | 87,12 | 82,41 | Choroba Leśniowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 8,27 |
| 491 | Mesalazinum | Crohnax, czopki, 250 mg | 30 czop. (6 blist.po 5 szt.) | 5909991074012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 23,76 | 34,35 | 34,35 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 492 | Mesalazinum | Pentasa, czopki, 1000 mg | 28 czop. (blist.) | 5909990656813 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 165,24 | 193,43 | 189,22 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 7,41 |
| 493 | Mesalazinum | Pentasa, czopki, 1000 mg | 14 czop. (blist.) | 5909990656820 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 82,62 | 101,03 | 94,61 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 9,62 |
| 494 | Mesalazinum | Pentasa, tabl. o przedtym uwalnianiu, 500 mg | 100 tabl. (blist.) | 5909990662111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 133,98 | 154,81 | 82,41 | Choroba Leśniowskiego-Crohna; Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 75,96 |
| 495 | Mesalazinum | Pentasa, zawiesina doodbytnicza, 1 g/100 ml | 7 szt.a 100 ml | 5909990818815 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne | 81,00 | 94,12 | 36,80 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 60,52 |
| 496 | Mesalazinum | Salofalk, zawiesina doodbytnicza, 4 g/60ml | 7 but.a 60 ml | 5909990970117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.3. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - płynne postacie farmaceutyczne | 123,47 | 147,21 | 147,21 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 497 | Mesalazinum | Salofalk 250, czopki, 250 mg | 30 czop. | 5909990088829 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2. Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 47,73 | 60,00 | 50,69 | Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku życia | ryczałt | 12,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|---|---|---------|-------|
| 498 | Mesalazinum | Salofalk 250, tabl. dojel., 250 mg | 50 tabl. | 5909990400010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 26,78 | 33,63 | 20,60 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 16,23 |
| 499 | Mesalazinum | Salofalk 500, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990400119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 43,02 | 53,74 | 41,21 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 15,73 |
| 500 | Mesalazinum | Salofalk 500, czopki, 500 mg | 30 czop. | 5909990422227 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.2, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna - produkty do stosowania doodbytniczego - stałe postacie farmaceutyczne | 82,66 | 101,37 | 101,37 | Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | Zapalenia jelita grubego u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 501 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl., 2,5 mg | 50 tabl. | 5909990453726 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 8,09 | 11,76 | 10,58 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 6,51 |
| 502 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl., 5 mg | 50 tabl. | 5909990453825 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 16,18 | 22,27 | 21,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 11,78 |
| 503 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl., 10 mg | 50 tabl. | 5909990453924 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 32,36 | 42,32 | 42,32 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 21,33 |
| 504 | Methotrexatum | Trexan, tabl., 2,5 mg | 100 tabl. (but.) | 5909990111619 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 16,19 | 22,29 | 21,16 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 11,80 |
| 505 | Methotrexatum | Trexan, tabl., 10 mg | 100 tabl. (1 poj.po100 szt) | 5909990730346 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 120.1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - antymetabolity - metotreksat do stosowania doustnego | 64,80 | 80,76 | 80,76 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroby autoimmunizacyjne | ryczałt | 42,67 |
| 506 | Metoprololum | Metocard, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990034420 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 2,87 | 3,58 | 1,80 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadcisnienie tnicze oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,58 |
| 507 | Metoprololum | Metocard, tabl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990034529 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 40.0, Leki beta-adrenolityczne - selektywne - do stosowania doustnego | 5,30 | 6,70 | 3,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Tachyarytmie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego, migotanie przedsionków, nadcisnienie tnicze oraz niewydolno serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|--|----------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 508 | Mycophenolas mofetil | CellCept, tabl. , 500 mg | 50 tabl. | 5909990707515 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,39 | 370,47 | 370,47 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 509 | Mycophenolas mofetil | CellCept, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. | 5909990707614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,39 | 370,47 | 370,47 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 510 | Mycophenolas mofetil | CellCept, proszek do sporz dziania zawiesiny doustnej, 1 g/5ml | 110 g (175 ml) | 5909990980918 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 291,60 | 336,74 | 336,74 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 511 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10 szt.) | 5909990752003 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 115,16 | 144,45 | 144,45 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 512 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, kaps. twarde, 250 mg | 300 kaps. (30 blist.po 10 szt.) | 5909990752034 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 259,33 | 316,18 | 316,18 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,00 |
| 513 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990752355 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 178,20 | 211,90 | 211,90 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 514 | Mycophenolas mofetil | Limfocept, tabl. powł., 500 mg | 150 tabl. (15 blist.po 10 szt.) | 5909990752362 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 534,60 | 610,71 | 610,71 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 4,00 |
| 515 | Mycophenolas mofetil | Mofimutral, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990796069 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 167,40 | 200,35 | 200,35 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 516 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Apotex, kaps., 250 mg | 100 kaps. | 5909990718375 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 278,10 | 318,80 | 318,80 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 517 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Apotex, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990718405 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 278,10 | 318,80 | 318,80 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 518 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Sandoz 250, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. (10 blist.po 10) | 5909990074563 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 114,48 | 143,72 | 143,72 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 519 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Sandoz 500, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990715268 | 2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 140,40 | 171,46 | 171,46 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|--|-----------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 520 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Stada, kaps., 250 mg | 100 kaps. | 5909990807703 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 162,00 | 194,57 | 194,57 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 521 | Mycophenolas mofetil | Mycophenolate mofetil Stada, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990807741 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 162,00 | 194,57 | 194,57 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 522 | Mycophenolas mofetil | Myfenax, kaps. twarde, 250 mg | 100 kaps. | 5909990638185 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,16 | 370,22 | 370,22 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|-------------------------------|-----------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 523 | Mycophenolas mofetil | Myfenax, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990638208 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 326,16 | 370,22 | 370,22 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 524 | Mycophenolas mofetil | Nolfemic, tabl. powł., 250 mg | 100 tabl. | 5909990885091 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 297,00 | 339,02 | 339,02 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 525 | Mycophenolas mofetil | Nolfemic, tabl. powł., 500 mg | 50 tabl. | 5909990885107 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-05-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 134.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - kwas mykofenolowy i jego pochodne | 297,00 | 339,02 | 339,02 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy , nefropatia IgA oraz stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Steroidzale ny i cyklosporynozale ny zespół nerczycowy, nefropatia toczniowa, zapalenie naczy - u dorosłych; Leczenie tocznia rumieniowatego układowego oraz twardziny układowej; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 526 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 2850 j.m Axa/0,3ml | 10 amp.-strz.a 0,3 ml | 5909990075621 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 47,97 | 60,67 | 53,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 10,28 |
| 527 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 5700 j.m. Axa/0,6ml | 10 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990075720 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 103,47 | 124,04 | 107,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 20,06 |
| 528 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 9500 j.m. Axa/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990075829 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 160,54 | 188,31 | 178,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 13,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|--|-----------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 529 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 3800 j.m. Axa/0,4ml | 10 amp.-strz.a 0,4 ml | 5909990716821 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 64,39 | 79,85 | 71,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 11,60 |
| 530 | Nadroparinum calcicum | Fraxiparine, roztwór do wstrzykiwań, 7600 j.m. Axa/0,8ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990716920 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 128,00 | 151,90 | 142,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 12,19 |
| 531 | Nadroparinum calcicum | Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 11400 j.m. Axa/0,6ml | 10 amp.-strz.a 0,6 ml | 5909990836932 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 183,88 | 214,09 | 214,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronienia nawykowych – jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego; | ryczałt | 4,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------------|---|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|---|--|---------|-------|
| 532 | Nadroparinum calcicum | Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 15200 j.m. AXa/0,8ml | 10 amp.-strz.a 0,8 ml | 5909990837038 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 263,00 | 300,35 | 285,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 20,23 |
| 533 | Nadroparinum calcicum | Fraxodi, roztwór do wstrzykiwań, 19000 j.m. Axa/ml | 10 amp.-strz.a 1 ml | 5909990837137 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 22.0, Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn drobnocząsteczkowych | 307,17 | 349,22 | 349,22 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zaburzenia krążenia w tętnicach macicznych u kobiet w ciąży, opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego płodu, w leczeniu poronów nawykowych - jedynie w przebiegu zespołu antyfosfolipidowego; Leczenie i profilaktyka zmian zakrzepowatozatorowych u dzieci do 18 roku życia; Profilaktyka i leczenie przeciwzakrzepowe u chorych z chorobami nowotworowymi; Diagnostyka niedoboru białka C i białka S; Diagnostyka zespołu antyfosfolipidowego | ryczałt | 7,11 |
| 534 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990139613 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,66 | 8,43 | 8,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 535 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 20 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990139620 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,34 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 6,40 |
| 536 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl., 10 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990277216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0, Antagoniści wapnia - pochodne dihydropirydyny | 3,83 | 5,35 | 4,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---|------------------------------------|---------------|--|--------|---|----------|----------|----------|--|--|---------|------|
| 537 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (2 blist.po 30 szt.) | 5909990277223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 7,69 | 10,60 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 5,18 |
| 538 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | 5909990694754 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 11,34 | 16,13 | 16,13 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 6,40 |
| 539 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 20 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990694761 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 5,66 | 8,43 | 8,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,20 |
| 540 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990694778 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 3,83 | 5,35 | 4,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 4,24 |
| 541 | Nitrendipinum | Nitrendypina EGIS, tabl. , 10 mg | 60 tabl. (4 blist.po 15szt.) | 5909990694785 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 41.0. Antagoni ci wapnia - pochodne dihydropirydyny | 7,69 | 10,60 | 8,62 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda zwi zanego z twardzin ukladow (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 5,18 |
| 542 | Octreotidum | Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 50 g/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990042715 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreatyd | 37,80 | 50,72 | 50,72 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrnynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 543 | Octreotidum | Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 100 g/ml | 5 amp.a 1 ml | 5909990042913 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreatyd | 48,60 | 66,28 | 66,28 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrnynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 544 | Octreotidum | Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 20 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459612 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreatyd | 4 320,00 | 4 708,68 | 4 708,68 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji wyst puj cych w przebiegu nowotworów neuroendokrnynych; Leczenie guzów wydzielaj cych insulin oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|--|------------------------------------|---------------|--|--------|---|----------|----------|----------|---|--|---------|-------|
| 545 | Octreotidum | Sandostatin LAR, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia zawiesiny do wstrzykiwa, 10 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459711 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 79.1, Hormony przysadki i podwzgórza - inhibitory hormonu wzrostu - oktreotyd | 2 160,00 | 2 368,59 | 2 354,34 | Akromegalia | Leczenie objawów hipersekcji występujących w przebiegu nowotworów neuroendokrynnych; Leczenie guzów wydzielających insuliny oraz leczenie hyperinsulinizmu u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 17,45 |
| 546 | Omeprazolom | Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990068401 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,70 | 11,51 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 5,88 |
| 547 | Omeprazolom | Agastin, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990068425 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,05 | 22,37 | 22,37 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 11,19 |
| 548 | Omeprazolom | Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg | 14 kaps. (pojem.) | 5909990880218 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,26 | 14,26 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 8,63 |
| 549 | Omeprazolom | Bioprazol, kaps. twarde, 20 mg | 28 kaps. (pojem.) | 5909990880225 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 12,43 |
| 550 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 7 kaps. | 5909990420513 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 14,90 | 17,79 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 14,98 |
| 551 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 14 kaps. | 5909990420520 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,63 | 25,35 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 19,72 |
| 552 | Omeprazolom | Gasec - 20 Gastrocaps, kaps., 20 mg | 28 kaps. | 5909990420537 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,84 | 26,43 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej żołądka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 15,17 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|-------------------------------------|-----------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 553 | Omeprazolom | Helicid 10, kaps., 10 mg | 14 kaps. | 5909990877317 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,72 | 12,25 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,44 |
| 554 | Omeprazolom | Helicid 10, kaps., 10 mg | 28 kaps. | 5909990877324 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,36 | 22,92 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 17,29 |
| 555 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps., 20 mg | 14 kaps. (but.) | 5909990420612 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,20 | 20,61 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 14,98 |
| 556 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps., 20 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990420629 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,36 | 24,84 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,58 |
| 557 | Omeprazolom | Helicid 20, kaps., 20 mg | 90 kaps. (but.) | 5909990422654 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 57,24 | 71,69 | 71,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 35,85 |
| 558 | Omeprazolom | Heligen, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 tabl. | 5909990889600 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,69 | 18,77 | 18,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,39 |
| 559 | Omeprazolom | Heligen, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 tabl. | 5909990891351 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 25,38 | 35,21 | 35,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 17,61 |
| 560 | Omeprazolom | Losec, kaps., 20 mg | 14 kaps. | 5909990193721 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 29,51 | 34,85 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 29,22 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---|------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 561 | Omeprazolom | Loseprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. | 5909991100926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,58 | 18,65 | 18,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,33 |
| 562 | Omeprazolom | Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990613205 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,36 | 24,84 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,58 |
| 563 | Omeprazolom | Ortanol 20 Plus, kaps., 20 mg | 56 kaps. (8 blist.po 7 szt.) | 5909990615230 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 32,40 | 42,71 | 42,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 21,36 |
| 564 | Omeprazolom | Ortanol 40 Plus, kaps., 40 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990613359 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 32,40 | 42,71 | 42,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 21,36 |
| 565 | Omeprazolom | Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 14 kaps. (2 blist.po 7 szt.) | 5909990772629 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 21,06 | 25,80 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 20,17 |
| 566 | Omeprazolom | Polprazol, kaps. dojel. twarde, 20 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990772667 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 23,22 | 30,05 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 18,79 |
| 567 | Omeprazolom | Polprazol PPH, kaps. dojel. twarde, 40 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990077731 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 34,56 | 45,03 | 45,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 22,52 |
| 568 | Omeprazolom | Prazol, kaps., 20 mg | 14 kaps. | 5909990772919 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 12,96 | 17,14 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,51 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 569 | Omeprazolom | Prazol, kaps., 20 mg | 7 kaps. | 5909990772926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,48 | 8,78 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,97 |
| 570 | Omeprazolom | Prazol, kaps., 20 mg | 28 kaps. | 5909990772933 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,28 | 23,69 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,43 |
| 571 | Omeprazolom | Progastim, kaps. dojel., 20 mg | 14 kaps. (but.) | 5909990635443 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,94 | 13,91 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,28 |
| 572 | Omeprazolom | Progastim, kaps. dojel., 20 mg | 28 kaps. (but.) | 5909990635450 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,28 | 19,41 | 19,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,71 |
| 573 | Oxcarbapazepinum | Karbagen, tabl. powl., 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990048809 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbapazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 24,90 | 33,65 | 33,65 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 574 | Oxcarbapazepinum | Karbagen, tabl. powl., 300 mg | 50 tabl. | 5909990048823 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbapazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 49,68 | 63,67 | 63,67 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 575 | Oxcarbapazepinum | Karbagen, tabl. powl., 600 mg | 50 tabl. | 5909990048854 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbapazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 98,28 | 119,67 | 119,67 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 576 | Oxcarbapazepinum | Trileptal, zawiesina doustna, 60 mg/ml | 250 ml | 5909990747115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.2, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbapazepina - plynne postacie farmaceutyczne | 86,63 | 105,82 | 105,82 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 577 | Oxcarbapazepinum | Trileptal, tabl., 150 mg | 50 tabl. | 5909990825516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbapazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 29,80 | 38,90 | 33,67 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 8,43 |
| 578 | Oxcarbapazepinum | Trileptal, tabl., 300 mg | 50 tabl. | 5909990825615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksykarbapazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 57,24 | 71,76 | 67,35 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku ycia | ryczałt | 7,61 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 579 | Oxcarbazepinum | Trileptal, tabl., 600 mg | 50 tabl. | 5909990825714 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 160.1, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - oksycarbazepina - stałe postacie farmaceutyczne | 112,32 | 134,69 | 134,69 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne odogniskowe napady padaczkowe - do 6 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 580 | Pantoprazolum | Anesteloc, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990621026 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 11,34 | 15,40 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 9,77 |
| 581 | Pantoprazolum | Anesteloc, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990621040 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,30 | 26,92 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 15,66 |
| 582 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909991128418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,30 | 14,29 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 8,66 |
| 583 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991128432 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,67 | 26,25 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 14,99 |
| 584 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909991128814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 5,16 | 7,37 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 4,56 |
| 585 | Pantoprazolum | Contix, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991128838 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,69 | 14,71 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 9,08 |
| 586 | Pantoprazolum | Contracid, tabl. powł. dojelitowe, 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990736706 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,16 | 13,07 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku życia | 50% | 7,44 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 587 | Pantoprazolum | Contracid, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990736720 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 18,34 | 24,82 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,56 |
| 588 | Pantoprazolum | Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990478767 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,02 | 9,35 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 6,54 |
| 589 | Pantoprazolum | Controloc 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990478774 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 14,04 | 18,30 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,67 |
| 590 | Pantoprazolum | Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. (blist.) | 5909990689842 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 9,72 | 13,67 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,04 |
| 591 | Pantoprazolum | Controloc 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990689859 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,44 | 26,00 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 14,74 |
| 592 | Pantoprazolum | Gastrostad, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. | 5909990653409 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,56 | 11,36 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,73 |
| 593 | Pantoprazolum | Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. | 5909990653508 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,56 | 11,36 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,73 |
| 594 | Pantoprazolum | Gastrostad, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. | 5909990653539 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,50 | 19,65 | 19,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 595 | Pantoprazolum | IPP 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990085033 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,37 | 14,38 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 8,75 |
| 596 | Pantoprazolum | IPP 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (blist.) | 5909990082643 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,69 | 26,27 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,01 |
| 597 | Pantoprazolum | Noacid, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990645640 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 11,60 | 15,68 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 10,05 |
| 598 | Pantoprazolum | Noacid, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990645732 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 20,50 | 27,13 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,87 |
| 599 | Pantoprazolum | Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990075003 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 10,82 | 14,85 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,22 |
| 600 | Pantoprazolum | Nolpaza 20, tabl. dojel., 20 mg | 56 tabl. | 5909990075041 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,65 | 19,81 | 19,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,91 |
| 601 | Pantoprazolum | Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990075089 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 19,68 | 26,26 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 15,00 |
| 602 | Pantoprazolum | Nolpaza 40, tabl. dojel., 40 mg | 56 tabl. | 5909990075126 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 27,54 | 37,52 | 37,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 18,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 603 | Pantoprazolum | Panogastin, tabl. dojel., 20 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990646210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 11,34 | 15,40 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,77 |
| 604 | Pantoprazolum | Panogastin, tabl. dojel., 40 miligramy | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990646272 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 21,06 | 27,73 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 16,47 |
| 605 | Pantoprazolum | Panrazol, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990698974 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,18 | 10,95 | 10,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,48 |
| 606 | Pantoprazolum | Panrazol, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990699209 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 14,42 | 20,63 | 20,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 10,32 |
| 607 | Pantoprazolum | Pantogen 20, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (blist.Alu/Alu) | 5909990780549 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 7,35 | 11,14 | 11,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,57 |
| 608 | Pantoprazolum | Pantogen 40, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (blist.Alu/Alu) | 5909990780587 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 15,66 | 21,96 | 21,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 10,98 |
| 609 | Pantoprazolum | Pantopraz 40 mg, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990889167 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 16,09 | 22,41 | 22,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 11,21 |
| 610 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. | 5909990652303 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 4,35 | 6,50 | 5,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 3,69 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 611 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. | 5909990652334 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,82 | 12,71 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 7,08 |
| 612 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. | 5909990652358 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,69 | 12,57 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 6,94 |
| 613 | Pantoprazolum | Panzol, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. | 5909990652372 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,77 | 24,21 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 12,95 |
| 614 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 20 mg | 14 tabl. | 5909990730094 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 3,46 | 5,55 | 5,55 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 2,78 |
| 615 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990730100 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,91 | 10,66 | 10,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,33 |
| 616 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 40 mg | 14 tabl. | 5909990730162 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 6,91 | 10,66 | 10,66 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 5,33 |
| 617 | Pantoprazolum | Ranloc, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990730179 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 13,82 | 19,98 | 19,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 9,99 |
| 618 | Pantoprazolum | Xotepic, tabl. dojel., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990059546 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0, Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 8,86 | 12,76 | 11,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony luzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 7,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|---|-----------------------------------|---------------|--|--------|--|----------|----------|----------|---|--|---------|-------|
| 619 | Pantoprazolum | Xotepic, tabl. dojel., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990059591 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 2.0. Inhibitory pompy protonowej - stosowane doustnie | 17,93 | 24,39 | 22,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Choroba refluksowa, zapalenie błony łuzowej oł dka, choroba wrzodowa, zapalenie trzustki oraz przy długotrwałym stosowaniu NLPZ - u dzieci do 2 roku ycia | 50% | 13,13 |
| 620 | Pegfilgrastimum | Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml | 1 amp.-strz.a 0,6 ml (z zab.igly) | 5909990007523 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 133.0. Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - immunostymulujące - czynniki stymuluj ce wzrost granulocytów | 3 286,98 | 3 587,47 | 3 587,47 | Nowotwory zło liwe, Neutropenia w chorobach nowotworowych | Profilaktyka pierwotna i wtórna neutropenii w czasie chemioterapii o ryzyku neutropenicznej gor czki powy ej 20% oraz w uzasadnionych przypadkach u chorych z ni szym ryzykiem, w szczególności u chorych poddawanych chemioterapii o zało eniu radykalnym | ryczałt | 3,20 |
| 621 | Phenobarbitalum | Luminalum, czopki, 15 mg | 10 czop. (2 blist.po 5 szt.) | 5909990148813 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 155.1. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doodbytniczego | 2,15 | 3,22 | 3,22 | Padaczka | Padaczka u dzieci do 30 miesi ca ycia | ryczałt | 3,20 |
| 622 | Phenobarbitalum | Luminalum, tabl. , 100 mg | 10 tabl. | 5909990260614 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 155.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego | 4,40 | 6,58 | 6,56 | Padaczka | Padaczka u dzieci | ryczałt | 3,22 |
| 623 | Phenobarbitalum | Luminalum UNIA, tabl. , 100 mg | 10 tabl. | 5909990812615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 155.2. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - fenobarbital - postaci do podawania doustnego | 4,38 | 6,56 | 6,56 | Padaczka | Padaczka u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 624 | Phenoxymethylpenicillinum | Ospen 1000, tabl. powl., 1000000 U | 12 tabl. | 5909990070916 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 88.3. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postaci farmaceutyczne | 4,54 | 6,56 | 5,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | ryczałt | 3,91 |
| 625 | Phenoxymethylpenicillinum | Ospen 1500, tabl. powl., 1500000 j.m. | 12 tabl. | 5909990071012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 88.3. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - stałe postaci farmaceutyczne | 5,94 | 8,77 | 8,77 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | ryczałt | 3,20 |
| 626 | Phenoxymethylpenicillinum | Ospen 750, zawiesina doustna, 750000 j.m./5ml | 60 ml (but.) | 5909990363216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 88.4. Penicylina do stosowania doustnego - penicylina fenoksymetylowa - płynne postaci farmaceutyczne | 7,02 | 10,26 | 10,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|--|---------|------|
| 627 | Prednisolonum | Encortolon, tabl. , 5 mg | 20 tabl. | 5909990170715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.4. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednisolon | 3,93 | 5,90 | 5,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 628 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 1 mg | 20 tabl. | 5909990170616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 3,24 | 3,68 | 0,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,68 |
| 629 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 5 mg | 20 tabl. | 5909990297016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 4,15 | 5,49 | 3,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 5,15 |
| 630 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 5 mg | 100 tabl. | 5909990297023 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 13,50 | 18,59 | 17,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,21 |
| 631 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 10 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990405329 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 7,33 | 9,93 | 7,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 6,04 |
| 632 | Prednisonum | Encorton, tabl. , 20 mg | 20 tabl. (fiol.) | 5909990405428 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 82.5. Kortykosteroidy do stosowania ogólnego - glukokortykoidy do podawania doustnego - prednison | 9,87 | 14,17 | 14,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Autoimmunizacyjne zapalenie w troby lub trzustki, eozynofilowe zapalenie jelit, stan po przeszczepie nerki - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,27 |
| 633 | Propafenonum | Polfenon, tabl. powl., 150 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990034123 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 30.0. Leki przeciwyarytmiczne klasy IC - propafenon | 5,29 | 7,70 | 6,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburze rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadci nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 634 | Propafenonum | Polfenon, tabl. powł., 300 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990034215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 30.0, Leki przeciwaritmiczne klasy IC - propafenon | 9,61 | 13,84 | 13,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie dora ne i profilaktyka nawrotów nadkomorowych zaburze rytmu serca zwłaszcza u chorych z objawowym migotaniem przedsionków bez choroby organicznej serca lub w przebiegu nadci nienia t tniczego bez cech istotnego przerostu lewej komory; Zaburzenia rytmu serca w zespole WPW oraz komorowe zaburzenia rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 635 | Propranololum | Propranolol WZF, tabl. , 10 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990112111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 2,17 | 2,65 | 1,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw niem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczyńniaków wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 2,65 |
| 636 | Propranololum | Propranolol WZF, tabl. , 40 mg | 50 tabl. (2 blist.po 25szt.) | 5909990112210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 3,03 | 4,54 | 4,54 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie tachyarytmii nadkomorowych i komorowych, nadci nienia t tniczego, kardiomiopatii przerostowej z zaw niem drogi odpływu, profilaktyka napadów anoksemicznych, leczenie niewydolno ci serca oraz leczenie naczyńniaków wczesnoniemowl cych - u dzieci do 18 roku ycia; Profilaktyka migreny - u dzieci do 6 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 637 | Quinaprilum | Accupro 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909990707010 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złoż one | 18,36 | 20,79 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 20,00 |
| 638 | Quinaprilum | Accupro 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990707119 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złoż one | 22,68 | 26,48 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 22,76 |
| 639 | Quinaprilum | Accupro 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909991080129 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złoż one | 35,64 | 41,76 | 14,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 34,81 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 640 | Quinaprilum | Accupro 5, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. | 5909990706914 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,80 | 16,41 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 16,41 |
| 641 | Quinaprilum | Acurenal, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991125417 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,34 | 12,70 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,70 |
| 642 | Quinaprilum | Acurenal, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991125516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,58 | 16,74 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,95 |
| 643 | Quinaprilum | Acurenal, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991125615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 19,43 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,71 |
| 644 | Quinaprilum | Aprilgen 10mg, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014439 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 13,85 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 13,06 |
| 645 | Quinaprilum | Aprilgen 20mg, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990014460 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,20 | 19,54 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,82 |
| 646 | Quinaprilum | Aprilgen 40mg, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990014507 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 33,83 | 15,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 26,39 |
| 647 | Quinaprilum | Aprilgen 5mg, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (2 blist.po 15 szt.) | 5909990014354 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,72 | 10,97 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 10,97 |
| 648 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215737 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,72 | 10,97 | 2,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 10,97 |
| 649 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215805 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 13,85 | 3,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 13,06 |
| 650 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215898 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 19,43 | 7,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,71 |
| 651 | Quinaprilum | Quinapril Teva, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990215980 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,08 | 33,83 | 15,97 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 26,39 |
| 652 | Ramiprilum | Ampril 10 mg tabletki, tabl., 10 mg | 30 tabl. | 5909990571468 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,66 | 21,68 | 21,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 653 | Ramiprilum | Ampril 10 mg tabletki, tabl. , 10 mg | 60 tabl. | 5909990571475 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 24,84 | 34,21 | 34,21 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 25,60 |
| 654 | Ramiprilum | Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990571499 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,64 | 12,31 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,73 |
| 655 | Ramiprilum | Ampril 5 mg tabletki, tabl. , 5 mg | 60 tabl. | 5909990571505 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,77 | 19,65 | 19,65 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 656 | Ramiprilum | Apo-Rami, tabl. , 2,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990653355 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,60 | 5,44 | 5,44 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 657 | Ramiprilum | Apo-Rami, tabl. , 5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990653362 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,60 | 11,03 | 11,03 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,97 |
| 658 | Ramiprilum | Apo-Rami, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990653379 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,03 | 20,78 | 20,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 659 | Ramiprilum | Axtil, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337958 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,36 | 6,38 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,59 |
| 660 | Ramiprilum | Axtil, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337972 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 8,69 | 12,36 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,78 |
| 661 | Ramiprilum | Axtil, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990337989 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,28 | 23,41 | 23,41 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 662 | Ramiprilum | Mitrip, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909991110611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,89 | 5,87 | 5,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 663 | Ramiprilum | Mitrip, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909991110710 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,78 | 11,38 | 11,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 664 | Ramiprilum | Piramil 10 mg, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990661756 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,36 | 20,06 | 20,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 665 | Ramiprilum | Piramil 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990212170 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 6,48 | 8,64 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 666 | Ramiprilum | Piramil 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990212248 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 9,61 | 13,35 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 7,77 |
| 667 | Ramiprilum | Polpril, kaps. twarde, 5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990694631 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,88 | 11,33 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,12 |
| 668 | Ramiprilum | Polpril, kaps. twarde, 10 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990694655 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 21,91 | 21,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 669 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 10 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990052653 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 20,98 | 27,37 | 23,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 16,21 |
| 670 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 2,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990644551 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 6,49 | 8,66 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,87 |
| 671 | Ramiprilum | Ramicor, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990644575 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,88 | 16,85 | 11,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,27 |
| 672 | Ramiprilum | Ramistad 10, tabl. , 10 mg | 28 tabl. | 5909990017461 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 16,25 | 16,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 673 | Ramiprilum | Ramistad 2,5, tabl. , 2,5 mg | 28 tabl. | 5909990017447 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,24 | 5,06 | 5,06 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 674 | Ramiprilum | Ramistad 5, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990017454 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 6,48 | 9,83 | 9,83 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 5,97 |
| 675 | Ramiprilum | Ramve 10 mg, kaps. twarde, 10 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047987 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 15,34 | 21,10 | 21,10 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 11,95 |
| 676 | Ramiprilum | Ramve 2,5 mg, kaps. twarde, 2,5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047949 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 3,46 | 5,30 | 5,30 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 677 | Ramiprilum | Ramve 5 mg, kaps. twarde, 5 mg | 28 kaps. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990047963 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,78 | 11,21 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,00 |
| 678 | Ramiprilum | Tritace 10, tabl. , 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990916016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 19,76 | 25,83 | 22,36 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 679 | Ramiprilum | Tritace 2,5, tabl. , 2,5 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990478217 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 12,85 | 15,34 | 5,59 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,95 |
| 680 | Ramiprilum | Tritace 5, tabl. , 5 mg | 28 tabl. | 5909990478316 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,52 | 20,57 | 11,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 15,36 |
| 681 | Ramiprilum | Vivace 10 mg, tabl. , 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990610532 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 16,09 | 22,14 | 22,14 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 12,80 |
| 682 | Ramiprilum | Vivace 2,5 mg, tabl. , 2,5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990610440 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 4,00 | 5,99 | 5,99 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 683 | Ramiprilum | Vivace 5 mg, tabl. , 5 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990610495 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 44.0, Inhibitory konwertazy angiotensyny - produkty jednoskładnikowe i złożone | 7,88 | 11,50 | 11,50 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 6,40 |
| 684 | Ranitidinum | Ranigast, tabl. powł., 150 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990206728 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 1.0, Leki blokujące receptory histaminowe H ₂ - stosowane doustnie | 8,18 | 11,87 | 11,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Zapalenie błony śluzowej żołądka u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 685 | Risedronatum natrium | Risendros 35, tabl. powł., 35 mg | 4 tabl. | 5909990082599 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 147.0, Leki stosowane w chorobach kości - bisfosfoniany doustne - kwas alendronowy i ryzendronowy | 14,68 | 19,40 | 13,39 | Osteoporoza | Profilaktyka osteoporozy posterydowej | 30% | 10,03 |
| 686 | Salbutamolom | Salbutamol Hasco, syrop, 2 mg/5ml | 100 ml | 5909990317516 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 197.2, Doustne leki beta-2-mimetyczne o krótkim działaniu, przeznaczone do stosowania w leczeniu chorób układu oddechowego | 3,00 | 4,49 | 4,49 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 687 | Simvastatinum | Angiolip, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990673742 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,94 | 14,09 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,63 |
| 688 | Simvastatinum | Angiolip, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. | 5909990673759 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,76 | 26,57 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,65 |
| 689 | Simvastatinum | Apo-Simva 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618279 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,01 | 9,58 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,04 |
| 690 | Simvastatinum | Apo-Simva 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618286 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,80 | 16,23 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,17 |
| 691 | Simvastatinum | Apo-Simva 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990618293 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46.0, Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 22,36 | 29,59 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,46 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 692 | Simvastatinum | Egilipid, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990023608 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,32 | 10,87 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,64 |
| 693 | Simvastatinum | Egilipid, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990023646 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,85 | 21,47 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,01 |
| 694 | Simvastatinum | Egilipid, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990023653 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,81 | 39,47 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,55 |
| 695 | Simvastatinum | Simcovas, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990649532 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,99 | 12,00 | 12,00 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,60 |
| 696 | Simvastatinum | Simcovas, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990649655 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,06 | 23,69 | 23,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,11 |
| 697 | Simvastatinum | Simgal, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,23 | 13,99 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,76 |
| 698 | Simvastatinum | Simgal, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860319 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,74 | 21,35 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,89 |
| 699 | Simvastatinum | Simgal, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990860418 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 30,78 | 38,36 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 21,44 |
| 700 | Simvastatinum | Simratio 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019723 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 10,77 | 13,49 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,26 |
| 701 | Simvastatinum | Simratio 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019822 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 16,20 | 20,78 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,32 |
| 702 | Simvastatinum | Simratio 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991019945 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,32 | 38,95 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,03 |
| 703 | Simvastatinum | Simvacard 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940110 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,72 | 12,37 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,14 |
| 704 | Simvastatinum | Simvacard 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940219 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,55 | 20,09 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,63 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 705 | Simvastatinum | Simvacard 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990940318 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 27,00 | 34,32 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 17,40 |
| 706 | Simvastatinum | Simvachol, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941025 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,40 | 7,75 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,52 |
| 707 | Simvastatinum | Simvachol, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,18 | 13,27 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,81 |
| 708 | Simvastatinum | Simvachol, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990941223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 23,92 | 23,92 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,18 |
| 709 | Simvastatinum | Simvacor, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990336623 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,40 | 10,00 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,46 |
| 710 | Simvastatinum | Simvacor, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990336630 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 13,39 | 17,94 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,88 |
| 711 | Simvastatinum | Simvacor, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990675227 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 20,52 | 27,62 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,49 |
| 712 | Simvastatinum | Simvagama 10, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. | 5909991146016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 4,10 | 6,47 | 6,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 1,94 |
| 713 | Simvastatinum | Simvagama 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909991146115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,10 | 12,28 | 12,28 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,68 |
| 714 | Simvastatinum | Simvagama 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909991146214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,82 | 24,73 | 24,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,42 |
| 715 | Simvastatinum | Simvagen 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743575 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 3,63 | 5,85 | 5,85 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 1,76 |
| 716 | Simvastatinum | Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990037940 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,23 | 13,49 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,43 |
| 717 | Simvastatinum | Simvagen 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743650 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,24 | 11,20 | 11,20 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 718 | Simvastatinum | Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990037964 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,93 | 26,99 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,86 |
| 719 | Simvastatinum | Simvagen 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743667 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 21,61 | 21,61 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,48 |
| 720 | Simvastatinum | SimvaHEXAL 10, tabl. powł., 0,01 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623273 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 8,10 | 10,75 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,21 |
| 721 | Simvastatinum | SimvaHEXAL 20, tabl. powł., 0,02 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623297 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 22,10 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,04 |
| 722 | Simvastatinum | SimvaHEXAL 40, tabl. powł., 0,04 g | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623334 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 25,92 | 33,40 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,27 |
| 723 | Simvastatinum | Simvalip, tabl. powł., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623082 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,40 | 7,86 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,32 |
| 724 | Simvastatinum | Simvalip, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623105 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,83 | 14,13 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,07 |
| 725 | Simvastatinum | Simvalip, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990623136 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,82 | 24,73 | 24,73 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,42 |
| 726 | Simvastatinum | Simvastatin 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. | 5909990037698 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 6,91 | 10,84 | 10,84 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,25 |
| 727 | Simvastatinum | Simvastatin 20, tabl. powł., 20 mg | 30 tabl. | 5909990037704 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 7,88 | 12,04 | 12,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,61 |
| 728 | Simvastatinum | Simvastatin 40, tabl. powł., 40 mg | 30 tabl. | 5909990037582 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,66 | 22,42 | 22,42 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 6,73 |
| 729 | Simvastatinum | Simvasterol, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990927616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 13,50 | 16,42 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,19 |
| 730 | Simvastatinum | Simvasterol, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990927715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 17,28 | 21,94 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 13,48 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|-----|-------|
| 731 | Simvastatinum | Simvasterol, tabl. powl., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990927838 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,32 | 38,95 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,03 |
| 732 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990436316 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,72 | 12,37 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,14 |
| 733 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powl., 20 mg | 28 tabl. | 5909990436415 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 19,63 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,17 |
| 734 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. | 5909990914012 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,72 | 12,37 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,14 |
| 735 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powl., 20 mg | 28 tabl. | 5909990914111 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 15,12 | 19,63 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,17 |
| 736 | Simvastatinum | Vasilip, tabl. powl., 40 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990982714 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 22,46 | 29,46 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,54 |
| 737 | Simvastatinum | Vastan, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073114 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 8,33 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,10 |
| 738 | Simvastatinum | Vastan, tabl. powl., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909991073213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 12,10 | 16,40 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,94 |
| 739 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powl., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990055722 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,34 | 15,58 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,12 |
| 740 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powl., 10 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 5,94 | 8,44 | 6,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 3,90 |
| 741 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 11,77 | 16,20 | 12,95 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,14 |
| 742 | Simvastatinum | Ximve, tabl. powl., 40 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990935314 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,44 | 26,46 | 25,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,33 |
| 743 | Simvastatinum | Zifam 10, tabl. powl., 10 mg | 28 tabl. (pojem.) | 5909990736621 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidów - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 4,80 | 7,11 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 2,88 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|----------|----------|--|--|---------|-------|
| 744 | Simvastatinum | Zifam 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (pojem.) | 5909990736638 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 9,54 | 13,65 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,19 |
| 745 | Simvastatinum | Zifam 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (pojem.) | 5909990736645 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,38 | 26,17 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,25 |
| 746 | Simvastatinum | Zocor 10, tabl. powł., 10 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990365913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,53 | 22,87 | 6,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,64 |
| 747 | Simvastatinum | Zocor 20, tabl. powł., 20 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990366026 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 19,53 | 24,35 | 12,09 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 15,89 |
| 748 | Simvastatinum | Zocor 40, tabl. powł., 40 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990769124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 31,86 | 39,52 | 24,17 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,60 |
| 749 | Simvastatinum | Zocor 80, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990846627 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 46,0. Leki wpływające na gospodarkę lipidową - inhibitory reduktazy HMG-CoA | 71,38 | 84,78 | 48,35 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Wtórna hipercholesterolemia u dzieci do 18 roku życia | 30% | 50,94 |
| 750 | Sirolimusum | Rapamune, roztwór doustny, 1 mg/ml | 60 ml (but.+30 strzyk.) | 5909990893645 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135,1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus | 986,50 | 1 094,05 | 1 090,50 | Stan po przeszczepie narządów u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek | Stan po przeszczepie narządów u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 6,75 |
| 751 | Sirolimusum | Rapamune, tabl. powł., 1 mg | 30 tabl. | 5909990985210 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 135,1, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - sirolimus | 485,76 | 545,25 | 545,25 | Stan po przeszczepie narządów u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek | Stan po przeszczepie narządów u dzieci do 18 roku życia; Stan po przeszczepie kości, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 752 | Sotalolum | Biosotal 160, tabl., 160 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990365814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39,0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 13,91 | 17,72 | 10,90 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,09 |
| 753 | Sotalolum | Biosotal 40, tabl., 40 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990365715 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39,0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 7,58 | 9,67 | 5,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,86 |
| 754 | Sotalolum | Biosotal 80, tabl., 80 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990365616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39,0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 7,27 | 9,33 | 5,45 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,52 |
| 755 | Sotalolum | SotaHEXAL 160, tabl., 160 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990309115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39,0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 12,96 | 15,92 | 7,26 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburzeń rytmu serca - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|-------|-------|--|---|-----|-------|
| 756 | Sotalolum | SotaHEXAL 40, tabl. , 40 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991014711 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 2,43 | 3,12 | 1,82 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 1,85 |
| 757 | Sotalolum | SotaHEXAL 80, tabl. , 80 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990309016 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 39.0, Leki beta-adrenolityczne - nieselektywne - do stosowania doustnego | 7,02 | 8,54 | 3,63 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie komorowych i nadkomorowych zaburze rytmu serca - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 6,00 |
| 758 | Spironolactonum | Spironol, tabl. , 25 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990110216 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 4,81 | 6,21 | 3,56 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 3,72 |
| 759 | Spironolactonum | Spironol, tabl. , 25 mg | 100 tabl. | 5909990110223 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 17,82 | 23,23 | 17,81 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 10,76 |
| 760 | Spironolactonum | Spironol, tabl. , 100 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990673124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 9,93 | 14,25 | 14,25 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 4,28 |
| 761 | Spironolactonum | Verospiron, tabl. , 25 mg | 20 tabl. | 5909990117215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 5,89 | 7,36 | 3,56 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 4,87 |
| 762 | Spironolactonum | Verospiron, kaps. twarde, 50 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990488414 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 10,90 | 14,56 | 10,69 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 7,08 |
| 763 | Spironolactonum | Verospiron, kaps. twarde, 100 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990488513 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 38.0, Antagoni ci aldosteronu - spironolakton | 16,38 | 22,22 | 21,38 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, niewydolno serca, leczenie objawowe niewydolno ci nerek - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 7,25 |
| 764 | Sucralfatum | Ulgastran, zawiesina doustna, 1 g/5ml | 250 ml | 5909990164615 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 3.2, Leki dzialej ce ochronnie na luzowk oł dka - sukralfat - plynne postacie farmaceutyczne | 10,89 | 15,48 | 15,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci | 50% | 7,74 |
| 765 | Sucralfatum | Ulgastran, tabl. , 1 g | 50 tabl. | 5909990223619 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 3.1, Leki dzialej ce ochronnie na luzowk oł dka - sukralfat - stale postacie farmaceutyczne | 10,89 | 15,48 | 15,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci | 50% | 7,74 |
| 766 | Sucralfatum | Venter, tabl. powl., 1 g | 50 tabl. | 5909990242818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 3.1, Leki dzialej ce ochronnie na luzowk oł dka - sukralfat - stale postacie farmaceutyczne | 15,57 | 20,50 | 15,48 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Choroba wrzodowa oł dka i dwunastnicy u dzieci | 50% | 12,76 |
| 767 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Bactrim, syrop, 200+ 40 g/5ml | 100 ml | 5909990312610 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.2, Sulfametoksazol w poł czeniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie plynne | 9,80 | 13,85 | 12,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporno ci lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,39 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------------------|--|-------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 768 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Bactrim, zawiesina doustna, (0,2 g+0,04 g)/5 ml ml | 100 ml | 5909997198927 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.2, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne | 9,72 | 13,77 | 12,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 7,31 |
| 769 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol, zawiesina doustna, 200+40 g/5ml | 100 ml | 5909990117819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.2, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie płynne | 8,93 | 12,93 | 12,93 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 6,47 |
| 770 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol 120, tabl., 100+20 mg | 20 tabl. (blist.) | 5909990117529 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.1, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | 8,64 | 10,86 | 5,23 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 8,25 |
| 771 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol 480, tabl., 400+80 mg | 20 tabl. | 5909990117611 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.1, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | 15,12 | 20,91 | 20,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 10,46 |
| 772 | Sulfamethoxazolum + Trimethoprimum | Biseptol 960, tabl., 800+160 mg | 10 tabl. (blist.) | 5909990117710 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 100.1, Sulfametoksazol w połączaniu z trimetoprymem do stosowania doustnego - postacie stałe | 15,12 | 20,91 | 20,91 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego | 50% | 10,46 |
| 773 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990864416 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 25,92 | 34,14 | 30,91 | Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 6,43 |
| 774 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909990864423 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 49,68 | 62,87 | 61,81 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziejce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziejce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 4,26 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------|---|-----------|---------------|---|--------|--|--------|----------|--------|---|---|---------|--------|
| 775 | Sulfasalazinum | Salazopyrin EN , tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909997012001 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 44,82 | 57,67 | 57,67 | Choroba Le niowskiego-Crohna; Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 776 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg | 50 tabl. | 5909990283316 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 27,15 | 35,46 | 30,91 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 7,75 |
| 777 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin EN Krka, tabl. dojel., 500 mg | 100 tabl. | 5909990283323 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 48,69 | 61,81 | 61,81 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 3,20 |
| 778 | Sulfasalazinum | Sulfasalazin Krka, tabl. powl., 500 mg | 50 tabl. | 5909990283217 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 12.1, Leki przeciwzapalne działające na jelita - mesalazyna i sulfasalazyna - produkty do stosowania doustnego | 23,05 | 31,06 | 30,91 | Choroba Le niowskiego-Crohna, Wrzodziej ce zapalenie jelita grubego | 1. Choroby autoimmunizacyjne; 2. Choroba Le niowskiego-Crohna, wrzodziej ce zapalenie jelita grubego - u dzieci | ryczałt | 3,35 |
| 779 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 0,5 miligram | 30 kaps. | 5909990051052 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 100,20 | 119,53 | 86,38 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 36,35 |
| 780 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 1 miligram | 30 kaps. | 5909990051076 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 146,20 | 172,75 | 172,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 781 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 5 miligram | 30 kaps. | 5909990051137 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 995,16 | 1 096,87 | 863,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 236,32 |
| 782 | Tacrolimusum | Advagraf, kaps. o przedłu onym uwalnianiu, twarde, 3 miligram | 30 kaps. | 5909990699957 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 592,73 | 658,45 | 518,25 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 143,40 |
| 783 | Tacrolimusum | Cidimus, kaps. twarde, 0,5 mg | 30 kaps. | 5909990783489 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 74,41 | 91,94 | 86,38 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 8,76 |
| 784 | Tacrolimusum | Cidimus, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. | 5909990783533 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 729,00 | 812,08 | 812,08 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|-------------------------------------|-------------------------------|---------------|---|--------|--|--------|--------|--------|---|--|---------|------|
| 785 | Tacrolimusum | Cidimus, kaps. twarde, 1 mg | 30 kaps. | 5909990783571 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 140,40 | 166,55 | 166,55 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 786 | Tacrolimusum | Prograf, kaps. twarde, 1 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990447213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 146,20 | 172,75 | 172,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 787 | Tacrolimusum | Prograf, kaps. twarde, 5 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990447312 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 743,64 | 827,74 | 827,74 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 788 | Tacrolimusum | Prograf, kaps. twarde, 0,5 miligram | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909991148713 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 74,41 | 91,94 | 86,38 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 8,76 |
| 789 | Tacrolimusum | Tacni, kaps. twarde, 0,5 mg | 30 kaps. | 5909990821006 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 66,96 | 83,97 | 83,97 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 790 | Tacrolimusum | Tacni, kaps. twarde, 1 mg | 30 kaps. | 5909990821228 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 146,20 | 172,75 | 172,75 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 791 | Tacrolimusum | Tacni, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. | 5909990821280 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 669,60 | 748,53 | 748,53 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 792 | Tacrolimusum | Tacrolimus Intas, kaps., 0,5 mg | 30 kaps. | 5909990881352 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 68,85 | 85,99 | 85,99 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 793 | Tacrolimusum | Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg | 30 kaps. | 5909990881406 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 140,40 | 166,55 | 166,55 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czyny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------|--|-------------------------------|---------------|---|--------|---|--------|--------|--------|--|---|---------|-------|
| 794 | Tacrolimusum | Tacrolimus Intas, kaps., 1 mg | 90 kaps. | 5909990881475 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 421,20 | 474,92 | 474,92 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 795 | Tacrolimusum | Taliximun, kaps. twarde, 0,5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990836857 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 59,40 | 75,88 | 75,88 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 796 | Tacrolimusum | Taliximun, kaps. twarde, 1 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990836888 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 112,32 | 136,50 | 136,50 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 797 | Tacrolimusum | Taliximun, kaps. twarde, 5 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990836949 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 139.0, Leki przeciwnowotworowe i immunomodulujące - leki immunosupresyjne - inhibitory kalcyneuryny - takrolimus | 540,00 | 609,85 | 609,85 | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku | Stan po przeszczepie narz du unaczynionego b d szpiku - u dzieci do 18 roku ycia; Stan po przeszczepie ko czynny, rogówki, tkanek lub komórek | ryczałt | 3,20 |
| 798 | Telmisartanum | Micardis, tabl. , 40 mg | 28 tabl. | 5909990440726 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 40,48 | 47,35 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 36,24 |
| 799 | Telmisartanum | Micardis, tabl. , 80 mg | 14 tabl. | 5909990440818 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 26,18 | 32,06 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 20,95 |
| 800 | Telmisartanum | Micardis, tabl. , 80 mg | 28 tabl. | 5909990440825 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 54,02 | 64,12 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 41,90 |
| 801 | Telmisartanum | Pritor, tabl. , 40 mg | 28 tabl. | 5909990463428 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 47,43 | 54,79 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 43,68 |
| 802 | Telmisartanum | Pritor, tabl. , 80 mg | 14 tabl. | 5909990463510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 32,70 | 39,03 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 27,92 |
| 803 | Telmisartanum | Pritor, tabl. , 80 mg | 28 tabl. | 5909990463527 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anagioni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i zło one | 56,16 | 66,40 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Nadci nienie t tnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku ycia | 30% | 44,18 |
| 804 | Theophyllinum | Euphyllin CR retard, tabl. o przedtu onym uwalnianiu, 250 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990665419 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postaci o przedtu onym uwalnianiu | 5,94 | 8,12 | 5,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 5,34 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|---|-------------------------------|---------------|--|--------|--|--------|--------|--------|--|--|---------|-------|
| 805 | Theophyllum | Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990450114 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 7,02 | 8,92 | 4,78 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 7,34 |
| 806 | Theophyllum | Euphyllin Long, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 300 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990450213 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 9,18 | 11,90 | 7,18 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 7,92 |
| 807 | Theophyllum | Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. | 5909990261215 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 8,23 | 11,96 | 11,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,00 |
| 808 | Theophyllum | Theospirex retard, tabl. powł. o przedłu onym uwalnianiu, 150 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990803910 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 6,31 | 8,51 | 5,98 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 5,73 |
| 809 | Theophyllum | Theovent 300, tabl. o przedłu onym uwalnianiu, 300 mg | 50 tabl. (5 blist.po 10 szt.) | 5909990149926 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 203.0, Inne leki doustne stosowane w obturacyjnych chorobach dróg oddechowych - teofilina - postacie o przedłu onym uwalnianiu | 8,51 | 12,26 | 11,96 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Bradykardia u dzieci do 18 roku ycia | ryczałt | 4,30 |
| 810 | Tiagabinum | Gabitril, tabl. powł., 5 mg | 50 tabl. | 5909990058822 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne | 79,03 | 97,29 | 97,29 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 811 | Tiagabinum | Gabitril, tabl. powł., 10 mg | 50 tabl. | 5909990058839 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne | 163,57 | 191,75 | 191,75 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 812 | Tiagabinum | Gabitril, tabl. powł., 15 mg | 50 tabl. | 5909990058846 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 162.3, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - tiagabina - stałe postacie farmaceutyczne | 248,35 | 284,58 | 284,58 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 813 | Ticlopidinum | Aclostin, tabl. powł., 0,25 g | 60 tabl. (3 blist.po 20 szt.) | 5909990334971 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 31,32 | 41,04 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 12,31 |
| 814 | Ticlopidinum | Aclostin, tabl. powł., 0,25 g | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990667116 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 16,20 | 21,07 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,49 |
| 815 | Ticlopidinum | Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (but.) | 5909990646616 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 27,27 | 36,71 | 36,71 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,01 |
| 816 | Ticlopidinum | Apo-Clodin, tabl. powł., 250 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990938315 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 18,76 | 24,92 | 20,52 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 10,56 |
| 817 | Ticlopidinum | Iclopid, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990044986 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2, Doustne leki przeciwplytkowe - tyklopidyna | 29,70 | 39,31 | 39,31 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzie wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--------------|--|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|---|---------|-------|
| 818 | Ticlopidinum | Iclopilid, tabl. powł., 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909991029333 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 11,45 | 15,98 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 6,40 |
| 819 | Ticlopidinum | Ifapilid, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990694846 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 32,18 | 41,96 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 13,23 |
| 820 | Ticlopidinum | Ifapilid, tabl. powł., 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990694853 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 16,63 | 21,52 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 11,94 |
| 821 | Ticlopidinum | Ticlo, tabl. powł., 250 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990450510 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 17,82 | 22,81 | 13,68 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 13,23 |
| 822 | Ticlopidinum | Ticlo, tabl. powł., 250 mg | 60 tabl. (6 blist.po 10 szt.) | 5909990450534 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 23.2. Doustne leki przeciwplatekcyjne - tyklopidyna | 37,80 | 47,97 | 41,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych | 30% | 19,24 |
| 823 | Tizanidinum | Sirdalud MR, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 6 mg | 30 kaps. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671410 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 144.0. Leki działające rozkurczowo na mięśnie szkieletowe - tizanidyna | 44,24 | 55,16 | 44,58 | Stwardnienie rozsiane | Stany spastyczne ciążone z chorobami demielinizacyjnymi i neurodegeneracyjnymi u dzieci | 30% | 23,95 |
| 824 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990017652 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 10,63 | 15,10 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 5,56 |
| 825 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990017669 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 18,14 | 25,25 | 25,25 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 826 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990017676 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 32,26 | 43,47 | 43,47 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 827 | Topiramatum | Epiramat, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990017751 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 60,45 | 77,63 | 77,63 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 828 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. | 5909990649556 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 10,68 | 15,15 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 5,61 |
| 829 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990649570 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 19,70 | 26,92 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 4,64 |
| 830 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. | 5909990649594 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0. Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 30,46 | 41,54 | 41,54 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|------|
| 831 | Topiramatum | Epitoram, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. | 5909990649617 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,99 | 78,21 | 78,21 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 832 | Topiramatum | Erudan, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644117 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,56 | 16,09 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,55 |
| 833 | Topiramatum | Erudan, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644148 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 20,52 | 27,79 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,51 |
| 834 | Topiramatum | Erudan, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644155 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 41,47 | 53,31 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,54 |
| 835 | Topiramatum | Erudan, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990644162 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 81,65 | 100,32 | 100,32 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 836 | Topiramatum | Etopro, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. | 5909990061464 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 83,16 | 101,93 | 101,93 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 837 | Topiramatum | Etopro, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990061471 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 22,68 | 30,10 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,82 |
| 838 | Topiramatum | Etopro, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. | 5909990061488 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,34 | 15,85 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,31 |
| 839 | Topiramatum | Etopro, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. | 5909990061495 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 44,28 | 56,33 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 8,56 |
| 840 | Topiramatum | Oritop, tabl. powł., 25 mg | 1 but. po 60szt. | 5909990715084 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 16,20 | 23,41 | 23,41 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 841 | Topiramatum | Oritop, tabl. powł., 50 mg | 1 but. po 60szt. | 5909990715145 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 30,24 | 41,62 | 41,62 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 842 | Topiramatum | Oritop, tabl. powł., 100 mg | 1 but. po 60szt. | 5909990715169 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 56,70 | 73,94 | 73,94 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 843 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. | 5909990644056 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,45 | 77,63 | 77,63 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|-------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|-------|
| 844 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. | 5909990644070 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 32,26 | 43,47 | 43,47 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 845 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990644094 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 18,14 | 25,24 | 25,24 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 846 | Topiramatum | Symtopiram, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. | 5909990644124 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 10,63 | 15,10 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,56 |
| 847 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990758814 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 11,72 | 16,26 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 6,72 |
| 848 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990758913 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 23,44 | 30,91 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 8,63 |
| 849 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990759019 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 46,87 | 59,10 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 11,33 |
| 850 | Topiramatum | Topamax, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. (but.) | 5909990759118 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 93,64 | 113,14 | 101,93 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 14,41 |
| 851 | Topiramatum | Topamax, kaps., 15 mg | 60 kaps. (poj.) | 5909990861514 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 15,67 | 21,13 | 16,38 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,95 |
| 852 | Topiramatum | Topamax, kaps., 25 mg | 60 kaps. (poj.) | 5909990861613 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 26,13 | 34,03 | 27,30 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 9,93 |
| 853 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 25 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743377 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 10,63 | 15,10 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 5,56 |
| 854 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 50 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743384 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 18,14 | 25,24 | 25,24 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 855 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 100 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743391 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 32,26 | 43,47 | 43,47 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 856 | Topiramatum | Topigen, tabl. powł., 200 miligram | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990743407 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramat | 60,45 | 77,63 | 77,63 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|---|--------|--------|--------|-----------------------------|--|---------|------|
| 857 | Topiramatum | TopiLEK 100, tabl. powł., 0,1 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740802 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 25,92 | 36,68 | 36,68 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 858 | Topiramatum | TopiLEK 200, tabl. powł., 0,2 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740819 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 51,84 | 68,42 | 68,42 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 859 | Topiramatum | TopiLEK 25, tabl. powł., 0,025 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740789 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 6,48 | 10,66 | 10,66 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 860 | Topiramatum | TopiLEK 50, tabl. powł., 0,05 g | 28 tabl. (but.) | 5909990740796 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 12,96 | 19,70 | 19,70 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 861 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 25 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990676545 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 12,85 | 17,47 | 12,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,93 |
| 862 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990676552 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 23,54 | 31,02 | 25,48 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 8,74 |
| 863 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990676569 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 43,18 | 55,15 | 50,97 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 7,38 |
| 864 | Topiramatum | Topimatil, tabl. powł., 200 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990676576 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 80,46 | 99,04 | 99,04 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 865 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 25 mg | 60 tabl. | 5909990744978 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 12,96 | 19,94 | 19,94 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 866 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 50 mg | 60 tabl. | 5909990744985 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 25,92 | 37,00 | 37,00 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 867 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 100 mg | 60 tabl. | 5909990744992 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 51,84 | 68,74 | 68,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |
| 868 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 200 mg | 60 tabl. | 5909990745005 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 103,68 | 128,20 | 128,20 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 4,27 |
| 869 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 200 mg | 30 tabl. | 5909990763344 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 51,84 | 68,74 | 68,74 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku ycia | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|----------|----------|----------|---|--|---------|-------|
| 870 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 50 mg | 30 tabl. | 5909990763351 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 12,96 | 19,94 | 19,94 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 871 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990763368 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 25,92 | 37,00 | 37,00 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 872 | Topiramatum | Topiran, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990763375 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 6,48 | 10,82 | 10,82 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 873 | Topiramatum | Toramat, tabl., 25 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671472 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 11,88 | 16,60 | 13,65 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 6,15 |
| 874 | Topiramatum | Toramat, tabl., 50 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671489 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 19,44 | 26,87 | 26,87 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 875 | Topiramatum | Toramat, tabl., 100 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671496 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 34,56 | 46,25 | 46,25 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 876 | Topiramatum | Toramat, tabl., 200 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990671502 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 164.0, Leki przeciwpadaczkowe do stosowania doustnego - topiramatum | 64,80 | 82,60 | 82,60 | Padaczka oporna na leczenie | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia | ryczałt | 3,20 |
| 877 | Torasemidum | Trifas 10, tabl., 10 mg | 30 tabl. | 5909990471324 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 37.0, Leki moczop. - p. t.łowe | 18,47 | 20,47 | 2,46 | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III – NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem u dzieci poniżej 12 roku życia | 30% | 18,75 |
| 878 | Valganciclovirum | Valcyte, tabl. powł., 450 mg | 60 tabl. (but.) | 5909990727407 | 2012-01-01/2012-05-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01/2012-07-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 116.0, Leki przeciwwirusowe - walgancyklowir - postaci do stosowania doustnego | 5 562,00 | 6 054,23 | 6 054,23 | Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów miąższowych - profilaktyka po zakażeniu hospitalizacji zwi. zanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie, Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom nerek - profilaktyka po zakażeniu hospitalizacji zwi. zanej z transplantacją do 200 dni po przeszczepie | Zapobieganie i leczenie zakażenia wirusem cytomegalii po transplantacji narządów i szpiku - u dzieci w wieku do 18 roku życia; Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom ko. czyny, rogówki, szpiku, tkanek lub komórek - profilaktyka po zakażeniu hospitalizacji zwi. zanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie | ryczałt | 3,20 |
| 879 | Valsartanum | Axudan, tabl. powł., 0,08 g | 28 tabl. | 5909990830961 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ciśn. angiotensyn II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,58 | 16,43 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadciśnienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|-----|-------|
| 880 | Valsartanum | Axudan, tabl. powł., 0,16 g | 28 tabl. | 5909990831067 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,52 |
| 881 | Valsartanum | Bespres, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990751594 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,64 |
| 882 | Valsartanum | Bespres, tabl. powł., 160 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990751877 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,50 | 31,47 | 31,47 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,44 |
| 883 | Valsartanum | Diovan, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. | 5909990929115 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 43,20 | 50,27 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 39,16 |
| 884 | Valsartanum | Diovan, tabl. powł., 160 mg | 28 tabl. | 5909990929214 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 46,44 | 56,00 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 33,78 |
| 885 | Valsartanum | Diovan, tabl. powł., 160 mg | 14 tabl. | 5909990929238 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 29,47 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,36 |
| 886 | Valsartanum | Nortivan, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990726776 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 13,82 | 18,83 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 7,72 |
| 887 | Valsartanum | Nortivan, tabl. powł., 160 mg | 28 tabl. (2 blist.po 14 szt.) | 5909990726844 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 26,46 | 34,62 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 12,40 |
| 888 | Valsartanum | Tensart, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990681877 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 14,82 | 19,91 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,80 |
| 889 | Valsartanum | Tensart, tabl. powł., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990682065 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 30,15 | 38,57 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 16,35 |
| 890 | Valsartanum | Valsacor 160, tabl. powł., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990074969 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,52 |
| 891 | Valsartanum | Valsacor 160, tabl. powł., 160 mg | 60 tabl. | 5909990818983 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 47,52 | 60,79 | 60,79 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 18,24 |
| 892 | Valsartanum | Valsacor 80, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990074945 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 17,28 | 22,53 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 11,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|---------------|--|--------|--|-------|-------|-------|---|--|---------|-------|
| 893 | Valsartanum | Valsacor 80, tabl. powł., 80 mg | 60 tabl. | 5909990818853 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 25,16 | 33,51 | 33,51 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 10,05 |
| 894 | Valsartanum | Valsargen, kaps. twarde, 80 mg | 28 kaps. | 5909990856954 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 10,80 | 15,60 | 15,60 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 4,68 |
| 895 | Valsartanum | Valsargen, kaps. twarde, 160 mg | 28 kaps. | 5909990857081 | 2012-03-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 21,60 | 29,43 | 29,43 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 8,83 |
| 896 | Valsartanum | Valzek, tabl., 80 mg | 28 tabl. | 5909990681761 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 11,88 | 16,75 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 5,64 |
| 897 | Valsartanum | Valzek, tabl., 160 mg | 28 tabl. | 5909990681785 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 23,76 | 31,74 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 9,52 |
| 898 | Valsartanum | Zelvartan, tabl. powł., 80 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990688531 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 27,76 | 33,74 | 15,87 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 22,63 |
| 899 | Valsartanum | Zelvartan, tabl. powł., 160 mg | 28 tabl. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990688722 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-03-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 45.0, Anatagoni ci angiotensyny II - produkty jednoskładnikowe i złożone | 28,84 | 37,17 | 31,74 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | Nadcinienie tętnicze, przewlekła choroba nerek, leczenie renoprotekcyjne - u dzieci do 18 roku życia | 30% | 14,95 |
| 900 | Verapamilum | Staveran 120, tabl. powł., 120 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990045419 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil | 2,08 | 3,11 | 3,11 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 3,11 |
| 901 | Verapamilum | Staveran 40, tabl. powł., 40 mg | 20 tabl. (1 blist.po 20 szt.) | 5909990045211 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil | 2,08 | 2,52 | 1,04 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 2,52 |
| 902 | Verapamilum | Staveran 80, tabl. powł., 80 mg | 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.) | 5909990045310 | 2012-01-01 – dla kolumny 12, 2012-05-01 – dla kolumny 13 | 2 lata | 42.0, Antagoni ci wapnia - pochodne fenyloalkilaminy - werapamil | 2,08 | 2,82 | 2,07 | We wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji | W leczeniu pierwszoliniowym objawu Raynauda związanego z twardziną układów (Systemic Sclerosis - Related Raynaud's Phenomenon) | ryczałt | 2,82 |

A 2. Rodki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego dostępne w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

| lp. | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka rodka spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin wejścia w życie decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena detaliczna | Wysokość limitu finansowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją | Poziomota odpłatności | Wysokość dopłaty wiodawczych -biorecy |
|-----|-----------------------------------|--|----------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-----------------|------------------------------|---|---|-----------------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Bebilon pepti 1, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2025 kJ/100 g | 450 g | 5909990734511, 8718117600601 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka | 17,16 | 22,21 | 15,09 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 11,65 |
| 2 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Bebilon pepti 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, | 450 g | 5909990823710, 8718117600618 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka | 17,16 | 23,53 | 23,53 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 7,06 |
| 3 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Bebilon sojowy 2, proszek do sporządzenia roztworu doustnego, 2065 kJ/100 g | 400 g | 5909990400713, 8718117600632 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następnie stosowane powyżej 6 miesięcy | 10,48 | 14,95 | 14,95 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 4,49 |
| 4 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Humana SL, proszek, | 650 g | 5909990319718, 4031244774132 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia | 18,01 | 24,62 | 24,62 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 7,39 |
| 5 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Isomil, proszek, | 400 g (puszka) | 5909990660414 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.1, Diety eliminacyjne mlekozastępcze początkowe przeznaczone dla niemowląt od urodzenia | 10,09 | 13,89 | 11,04 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 6,16 |
| 6 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Isomil 2, proszek, | 400 g (puszka) | 5909990836413 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.2, Diety eliminacyjne mlekozastępcze następnie stosowane powyżej 6 miesięcy | 11,42 | 15,09 | 10,54 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 7,71 |
| 7 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Nutramigen 1, proszek do sporządzenia roztworu, | 425 g | 5909990335046, 87-12045-02729-5 | 2012-03-01 | 2 lata | 217.6, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty kazeiny | 29,70 | 38,18 | 31,86 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | ryczałt | 9,52 |
| 8 | Dieta eliminacyjna mlekozastępcza | Nutramigen 1 LGG, proszek do sporządzenia roztworu, | 400 g | 5909990586851, 8712045027530 | 2012-07-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozastępcze - hydrolizaty białek mleka | 48,28 | 55,60 | 15,62 | Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białko mleka krowiego, nietolerancja laktozy związane z nadwrażliwością na białko mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związane z nadwrażliwością na białko mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białko mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białko mleka krowiego | | 30% | 44,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------------|------------|--------|---|--------|----------|----------|---|----|---------|-------|
| 9 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen 2, proszek do sporz dzania roztworu, | 425 g | 5909990224586, 87-12045-02730-1 | 2012-03-01 | 2 lata | 217.6, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty kazeiny | 29,70 | 39,05 | 39,05 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | ryczałt | 3,20 |
| 10 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen 2 LGG, proszek do sporz dzania roztworu, | 400 g | 5909990586837, 8712045027547 | 2012-07-01 | 2 lata | 217.8, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - hydrolizaty białek mleka | 48,28 | 57,76 | 30,76 | Alergia na białko mleka krowiego, objawy zwi zane z alergii pokarmow zwi zane z nadwra liwo ci na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy zwi zana z nadwra liwo ci na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy zwi zana z nadwra liwo ci na białka mleka krowiego, inne alergie zwi zane z nadwra liwo ci na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwra liwo ci na białka mleka krowiego | | 30% | 36,23 |
| 11 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutramigen AA, proszek do przygotowania roztworu doustnego, - - | 400g | 5909990799909, 87-12045-02755-4 | 2012-07-01 | 2 lata | 217.7, Diety eliminacyjne mlekozast pcze - mieszanki elementarne | 125,28 | 149,25 | 149,25 | Stosowanie dietetyczne u niemowl t od urodzenia i dzieci z ci k postaci alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancj ró nego rodzaju ywno ci, u których zastosowanie w post powaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie przyniosło efektu, a tak e w alergii na białko sojowe i w przypadkach, gdy wskazane jest zastosowanie mieszanki elementarnej zwyczajnej | | ryczałt | 3,20 |
| 12 | Dieta eliminacyjna mlekozast pcza | Nutrison advanced Peptisorb Powder, proszek, | 4 szt.a 125g (kart.) | 5909990661510, 8712400763141 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.3, Dieta peptydowa kompletna | 44,54 | 56,93 | 56,93 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 17,08 |
| 13 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Easiphen o smaku owoców le nych, płyn doustny, | 18 poj.a 250 ml (4500 ml) | 5909990652129, 5016533625929 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.15, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w glowodany), porcjowana, w płynie - przeznaczona dla pacjentów powy ej 8 r | 501,65 | 562,69 | 562,69 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 14 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Lophlex o smaku neutralnym, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 27,8g (834g) | 5909990635030, 5016533630992 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 992,11 | 1 100,60 | 1 100,60 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 15 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Lophlex o smaku owoców le nych, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 27,8g (834g) | 5909990635054, 5016533630978 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 992,11 | 1 100,60 | 1 100,60 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 16 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Lophlex o smaku pomara czowym, proszek do sporz dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 27,8g (834g) | 5909990635047, 5016533630985 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.14, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii skondensowane, porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 992,11 | 1 100,60 | 1 100,60 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|-----------------|----|---------|------|
| 17 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 1, granulata, | 500 g | 5909990904112, 5016533644418 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.1, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla niemowl t | 252,93 | 289,90 | 289,90 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 18 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 1 mix, granulata, | 1 kg | 5909990966011, 4008976340270 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.3, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długoła cuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla niemowl t | 270,13 | 308,77 | 308,77 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 19 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 mix, proszek, | 400 g | 5909991059019, 4008976340287 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.10, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawieraj ca wszystkie składniki od ywczce, z długoła cuchowymi kwasami tłuszczowymi - przeznaczona dla dzieci po uko czeniu 1. roku ycia | 359,96 | 407,29 | 407,29 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 20 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 prima, granulata, | 500 g | 5909990634705, 5016533644425 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.8, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii skondensowana - przeznaczona dla dzieci po uko czeniu 1. roku ycia | 376,37 | 425,28 | 425,28 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 21 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 secunda, granulata, | 500 g | 5909990634699, 5016533644432 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.11, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powy ej 8 r. . | 393,86 | 444,46 | 444,46 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 22 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 shake choco, proszek, | 20 sasz.a 30g (600g) | 5909990639373, 4008976340300 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w glowodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 281,81 | 321,58 | 321,58 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 23 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 2 shake truskawkowo-waniliowy, proszek, | 20 sasz.a 30g (600g) | 5909990639366, 4008976340317 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.12, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii z dodatkowymi składnikami energetycznymi (tłuszcze i w glowodany), porcjowane - przeznaczone dla pacjentów powy ej 8 r. . | 281,81 | 321,58 | 321,58 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 24 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 3 , tabl. powl., | 600 tabl. | 5909990654857, 4008976340331 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.6, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii porcjowane, w postaci tabletek powlekanych - przeznaczone dla pacjentów powy ej 15 r. . | 501,72 | 562,77 | 562,77 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 25 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 3 advanta, granulata, | 500 g | 5909990634712, 5016533644449 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.5, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, skondensowana - przeznaczona dla pacjentów powy ej 15 r. . | 458,45 | 515,30 | 515,30 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 26 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | milupa pku 3 shake pomara czowy, proszek, | 20 sasz.a 30g (600g) | 5909990639274, 4008976340324 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.7, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii zawieraj ca dodatkowe składniki energetyczne (tłuszcze i w glowodany), porcjowane - przeznaczona dla pacjentów powy ej 15 r. . | 409,46 | 461,58 | 461,58 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 27 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Milupa PKU 3 tempora, proszek do sporz dzania roztworu doustnego, - - | 10 saszetek | 4008976599661, 4008976340294 | 2012-07-01 | 2 lata | 216.18, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii przeznaczone do stosowania u kobiet w okresie prekoncepcji, podczas ci y oraz w okresie laktacji | 438,90 | 493,86 | 493,86 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 28 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Minaphlex, proszek, | 30 sasz.a 29g (870g) | 5909991072216, 5016533640021 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane, porcjowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r. . | 432,55 | 486,90 | 486,90 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|--------------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|------------|--------|---|--------|----------|----------|---|----|---------|-------|
| 29 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Minaphlex o smaku waniliowo-ananasowym, proszek, | 30 sasz.a 29g (870g) | 5909991072315, 5016533624878 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.9, Diety eliminacyjne w fenyloketonurii nieskondensowane - przeznaczone dla dzieci w wieku od 1 do 10 r. . | 432,55 | 486,90 | 486,90 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 30 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Phenyl-Free 1, proszek do sporz. dzania roztworu, | 454 g | 5909990754465, 03-0087-510213-8 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.2, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla niemowl t i małych dzieci | 136,31 | 161,65 | 161,65 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 31 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Phenyl-Free 2, proszek do sporz. dzania roztworu, | 454 g | 5909990886715, 03-0087-510006-6 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.13, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla dzieci i dorosłych | 129,14 | 153,58 | 153,58 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 32 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | Phenyl-Free 2HP, proszek do sporz. dzania roztworu, | 454 g | 5909990886616, 03-0087-510012-7 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.16, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii - przeznaczona dla dzieci i dorosłych, w tym dla kobiet w ci y | 189,12 | 219,92 | 219,92 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 33 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | XP Analog LCP, proszek do sporz. dzania roztworu doustnego, | 400 g | 5909991022112, 5016533644456 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.4, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii nieskondensowana, z długoła cuchowymi kwasami tłuszczowymi i prebiotykami - przeznaczona dla niemowl t i jako uzupełnienie diety u dzieci do 3 r. . | 146,52 | 173,11 | 173,11 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 34 | Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii | XP Maxamum o smaku pomara czowym, proszek do sporz. dzania zawiesiny doustnej, | 30 sasz.a 50g (1500 g) | 5909990642601, 5016533620368 | 2012-01-01 | 2 lata | 216.17, Dieta eliminacyjna w fenyloketonurii, porcjowana - przeznaczona dla pacjentów powy ej 8 r. . w tym dla kobiet w ci y | 922,52 | 1 024,28 | 1 024,28 | Fenyloketonuria | | ryczałt | 3,20 |
| 35 | Dieta eliminacyjna z MCT | Bebilon pepti MCT, proszek do sporz. dzania roztworu doustnego, 2155 kJ/100 g | 450 g | 5909990713912, 8718117600625 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.4, Diety eliminacyjne z MCT | 26,10 | 33,59 | 27,40 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 14,41 |
| 36 | Dieta eliminacyjna z MCT | Humana z MCT, proszek, | 350 g | 5909990306718, 4031244774125 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.4, Diety eliminacyjne z MCT | 13,80 | 19,23 | 19,23 | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe | | 30% | 5,77 |
| 37 | Dieta eliminacyjna z MCT | Milupa cystilac, proszek, | 900 g | 5909990223299, 4008976340348 | 2012-01-01 | 2 lata | 217.5, Dieta stosowana w mukowiscydozie | 128,73 | 153,13 | 153,13 | Mukowiscydoza | | ryczałt | 3,20 |

A 3. Wyroby medyczne dostępnym w aptece na receptę w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń lub we wskazaniu określonym stanem klinicznym

| lp. | Rodzaj wyrobu | Nazwa, postać i dawka/rozmiar wyrobu medycznego | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin ważności wycie decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena detaliczna | Wysokość limitu finansowania | Zakres wskazań objętych refundacją | Zakres wskazań pozarejestrowanych objętych refundacją | Poziomota odpłatności | Wysokość dopłaty świadczeniobiorcy |
|-----|--------------------------------------|--|----------------------|---|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|-----------------|------------------------------|------------------------------------|---|-----------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | - | Keto-Diastix, test paskowy, | 50 pasków | 5016003288302 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.1, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy i ciał ketonowych w moczu | 12,74 | 17,86 | 17,86 | Cukrzyca | | 30% | 5,36 |
| 2 | - | strzykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | 10 szt. | 382900932019 | 2012-01-01 | 2 lata | 221.0, Strzykawki insulinowe | 2,16 | 3,24 | 3,24 | Cukrzyca | | 30% | 0,97 |
| 3 | - | strzykawki 0,5 ml, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | 100 szt. | 382900932033 | 2012-01-01 | 2 lata | 221.0, Strzykawki insulinowe | 21,60 | 29,08 | 29,08 | Cukrzyca | | 30% | 8,72 |
| 4 | - | strzykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | 10 szt. | 382900931012 | 2012-01-01 | 2 lata | 221.0, Strzykawki insulinowe | 2,16 | 3,24 | 3,24 | Cukrzyca | | 30% | 0,97 |
| 5 | - | strzykawki 1 ml 100U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | 100 szt. | 382900931036 | 2012-01-01 | 2 lata | 221.0, Strzykawki insulinowe | 21,60 | 29,08 | 29,08 | Cukrzyca | | 30% | 8,72 |
| 6 | - | strzykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | 10 szt. | 382900911014 | 2012-01-01 | 2 lata | 221.0, Strzykawki insulinowe | 2,16 | 3,24 | 3,24 | Cukrzyca | | 30% | 0,97 |
| 7 | - | strzykawki 1 ml 40U, wyrób medyczny jednorazowego użytku do iniekcji, | 100 szt. | 382900911038 | 2012-01-01 | 2 lata | 221.0, Strzykawki insulinowe | 21,60 | 29,08 | 29,08 | Cukrzyca | | 30% | 8,72 |
| 8 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Aquacel - opatrunek hydrofiber, opatrunek, 5x5 cm2 | 1 szt. | 768455087716 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 2,43 | 3,42 | 2,77 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 1,48 |
| 9 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Aquacel - opatrunek hydrofiber, opatrunek, 5x5 cm2 | 1 szt. | 768455087716 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 2,43 | 3,42 | 2,77 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,65 |
| 10 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Aquacel - opatrunek hydrofiber, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455087723 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 9,07 | 12,64 | 11,09 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,88 |
| 11 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Aquacel - opatrunek hydrofiber, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455087723 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 9,07 | 12,64 | 11,09 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,55 |
| 12 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Aquacel - opatrunek hydrofiber, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455087730 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 18,90 | 25,38 | 24,95 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 7,92 |
| 13 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Aquacel - opatrunek hydrofiber, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455087730 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 18,90 | 25,38 | 24,95 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,43 |
| 14 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylny, 7,5x12 cm2 | 1 szt. | 768455054367 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 6,48 | 9,63 | 9,63 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,89 |
| 15 | Emplastri alginatosa et hydrofibrice | Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylny, 7,5x12 cm2 | 1 szt. | 768455054367 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1, Opatrunki alginianowe i hydro włókienne | 6,48 | 9,63 | 9,63 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---------------------------------------|--|--------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|------|
| 16 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylne, 10x20 cm2 | 1 szt. | 768455054374 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 15,66 | 21,52 | 21,52 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,46 |
| 17 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Kaltostat - opatrunek alginianowy, opatrunek alginianowy, sterylne, 10x20 cm2 | 1 szt. | 768455054374 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 15,66 | 21,52 | 21,52 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 18 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5900516844714 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 7,42 | 10,88 | 10,88 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,26 |
| 19 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Medisorb A, opatrunek alginianowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5900516844714 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 7,42 | 10,88 | 10,88 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 20 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4049500217927 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 14,80 | 20,60 | 20,60 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,18 |
| 21 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4049500217927 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 14,80 | 20,60 | 20,60 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 22 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500217958 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 7,61 | 11,09 | 11,09 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,33 |
| 23 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500217958 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 7,61 | 11,09 | 11,09 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 24 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5x5 cm2 | 1 szt. | 4049500217965 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 3,11 | 4,14 | 2,77 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,20 |
| 25 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Sorbalgon, jałowy opatrunek z alginianów wapnia, 5x5 cm2 | 1 szt. | 4049500217965 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 3,11 | 4,14 | 2,77 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,37 |
| 26 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013466 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 6,76 | 10,17 | 10,17 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,05 |
| 27 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013466 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 6,76 | 10,17 | 10,17 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 28 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylne, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4021447013480 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 15,17 | 20,99 | 20,99 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,30 |
| 29 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylne, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4021447013480 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 15,17 | 20,99 | 20,99 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 30 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylne, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2 | 1 szt. | 4021447013442 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 2,31 | 3,29 | 2,77 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 1,35 |
| 31 | Emplastris alginatosa et hydrofibrice | Suprasorb A opatrunek z alginianu wapnia, sterylne, 5x5cm, opatrunek, 5x5 cm2 | 1 szt. | 4021447013442 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.1. Opatrunki alginianowe i hydrowłókiennne | 2,31 | 3,29 | 2,77 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,52 |
| 32 | Emplastris antimicrobica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455095148 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7. Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 17,50 | 23,81 | 21,70 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,62 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------------------|--|--------|---------------|------------|--------|--|--------|--------|--------|------------------------|----|-----------|-------|
| 33 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455095148 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 17,50 | 23,81 | 21,70 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,11 |
| 34 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455095155 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 37,66 | 48,82 | 48,82 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 14,65 |
| 35 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455095155 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 37,66 | 48,82 | 48,82 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 36 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm2 | 1 szt. | 768455095162 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 102,06 | 123,07 | 123,07 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 36,92 |
| 37 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 20x30 cm2 | 1 szt. | 768455095162 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 102,06 | 123,07 | 123,07 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 38 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2x45 cm2 | 1 szt. | 768455106738 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 15,01 | 20,78 | 19,53 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 7,11 |
| 39 | Emplastry antimicrobiotica | Aquacel Ag - opatrunek hydrofibr ze srebrem, płytki z włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem srebra, 2x45 cm2 | 1 szt. | 768455106738 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 15,01 | 20,78 | 19,53 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,25 |
| 40 | Emplastry antimicrobiotica | Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 5 x 5 cm | 1 szt. | 4049500586412 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 4,00 | 6,07 | 5,42 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,28 |
| 41 | Emplastry antimicrobiotica | Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 5 x 5 cm | 1 szt. | 4049500586412 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 4,00 | 6,07 | 5,42 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,65 |
| 42 | Emplastry antimicrobiotica | Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500586429 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 6,91 | 12,47 | 12,47 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,74 |
| 43 | Emplastry antimicrobiotica | Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500586429 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 6,91 | 12,47 | 12,47 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 44 | Emplastry antimicrobiotica | Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4049500586436 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 11,02 | 19,67 | 19,67 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,90 |
| 45 | Emplastry antimicrobiotica | Atrauman Ag, opatrunek jałowy z ma ci zawieraj cy srebro, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4049500586436 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 11,02 | 19,67 | 19,67 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|----------------------------|---|--------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 46 | Emplastry antimicrobiotica | Biatain Ag, opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm2 | 1 szt. | 5708932481922 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 34,88 | 45,85 | 45,85 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 13,76 |
| 47 | Emplastry antimicrobiotica | Biatain Ag, opatrunek piankowy ze srebrem, 15x15 cm2 | 1 szt. | 5708932481922 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 34,88 | 45,85 | 45,85 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 48 | Emplastry antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447930350 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 16,71 | 22,97 | 21,70 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 7,78 |
| 49 | Emplastry antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447930350 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 16,71 | 22,97 | 21,70 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,27 |
| 50 | Emplastry antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4021447930381 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 29,48 | 39,41 | 39,41 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 11,82 |
| 51 | Emplastry antimicrobiotica | Suprasorb A+Ag ,opatrunek alginianowy ze srebrem jonowym, sterylny, 10x20cm, opatrunek, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4021447930381 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 29,48 | 39,41 | 39,41 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 52 | Emplastry antimicrobiotica | Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447309323 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 15,40 | 21,56 | 21,56 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,47 |
| 53 | Emplastry antimicrobiotica | Vliwaktiv Ag ,opatrunek węglowy, ze srebrem chłonny , sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447309323 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 15,40 | 21,56 | 21,56 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 54 | Emplastry antimicrobiotica | Vliwaktiv Ag opatrunek w głowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, tamponada do ran gł bokich, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447309200 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 12,15 | 18,08 | 18,08 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,42 |
| 55 | Emplastry antimicrobiotica | Vliwaktiv Ag opatrunek w głowy, ze srebrem, sterylny, 10x10cm, tamponada do ran gł bokich, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447309200 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.7, Opatrunki przeciwbakteryjne zawierające jony srebra | 12,15 | 18,08 | 18,08 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 56 | Emplastry carbo activatus | Vliwaktiv opatrunek w głowy, chłonny , sterylny, 10x10cm , opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447037493 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.8, Opatrunki z w glem aktywowanym | 5,40 | 8,01 | 8,01 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,40 |
| 57 | Emplastry carbo activatus | Vliwaktiv opatrunek w głowy, chłonny , sterylny, 10x10cm , opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447037493 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.8, Opatrunki z w glem aktywowanym | 5,40 | 8,01 | 8,01 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 58 | Emplastry collagenosa | Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8 cm2 | 1 szt. | 4021447013862 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.9, Opatrunki kolagenowe | 30,21 | 39,67 | 39,67 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 11,90 |
| 59 | Emplastry collagenosa | Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 6x8x0,8cm, opatrunek, 6x8 cm2 | 1 szt. | 4021447013862 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.9, Opatrunki kolagenowe | 30,21 | 39,67 | 39,67 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|-----------------------|---|--------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 60 | Emplastry collagenosa | Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12 cm2 | 1 szt. | 4021447013886 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.9, Opatrunki kolagenowe | 57,67 | 72,68 | 72,68 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 21,80 |
| 61 | Emplastry collagenosa | Suprasorb C, opatrunek kolagenowy, sterylny 8x12x0,8cm, opatrunek, 8x12 cm2 | 1 szt. | 4021447013886 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.9, Opatrunki kolagenowe | 57,67 | 72,68 | 72,68 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 62 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500737043 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 8,18 | 11,36 | 9,64 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,61 |
| 63 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500737043 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 8,18 | 11,36 | 9,64 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,72 |
| 64 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4049500737074 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 17,82 | 23,39 | 19,28 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 9,89 |
| 65 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x20 cm2 | 1 szt. | 4049500737074 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 17,82 | 23,39 | 19,28 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 4,11 |
| 66 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500737258 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 19,44 | 25,47 | 21,69 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,29 |
| 67 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500737258 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 19,44 | 25,47 | 21,69 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 3,78 |
| 68 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4049500737401 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 30,24 | 39,08 | 38,56 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 12,09 |
| 69 | Emplastry conlativi | HydroTac , jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4049500737401 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 30,24 | 39,08 | 38,56 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,52 |
| 70 | Emplastry conlativi | HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 12,5x12,5 cm2 | 1 szt. | 4049500736534 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 7,99 | 12,25 | 12,25 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,68 |
| 71 | Emplastry conlativi | HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 12,5x12,5 cm2 | 1 szt. | 4049500736534 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 7,99 | 12,25 | 12,25 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 72 | Emplastry conlativi | HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500736596 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 12,20 | 17,71 | 17,71 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,31 |
| 73 | Emplastry conlativi | HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500736596 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 12,20 | 17,71 | 17,71 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 74 | Emplastry conlativi | HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4049500736749 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 20,52 | 28,67 | 28,67 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,60 |
| 75 | Emplastry conlativi | HydroTac comfort, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4049500736749 | 2012-05-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 20,52 | 28,67 | 28,67 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|----|---------------------|---|--------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|------|
| 76 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 20 cm | 1 szt. | 4049500586351 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 10,26 | 15,30 | 15,30 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,59 |
| 77 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 20 cm | 1 szt. | 4049500586351 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 10,26 | 15,30 | 15,30 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 78 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 10 cm | 1 szt. | 4049500587495 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 5,13 | 8,10 | 8,10 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,43 |
| 79 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 10 cm | 1 szt. | 4049500587495 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 5,13 | 8,10 | 8,10 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 80 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15 x 15 cm | 1 szt. | 4049500587501 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 11,55 | 17,02 | 17,02 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,11 |
| 81 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15 x 15 cm | 1 szt. | 4049500587501 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 11,55 | 17,02 | 17,02 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 82 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20 x 20 cm | 1 szt. | 4049500587518 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 20,52 | 28,67 | 28,67 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,60 |
| 83 | Emplastry conlativi | PermaFoam , opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20 x 20 cm | 1 szt. | 4049500587518 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 20,52 | 28,67 | 28,67 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 84 | Emplastry conlativi | PermaFoam cavity, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 10 cm | 1 szt. | 4049500586399 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 5,13 | 8,10 | 8,10 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,43 |
| 85 | Emplastry conlativi | PermaFoam cavity, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 10 cm | 1 szt. | 4049500586399 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 5,13 | 8,10 | 8,10 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 86 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 20 cm | 1 szt. | 4049500586344 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 10,26 | 15,30 | 15,30 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,59 |
| 87 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 10 x 20 cm | 1 szt. | 4049500586344 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 10,26 | 15,30 | 15,30 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 88 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 11 x 11 cm | 1 szt. | 4049500587525 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 6,21 | 9,70 | 9,70 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,91 |
| 89 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 11 x 11 cm | 1 szt. | 4049500587525 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 6,21 | 9,70 | 9,70 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 90 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15 x 15 cm | 1 szt. | 4049500587532 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 11,55 | 17,02 | 17,02 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,11 |
| 91 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 15 x 15 cm | 1 szt. | 4049500587532 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 11,55 | 17,02 | 17,02 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 92 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20 x 20 cm | 1 szt. | 4049500587549 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 20,52 | 28,67 | 28,67 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------|---|--------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 93 | Emplastry conlativi | PermaFoam comfort, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 20 x 20 cm | 1 szt. | 4049500587549 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 20,52 | 28,67 | 28,67 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 94 | Emplastry conlativi | PermaFoam concave, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 16,5 x 18 cm | 1 szt. | 4049500586382 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 15,12 | 21,81 | 21,81 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,54 |
| 95 | Emplastry conlativi | PermaFoam concave, opatrunek jałowy hydropolimerowy, 16,5 x 18 cm | 1 szt. | 4049500586382 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 15,12 | 21,81 | 21,81 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 96 | Emplastry conlativi | PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 18x18 cm2 | 1 szt. | 4049500586368 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 16,52 | 23,60 | 23,60 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 7,08 |
| 97 | Emplastry conlativi | PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 18x18 cm2 | 1 szt. | 4049500586368 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 16,52 | 23,60 | 23,60 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 98 | Emplastry conlativi | PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 22x22 cm2 | 1 szt. | 4049500586375 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 24,83 | 34,17 | 34,17 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,25 |
| 99 | Emplastry conlativi | PermaFoam sacral, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 22x22 cm2 | 1 szt. | 4049500586375 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 24,83 | 34,17 | 34,17 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 100 | Emplastry conlativi | Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 14x20 cm2 | 1 szt. | 4021447924816 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 46,87 | 55,59 | 26,99 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 36,70 |
| 101 | Emplastry conlativi | Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 14x20 cm2 | 1 szt. | 4021447924816 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 46,87 | 55,59 | 26,99 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 28,60 |
| 102 | Emplastry conlativi | Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 5x5 cm2 | 1 szt. | 4021447931289 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 12,51 | 14,10 | 2,41 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 12,41 |
| 103 | Emplastry conlativi | Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 5x5cm , opatrunek, 5x5 cm2 | 1 szt. | 4021447931289 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 12,51 | 14,10 | 2,41 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 11,69 |
| 104 | Emplastry conlativi | Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 9x9 cm , opatrunek, 9x9 cm2 | 1 szt. | 4021447924786 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 17,47 | 20,90 | 7,81 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 15,43 |
| 105 | Emplastry conlativi | Suprasorb X+PHMB, opatrunek, z uwodnionej celulozy hydrobalans z PHMB,sterylny 9x9 cm , opatrunek, 9x9 cm2 | 1 szt. | 4021447924786 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 17,47 | 20,90 | 7,81 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 13,09 |
| 106 | Emplastry conlativi | TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 4049500759823 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 5,48 | 7,45 | 5,42 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,66 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|--|--------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 107 | Emplastry conlativi | TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm ² | 1 szt. | 4049500759823 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 5,48 | 7,45 | 5,42 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,03 |
| 108 | Emplastry conlativi | TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm ² | 1 szt. | 4049500759854 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 8,18 | 11,36 | 9,64 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,61 |
| 109 | Emplastry conlativi | TenderWet, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm ² | 1 szt. | 4049500759854 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 8,18 | 11,36 | 9,64 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,72 |
| 110 | Emplastry conlativi | TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm ² | 1 szt. | 4049500759946 | 2012-03-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 4,50 | 6,40 | 5,42 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,61 |
| 111 | Emplastry conlativi | TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 7,5x7,5 cm ² | 1 szt. | 4049500759946 | 2012-03-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 4,50 | 6,40 | 5,42 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,98 |
| 112 | Emplastry conlativi | TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm ² | 1 szt. | 4049500759977 | 2012-03-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 6,57 | 9,64 | 9,64 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,89 |
| 113 | Emplastry conlativi | TenderWet 24, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm ² | 1 szt. | 4049500759977 | 2012-03-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 6,57 | 9,64 | 9,64 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 114 | Emplastry conlativi | TenderWet active cavity, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm ² | 1 szt. | 4049500021746 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 15,12 | 18,79 | 9,64 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 12,04 |
| 115 | Emplastry conlativi | TenderWet active cavity, jałowy opatrunek hydropolimerowy, 10x10 cm ² | 1 szt. | 4049500021746 | 2012-07-01 | 2 lata | 220.3, Opatrunki regulujące poziom wilgotno ci rany z dodatkami | 15,12 | 18,79 | 9,64 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 9,15 |
| 116 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 6x6 cm ² | 1 szt. | 768455050390 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,51 | 6,69 | 2,61 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,86 |
| 117 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 6x6 cm ² | 1 szt. | 768455050390 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,51 | 6,69 | 2,61 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 4,08 |
| 118 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x10 cm ² | 1 szt. | 768455050406 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 11,88 | 14,86 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 9,78 |
| 119 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x10 cm ² | 1 szt. | 768455050406 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 11,88 | 14,86 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 7,60 |
| 120 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 15x15 cm ² | 1 szt. | 768455050413 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 18,58 | 23,86 | 16,34 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 12,42 |
| 121 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 15x15 cm ² | 1 szt. | 768455050413 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 18,58 | 23,86 | 16,34 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 7,52 |
| 122 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x13 cm ² | 1 szt. | 768455050420 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 15,66 | 19,40 | 9,44 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 12,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|--|--------|--------------|------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 123 | Emplastry hydrocolloidosa | Bordered Granuflex - obramowany opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek, 10x13 cm2 | 1 szt. | 768455050420 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 15,66 | 19,40 | 9,44 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 9,96 |
| 124 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455050345 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,67 | 8,22 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,14 |
| 125 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455050345 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,67 | 8,22 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,96 |
| 126 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455050352 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 11,56 | 16,34 | 16,34 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,90 |
| 127 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455050352 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 11,56 | 16,34 | 16,34 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 128 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 768455050369 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 22,68 | 30,06 | 29,05 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 9,73 |
| 129 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 768455050369 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 22,68 | 30,06 | 29,05 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,01 |
| 130 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x20 cm2 | 1 szt. | 768455050376 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 17,93 | 23,99 | 21,79 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,74 |
| 131 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, 15x20 cm2 | 1 szt. | 768455050376 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 17,93 | 23,99 | 21,79 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,20 |
| 132 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - pasta hydrokoloidowa, pasta, 30 g | 30 g | 768455094950 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 10,80 | 12,22 | 2,18 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,69 |
| 133 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex - pasta hydrokoloidowa, pasta, 30 g | 30 g | 768455094950 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 10,80 | 12,22 | 2,18 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 10,04 |
| 134 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylne, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 768455050444 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,72 | 7,36 | 4,09 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,50 |
| 135 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylne, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 768455050444 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,72 | 7,36 | 4,09 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 3,27 |
| 136 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylne, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455050451 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 7,93 | 10,64 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,56 |
| 137 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylne, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455050451 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 7,93 | 10,64 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 3,38 |
| 138 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylne, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455050468 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 13,28 | 18,19 | 16,34 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|--|--------|---------------|------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 139 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Extra Thin - opatrunek hydrokoloidowy, opatrunek hydrokoloidowy, cienki, sterylny, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455050468 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 13,28 | 18,19 | 16,34 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,85 |
| 140 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5x19,5 cm2 | 1 szt. | 768455100309 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 18,19 | 24,93 | 24,93 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 7,48 |
| 141 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 18,5x19,5 cm2 | 1 szt. | 768455100309 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 18,19 | 24,93 | 24,93 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 142 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20x22,5 cm2 | 1 szt. | 768455100316 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 17,98 | 25,44 | 25,44 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 7,63 |
| 143 | Emplastry hydrocolloidosa | Granuflex Signal – obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, obramowany opatrunek hydrokoloidowy ze wska nikiem zmiany, samoprzylepne płytki, 20x22,5 cm2 | 1 szt. | 768455100316 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 17,98 | 25,44 | 25,44 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 144 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500222464 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 7,45 | 10,12 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,04 |
| 145 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500222464 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 7,45 | 10,12 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,86 |
| 146 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500222471 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 19,98 | 25,36 | 16,34 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 13,92 |
| 147 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500222471 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 19,98 | 25,36 | 16,34 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 9,02 |
| 148 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4049500222488 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 33,80 | 41,97 | 29,05 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 21,64 |
| 149 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4049500222488 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 33,80 | 41,97 | 29,05 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 12,92 |
| 150 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll concave, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 8x12 cm2 | 1 szt. | 4049500222501 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 15,63 | 18,80 | 6,97 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 13,92 |
| 151 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll concave, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 8x12 cm2 | 1 szt. | 4049500222501 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 15,63 | 18,80 | 6,97 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 11,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|---|--------|---------------|------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 152 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll sacral, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 12x18 cm2 | 1 szt. | 4049500222259 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 24,08 | 29,64 | 15,69 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 18,66 |
| 153 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll sacral, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 12x18 cm2 | 1 szt. | 4049500222259 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 24,08 | 29,64 | 15,69 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 13,95 |
| 154 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500222525 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 6,75 | 9,37 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,29 |
| 155 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4049500222525 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 6,75 | 9,37 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,11 |
| 156 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500222532 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 11,66 | 16,46 | 16,34 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,02 |
| 157 | Emplastry hydrocolloidosa | Hydrocoll thin, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4049500222532 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 11,66 | 16,46 | 16,34 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,12 |
| 158 | Emplastry hydrocolloidosa | Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5900516844721 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,38 | 7,91 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,83 |
| 159 | Emplastry hydrocolloidosa | Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5900516844721 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,38 | 7,91 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,65 |
| 160 | Emplastry hydrocolloidosa | Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 5900516844745 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 9,49 | 14,13 | 14,13 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,24 |
| 161 | Emplastry hydrocolloidosa | Medisorb H, opatrunek hydrokoloidowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 5900516844745 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 9,49 | 14,13 | 14,13 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 162 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolic krzyżow, sterylne, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2 | 1 szt. | 4021447013428 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 21,49 | 26,96 | 16,27 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 15,57 |
| 163 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, na okolic krzyżow, sterylne, 14x16cm, opatrunek, 14x16 cm2 | 1 szt. | 4021447013428 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 21,49 | 26,96 | 16,27 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 10,69 |
| 164 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013268 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,94 | 8,51 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,43 |
| 165 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013268 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,94 | 8,51 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,25 |
| 166 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylne, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013220 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 4,20 | 5,59 | 3,63 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,05 |
| 167 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, cienki sterylne, 5x10cm, opatrunek, 5x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013220 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 4,20 | 5,59 | 3,63 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,96 |
| 168 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylne, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447914978 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,78 | 8,33 | 7,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|---------------------------|--|--------|---------------|------------|--------|---------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 169 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447914978 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 5,78 | 8,33 | 7,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,07 |
| 170 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4021447013077 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 12,53 | 17,39 | 16,34 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,95 |
| 171 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4021447013077 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 12,53 | 17,39 | 16,34 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,05 |
| 172 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4021447013091 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 21,38 | 28,68 | 28,68 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,60 |
| 173 | Emplastry hydrocolloidosa | Suprasorb H, opatrunek hydrokoloidowy, standard, sterylny, 15x15cm, opatrunek, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4021447013091 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 21,38 | 28,68 | 28,68 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 174 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 6x12 cm2 | 1 szt. | 5900656000032 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 2,62 | 3,59 | 2,70 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 1,70 |
| 175 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 6x12 cm2 | 1 szt. | 5900656000032 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 2,62 | 3,59 | 2,70 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,89 |
| 176 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 10x12 cm2 | 1 szt. | 5900656000056 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 3,48 | 5,04 | 4,50 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 1,89 |
| 177 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 10x12 cm2 | 1 szt. | 5900656000056 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 3,48 | 5,04 | 4,50 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,54 |
| 178 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x12 cm2 | 1 szt. | 5900656000063 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 3,86 | 5,71 | 5,40 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 1,93 |
| 179 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x12 cm2 | 1 szt. | 5900656000063 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 3,86 | 5,71 | 5,40 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,31 |
| 180 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x24 cm2 | 1 szt. | 5900656000070 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 7,40 | 10,79 | 10,79 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,24 |
| 181 | Emplastry hydropolymerosa | Aqua-Gel, opatrunek hydro elowy, 12x24 cm2 | 1 szt. | 5900656000070 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 7,40 | 10,79 | 10,79 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 182 | Emplastry hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 5900516844691 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 15,91 | 20,99 | 15,61 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,06 |
| 183 | Emplastry hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 5900516844691 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 15,91 | 20,99 | 15,61 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 5,38 |
| 184 | Emplastry hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 5900516844707 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 20,57 | 27,80 | 27,75 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,38 |
| 185 | Emplastry hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 5900516844707 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 20,57 | 27,80 | 27,75 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,05 |
| 186 | Emplastry hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5900516844738 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,42 | 7,95 | 6,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,09 |
| 187 | Emplastry hydropolymerosa | Medisorb P, opatrunek polimerowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5900516844738 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,42 | 7,95 | 6,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,01 |
| 188 | Emplastry hydropolymerosa | Suprasorb G, opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013749 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 11,50 | 13,41 | 3,75 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,79 |
| 189 | Emplastry hydropolymerosa | Suprasorb G, opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylny, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013749 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 11,50 | 13,41 | 3,75 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 9,66 |
| 190 | Emplastry hydropolymerosa | Suprasorb G, opatrunek hydro elowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatrunek, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4021447013763 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydro elowe | 32,78 | 38,77 | 14,99 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 28,28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-------------------------------------|---|----------------|---------------|------------|--------|---|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 191 | Emplastry hydropolymerosa | Suprasorb G, opatrunek hydroelowy w kompresie, sterylny, 20x20cm, opatrunek, 20x20 cm2 | 1 szt. | 4021447013763 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydroelowe | 32,78 | 38,77 | 14,99 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 23,78 |
| 192 | Emplastry hydropolymerosa | Suprasorb G, el amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatrunek, 20g | 1 strzyk.a 20g | 4021447013800 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydroelowe | 16,20 | 17,55 | 0,75 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 17,03 |
| 193 | Emplastry hydropolymerosa | Suprasorb G, el amorficzny w strzykawce, sterylny, 20g, opatrunek, 20g | 1 strzyk.a 20g | 4021447013800 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.5, Opatrunki hydroelowe | 16,20 | 17,55 | 0,75 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 16,80 |
| 194 | Emplastry microfibrillum cellulosae | Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 14x20cm, opatrunek, 14x20 cm2 | 1 szt. | 4021447924724 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany | 42,98 | 55,09 | 55,09 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 16,53 |
| 195 | Emplastry microfibrillum cellulosae | Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 14x20cm, opatrunek, 14x20 cm2 | 1 szt. | 4021447924724 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany | 42,98 | 55,09 | 55,09 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 196 | Emplastry microfibrillum cellulosae | Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatrunek, 2x21 cm2 | 1 szt. | 4021447924755 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany | 17,12 | 20,89 | 8,26 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 15,11 |
| 197 | Emplastry microfibrillum cellulosae | Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 2x21cm, opatrunek, 2x21 cm2 | 1 szt. | 4021447924755 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany | 17,12 | 20,89 | 8,26 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 12,63 |
| 198 | Emplastry microfibrillum cellulosae | Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatrunek, 9x9 cm2 | 1 szt. | 4021447924663 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany | 16,36 | 21,67 | 15,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,51 |
| 199 | Emplastry microfibrillum cellulosae | Suprasorb X, z uwodnionej celulozy, hydrobalans, sterylny 9x9cm, opatrunek, 9x9 cm2 | 1 szt. | 4021447924663 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.6, Opatrunki regulujące poziom wilgotności rany | 16,36 | 21,67 | 15,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 5,73 |
| 200 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5000223415846 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 10,80 | 13,70 | 6,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,84 |
| 201 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 5000223415846 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 10,80 | 13,70 | 6,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 6,76 |
| 202 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 5000223415853 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 31,31 | 39,30 | 27,75 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 19,88 |
| 203 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 5000223415853 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 31,31 | 39,30 | 27,75 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 11,55 |
| 204 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5x5 cm2 | 1 szt. | 5000223415877 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 6,37 | 7,36 | 1,73 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,15 |
| 205 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 5x5 cm2 | 1 szt. | 5000223415877 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 6,37 | 7,36 | 1,73 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 5,63 |
| 206 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x20 cm2 | 1 szt. | 5000223416775 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 23,76 | 29,12 | 13,88 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 19,40 |
| 207 | Emplastry polyurethanum spumatum | Allewyn Non Adhesive, opatrunek poliuretanowy, 10x20 cm2 | 1 szt. | 5000223416775 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 23,76 | 29,12 | 13,88 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 15,24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|----------------------------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 208 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolic krzy ow sterylne, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2 | 1 szt. | 4021447031002 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 25,06 | 32,34 | 25,60 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 14,42 |
| 209 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, opatrunek z pianki poliuretanowej, na okolic krzy ow sterylne, 18x20,5 cm., opatrunek, 18x20,5 cm2 | 1 szt. | 4021447031002 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 25,06 | 32,34 | 25,60 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 6,74 |
| 210 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013169 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,24 | 7,75 | 6,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,89 |
| 211 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013169 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,24 | 7,75 | 6,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,81 |
| 212 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4021447013183 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 12,32 | 17,15 | 15,61 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,22 |
| 213 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4021447013183 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 12,32 | 17,15 | 15,61 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,54 |
| 214 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 4021447013145 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 4,11 | 5,63 | 3,90 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,90 |
| 215 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, nieprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 4021447013145 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 4,11 | 5,63 | 3,90 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,73 |
| 216 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013343 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,56 | 8,10 | 6,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,24 |
| 217 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 10x10cm, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 4021447013343 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,56 | 8,10 | 6,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,16 |
| 218 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4021447013367 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 12,96 | 17,84 | 15,61 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,91 |
| 219 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 15x15cm, opatrunek, 15x15 cm2 | 1 szt. | 4021447013367 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 12,96 | 17,84 | 15,61 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,23 |
| 220 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 4021447013329 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 4,37 | 5,91 | 3,90 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 3,18 |
| 221 | Emplastry polyurethanum spumatum | Suprasorb P, pianka poliuretanowa, sterylna, samoprzylepna, 7,5x7,5cm, opatrunek, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 4021447013329 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 4,37 | 5,91 | 3,90 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 2,01 |
| 222 | glukoza we krwi | Accu-Chek Active, test paskowy, | 50 pasków | 4015630056316 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,39 | 42,36 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 12,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|--------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 223 | glukoza we krwi | Accu-Chek Active, test paskowy, | 50 pasków | 4015630056316 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,39 | 42,36 | 42,36 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 224 | glukoza we krwi | Accu-Chek Go, test paskowy, | 50 pasków | 4015630056576 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,39 | 42,36 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 12,71 |
| 225 | glukoza we krwi | Accu-Chek Go, test paskowy, | 50 pasków | 4015630056576 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,39 | 42,36 | 42,36 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 226 | glukoza we krwi | Ascensia Entrust paski testowe, test paskowy, | 50 pasków | 5016003746208 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,70 | 43,76 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 14,11 |
| 227 | glukoza we krwi | Ascensia Entrust paski testowe, test paskowy, | 50 pasków | 5016003746208 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,70 | 43,76 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,60 |
| 228 | glukoza we krwi | BTM SuperCheck 1 paski testowe, test paskowy, | 50 pasków (2 fiol. po 25 szt.) | 4719932588185 | 2012-07-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,24 | 40,06 | 40,06 | Cukrzyca | | 30% | 12,02 |
| 229 | glukoza we krwi | BTM SuperCheck 1 paski testowe, test paskowy, | 50 pasków (2 fiol. po 25 szt.) | 4719932588185 | 2012-07-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,24 | 40,06 | 40,06 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 230 | glukoza we krwi | CareSens N , test paskowy, | 50 pasków | 8809126640358 | 2012-05-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,78 | 40,63 | 40,63 | Cukrzyca | | 30% | 12,19 |
| 231 | glukoza we krwi | CareSens N , test paskowy, | 50 pasków | 8809126640358 | 2012-05-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,78 | 40,63 | 40,63 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 232 | glukoza we krwi | Contour TS paski testowe, test paskowy, | 50 pasków | 5016003183904 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 34,30 | 44,40 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 14,75 |
| 233 | glukoza we krwi | Contour TS paski testowe, test paskowy, | 50 pasków | 5016003183904 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 34,30 | 44,40 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 5,24 |
| 234 | glukoza we krwi | Cukrotest Teva, test paskowy, | 50 pasków | 5907581253625 | 2012-07-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,24 | 40,06 | 40,06 | Cukrzyca | | 30% | 12,02 |
| 235 | glukoza we krwi | Cukrotest Teva, test paskowy, | 50 pasków | 5907581253625 | 2012-07-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,24 | 40,06 | 40,06 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 236 | glukoza we krwi | Diagnostic Gold Strip, test paskowy, | 50 pasków | 5906881862681 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,48 | 43,52 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 13,87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|---------|-------|
| 237 | glukoza we krwi | Diagnostic Gold Strip, test paskowy, | 50 pasków | 5906881862681 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,48 | 43,52 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,36 |
| 238 | glukoza we krwi | Diagomat Strip, test paskowy, | 50 pasków | 5906881862957 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,39 | 42,36 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 12,71 |
| 239 | glukoza we krwi | Diagomat Strip, test paskowy, | 50 pasków | 5906881862957 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,39 | 42,36 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 240 | glukoza we krwi | Eusure Test Paskowy, test paskowy, | 50 pasków | 5907814464033 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,40 | 42,37 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 12,72 |
| 241 | glukoza we krwi | Eusure Test Paskowy, test paskowy, | 50 pasków | 5907814464033 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,40 | 42,37 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,21 |
| 242 | glukoza we krwi | Evercare, test paskowy, | 50 pasków | 5904378480035 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,05 | 43,06 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 13,41 |
| 243 | glukoza we krwi | Evercare, test paskowy, | 50 pasków | 5904378480035 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,05 | 43,06 | 42,36 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,90 |
| 244 | glukoza we krwi | Evolution, test paskowy, | 50 pasków (2 fiol. po 25 szt.) | 8809115901385 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 31,32 | 41,21 | 41,21 | Cukrzyca | | 30% | 12,36 |
| 245 | glukoza we krwi | Evolution, test paskowy, | 50 pasków (2 fiol. po 25 szt.) | 8809115901385 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 31,32 | 41,21 | 41,21 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 246 | glukoza we krwi | Glucocard 01 Sensor, test paskowy, | 50 pasków | 4987486785590 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,94 | 44,02 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 14,37 |
| 247 | glukoza we krwi | Glucocard 01 Sensor, test paskowy, | 50 pasków | 4987486785590 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,94 | 44,02 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,86 |
| 248 | glukoza we krwi | Glucocard G Sensor, test paskowy, | 50 pasków | 4987486777328 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,94 | 44,02 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 14,37 |
| 249 | glukoza we krwi | Glucocard G Sensor, test paskowy, | 50 pasków | 4987486777328 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,94 | 44,02 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,86 |
| 250 | glukoza we krwi | Glucocard II, test paskowy, | 50 pasków | 4987486775454 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,26 | 42,22 | 42,22 | Cukrzyca | | 30% | 12,67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|-----------------|---|-----------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|---|----|---------|-------|
| 251 | glukoza we krwi | Glucocard II, test paskowy, | 50 pasków | 4987486775454 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,26 | 42,22 | 42,22 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 252 | glukoza we krwi | GLUCOCARD Vital Test Strip, test paskowy, | 50 pasków | 5028939000101 | 2012-07-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,24 | 40,06 | 40,06 | Cukrzyca | | 30% | 12,02 |
| 253 | glukoza we krwi | GLUCOCARD Vital Test Strip, test paskowy, | 50 pasków | 5028939000101 | 2012-07-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 30,24 | 40,06 | 40,06 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 254 | glukoza we krwi | Glucosense, test paskowy, | 50 pasków | 5908222562274 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,70 | 43,76 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 14,11 |
| 255 | glukoza we krwi | Glucosense, test paskowy, | 50 pasków | 5908222562274 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,70 | 43,76 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,60 |
| 256 | glukoza we krwi | iXell, test paskowy , test paskowy, | 50 pasków | 5908222562632 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 34,67 | 44,80 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 15,15 |
| 257 | glukoza we krwi | iXell, test paskowy , test paskowy, | 50 pasków | 5908222562632 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 34,67 | 44,80 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 5,64 |
| 258 | glukoza we krwi | Microdot, test paskowy, | 50 pasków | 5060141250035 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 31,32 | 41,21 | 41,21 | Cukrzyca | | 30% | 12,36 |
| 259 | glukoza we krwi | Microdot, test paskowy, | 50 pasków | 5060141250035 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 31,32 | 41,21 | 41,21 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 260 | glukoza we krwi | One Touch Horizon, test paskowy, | 50 pasków | 4030841253507 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,94 | 42,95 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 13,30 |
| 261 | glukoza we krwi | One Touch Horizon, test paskowy, | 50 pasków | 4030841253507 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,94 | 42,95 | 42,36 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,79 |
| 262 | glukoza we krwi | One Touch Select, test paskowy, | 50 pasków | 4030841213921 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,48 | 43,52 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 13,87 |
| 263 | glukoza we krwi | One Touch Select, test paskowy, | 50 pasków | 4030841213921 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,48 | 43,52 | 42,36 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,36 |
| 264 | glukoza we krwi | Optium Omega, test paskowy, | 50 pasków | 5021791708888 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,40 | 42,37 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 12,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|--|--|--------------------------------|---------------|------------|--------|--|-------|-------|-------|--|----|-----------|-------|
| 265 | glukoza we krwi | Optium Omega, test paskowy, | 50 pasków | 5021791708888 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 32,40 | 42,37 | 42,36 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,21 |
| 266 | glukoza we krwi | Optium Xido, test paskowy, | 50 pasków | 5021791707249 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,48 | 43,52 | 42,36 | Cukrzyca | | 30% | 13,87 |
| 267 | glukoza we krwi | Optium Xido, test paskowy, | 50 pasków | 5021791707249 | 2012-03-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 33,48 | 43,52 | 42,36 | Cukrzyca typu I; Pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 4,36 |
| 268 | glukoza we krwi | Rightest GS100, test paskowy, | 50 pasków (2 fiol. po 25 szt.) | 4710627333462 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 27,00 | 36,59 | 36,59 | Cukrzyca | | 30% | 10,98 |
| 269 | glukoza we krwi | Rightest GS100, test paskowy, | 50 pasków (2 fiol. po 25 szt.) | 4710627333462 | 2012-01-01 | 2 lata | 219.2, Paski diagnostyczne do oznaczania glukozy we krwi | 27,00 | 36,59 | 36,59 | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagaj ce co najmniej 3 wstrzykni insuliny na dob oraz terapia cukrzycy za pomoc pompy insulinowej | | ryczałt | 3,20 |
| 270 | Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one | Granugel - el hydrokoloidowy, el, 15 g | 15 g (tuba) | 768455057290 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 12,42 | 13,62 | 1,09 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 12,86 |
| 271 | Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one | Granugel - el hydrokoloidowy, el, 15 g | 15 g (tuba) | 768455057290 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 12,42 | 13,62 | 1,09 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 12,53 |
| 272 | Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one | Purilon Gel, opatrunek hydro elowy, 15 g | 15 g | 5701780645317 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 23,53 | 25,50 | 1,09 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 24,74 |
| 273 | Opatrunki hydro elowe oraz hydro elowe zlo one | Purilon Gel, opatrunek hydro elowy, 15 g | 15 g | 5701780645317 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.2, Opatrunki hydrokoloidowe | 23,53 | 25,50 | 1,09 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 24,41 |
| 274 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455059133 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 4,86 | 7,34 | 6,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 2,48 |
| 275 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455059133 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 4,86 | 7,34 | 6,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,40 |
| 276 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 14x14 cm2 | 1 szt. | 768455059140 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 10,80 | 15,21 | 13,60 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 5,69 |
| 277 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Combiderm - opatrunek absorpcyjny, opatrunek, 14x14 cm2 | 1 szt. | 768455059140 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 10,80 | 15,21 | 13,60 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 1,61 |
| 278 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 768455098910 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,40 | 7,01 | 3,90 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 4,28 |
| 279 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 7,5x7,5 cm2 | 1 szt. | 768455098910 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 5,40 | 7,01 | 3,90 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 3,11 |
| 280 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 11x11 cm2 | 1 szt. | 768455098927 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 8,86 | 11,98 | 8,39 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------------------|--|--------|--------------|------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|------------------------|----|-----------|-------|
| 281 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 11x11 cm2 | 1 szt. | 768455098927 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 8,86 | 11,98 | 8,39 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 3,59 |
| 282 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455098934 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 16,20 | 21,31 | 15,61 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 10,38 |
| 283 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 15x15 cm2 | 1 szt. | 768455098934 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 16,20 | 21,31 | 15,61 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 5,70 |
| 284 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 768455098941 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 20,52 | 27,75 | 27,75 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 8,33 |
| 285 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 20x20 cm2 | 1 szt. | 768455098941 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 20,52 | 27,75 | 27,75 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 0,00 |
| 286 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455098958 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 8,64 | 11,39 | 6,94 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 6,53 |
| 287 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 10x10 cm2 | 1 szt. | 768455098958 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 8,64 | 11,39 | 6,94 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 4,45 |
| 288 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 14x14 cm2 | 1 szt. | 768455098965 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 16,20 | 20,99 | 13,60 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 11,47 |
| 289 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 14x14 cm2 | 1 szt. | 768455098965 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 16,20 | 20,99 | 13,60 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 7,39 |
| 290 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 22x22 cm2 | 1 szt. | 768455098972 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 38,88 | 48,09 | 33,58 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 24,58 |
| 291 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 22x22 cm2 | 1 szt. | 768455098972 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 38,88 | 48,09 | 33,58 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 14,51 |
| 292 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 18,5x20,5 cm2 | 1 szt. | 768455098989 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 29,16 | 36,82 | 26,31 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 18,40 |
| 293 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 18,5x20,5 cm2 | 1 szt. | 768455098989 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 29,16 | 36,82 | 26,31 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 10,51 |
| 294 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 21x25 cm2 | 1 szt. | 768455098996 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 38,88 | 48,43 | 36,42 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 22,94 |
| 295 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 21x25 cm2 | 1 szt. | 768455098996 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 38,88 | 48,43 | 36,42 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 12,01 |
| 296 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 19x19 cm2 | 1 szt. | 768455099009 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 36,35 | 44,35 | 25,04 | Przewlekłe owrzodzenia | | 30% | 26,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|-----|------------------------------------|--|--------|--------------|------------|--------|--------------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|----|-----------|-------|
| 297 | Opatrunki poliuretanowe (piankowe) | Versiva XC - eluj cy opatrunek piankowy, eluj cy opatrunek piankowy, 19x19 cm2 | 1 szt. | 768455099009 | 2012-01-01 | 2 lata | 220.4, Opatrunki poliuretanowe | 36,35 | 44,35 | 25,04 | Epidermolysis bullosa | | bezpłatny | 19,31 |

B. Leki dostępne w ramach programu lekowego

| lp. | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin wejścia w życie decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena hurtowa brutto | Wysokość limitu finansowania | Oznaczenie załącznika zawierającego opis programu lekowego określającego zakres refundacji | Poziom odpłatności | Wysokość dopłaty wliczeniowej |
|-----|--------------------------------------|--|------------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|--|--------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Adalimumabum | Humira, roztwór do wstrzykiwań, 40 mg | 2 amp.-strz. (+2 gaziki) | 590999005055 | 2012-07-01 | 2 lata | 1050.1, blokery TNF - adalimumab | 4 155,84 | 4 446,75 | 4 446,75 | B.35.; B.33.; B.36.; B.32. | bezpłatne | 0 zł |
| 2 | Adefowir dipivoxilum | Hepsera, tabl., 10 mg | 30 tabl. | 590999009596 | 2012-07-01 | 2 lata | 1051.1, analogi nukleozydowe/nukleotydydowe inne niż lamiwudyna - adefowir | 1 814,40 | 1 941,41 | 1 941,41 | B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 3 | Alglucosidasum alfa | Myozyme, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 0,05 g | 1 fiol. a 20 ml | 5909990623853 | 2012-07-01 | 2 lata | 1052.0, Alglucosidase alfa | 1 892,16 | 2 024,61 | 2 024,61 | B.22. | bezpłatne | 0 zł |
| 4 | Anagrelidum | Thromboreductin, kaps., 0,5 mg | 100 kaps. | 5909990670154 | 2012-01-01 | 2 lata | 1053.0, anagrelidum | 1 488,24 | 1 592,42 | 1 592,42 | B.16. | bezpłatne | 0 zł |
| 5 | Betainum anhydricum | CYSTADANE, proszek doustny, 1 g | 1 but. 180 g + 3 miarki | 5909990031900 | 2012-07-01 | 2 lata | 1084.0, Betaine anhydrous | 1 728,00 | 1 848,96 | 1 848,96 | B.21. | bezpłatne | 0 zł |
| 6 | Bevacizumabum | Avastin, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 100 mg/4ml | 1 fiol. á 4 ml | 5909990010486 | 2012-07-01 | 2 lata | 1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacizumab | 1 387,80 | 1 484,95 | 1 484,95 | B.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 7 | Bevacizumabum | Avastin, koncentrat do sporządzenia roztworu do infuzji, 400 mg/16ml | 1 fiol. á 16 ml | 5909990010493 | 2012-07-01 | 2 lata | 1095.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - bewacizumab | 5 551,20 | 5 939,78 | 5 939,78 | B.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 8 | Bortezomibum | Velcade, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 3,5 mg | 1 fiol. | 5909990000890 | 2012-07-01 | 2 lata | 1054.0, Bortezomib | 4 298,40 | 4 599,29 | 4 599,29 | B.13. | bezpłatne | 0 zł |
| 9 | Bortezomibum | Velcade, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1 mg | 1 fiol. | 5909990646968 | 2012-07-01 | 2 lata | 1054.0, Bortezomib | 1 228,11 | 1 314,08 | 1 314,08 | B.13. | bezpłatne | 0 zł |
| 10 | Bosentanum | Tracleer, tabl. powł., 0,125 g | 56 tabl. (blis.) | 5909990213771 | 2012-07-01 | 2 lata | 1056.0, Bosentan | 9 828,00 | 10 515,96 | 10 515,96 | B.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 11 | Capecitabinum | Xeloda, tabl. powł., 150 mg | 60 tabl. | 5909990893416 | 2012-07-01 | 2 lata | 1006.0, Capecitabinum | 267,79 | 286,54 | 285,10 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 12 | Capecitabinum | Xeloda, tabl. powł., 500 mg | 120 tabl. | 5909990893515 | 2012-07-01 | 2 lata | 1006.0, Capecitabinum | 1 776,33 | 1 900,67 | 1 900,67 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 13 | Cetuximabum | Erbix, roztwór do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990035922 | 2012-07-01 | 2 lata | 1057.0, Cetuximab | 853,20 | 912,92 | 912,92 | B.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 14 | Cetuximabum | Erbix, roztwór do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990035946 | 2012-07-01 | 2 lata | 1057.0, Cetuximab | 4 266,00 | 4 564,62 | 4 564,62 | B.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 15 | Cinacalcetum | Mimpara, tabl. powł., 30 mg | 28 tabl. | 5909990016297 | 2012-07-01 | 2 lata | 1058.0, Cinacalcet | 643,68 | 688,74 | 688,74 | B.39. | bezpłatne | 0 zł |
| 16 | Cinacalcetum | Mimpara, tabl. powł., 60 mg | 28 tabl. | 5909990016341 | 2012-07-01 | 2 lata | 1058.0, Cinacalcet | 1 281,96 | 1 371,70 | 1 371,70 | B.39. | bezpłatne | 0 zł |
| 17 | Cinacalcetum | Mimpara, tabl. powł., 90 mg | 28 tabl. | 5909990016389 | 2012-07-01 | 2 lata | 1058.0, Cinacalcet | 1 924,56 | 2 059,28 | 2 059,28 | B.39. | bezpłatne | 0 zł |
| 18 | Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 250 j.m. | 1 fiol. (+ rozp.) | 5909990057184 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante | 675,00 | 722,25 | 722,25 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 19 | Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 500 j.m. | 1 fiol. (+ rozp.) | 5909990057191 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante | 1 350,00 | 1 444,50 | 1 444,50 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 20 | Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 1000 j.m. | 1 fiol. (+ rozp.) | 5909990057207 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante | 2 700,00 | 2 889,00 | 2 889,00 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 21 | Czynnik krzepnięcia IX rekombinowany | BeneFIX, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 2000 j.m. | 1 fiol. (+ rozp.) | 5909990057221 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.1, Factor IX coagulationis humanus recombinante | 5 400,00 | 5 778,00 | 5 778,00 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 22 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwań, 10 mcg/0,4ml | 1 amp.-strz. a 0,4 ml (b/op/blis.) | 5909990007608 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymulujące erytropoizę - darbepoetyna | 68,04 | 72,80 | 72,80 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------------|--|--|---------------|------------|--------|---|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 23 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml | 1 wstrz. 1 ml | 5909990340330 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 3 402,00 | 3 640,14 | 3 640,13 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 24 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 15 mcg/0,375ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,375 ml | 5909990738755 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 102,06 | 109,20 | 109,20 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 25 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 20 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml | 5909990738779 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 136,08 | 145,61 | 145,61 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 26 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,3 ml | 5909990738793 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 204,12 | 218,41 | 218,41 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 27 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 40 mcg/0,4ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,4 ml | 5909990738847 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 272,16 | 291,21 | 291,21 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 28 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 50 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml | 5909990738861 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 340,20 | 364,01 | 364,01 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 29 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 60 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,3 ml | 5909990738885 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 408,24 | 436,82 | 436,82 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 30 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 80 mcg/0,4ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,4 ml | 5909990738908 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 544,32 | 582,42 | 582,42 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 31 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 100 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml | 5909990738939 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 680,40 | 728,03 | 728,03 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 32 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 1 ml | 5909990739035 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 3 402,00 | 3 640,14 | 3 640,13 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 33 | Dasatynibum | Sprycel, tabl. , 20 mg | 60 tabl. (but.) | 5909990621323 | 2012-01-01 | 2 lata | 1059.0, dazatynib | 5 603,88 | 5 996,15 | 5 996,15 | B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 34 | Dasatynibum | Sprycel, tabl. , 50 mg | 60 tabl. | 5909990621354 | 2012-01-01 | 2 lata | 1059.0, dazatynib | 14 009,72 | 14 990,40 | 14 990,40 | B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 35 | Dasatynibum | Sprycel, tabl. , 100 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990671601 | 2012-01-01 | 2 lata | 1059.0, dazatynib | 14 009,72 | 14 990,40 | 14 990,40 | B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 36 | Dasatynibum | Sprycel, tabl. , 80 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990818631 | 2012-01-01 | 2 lata | 1059.0, dazatynib | 11 207,76 | 11 992,30 | 11 992,30 | B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 37 | Dasatynibum | Sprycel, tabl. , 140 mg | 30 tabl. (but.) | 5909990818655 | 2012-01-01 | 2 lata | 1059.0, dazatynib | 19 613,61 | 20 986,56 | 20 986,56 | B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 38 | Docetaxelum | Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 1 ml | 5909990810987 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 228,42 | 244,41 | 244,41 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 39 | Docetaxelum | Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 4 ml | 5909990810994 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 857,84 | 917,89 | 917,89 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 40 | Docetaxelum | Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 7 ml | 5909990811007 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 2 247,70 | 2 405,04 | 2 405,04 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 41 | Docetaxelum | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg | 1 fiol. a 2 ml | 5909990777006 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 246,02 | 263,24 | 263,24 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 42 | Docetaxelum | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg | 1 fiol. a 8 ml | 5909990777020 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 997,27 | 1 067,08 | 1 067,08 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 43 | Docetaxelum | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 160 mg | 1 fiol. a 16 ml | 5909990850280 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 1 053,97 | 1 127,75 | 1 127,75 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 44 | Docetaxelum | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml | 5909990786466 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 64,80 | 69,34 | 69,34 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 45 | Docetaxelum | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. á 8 ml | 5909990786473 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 259,20 | 277,34 | 277,34 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 46 | Docetaxelum | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. á 16 ml | 5909990786480 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 486,00 | 520,02 | 520,02 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 47 | Docetaxelum | Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml | 1 fiol. 0,5 ml + 1 fiol. rozp. 1,5 ml | 5909990744688 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 70,92 | 75,88 | 75,88 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 48 | Docetaxelum | Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml | 1 fiol. a 2 ml +1fiol. rozp. a 6 ml | 5909990744695 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 283,69 | 303,55 | 303,55 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----------------|---|---------------------------------------|---------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|-------|-----------|------|
| 49 | Docetaxelum | Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml | 1 fiol. a 0,5 ml (+ rozp.1,5 ml) | 5909990863662 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 97,98 | 104,84 | 104,84 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 50 | Docetaxelum | Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml | 1 fiol. a 2 ml (+1fiol. rozp. a 6 ml) | 5909990863679 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 538,92 | 576,64 | 576,64 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 51 | Entekavirum | Baraclude, tabl. , 0,5 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990619177 | 2012-07-01 | 2 lata | 1051.2, analogi nuklezydowe/nukleotydyne inne ni lamiwudyna - entekawir | 1 674,00 | 1 791,18 | 1 791,18 | B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 52 | Entekavirum | Baraclude, tabl. , 1 mg | 30 tabl. (1 blist.po 30 szt.) | 5909990619191 | 2012-07-01 | 2 lata | 1051.2, analogi nuklezydowe/nukleotydyne inne ni lamiwudyna - entekawir | 1 674,00 | 1 791,18 | 1 791,18 | B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 53 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 1000 j.m./0,5 ml | 6 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990654062 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 86,40 | 92,45 | 92,45 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 54 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 2000 j.m./ml | 6 amp.-strz. a 1 ml | 5909990654086 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 172,80 | 184,90 | 184,90 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 55 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 3000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990654109 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 259,20 | 277,34 | 277,34 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 56 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 4000 j.m./0,4 ml | 6 amp.-strz. a 0,4 ml | 5909990654123 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 345,60 | 369,79 | 369,79 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 57 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 5000 j.m./0,5 ml | 6 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990654147 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 432,00 | 462,24 | 462,24 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 58 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 6000 j.m./0,6 ml | 6 amp.-strz. a 0,6 ml | 5909990654161 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 518,40 | 554,69 | 554,69 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 59 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 8000 j.m./0,8 ml | 6 amp.-strz. a 0,8 ml | 5909990654185 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 691,20 | 739,58 | 739,58 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 60 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampułkostrzykawce, 10000 j.m./1 ml | 6 amp.-strz. a 1 ml | 5909990654208 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 864,00 | 924,48 | 924,48 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 61 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 1000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072378 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 172,80 | 184,90 | 92,45 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 62 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 2000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072392 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 345,60 | 369,79 | 184,90 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 63 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 3000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072439 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 518,40 | 554,69 | 277,34 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 64 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 4000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072453 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 691,20 | 739,58 | 369,79 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 65 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072477 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 864,00 | 924,48 | 462,24 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 66 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 6000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072491 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 036,80 | 1 109,38 | 554,69 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 67 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 8000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072538 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 382,40 | 1 479,17 | 739,58 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 68 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072552 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 728,00 | 1 848,96 | 924,48 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 69 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 40000 j.m./ml | 6 amp-strz. a 1 ml | 5909990845170 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 6 912,00 | 7 395,84 | 3 697,90 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 70 | Epoetinum alfa | Eprex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 2000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 0,5 ml | 5909990670956 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 183,12 | 195,94 | 92,45 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------|------------|--------|---|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|------|
| 71 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do żylnych, 4000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 0,5 ml | 5909990670963 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 366,25 | 391,89 | 184,90 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 72 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do żylnych, 10000 j.m./ml | 6 amp.-strz 0,3 ml | 5909990670970 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 549,37 | 587,83 | 277,34 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 73 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do żylnych, 10000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 0,4 ml | 5909990670987 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 732,50 | 783,78 | 369,79 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 74 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do żylnych, 10000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 1 ml | 5909990671045 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 831,25 | 1 959,44 | 924,48 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 75 | Erlotinibum | Tarceva, tabl. powł., 25 mg | 30 tabl. | 5909990334261 | 2012-07-01 | 2 lata | 1085.0, Erlotinib | 2 231,83 | 2 388,06 | 2 388,06 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 76 | Erlotinibum | Tarceva, tabl. powł., 100 mg | 30 tabl. | 5909990334278 | 2012-07-01 | 2 lata | 1085.0, Erlotinib | 7 752,66 | 8 295,35 | 8 295,35 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 77 | Erlotinibum | Tarceva, tabl. powł., 150 mg | 30 tabl. | 5909990334285 | 2012-07-01 | 2 lata | 1085.0, Erlotinib | 9 063,00 | 9 697,41 | 9 697,41 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 78 | Etanerceptum | Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa do stosowania u dzieci, 25 mg/ml | 4 fiol. (+4amp.-strz.+akces.) | 5909990612161 | 2012-07-01 | 2 lata | 1050.2, blokery TNF - etanercept | 1 998,00 | 2 137,86 | 2 137,86 | B.35.; B.33.; B.36. | bezpłatne | 0 zł |
| 79 | Etanerceptum | Enbrel, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 25 mg | 4 amp.-strz. (+8gazik.z alkoh.) | 5909990618217 | 2012-07-01 | 2 lata | 1050.2, blokery TNF - etanercept | 1 998,00 | 2 137,86 | 2 137,86 | B.35.; B.33.; B.36. | bezpłatne | 0 zł |
| 80 | Etanerceptum | Enbrel, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg | 4 amp.-strz. (+8gazik.z alkoh.) | 5909990618255 | 2012-07-01 | 2 lata | 1050.2, blokery TNF - etanercept | 3 996,00 | 4 275,72 | 4 275,72 | B.35.; B.33.; B.36. | bezpłatne | 0 zł |
| 81 | Etanerceptum | Enbrel, roztwór do wstrzykiwa we wstrzykiwaczu, 50 mg | 4 wstrz. (+8gazik.z alkoh.) | 5909990712755 | 2012-07-01 | 2 lata | 1050.2, blokery TNF - etanercept | 3 996,00 | 4 275,72 | 4 275,72 | B.35.; B.33.; B.36. | bezpłatne | 0 zł |
| 82 | Everolimusum | Afinitor, tabl. , 5 mg | 30 tabl. | 5909990711567 | 2012-07-01 | 2 lata | 1086.0, Ewerolimus | 12 088,44 | 12 934,63 | 12 934,63 | B.10. | bezpłatne | 0 zł |
| 83 | Everolimusum | Afinitor, tabl. , 10 mg | 30 tabl. | 5909990711598 | 2012-07-01 | 2 lata | 1086.0, Ewerolimus | 16 159,18 | 17 290,32 | 17 290,32 | B.10. | bezpłatne | 0 zł |
| 84 | Factor IX coagulationis humanus | Berinin P 1200, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 1200 j.m. | 1 zest. | 5909990930500 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 3 740,27 | 4 002,09 | 2 036,17 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 85 | Factor IX coagulationis humanus | Berinin P 300, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 300 j.m. | 1 zest. | 5909990930579 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 994,57 | 1 064,19 | 509,04 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 86 | Factor IX coagulationis humanus | Berinin P 600, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 600 j.m. | 1 zest. | 5909990930562 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 1 514,46 | 1 620,47 | 1 018,09 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 87 | Factor IX coagulationis humanus | Immunine 1200 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 1200 j.m. | 1 zest. | 5909990645220 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 1 902,96 | 2 036,17 | 2 036,17 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 88 | Factor IX coagulationis humanus | Immunine 600 IU, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 600 j.m. | 1 zest. | 5909990643110 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 951,48 | 1 018,08 | 1 018,08 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 89 | Factor IX coagulationis humanus | Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 100 j.m./ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990623549 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 1 444,42 | 1 545,53 | 848,40 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 90 | Factor IX coagulationis humanus | Mononine, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 100 j.m./ml | 1 fiol. a 10ml | 5909990623563 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 2 759,23 | 2 952,38 | 1 696,81 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---|---|------------------------------------|---------------|------------|--------|---|----------|-----------|-----------|-------|-----------|------|
| 91 | Factor IX coagulationis humanus | Octanine F 1000 IU, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m. | 1 amp. | 5909990799374 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 2 106,00 | 2 253,42 | 1 696,81 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 92 | Factor IX coagulationis humanus | Octanine F 500 IU, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m. | 1 amp. | 5909990799367 | 2012-07-01 | 2 lata | 1091.2, Factor IX coagulationis humanus | 1 053,00 | 1 126,71 | 848,40 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 93 | Factor VIII coagulationis humanus | Beriate P 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 1000 j.m. | 1 fiol.liof. (+ rozp.) | 5909990928057 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 2 701,08 | 2 890,16 | 2 288,09 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 94 | Factor VIII coagulationis humanus | Beriate P 250, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 250 j.m. | 1 fiol.liof. (+ rozp.) | 5909990928033 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 702,59 | 751,77 | 572,02 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 95 | Factor VIII coagulationis humanus | Beriate P 500, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 500 j.m. | 1 fiol.liof. (+ rozp.) | 5909990928040 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 1 233,53 | 1 319,88 | 1 144,05 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 96 | Factor VIII coagulationis humanus | Immunate Baxter 1000, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m./fiol. | 1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+ 1zest.) | 5909990573615 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 1 423,44 | 1 523,08 | 1 523,08 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 97 | Factor VIII coagulationis humanus | Immunate Baxter 250, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m./fiol. | 1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+ 1zest.) | 5909990573554 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 355,86 | 380,77 | 380,77 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 98 | Factor VIII coagulationis humanus | Immunate Baxter 500, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m. | 1 fiol.s.subs. (+ 1 rozp.+ 1zest.) | 5909990573561 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 711,72 | 761,54 | 761,54 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 99 | Factor VIII coagulationis humanus | Octanate 1 000 IU, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m. | 1 amp. | 5909990825349 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 2 138,40 | 2 288,09 | 2 288,09 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 100 | Factor VIII coagulationis humanus | Octanate 250 IU, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m. | 1 amp. | 5909990825301 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 534,60 | 572,02 | 572,02 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 101 | Factor VIII coagulationis humanus | Octanate 500 IU, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m. | 1 amp. | 5909990825332 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.2, Factor VIII coagulationis humanus | 1 069,20 | 1 144,04 | 1 144,04 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 102 | Galsulfaseum | NAGLAZYME , koncentrat do sporz. dzienia roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990614745 | 2012-07-01 | 2 lata | 1060.0, Galsulfase | 7 001,64 | 7 491,75 | 7 491,75 | B.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 103 | Gefitynibum | Iressa, tabl. powł., 250 mg | 30 tabl. | 5909990717231 | 2012-07-01 | 2 lata | 1087.0, Gefitynibum | 9 612,00 | 10 284,84 | 10 284,84 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 104 | Glatirameri acetat | Copaxone, roztwór do wstrzykiwa , 20 mg/ml | 28 amp.-strz. a 1 ml | 5909990017065 | 2012-01-01 | 2 lata | 1061.0, Glatirameri acetat | 2 700,00 | 2 889,00 | 2 889,00 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 105 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 50 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990052684 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | 420,50 | 449,94 | 449,93 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 106 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 100 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990052707 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | 841,00 | 899,87 | 899,86 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 107 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 200 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990052745 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | 1 682,00 | 1 799,74 | 1 799,72 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 108 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 75 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990052868 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | 630,75 | 674,90 | 674,90 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 109 | Glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 150 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990052875 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksypolietylenowy epoetyny beta | 1 261,49 | 1 349,79 | 1 349,79 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|---|-----------------------|---------------|------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------|
| 110 | Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990661008 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta | 252,30 | 269,96 | 269,96 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 111 | Glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta | Mircera, roztwór do wstrzykiwa , 120 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990661046 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.2, czynniki stymuluj ce erytropoez - glikol metoksy polietylenowy epoetyny beta | 1 009,20 | 1 079,84 | 1 079,83 | B.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 112 | Idursulfasum | Elapraxe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 3 ml | 5909990053742 | 2012-07-01 | 2 lata | 1062.0, Idursulfase | 11 340,00 | 12 133,80 | 12 133,80 | B.25. | bezpłatne | 0 zł |
| 113 | Iloprostum | Ventavis , roztwór do inhalacji z nebulizatora, 10 mcg | 30 amp. a 1 ml | 5909990609079 | 2012-07-01 | 2 lata | 1063.0, Iloprost | 1 807,13 | 1 933,63 | 1 933,63 | B.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 114 | Imatinibum | Glivec, tabl. powl., 100 mg | 60 tabl. | 5909990001057 | 2012-07-01 | 2 lata | 1064.0, Imatynib | 4 488,00 | 4 802,16 | 4 802,16 | B.7.; B.3.; B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 115 | Imatinibum | Glivec, tabl. powl., 400 mg | 30 tabl. | 5909990001071 | 2012-07-01 | 2 lata | 1064.0, Imatynib | 8 976,00 | 9 604,32 | 9 604,32 | B.7.; B.3.; B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 116 | Imiglucerasum | Cerezyme, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 400 j.m. | 1 fiol.s.subs. | 5909990943012 | 2012-07-01 | 2 lata | 1065.0, Imiglucerasum | 7 236,00 | 7 742,52 | 7 742,52 | B.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 117 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA, roztwór do infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990741038 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 004,40 | 1 074,71 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 118 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990797868 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 972,00 | 1 040,04 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 119 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 200 ml | 5909990797875 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 944,00 | 2 080,08 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 120 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 400 ml | 5909990797882 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 4 017,60 | 4 298,83 | 3 466,80 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 121 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990797899 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 486,00 | 520,02 | 433,35 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 122 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990836055 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 2 008,80 | 2 149,42 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 123 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 200 ml | 5909990836062 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 4 017,60 | 4 298,83 | 3 466,80 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 124 | Immunoglobulinum humanum | FLEBOGAMMA DIF, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990836079 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 972,00 | 1 040,04 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 125 | Immunoglobulinum humanum | Hizentra, roztwór do wstrzykiwa , 0,2 g/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990869541 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum | 243,42 | 260,46 | 187,79 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 126 | Immunoglobulinum humanum | Hizentra, roztwór do wstrzykiwa , 0,2 g/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990869572 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum | 462,21 | 494,56 | 375,58 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 127 | Immunoglobulinum humanum | Hizentra, roztwór do wstrzykiwa , 0,2 g/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990869657 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum | 914,72 | 978,75 | 751,15 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 128 | Immunoglobulinum humanum | Kiovig , roztwór do infuzji, 1 g | 1 fiol. a 10 ml | 5909990425143 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 205,20 | 219,56 | 173,34 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 129 | Immunoglobulinum humanum | Kiovig , roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990425150 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 513,00 | 548,91 | 433,35 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 130 | Immunoglobulinum humanum | Kiovig , roztwór do infuzji, 5 g | 1 fl. a 50 ml | 5909990425167 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 026,00 | 1 097,82 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 131 | Immunoglobulinum humanum | Kiovig , roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990425174 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 2 052,00 | 2 195,64 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 132 | Immunoglobulinum humanum | Kiovig , roztwór do infuzji, 20 g | 1 fiol. a 200 ml | 5909990425181 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 4 104,00 | 4 391,28 | 3 466,80 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 133 | Immunoglobulinum humanum | Kiovig , roztwór do infuzji, 30 g | 1 fiol. a 300 ml | 5909990782208 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 6 156,00 | 6 586,92 | 5 200,20 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 134 | Immunoglobulinum humanum | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990725786 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 063,80 | 1 138,27 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 135 | Immunoglobulinum humanum | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990725793 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 2 106,00 | 2 253,42 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 136 | Immunoglobulinum humanum | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 200 ml | 5909990725809 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 4 212,00 | 4 506,84 | 3 466,80 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 137 | Immunoglobulinum humanum | Privigen, roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990725823 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 594,00 | 635,58 | 433,35 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---|--|-------------------------------------|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|----------------------------|-----------|------|
| 138 | Immunoglobulinum humanum | Vivaglobin, roztwór do wstrzykiwa podskórnych, 0,16 g/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990571642 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum | 280,80 | 300,46 | 300,46 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 139 | Immunoglobulinum humanum normale | Gammanorm, roztwór do wstrzykiwa , 165 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990729883 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum | 442,80 | 473,80 | 309,85 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 140 | Immunoglobulinum humanum normale | Subcuvia, roztwór do wstrzykiwa , 0,16 g/ml | 10 ml | 5909990420490 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.1, Immunoglobulinum humanum subcutaneum | 367,20 | 392,90 | 300,46 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 141 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzenia roztworu do infuzji, 2,5 g | 1 fiol. z prosz. + 1 rozpuszczalnik | 5909990756117 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 540,00 | 577,80 | 433,35 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 142 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Gammagard S/D, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzenia roztworu do infuzji, 5 g | 1 fiol. z prosz. + 1 rozpuszczalnik | 5909990756216 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 080,00 | 1 155,60 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 143 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l | 1 fiol. a 50 ml + zest. do infuzji | 5909990049851 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 513,00 | 548,91 | 433,35 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 144 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l | 1 fiol. a 20 ml | 5909990049868 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 205,20 | 219,56 | 173,34 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 145 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l | 1 fiol. a 100 ml + zest. do infuzji | 5909990049875 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 026,00 | 1 097,82 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 146 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Ig VENA, roztwór do infuzji, 50 g/l | 1 fiol. a 200 ml + zest. do infuzji | 5909990049882 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 2 116,80 | 2 264,98 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 147 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam 10% (100 ml , 10g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 but. a 100 ml | 5909990763887 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 2 592,00 | 2 773,44 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 148 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam 10% (200ml , 20g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 but. a 200 ml | 5909990763894 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 5 292,00 | 5 662,44 | 3 466,80 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 149 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam 10% (20ml , 2g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 but. a 20 ml | 5909990763863 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 518,40 | 554,69 | 346,68 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 150 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam 10% (50ml , 5g), roztwór do infuzji, 100 mg/ml | 1 but. a 50 ml | 5909990763870 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 323,00 | 1 415,61 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 151 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam (5% 10g), roztwór do infuzji, 10 g/200ml | 1 but. a 200 ml | 5909990762712 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 2 592,00 | 2 773,44 | 1 733,40 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 152 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam (5% 2,5g), roztwór do infuzji, 2,5 g/50ml | 1 but. a 50 ml | 5909990762514 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 648,00 | 693,36 | 433,35 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 153 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Octagam (5% 5g), roztwór do infuzji, 5 g/100ml | 100 ml | 5909990762613 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 1 296,00 | 1 386,72 | 866,70 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 154 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Sandoglobulin P, proszek do sporz dzenia roztworu do infuzji, 3 g | 1 but. (3 g) | 5909990354313 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 486,00 | 520,02 | 520,02 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 155 | Immunoglobulinum humanum normale ad usum intravenosum | Sandoglobulin P, proszek do sporz dzenia roztworu do infuzji, 6 g | 1 but. (6 g) | 5909990354412 | 2012-01-01 | 2 lata | 1066.0, Immunoglobulinum humanum | 972,00 | 1 040,04 | 1 040,04 | B.17. | bezpłatne | 0 zł |
| 156 | Infliximabum | Remicade, proszek do sporz dzenia koncentratu do sporz dzenia roztworu do infuzji, 0,1 g | 1 fiol. a 20 ml | 5909990900114 | 2012-07-01 | 2 lata | 1050.3, blokery TNF - infliksimab | 2 113,80 | 2 261,77 | 2 261,77 | B.35.; B.33.; B.36.; B.32. | bezpłatne | 0 zł |
| 157 | Interferonum alfa | Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 3000000 j.m. | 1 amp. a 1 ml | 5909990861118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.1, interferonum alfa | 105,84 | 113,25 | 113,25 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|----------------------|--|--|---------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|--------------|-----------|------|
| 158 | Interferonum alfa | Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 6000000 j.m./ml | 1 amp. a 1 ml | 5909990861217 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.1, interferonum alfa | 211,68 | 226,50 | 226,50 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 159 | Interferonum alfa-2a | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 3 mln j.m./0,5 ml | 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) | 5909990465118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a | 50,33 | 53,85 | 53,85 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 160 | Interferonum alfa-2a | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 6 mln j.m./0,5 ml | 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) | 5909990465316 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a | 100,67 | 107,72 | 107,72 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 161 | Interferonum alfa-2a | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 9 mln j.m./0,5 ml | 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) | 5909990465415 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a | 150,99 | 161,56 | 161,56 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 162 | Interferonum alfa-2b | IntronA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 25 mln j.m./2,5 ml | 1 fiol. a 2,5 ml + 6 zest. (1 zest.: strzykawka + igła do wstrzykiwa + 2 waciki) | 5909990004805 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b | 419,58 | 448,95 | 448,95 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 163 | Interferonum alfa-2b | IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 15 mln j.m./ml | 1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik) | 5909990858118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b | 302,10 | 323,25 | 323,25 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 164 | Interferonum alfa-2b | IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 25 mln j.m./ml | 1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik) | 5909990858217 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b | 503,49 | 538,73 | 538,73 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 165 | Interferonum beta-1a | Avonex, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg | 4 amp.-strz. (+ 4 igły) | 5909990008148 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.41, Interferonum beta 1a a 30 mcg | 2 824,20 | 3 021,89 | 3 021,89 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 166 | Interferonum beta-1a | Rebif 44, roztwór do wstrzykiwa , 44 mcg/0,5 ml | 4 wkł. a 1,5 ml | 5909990728497 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.43, Interferonum beta 1a a 44 mcg | 4 167,72 | 4 459,46 | 4 372,79 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 167 | Interferonum beta-1a | Rebif 44 , roztwór do wstrzykiwa , 44 mcg/0,5 ml | 12 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990874934 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.43, Interferonum beta 1a a 44 mcg | 4 086,72 | 4 372,79 | 4 372,79 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 168 | Interferonum beta-1a | Rebif 8,8 mcg/0,1 ml; 22 mcg/0,25 ml, roztwór do wstrzykiwa podskórnych, 24 mln j.m./ml | 2 wkł. a 1,5 ml | 5909990728503 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.42, Interferonum beta 1a a 22 mcg | 3 528,36 | 3 775,35 | 3 775,35 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 169 | Interferonum beta-1a | Rebif 8,8 mcg/0,2 ml; 22 mcg/0,5 ml , roztwór do wstrzykiwa podskórnych, 8,8 mcg/(2,4 mln j.m.)/0,2 ml, 22 mcg/(6 mln j.m.)/0,5 ml mcg (j.m.)/ml | 6 amp.strz.0,2 ml+6 amp.strz.0,5 ml | 5909990568819 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.42, Interferonum beta 1a a 22 mcg | 3 818,88 | 4 086,20 | 4 086,20 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 170 | Interferonum beta-1b | Betaferon, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 250 mcg/ml | 15 zest. | 5909990619375 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.5, Interferonum beta 1b | 3 057,48 | 3 271,50 | 3 271,50 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 171 | Interferonum beta-1b | Extavia, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 250 mcg/ml | 15 fiol. (+15 a.-strz. rozp. a 1,2 ml) | 5909990650996 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.5, Interferonum beta 1b | 2 862,00 | 3 062,34 | 3 062,34 | B.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 172 | Lamivudinum | ZEFFIX, tabl. powł., 100 mg | 28 tabl. | 5909990479610 | 2012-01-01 | 2 lata | 1067.0, Lamivudinum | 225,70 | 241,50 | 241,50 | B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 173 | Lapatynibum | TYVERB, tabl. powł., 250 mg | 70 tabl. (blist.) | 5909990084340 | 2012-07-01 | 2 lata | 1068.0, Lapatynib | 4 305,00 | 4 606,35 | 4 606,35 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 174 | Lapatynibum | TYVERB, tabl. powł., 250 mg | 140 tabl.(2 blist.po 70 szt.) | 5909990084357 | 2012-07-01 | 2 lata | 1068.0, Lapatynib | 8 610,00 | 9 212,70 | 9 212,70 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 175 | Lapatynibum | TYVERB, tabl. powł., 250 mg | 84 tabl. (blist.) | 5909990763993 | 2012-07-01 | 2 lata | 1068.0, Lapatynib | 5 166,00 | 5 527,62 | 5 527,62 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 176 | Lapatynibum | TYVERB, tabl. powł., 250 mg | 70 tabl.(but.) | 5909990851966 | 2012-07-01 | 2 lata | 1068.0, Lapatynib | 4 305,00 | 4 606,35 | 4 606,35 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 177 | Lapatynibum | TYVERB, tabl. powł., 250 mg | 140 tabl.(but.) | 5909990851973 | 2012-07-01 | 2 lata | 1068.0, Lapatynib | 8 610,00 | 9 212,70 | 9 212,70 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 178 | Lapatynibum | TYVERB, tabl. powł., 250 mg | 84 tabl. (but.) | 5909990851980 | 2012-07-01 | 2 lata | 1068.0, Lapatynib | 5 166,00 | 5 527,62 | 5 527,62 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 179 | Laronidasum | Aldurazyme, konc.do wl.do . . , 100 j.m./ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990005673 | 2012-07-01 | 2 lata | 1069.0, Laronidasum | 2 808,00 | 3 004,56 | 3 004,56 | B.24. | bezpłatne | 0 zł |
| 180 | Leuprorelinum | Lucrin Depot, mikrosfery do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 3,75 mg | 1 zest. | 5909990686117 | 2012-07-01 | 2 lata | 1070.1, analogi gonadoliberyny - leuprorelina | 297,60 | 318,43 | 318,43 | B.18. | bezpłatne | 0 zł |
| 181 | Mecaserminum | INCRELEX, roztwór do wstrzykiwa , 0,01 g/ml | 1 fiol. a 4 ml | 5909990076024 | 2012-07-01 | 2 lata | 1071.0, Mecasermine | 2 538,04 | 2 715,70 | 2 715,70 | B.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 182 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampulko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,15 ml | 5909990791255 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 53,09 | 56,81 | 28,95 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---------------|---|------------------------------------|---------------|------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------|
| 183 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,2 ml | 5909990791309 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 50,45 | 53,98 | 38,60 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 184 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990791361 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 65,55 | 70,14 | 57,91 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 185 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,4 ml | 5909990791446 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 81,02 | 86,69 | 77,21 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 186 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990791491 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 90,20 | 96,51 | 96,51 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 187 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,25 ml | 5909990822171 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 58,00 | 62,06 | 48,26 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 188 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,35 ml | 5909990822195 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 73,29 | 78,42 | 67,56 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 189 | Methotrexatum | Metex, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 50 mg/ml | 1 amp.-strz. a 0,45 ml | 5909990822201 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.1, Methotrexatum s.c. | 85,55 | 91,54 | 86,86 | B.34.; B.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 190 | Nilotinibum | Tasigna, kaps., 200 mg | 112 kaps. | 5909990073535 | 2012-07-01 | 2 lata | 1072.0, Nilotynib | 14 672,01 | 15 699,05 | 15 699,05 | B.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 191 | Octocog alfa | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m. | 1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria) | 5909990224302 | 2012-01-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 901,08 | 964,16 | 785,81 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 192 | Octocog alfa | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 1000 j.m. | 1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria) | 5909990224340 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 3 603,96 | 3 856,24 | 3 143,24 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 193 | Octocog alfa | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 1500 j.m. | 1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria) | 5909990224357 | 2012-01-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 5 406,46 | 5 784,91 | 4 714,86 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 194 | Octocog alfa | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m. | 1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria) | 5909990669110 | 2012-01-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 1 802,15 | 1 928,30 | 1 571,62 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 195 | Octocog alfa | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 2000 j.m. | 1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria) | 5909990697441 | 2012-01-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 7 208,61 | 7 713,21 | 6 286,48 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 196 | Octocog alfa | Advate, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 3000 j.m. | 1 fiol. (+ rozp. 5 ml +akcesoria) | 5909990697458 | 2012-01-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 10 812,92 | 11 569,82 | 9 429,72 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 197 | Octocog alfa | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 250 j.m. | 1 fiol. (+amp-strz.+1 cznik fiol.) | 5909990020775 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 734,40 | 785,81 | 785,81 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 198 | Octocog alfa | Kogenate Bayer, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 500 j.m. | 1 fiol. (+amp-strz.+1 cznik fiol.) | 5909990020782 | 2012-07-01 | 2 lata | 1090.1, Factor VIII coagulationis humanus recombinat | 1 468,80 | 1 571,62 | 1 571,62 | B.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 199 | Palivizumabum | Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol. (+ rozp. 1 ml) | 5909990815616 | 2012-07-01 | 2 lata | 1073.0, Palivizumab | 2 265,30 | 2 423,87 | 2 423,87 | B.40. | bezpłatne | 0 zł |
| 200 | Palivizumabum | Synagis, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzania roztworu do wstrzykiwa , 100 mg | 1 fiol. (+ rozp. 1 ml) | 5909990815715 | 2012-07-01 | 2 lata | 1073.0, Palivizumab | 4 530,60 | 4 847,74 | 4 847,74 | B.40. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-------------------------|---|---|---------------|------------|--------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------|-----------|------|
| 201 | Panitumumabum | Vectibix, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990646531 | 2012-07-01 | 2 lata | 1096.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - panitumumab | 1 728,00 | 1 848,96 | 1 848,96 | B.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 202 | Panitumumabum | Vectibix, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990646555 | 2012-07-01 | 2 lata | 1096.0, Leki p-nowotworowe, przeciwciała monoklonalne - panitumumab | 6 912,00 | 7 395,84 | 7 395,84 | B.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 203 | Peginterferonum alfa-2a | Pegasys, roztwór do wstrzykiwa, 135 mcg/0,5 ml | 1 wstrz. + 2 gaziki nas czone alkoholem | 5909990881192 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.1, Peginterferonum alfa 2a | 664,99 | 711,54 | 650,03 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 204 | Peginterferonum alfa-2a | Pegasys, roztwór do wstrzykiwa, 180 mcg/0,5 ml | 1 wstrz. + 2 gaziki nas czone alkoholem | 5909990881260 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.1, Peginterferonum alfa 2a | 810,00 | 866,70 | 866,70 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 205 | Peginterferonum alfa-2a | Pegasys, roztwór do wstrzykiwa, 270 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml (+igła) | 5909990984718 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.1, Peginterferonum alfa 2a | 664,99 | 711,54 | 650,03 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 206 | Peginterferonum alfa-2a | Pegasys, roztwór do wstrzykiwa, 360 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml (+igła) | 5909990984817 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.1, Peginterferonum alfa 2a | 810,00 | 866,70 | 866,70 | B.2.; B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 207 | Peginterferonum alfa-2b | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 0,05 mg/0,5ml | 1 zest. (1 wstrz.+1 igła+ 2 waciki) | 5909991039110 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.2, Peginterferonum alfa 2b | 297,00 | 317,79 | 317,79 | B.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 208 | Peginterferonum alfa-2b | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 0,12 mg/0,5ml | 1 zest. | 5909991039219 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.2, Peginterferonum alfa 2b | 712,80 | 762,70 | 762,70 | B.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 209 | Peginterferonum alfa-2b | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 0,08 mg/0,5ml | 1 zest. | 5909991039318 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.2, Peginterferonum alfa 2b | 475,20 | 508,46 | 508,46 | B.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 210 | Peginterferonum alfa-2b | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 0,15 mg/0,5ml | 1 zest. | 5909991039417 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.2, Peginterferonum alfa 2b | 891,00 | 953,37 | 953,37 | B.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 211 | Peginterferonum alfa-2b | PegIntron, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 0,1 mg/0,5ml | 1 zest. | 5909991039516 | 2012-07-01 | 2 lata | 1074.2, Peginterferonum alfa 2b | 594,00 | 635,58 | 635,58 | B.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 212 | Pemetreksedum | Alimta 100 mg, proszek do sporz. dziania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol.s.subs. | 5909990080205 | 2012-07-01 | 2 lata | 1034.0, Pemetreksed | 764,10 | 817,59 | 817,59 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 213 | Pemetreksedum | Alimta 500 mg, proszek do sporz. dziania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg | 1 fiol.s.subs. | 5909990009664 | 2012-07-01 | 2 lata | 1034.0, Pemetreksed | 3 822,12 | 4 089,67 | 4 089,67 | B.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 214 | Ribavirinum | Rebetol, kaps. twarde, 200 mg | 140 kaps. | 5909990999828 | 2012-07-01 | 2 lata | 1075.0, Ribavirinum | 1 577,26 | 1 687,67 | 1 687,67 | B.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 215 | Rituximabum | MabThera, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 100 mg | 2 fiol. a 10 ml | 5909990418817 | 2012-07-01 | 2 lata | 1035.0, Rituximabum | 2 445,01 | 2 616,16 | 2 616,16 | B.33.; B.12. | bezpłatne | 0 zł |
| 216 | Rituximabum | MabThera, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 500 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990418824 | 2012-07-01 | 2 lata | 1035.0, Rituximabum | 6 112,52 | 6 540,40 | 6 540,40 | B.33.; B.12. | bezpłatne | 0 zł |
| 217 | Sildenafilum | Revatio, tabl. powł., 20 mg | 90 tabl. | 5909990423040 | 2012-01-01 | 2 lata | 1076.0, Sildenafilum | 2 340,67 | 2 504,52 | 2 504,52 | B.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 218 | Somatropinum | Genotropin 12, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 12 mg | 1 fiol. (+1 rozp.) | 5909990771813 | 2012-07-01 | 2 lata | 1077.0, Somatropinum | 1 082,57 | 1 158,35 | 1 048,66 | B.42.; B.41.; B.38.; B.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 219 | Somatropinum | Genotropin 5,3, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa, 5,3 mg | 1 fiol.s.subs. (+ rozp.) | 5909990671014 | 2012-07-01 | 2 lata | 1077.0, Somatropinum | 480,70 | 514,35 | 463,16 | B.42.; B.41.; B.38.; B.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 220 | Somatropinum | Omnitrope, roztwór do wstrzykiwa, 3,3 mg/ml | 5 wkł. a 1,5 ml | 5909990050161 | 2012-07-01 | 2 lata | 1077.0, Somatropinum | 1 836,00 | 1 964,52 | 1 964,52 | B.42.; B.41.; B.38.; B.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 221 | Somatropinum | Omnitrope, roztwór do wstrzykiwa, 6,7 mg/ml | 5 wkł. a 1,5 ml | 5909990072897 | 2012-07-01 | 2 lata | 1077.0, Somatropinum | 4 104,00 | 4 391,28 | 4 391,28 | B.42.; B.41.; B.38.; B.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 222 | Sorafenibum | Nexavar, tabl. powł., 200 mg | 112 tabl. | 5909990588169 | 2012-07-01 | 2 lata | 1078.0, Sorafenib | 15 660,00 | 16 756,20 | 16 756,20 | B.5.; B.10. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|------------------------------------|---|------------------------------|---------------|------------|--------|--|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------|
| 223 | Sunitinibum | Sutent, kaps. twarde, 12,5 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990079377 | 2012-07-01 | 2 lata | 1079.0, Sunitynib | 5 340,36 | 5 714,19 | 5 714,19 | B.3.; B.10. | bezpłatne | 0 zł |
| 224 | Sunitinibum | Sutent, kaps. twarde, 25 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990079384 | 2012-07-01 | 2 lata | 1079.0, Sunitynib | 10 680,72 | 11 428,37 | 11 428,37 | B.3.; B.10. | bezpłatne | 0 zł |
| 225 | Sunitinibum | Sutent, kaps. twarde, 50 mg | 28 kaps. (4 blist.po 7 szt.) | 5909990079391 | 2012-07-01 | 2 lata | 1079.0, Sunitynib | 21 361,45 | 22 856,75 | 22 856,75 | B.3.; B.10. | bezpłatne | 0 zł |
| 226 | Temozolomidum | Temodal, kaps. twarde, 20 mg | 5 kaps. (saszet.) | 5909990672158 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 218,16 | 233,43 | 153,69 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 227 | Temozolomidum | Temodal, kaps. twarde, 100 mg | 5 kaps. (saszet.) | 5909990672172 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 090,80 | 1 167,16 | 768,47 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 228 | Temozolomidum | Temodal, kaps. twarde, 250 mg | 5 kaps. (saszet.) | 5909990672196 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 2 727,00 | 2 917,89 | 1 921,18 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 229 | Temozolomidum | Temodal, kaps. twarde, 0,14 g | 5 kaps. (saszet.) | 5909990672219 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 527,12 | 1 634,02 | 1 075,86 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 230 | Temozolomidum | Temodal, kaps. twarde, 180 mg | 5 kaps. (saszet.) | 5909990672233 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 963,44 | 2 100,88 | 1 383,25 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 231 | Temozolomidum | Temodal, kaps. twarde, 5 mg | 5 kaps. (saszet.) | 5909990716999 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 54,54 | 58,36 | 38,42 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 232 | Temozolomidum | Temomedac, kaps. twarde, 5 mg | 5 kaps. (but.) | 4037353009967 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 35,91 | 38,42 | 38,42 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 233 | Temozolomidum | Temomedac, kaps. twarde, 20 mg | 5 kaps. (but.) | 4037353009974 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 143,64 | 153,69 | 153,69 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 234 | Temozolomidum | Temomedac, kaps. twarde, 100 mg | 5 kaps. (but.) | 4037353009981 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 718,20 | 768,47 | 768,47 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 235 | Temozolomidum | Temomedac, kaps. twarde, 140 mg | 5 kaps. (but.) | 4037353009998 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 005,48 | 1 075,86 | 1 075,86 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 236 | Temozolomidum | Temomedac, kaps. twarde, 180 mg | 5 kaps. (but.) | 4037353010000 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 292,76 | 1 383,25 | 1 383,25 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 237 | Temozolomidum | Temomedac, kaps. twarde, 250 mg | 5 kaps. (but.) | 4037353010017 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 795,50 | 1 921,19 | 1 921,18 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 238 | Temozolomidum | TEMOSTAD, kaps. twarde, 5 mg | 5 kaps. | 5909990805082 | 2012-01-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 27,00 | 28,89 | 28,89 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 239 | Temozolomidum | TEMOSTAD, kaps. twarde, 20 mg | 5 kaps. | 5909990805105 | 2012-01-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 108,00 | 115,56 | 115,56 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 240 | Temozolomidum | TEMOSTAD, kaps. twarde, 100 mg | 5 kaps. | 5909990805136 | 2012-01-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 518,40 | 554,69 | 554,69 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 241 | Temozolomidum | TEMOSTAD, kaps. twarde, 140 mg | 5 kaps. | 5909990805150 | 2012-01-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 756,00 | 808,92 | 808,92 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 242 | Temozolomidum | TEMOSTAD, kaps. twarde, 180 mg | 5 kaps. | 5909990805174 | 2012-01-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 972,00 | 1 040,04 | 1 040,04 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 243 | Temozolomidum | TEMOSTAD, kaps. twarde, 250 mg | 5 kaps. | 5909990805198 | 2012-01-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 447,20 | 1 548,50 | 1 548,50 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 244 | Temozolomidum | Temozolomide Teva, kaps. twarde, 5 mg | 5 kaps. (but.) | 5909990744701 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 35,91 | 38,42 | 38,42 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 245 | Temozolomidum | Temozolomide Teva, kaps. twarde, 20 mg | 5 kaps. (but.) | 5909990744725 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 143,64 | 153,69 | 153,69 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 246 | Temozolomidum | Temozolomide Teva, kaps. twarde, 100 mg | 5 kaps. (but.) | 5909990744749 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 718,20 | 768,47 | 768,47 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 247 | Temozolomidum | Temozolomide Teva, kaps. twarde, 140 mg | 5 kaps. (but.) | 5909990744763 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 005,48 | 1 075,86 | 1 075,86 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 248 | Temozolomidum | Temozolomide Teva, kaps. twarde, 180 mg | 5 kaps. (but.) | 5909990744787 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 292,76 | 1 383,25 | 1 383,25 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 249 | Temozolomidum | Temozolomide Teva, kaps. twarde, 250 mg | 5 kaps. (but.) | 5909990746057 | 2012-07-01 | 2 lata | 1080.0, Temozolomidum | 1 795,50 | 1 921,19 | 1 921,18 | B.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 250 | Tenofoviru disoproksilum fumaratum | Viread, tabl. powł., 245 mg | 30 tabl. | 5909990009589 | 2012-01-01 | 2 lata | 1051.0, analogi nukleozydowe/nukleotydydowe inne ni lamuwidyna | 1 591,92 | 1 703,35 | 1 703,35 | B.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 251 | Tobramycynum | Bramitob, płyn do inhalacji z nebulizatora w pojemniku jednodawkowym, 300 mg/4 ml, 300 mg/4ml | 56 poj. a 4 ml | 5909990045976 | 2012-07-01 | 2 lata | 1081.0, Tobramycynum | 8 316,00 | 8 898,12 | 8 898,12 | B.27. | bezpłatne | 0 zł |
| 252 | Tobramycynum | Tobi, płyn do inhalacji z nebulizatora, 300 mg/5ml | 56 amp. a 5 ml | 5909991056216 | 2012-07-01 | 2 lata | 1081.0, Tobramycynum | 6 696,00 | 7 164,72 | 7 164,72 | B.27. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|---|-----------------------------------|---------------|------------|--------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|------|
| 253 | Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile | Botox , proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 100 Jednostka Allergan | 1 fiol. | 5909990674817 | 2012-07-01 | 2 lata | 1055.2, toksyny botulinowe - 2 | 612,38 | 655,25 | 655,25 | B.28.; B.30. | bezpłatne | 0 zł |
| 254 | Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile | DYSPORT, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 500 j. | 1 fiol. a 500j.(LD50) | 5909990729227 | 2012-07-01 | 2 lata | 1055.3, toksyny botulinowe - 3 | 1 127,52 | 1 206,45 | 1 206,45 | B.28.; B.30. | bezpłatne | 0 zł |
| 255 | Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile | Xeomin , proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 100 j. | 1 fiol. a 100j. (LD50) | 5909990643950 | 2012-07-01 | 2 lata | 1055.1, toksyny botulinowe - 1 | 583,20 | 624,02 | 624,02 | B.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 256 | Trabectedinum | Yondelis, proszek do sporz. dzienia koncentratu roztworu do infuzji, 0,25 mg | 1 fiol. | 5909990635177 | 2012-07-01 | 2 lata | 1088.0, Trabectedin | 2 214,00 | 2 368,98 | 2 368,98 | B.8. | bezpłatne | 0 zł |
| 257 | Trabectedinum | Yondelis, proszek do sporz. dzienia koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg | 1 fiol. | 5909990635184 | 2012-07-01 | 2 lata | 1088.0, Trabectedin | 8 478,00 | 9 071,46 | 9 071,46 | B.8. | bezpłatne | 0 zł |
| 258 | Trastuzumabum | Herceptin, proszek do przygotowania koncentratu do sporz. dzienia roztworu do infuzji, 150 mg | 1 fiol. a 15 ml | 5909990855919 | 2012-07-01 | 2 lata | 1082.0, Trastuzumabum | 2 700,00 | 2 889,00 | 2 889,00 | B.9. | bezpłatne | 0 zł |
| 259 | Treprostynilum | Remodulin, roztwór do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990046805 | 2012-07-01 | 2 lata | 1083.0, treprostynilum | 12 690,00 | 13 578,30 | 13 578,30 | B.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 260 | Treprostynilum | Remodulin, roztwór do infuzji, 2,5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990046850 | 2012-07-01 | 2 lata | 1083.0, treprostynilum | 31 726,08 | 33 946,91 | 33 946,91 | B.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 261 | Treprostynilum | Remodulin, roztwór do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990046867 | 2012-07-01 | 2 lata | 1083.0, treprostynilum | 63 453,24 | 67 894,97 | 67 894,97 | B.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 262 | Triptorelinum | Diphereline SR 3,75, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dzienia zawiesiny o przedłu onym uwalnianiu do wstrzykiwa , 3,75 mg | 1 fiol.pr. (+amp-st.z rozp.+igły) | 5909990486915 | 2012-01-01 | 2 lata | 1070.0, analogi gonadoliberyny | 289,98 | 310,28 | 310,28 | B.18. | bezpłatne | 0 zł |

Załącznik B.1.

LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B (ICD-10 B 18.1)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3 lat, chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, charakteryzujący się obecnością HBV DNA w surowicy oraz antygenu HBs przez czas dłuższy niż 6 miesięcy oraz spełniający dwa spośród trzech poniższych kryteriów:</p> <p>1) poziom wirerii HBV DNA powyżej 2000 IU/mL dla osób HBe (-) i powyżej 20 000 IU/mL dla osób HBe (+);</p> <p>2) aktywność AIAT przekraczająca górną granicę normy w co najmniej trzech oznaczeniach wykonanych w okresie nie krótszym niż trzy miesiące i nie dłuższym niż 12 miesięcy;</p> <p>3) zmiany histologiczne w wątrobie potwierdzające rozpoznanie przewlekłego zapalenia wątroby; w uzasadnionych przypadkach w ocenie stopnia nasilenia włóknienia wątrobowego można uwzględniać nieinwazyjne metody badania o potwierdzonej naukowo wiarygodności diagnostycznej:</p> <p>a) badanie elastograficzne, fibroscan, b) badanie metodą fibrotest.</p> <p>1.2. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy z marskością wątroby oraz z wykrywalnym HBV DNA niezależnie od poziomu transaminaz (świadczeniobiorcy z niewyrównaną marskością wątroby są leczeni w trybie pilnym, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1).</p> <p>1.3. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy oczekujący na przeszczep narządowy niezależnie od poziomu wirerii HBV DNA i stwierdzonego poziomu aktywności AIAT.</p> <p>2. U świadczeniobiorców w wieku od 3 do 18 lat stosuje się wyłącznie interferon rekombinowany alfa-2b.</p> <p>3. Lekiem pierwszego rzutu w terapii pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu B dotychczas nieleczonych są interferony stosowane w monoterapii, o ile nie ma przeciwwskazań do ich podania.</p> | <p>1. Interferony:</p> <p>1) interferon pegylowany alfa-2a: - roztwór do wstrzykiwań: 135 µg/0,5 ml oraz 180 µg/0,5 ml;</p> <p>2) interferon rekombinowany alfa-2a: a) ampułkostrzykawki zawierające 3 mln j.m./0,5 ml, b) ampułkostrzykawki zawierające 6 mln j.m./0,5 ml, c) ampułkostrzykawki zawierające 9 mln j.m./0,5 ml;</p> <p>3) interferon rekombinowany alfa-2b - wielodawkowy automatyczny dozownik po 18 MIU, 30 MIU lub 60 MIU, zawierający 1,2 ml roztworu o stężeniu 15 mln j.m./ml (6 dawek po 3 mln j.m.) lub 25 mln j.m./ml (6 dawek po 5 mln j.m.), lub 50 mln j.m./ml (6 dawek po 10 mln j.m.);</p> <p>4) naturalny interferon leukocytarny: a) ampułki po 3 000 000 j.m., b) ampułki po 6 000 000 j.m.</p> <p>Interferony dawkuje się zgodnie z zaleceniami zawartymi w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych. Czas leczenia interferonami nie może przekroczyć 48 tygodni.</p> <p>2. Analogi nukleozydowe lub nukleotydydowe</p> <p>1) lamiwudyna - tabletki po 100 mg - raz dziennie 1 tabletką;</p> <p>2) entekawir: a) tabletki po 0,5 mg - raz dziennie 1 tabletką u osób uprzednio nieleczonych analogami nukleozydowymi</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia interferonem</p> <p>1) poziom wirerii HBV DNA; 2) oznaczenie antygenu HBs; 3) oznaczenie antygenu HBe; 4) oznaczenie przeciwciał anti-HBe; 5) oznaczenie przeciwciał anti-HCV; 6) oznaczenie przeciwciał anti-HIV; 7) morfologia krwi; 8) oznaczenie poziomu AIAT; 9) proteinogram; 10) oznaczenie poziomu glukozy; 11) czas lub wskaźnik protrombinowy; 12) oznaczenie autoprzeciwciał; 13) oznaczenie poziomu TSH; 14) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3; 15) oznaczenie stężenia mocznika i kreatyniny; 16) USG jamy brzusznej; 17) biopsja wątroby - w przypadkach uzasadnionych kryteriami kwalifikacji; 18) próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia interferonem</p> <p>1) w dniu rozpoczęcia terapii: a) morfologia krwi, b) oznaczenie poziomu AIAT, c) czas lub wskaźnik protrombinowy, d) oznaczenie stężenia kreatyniny, e) oznaczenie poziomu AFP;</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>Preferowanym interferonem ze względu na wyniki leczenia jest interferon pegylowany alfa-2a, a pozostałe interferony bierze się pod uwagę tylko w szczególnych sytuacjach, podanych w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych.</p> <p>4. Choroby lub stany wykluczające stosowanie interferonów</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) niewyrównana marskość wątroby; 2) ciężka współistniejąca choroba serca, w tym niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa; 3) niewyrównana cukrzyca insulinozależna; 4) choroby o podłożu autoimmunologicznym, z wyłączeniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu II (anty-LKM-1); 5) niewyrównana nadczynność tarczycy; 6) retinopatia (po konsultacji okulistycznej); 7) padaczka (po konsultacji neurologicznej); 8) czynne uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających; 9) ciąża lub karmienie piersią; 10) czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej); 11) choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy (po konsultacji onkologicznej, hematologicznej lub hematologicznej); 12) inne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów interferonu określone w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych. <p>5. Kryteria wyłączenia z leczenia interferonem</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) brak odpowiedzi po 12 tygodniach leczenia definiowanej jako zmniejszenie poziomu wirerii HBV DNA o co najmniej 1 log₁₀; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości lub nietolerancji na substancję czynną lub pomocniczą; 3) choroby lub stany wymienione w ust. 4 ujawnione w trakcie leczenia interferonem. <p>6.1. W przypadkach niemożności zastosowania interferonów lub ich nieskuteczności należy rozważyć stosowanie analogów nukleozydowych lub nukleotydocowych.</p> <p>6.2. U pacjentów HBeAg (-) leczenie należy rozpocząć od lamiwudyny, a u osób HBeAg (+) leczenie należy rozpocząć od innego analogu nukleozydowego lub nukleotydocowego stosowanego w monoterapii. W ramach programu stosuje się następujące analogi nukleozydowe lub nukleotydocowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adefowir, entekawir lub tenofowir - u pacjentów HBeAg (+) oraz HBeAg | <p>lub nukleotydocowymi,</p> <ol style="list-style-type: none"> b) tabletki po 1,0 mg - raz dziennie 1 tabletka u osób uprzednio leczonych analogami nukleozydowymi lub nukleotydocowymi; 3) adefowir - tabletki po 10,0 mg - raz dziennie 1 tabletka; 4) tenofowir - tabletki po 245 mg - raz dziennie 1 tabletka. | <ol style="list-style-type: none"> 2) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi, b) oznaczenie poziomu AIAT; 3) w 4, 12, 24, 48 tygodniu - oznaczenie stężenia kreatyniny; 4) w 12 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) poziom wirerii HBV DNA, b) oznaczenie antygeny HBsAg; 5) w 24, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie antygeny HBsAg, b) oznaczenie antygeny HBeAg, c) oznaczenie przeciwciał anti-HBe, d) poziom wirerii HBV DNA; 6) w 12, 24, 36, 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) oznaczenie poziomu TSH, b) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3; 7) w 48 tygodniu: <ol style="list-style-type: none"> a) proteinogram, b) czas lub wskaźnik protrombinowy, c) oznaczenie poziomu AFP, d) USG jamy brzusznej. <p>3. Badania przy kwalifikacji do leczenia analogami nukleozydowymi lub nukleotydocowymi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poziom wirerii HBV DNA; 2) oznaczenie antygeny HBe; 3) oznaczenie przeciwciał anti-HBe; 4) wiogram (lekooporność); 5) morfologia krwi; 6) oznaczenie poziomu AIAT; 7) proteinogram; |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>(-) ;</p> <p>2) lamiwudynę - u pacjentów HBeAg (-).</p> <p>6.3. Po pierwszych 12 tygodniach leczenia analogami nukleozydowymi lub nukleotydomi należy ocenić ich skuteczność. Dla kontynuacji leczenia określonym analogiem nukleozydowym lub nukleotydom konieczne jest obniżenie początkowych wartości wirerii HBV DNA co najmniej o 1 log₁₀.</p> <p>6.4. W uzasadnionych przypadkach leczenie określonym analogiem nukleozydowym lub nukleotydom może być kontynuowane do 24 tygodnia, do ponownej oceny skuteczności, zgodnie z ust. 6.5.</p> <p>W innych przypadkach należy zmienić lek po uzyskaniu wyniku lekooporności i sprawdzeniu adherencji pacjenta do leczenia.</p> <p>6.5. Po 24 tygodniach terapii należy ponownie ocenić jej skuteczność poprzez ilościowe oznaczenie poziomu wirerii HBV DNA. W wypadku niewykrywalnego HBV DNA leczenie należy kontynuować do osiągnięcia punktu końcowego leczenia. W innym wypadku należy zmienić lek po uzyskaniu wyniku wirogramu i sprawdzeniu adherencji pacjenta do leczenia.</p> <p>6.6. U świadczeniobiorców HBeAg (-), uprzednio nieleczonych, poddanych terapii lamiwudyną, u których stwierdza się spadek wirerii HBV DNA w 24 tygodniu powyżej 1 log₁₀ można kontynuować podawanie leku do osiągnięcia niewykrywalnego HBV DNA w 48 tygodniu.</p> <p>7. W przypadku wyczerpania opcji terapeutycznych i nieuzyskania nieoznaczalnej wirerii HBV DNA, zwłaszcza u pacjentów z marskością wątroby, w przypadkach uzasadnionych, należy rozważyć leczenie równocześnie dwoma analogami nukleozydowymi albo interferonem, z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 1. Wniosek na taki sposób leczenia powinien być pozytywnie zaopiniowany przez konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych i zaakceptowany przez konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych.</p> <p>8. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>8.1. Leczenie można zakończyć u osób leczonych dłużej niż rok, po stwierdzeniu:</p> <p>1) serokonwersji w układzie "s" lub</p> <p>2) dwukrotnie ujemnych wyników oznaczenia HBV DNA wykonanych w odstępach co najmniej 3 miesięcy.</p> <p>Badania wykonuje się w medycznym laboratorium diagnostycznym posiadającym odpowiedni certyfikat jakości.</p> <p>8.2. W przypadku pacjentów z marskością wątroby i po przeszczepach</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| narządowych terapię należy stosować bez ograniczeń czasowych | | |
|--|--|--|

Załącznik B.2.

B.2. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C (ICD-10 B 18.2)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1. Do programu kwalifikowani są świadczeniobiorcy w wieku powyżej 3 roku życia, chorzy na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu C i spełniający poniższe kryteria:</p> <p>1) obecność wirerii HCV RNA w surowicy krwi lub w tkance wątrobowej;</p> <p>2) obecność przeciwciał anti-HCV;</p> <p>3) zmiany zapalne i włóknienie w obrazie histopatologicznym wątroby; u pacjentów z genotypem 2 i 3 oraz w innych uzasadnionych przypadkach można odstąpić od biopsji wątroby, uwzględniając wyniki nieinwazyjnych metod badania o potwierdzonej naukowo wiarygodności diagnostycznej:</p> <p>a) badania elastograficznego, fibroskanu,</p> <p>b) badania metodą fibrotest.</p> <p>1.2. Do programu są kwalifikowani świadczeniobiorcy powyżej 3 roku życia z pozawątrobową manifestacją zakażenia HCV, niezależnie od zaawansowania choroby w obrazie histopatologicznym.</p> <p>2. U świadczeniobiorców w wieku od 3 do 18 roku życia stosuje się wyłącznie interferon pegylowany alfa-2b albo rekombinowany alfa-2b.</p> <p>3. Interferony pegylowane alfa w ramach programu mogą być stosowane:</p> <p>1) w monoterapii:</p> <p>a) u świadczeniobiorców dializowanych,</p> <p>b) u świadczeniobiorców przed i po przeszczepach narządowych,</p> <p>c) u świadczeniobiorców z przeciwwskazaniami do stosowania lub nadwrażliwością na rybawiryne;</p> | <p>1. Interferon pegylowany alfa-2a</p> <p>1.1. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2a w terapii skojarzonej z rybawiryną lub w monoterapii:</p> <p>1) 180 µg;</p> <p>2) 35 µg - u świadczeniobiorców ze schyłkową niewydolnością nerek;</p> <p>3) w przypadku wystąpienia działań niepożądanych możliwa jest redukcja dawki (interferonu lub rybawiryny) albo przerwanie leczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.</p> <p>1.2. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem pegylowanym alfa-2a:</p> <p>1) genotyp 1 lub 4:</p> <p>a) 1000 mg/dobę dla świadczeniobiorców o masie ciała poniżej 75 kg,</p> <p>b) 1200 mg/dobę dla świadczeniobiorców o masie ciała równej lub powyżej 75 kg;</p> <p>2) genotyp 2 lub 3 - 800 mg/dobę.</p> <p>1.3. Czas terapii dla leczenia skojarzonego:</p> <p>1) genotyp 1 lub 4:</p> <p>a) 48 tygodni, gdy po 12 tygodniach stwierdzono brak wirerii HCV RNA,</p> <p>b) dopuszczalne jest leczenie przez 24 tygodnie, gdy stwierdzono:</p> <p>- niskie wyjściowe miano wirusa ($\leq 800\ 000$ j.m./ml) oraz</p> <p>- brak wirerii HCV RNA w 4 tygodniu leczenia oraz</p> <p>- brak wirerii HCV RNA w 24 tygodniu leczenia,</p> <p>c) 72 tygodnie, gdy po 12 tygodniach leczenia wiramia HCV RNA obniża się o co najmniej $2 \log_{10}$ i zanika po 24 tygodniach leczenia;</p> <p>2) genotyp 2 lub 3 - 24 tygodnie;</p> <p>3) niezależnie od genotypu, przy współistniejącym zakażeniu HIV i HCV - 48 tygodni;</p> <p>4) niezależnie od genotypu, przy współistniejącym zakażeniu HBV i</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia interferonami:</p> <p>1) oznaczenie PCR HCV metodą ilościową;</p> <p>2) morfologia krwi;</p> <p>3) oznaczenie poziomu AIAT;</p> <p>4) proteinogram;</p> <p>5) czas lub wskaźnik protrombinowy;</p> <p>6) oznaczenie autoprzeciwciał;</p> <p>7) oznaczenie poziomu TSH;</p> <p>8) oznaczenie poziomu fT4 lub fT3;</p> <p>9) oznaczenie poziomu kwasu moczowego;</p> <p>10) oznaczenia poziomu mocznika i kreatyniny;</p> <p>11) oznaczenie poziomu glukozy;</p> <p>12) oznaczenie przeciwciał anti-HIV;</p> <p>13) oznaczenie antygenu Hbs;</p> <p>14) USG jamy brzusznej;</p> <p>15) biopsja wątroby - w przypadkach uzasadnionych kryteriami kwalifikacji;</p> <p>16) próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>17) oznaczenie genotypu HCV u osób leczonych interferonami pegylowanymi.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia interferonami:</p> <p>1) świadczeniobiorcy z genotypem 2 lub 3 leczeni interferonem alfa pegylowanym:</p> <p>a) w 1 dniu:</p> <p>- oznaczenie poziomu AIAT,</p> <p>- morfologia krwi,</p> <p>- próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym,</p> <p>b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24 tygodniu:</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>2) w leczeniu skojarzonym z rybawiryną u świadczeniobiorców:</p> <p>a) nieleczonych uprzednio interferonami,</p> <p>b) z nawrotem zakażenia,</p> <p>c) u których terapia interferonem rekombinowanym alfa lub interferonem rekombinowanym alfa i rybawiryną okazała się nieskuteczna,</p> <p>d) przed i po przeszczepach narządowych,</p> <p>e) u których terapia interferonem pegylowanym innego typu okazała się nieskuteczna jedynie w przypadku obserwowanej progresji choroby.</p> <p>4. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonami pegylowanymi alfa:</p> <p>1) przewlekłe zapalenie wątroby lub wyrównana marskość wątroby;</p> <p>2) pozawątrobowa manifestacja zakażenia HCV, niezależnie od zaawansowania choroby w obrazie histopatologicznym.</p> <p>5. Interferony rekombinowane alfa w ramach programu mogą być stosowane:</p> <p>1) w monoterapii:</p> <p>a) u świadczeniobiorców dializowanych,</p> <p>b) u świadczeniobiorców przed lub po przeszczepach narządowych,</p> <p>c) u świadczeniobiorców z przeciwwskazaniami do stosowania lub nadwrażliwością na rybawirynę;</p> <p>2) w leczeniu skojarzonym z rybawiryną.</p> <p>U świadczeniobiorców od 3 do 18 roku życia stosuje się interferon rekombinowany alfa-2b, po spełnieniu przez nich łącznie następujących warunków:</p> <p>a) brak wcześniejszego leczenia,</p> <p>b) brak cech dekompensacji czynności wątroby,</p> <p>c) stwierdzenie obecności HCV-RNA w surowicy,</p> <p>d) stwierdzenie obecności przeciwciał anti-HCV w surowicy.</p> <p>6. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonami rekombinowanymi alfa:</p> <p>1) przeciwwskazania do stosowania interferonu</p> | <p>HCV - 48 tygodni.</p> <p>1.4. Leczenie należy przerwać u świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby do 2 stopnia włącznie w skali Scheuer'a, zakażonych genotypem 1 lub 4, u których:</p> <p>a) po 12 tygodniach terapii nie stwierdza się spadku wirerii o minimum 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej albo</p> <p>b) po 24 tygodniach terapii wiremia HCV RNA jest nadal wykrywalna, mimo że po 12 tygodniach zmniejszyła się o ponad 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej.</p> <p>1.5. U świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby powyżej 2 stopnia w skali Scheuer'a lub manifestacją pozawątrobową zakażenia HCV terapię kontynuuje się do 48 tygodni.</p> <p>2. Interferon pegylowany alfa-2b</p> <p>2.1. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2b w terapii skojarzonej z rybawiryną:</p> <p>1) 1,5 µg/kg masy ciała / tydzień - świadczeniobiorcy powyżej 18 roku życia;</p> <p>2) 60 µg/m² powierzchni ciała / tydzień - świadczeniobiorcy w wieku od 3 do 18 roku życia;</p> <p>3) w leczeniu skojarzonym świadczeniobiorcom o różnej masie ciała można podać zalecaną dawkę interferonu pegylowanego alfa-2b określoną w pkt 1, stosując wstrzykiwacze lub fiolki o różnej mocy w połączeniu z rybawiryną w odpowiedniej dawce zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego dla interferonu pegylowanego alfa-2b;</p> <p>4) w przypadku wystąpienia działań niepożądanych możliwa jest redukcja dawki (interferonu lub rybawiryny) albo przerwanie leczenia zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego.</p> <p>2.2. Dawkowanie interferonu pegylowanego alfa-2b w monoterapii:</p> <p>1) 0,5 µg/kg masy ciała / tydzień lub</p> <p>2) 1,0 µg/kg masy ciała / tydzień. Szczegóły dotyczące dawkowania w tym przypadku określone są w charakterystyce produktu leczniczego.</p> <p>2.3. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem pegylowanym alfa-2b - zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego dla interferonu pegylowanego</p> | <p>- oznaczenie poziomu AIAT,</p> <p>- morfologia krwi,</p> <p>c) w 12 tygodniu:</p> <p>- oznaczenie stężenia kreatyniny,</p> <p>- oznaczenie poziomu kwasu moczowego,</p> <p>- oznaczenie poziomu TSH,</p> <p>- oznaczenie poziomu fT4,</p> <p>d) w 24 tygodniu:</p> <p>- oznaczenie poziomu GGTP,</p> <p>- oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej,</p> <p>- oznaczenie stężenia kreatyniny,</p> <p>- oznaczenie poziomu kwasu moczowego,</p> <p>- oznaczenie poziomu TSH,</p> <p>- oznaczenie poziomu fT4,</p> <p>- oznaczenie poziomu AFP,</p> <p>- proteinogram,</p> <p>- oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową,</p> <p>- USG jamy brzusznej,</p> <p>e) w 48 tygodniu - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową;</p> <p>2) świadczeniobiorcy z genotypem 1 lub 4 leczeni interferonem alfa pegylowanym:</p> <p>a) w 1 dniu:</p> <p>- morfologia krwi,</p> <p>- oznaczenie poziomu AIAT,</p> <p>- próba ciążowa u kobiet w wieku rozrodczym,</p> <p>b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72 tygodniu:</p> <p>- morfologia krwi,</p> <p>- oznaczenie poziomu AIAT,</p> <p>c) w 4 tygodniu:</p> <p>- oznaczenie PCR HCV metodą ilościową (w genotypie 1) u świadczeniobiorców z wyjściową wiracją, poniżej 600 000 IU/ml,</p> <p>d) w 12, 24, 36, 48, 60 tygodniu:</p> <p>- oznaczenie stężenia kreatyniny,</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>pegylowanego;</p> <p>2) nietolerancja lub działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego;</p> <p>3) przeciwwskazania do zastosowania interferonu pegylowanego alfa-2b u świadczeniobiorców poniżej 18 roku życia.</p> <p>Interferon rekombinowany alfa w leczeniu wirusowego zapalenia wątroby typu C u dorosłych jest stosowany tylko w przypadku niemożności zastosowania interferonu pegylowanego alfa.</p> <p>7. Szczegółowe kryteria kwalifikacji do leczenia interferonem naturalnym:</p> <p>1) niepowodzenie terapeutyczne po leczeniu interferonem pegylowanym lub interferonem rekombinowanym i potwierdzona celowość ponownego rozpoczęcia leczenia;</p> <p>2) nietolerancja i inne działania niepożądane po stosowaniu interferonu pegylowanego lub interferonu rekombinowanego;</p> <p>3) zaawansowane włóknienie lub wyrównana marskość wątroby.</p> <p>8. Kryteria uniemożliwiające kwalifikację do programu:</p> <p>1) nadwrażliwość na substancję czynną lub substancję pomocniczą;</p> <p>2) niestwierdzenie HCV RNA w surowicy lub w tkance wątrobowej przy obecności przeciwciał anti-HCV;</p> <p>3) niewyrównana marskość wątroby;</p> <p>4) ciężka współistniejąca choroba serca, w tym niewydolność krążenia, niestabilna choroba wieńcowa;</p> <p>5) niewyrównana cukrzyca insulinozależna;</p> <p>6) choroby o podłożu autoimmunologicznym z wyłączeniem autoimmunologicznego zapalenia wątroby typu II (anty-LKM-1);</p> <p>7) niewyrównana nadczynność tarczycy;</p> <p>8) retinopatia (po konsultacji okulistycznej);</p> <p>9) padaczka (po konsultacji neurologicznej);</p> <p>10) czynne uzależnienie od alkoholu lub środków odurzających;</p> | <p>alfa-2b.</p> <p>2.4. Czas terapii dla leczenia skojarzonego:</p> <p>1) genotyp 1 lub 4:</p> <p>a) 48 tygodni, gdy po 12 tygodniach stwierdzono brak wirerii HCV RNA,</p> <p>b) dopuszczalne jest leczenie przez 24 tygodnie, gdy stwierdzono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niskie wyjściowe miano wirusa (< 600 000 j.m./ml) oraz - brak wirerii HCV RNA w 4 tygodniu leczenia oraz - brak wirerii HCV RNA w 24 tygodniu leczenia, <p>c) 72 tygodnie, gdy po 12 tygodniach leczenia wiramia HCV RNA obniża się o co najmniej 2 log₁₀ i zanika po 24 tygodniach leczenia;</p> <p>2) genotyp 2 lub 3 - 24 tygodnie;</p> <p>3) niezależnie od genotypu, przy współistniejącym zakażeniu HIV i HCV - 48 tygodni.</p> <p>2.5. Leczenie należy przerwać u świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby do 2 stopnia włącznie w skali Scheuer'a, zakażonych genotypem 1 lub 4, u których:</p> <p>a) po 12 tygodniach terapii nie stwierdza się spadku wirerii o minimum 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej albo</p> <p>b) po 24 tygodniach terapii wiramia HCV RNA jest nadal wykrywalna, mimo że po 12 tygodniach zmniejszyła się o ponad 2 log₁₀ względem wartości wyjściowej.</p> <p>2.6. U świadczeniobiorców z włóknieniem wątroby powyżej 2 punktów w skali Scheuer'a lub manifestacją pozawątrobową zakażenia HCV terapię kontynuuje się do 48 tygodni.</p> <p>3. Interferon rekombinowany alfa-2a oraz interferon rekombinowany alfa-2b</p> <p>3.1. Dawkowanie interferonu rekombinowanego alfa-2a oraz interferonu rekombinowanego alfa-2b w terapii skojarzonej z rybawiryną lub w monoterapii:</p> <p>1) świadczeniobiorcy powyżej 18 roku życia - zgodnie z charakterystykami odpowiednich produktów leczniczych;</p> <p>2) świadczeniobiorcy od 3 do 18 roku życia (może być stosowany jedynie interferon rekombinowany alfa-2b) - 3 mln j.m./m² powierzchni ciała, 3 razy w tygodniu przez 24 lub 48 tygodni, zgodnie z</p> | <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu kwasu moczowego, - oznaczenie poziomu TSH, - oznaczenie poziomu fT4, <p>e) w 12 tygodniu - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową,</p> <p>f) w 24 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową, - oznaczenie poziomu AFP, <p>g) na zakończenie leczenia - w 24 albo 48, albo 72 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie poziomu GGTP, - oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej, - oznaczenie stężenia kreatyniny, - oznaczenie poziomu kwasu moczowego, - oznaczenie poziomu TSH, - oznaczenie poziomu fT4, - oznaczenie poziomu AFP, - proteinogram, - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową, - USG jamy brzusznej, <p>h) po 24 tygodniach od zakończenia leczenia - w 48 albo 72, albo 96 tygodniu</p> <ul style="list-style-type: none"> - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową; <p>3) świadczeniobiorcy leczeni interferonem rekombinowanym alfa albo interferonem naturalnym alfa:</p> <p>a) w 1 dniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morfologia krwi, - oznaczenie poziomu AIAT, - próba ciążowa, <p>b) w 2, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - morfologia krwi, - oznaczenie poziomu AIAT, |
|--|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>11) ciąża lub karmienie piersią;</p> <p>12) czynna psychoza, depresja (po konsultacji psychiatrycznej);</p> <p>13) choroba nowotworowa czynna lub z dużym ryzykiem wznowy (po konsultacji onkologicznej, hematoonkologicznej lub hematologicznej);</p> <p>14) inne przeciwwskazania do stosowania poszczególnych rodzajów interferonu albo rybawiryny określone w odpowiednich charakterystykach produktów leczniczych.</p> <p>9. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <p>1) ujawnienie okoliczności określonych w ust. 8 w trakcie leczenia;</p> <p>2) działania niepożądane stosowanych w programie leków uzasadniające przerwanie leczenia:</p> <p>a) w opinii lekarza prowadzącego terapię lub</p> <p>b) zgodnie z charakterystykami odpowiednich produktów leczniczych.</p> | <p>charakterystyką produktu leczniczego.</p> <p>3.2. Dawkowanie rybawiryny w terapii skojarzonej z interferonem rekombinowanym alfa-2a lub interferonem rekombinowanym alfa-2b:</p> <p>1) 1000 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych dla świadczeniobiorców dorosłych o masie ciała poniżej 75 kg;</p> <p>2) 1200 mg na dobę w 2 dawkach podzielonych dla świadczeniobiorców dorosłych o masie ciała równej lub powyżej 75 kg;</p> <p>3) 15 mg/kg masy ciała / dobę dla świadczeniobiorców od 3 do 18 roku życia.</p> <p>4. Interferon naturalny - dawkowanie i czas trwania leczenia zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego.</p> | <p>c) w 12, 24, 36 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none">- oznaczenie stężenia kreatyniny,- oznaczenie poziomu kwasu moczowego,- oznaczenie poziomu TSH,- oznaczenie poziomu fT4, <p>d) na zakończenie leczenia - w 24 albo 48 tygodniu:</p> <ul style="list-style-type: none">- oznaczenie poziomu GGTP,- oznaczenie poziomu fosfatazy zasadowej,- oznaczenie stężenia kreatyniny,- oznaczenie poziomu kwasu moczowego,- oznaczenie poziomu TSH,- oznaczenie poziomu fT4,- oznaczenie poziomu AFP,- proteinogram,- oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową,- USG jamy brzusznej, <p>e) po 24 tygodniach od zakończenia leczenia - w 48 albo 72 tygodniu - oznaczenie PCR HCV metodą ilościową lub jakościową.</p> |
|--|---|---|

Załącznik B.3.

LECZENIE NOWOTWORÓW PODŚCIELISKA PRZEWODU POKARMOWEGO (GIST) (ICD-10 C 15, C 16, C 17, C 18, C 20, C 48)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia imatinibem</p> <p>1) rozpoznanie podścieliskowego mięsaka potwierdzone histologicznie; 2) ekspresja CD117 potwierdzona immunohistochemicznie; 3) brak możliwości zastosowania chirurgicznego leczenia lub obecność przerzutów udokumentowana na podstawie oceny stanu klinicznego i wyników obrazowych badań; 4) obecność zmian możliwych do zmierzenia w badaniu komputerowej tomografii; 5) wiek: powyżej 18 roku życia; 6) stan sprawności (według klasyfikacji WHO 0-2) 7) prawidłowe wyniki badań czynności szpiku; 8) prawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby i nerek.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia imatinibem w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z leczenia imatinibem</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na imatinib; 2) progresja choroby w trakcie stosowania leku po zwiększeniu dawki imatinibu do 800 mg/dobę, zwłaszcza pierwotna oporność na imatinib; 3) brak skuteczności po 4 miesiącach stosowania leku (zwiększenie sumy wielkości zmian w TK spiralnej, powyżej 20% z wyjątkiem sytuacji gdy gęstość tych zmian jest mniejsza niż 15% w stosunku do gęstości wyjściowej lub pojawienie się nowej/nowych zmian o wielkości co najmniej 10 mm); 4) toksyczność według skali WHO większa bądź równa 3 (zwłaszcza 3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych, ciężka niedokrwistość, neutropenia lub</p> | <p>1. Dawkowanie imatinibu</p> <p>-dobowa dawka początkowa- 400 mg jednorazowo -dobowa dawka w przypadku wystąpienia progresji 800 mg w dwóch dawkach (2x400mg)</p> <p>2. Dawkowanie sunitynibu</p> <p>Zalecana dawka początkowa preparatu sunitynib wynosi 50 mg doustnie raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie, po czym następuje dwutygodniowa przerwa (schemat 4/2), co stanowi pełny cykl 6 tygodni.</p> <p>Można stopniowo dokonywać zmian dawkowania za każdym razem o 12,5 mg, zależnie od indywidualnie ocenianego bezpieczeństwa i tolerancji lub przedłużać przerwę w przyjmowaniu leku. Dawka dobową nie powinna być mniejsza niż 25 mg.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia imatinibem albo sunitynibem</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem 2) badanie ogólne moczu 3) aktywność transaminaz wątrobowych, 4) stężenie bilirubiny; 5) aktywności fosfatazy zasadowej; 6) poziom albumin, 7) tomografia komputerowa, 8) EKG.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia imatinibem albo sunitynibem</p> <p>Badania kontrolne należy przeprowadzać podczas każdej wizyty świadczeniobiorcy - nie rzadziej niż raz na 4-6 tygodni:</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem; 2) badanie ogólne moczu; 3) aktywność aminotransferaz wątrobowych; 4) stężenie bilirubiny; 5) aktywność fosfatazy zasadowej; 6) poziom albumin; 7) tomografia komputerowa (badanie TK należy wykonywać co 2 miesiące w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia i następnie co 3 miesiące). Należy oceniać zmiany pod względem różnic ich wielkości (skala RECIST) i gęstości.</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>małopłytkowość); 5) stan sprawności według WHO 3-4.</p> <p>4. Kryteria kwalifikacji do leczenia sunitynibem</p> <p>1) rozpoznanie mięsaka podścieliska przewodu pokarmowego (GIST) potwierdzone histologicznie; 2) ekspresja CD117 potwierdzona immunohistochemicznie; 3) brak możliwości leczenia resekcji zmian lub obecność przerzutów udokumentowane na podstawie oceny stanu klinicznego i wyników obrazowych badań; 4) obecność zmian możliwych do zmierzenia w badaniu komputerowej tomografii; 5) udokumentowana progresja w czasie leczenia imatynibem (oporność) lub nietolerancja imatinibu (3-4 stopień toksyczności); 6) stan sprawności według klasyfikacji WHO 0-3; 7) wiek: powyżej 18 roku życia; 8) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: liczba płytek krwi $\geq 75,000/\text{mm}^3$, liczba bezwzględna neutrofilii $\geq 1000/\text{mm}^3$, stężenie hemoglobiny $\geq 8.0 \text{ g/dl}$; 9) prawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby i nerek (nieprzekraczające 2,5 raza górnej granicy normy lub 5 razy dla prób wątrobowych w przypadku przerzutów do wątroby).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie.</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Wyłączenie z programu leczenia sunitynibem:</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sunitynib, 2) udokumentowana progresja choroby w trakcie stosowania leku, 3) brak skuteczności (pod postacią progresji choroby) po 3 miesiącach stosowania leku, nieakceptowalna, nawracająca (pomimo modyfikacji dawkowania) toksyczność według skali WHO ≥ 3 (zwłaszcza 3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych, neutropenia lub małopłytkowość; wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia). 4) stan sprawności 4 według WHO. | | |
|--|--|--|

Załącznik B.4.

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO RAKA JELITA GRUBEGO (ICD-10 C 18 – C 20)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnej bewacyzumab.</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego; 2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych; 3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii; 4) udokumentowana nieskuteczność chemioterapii pierwszej linii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu; 5) niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem oksaliplatyny lub bewacyzumabu; 6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST; 7) stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO; 8) wiek powyżej 18 roku życia; 9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: <ol style="list-style-type: none"> a) liczba płytek krwi większa lub równa $1,5 \times 10^5/\text{mm}^3$, b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa $1500/\text{mm}^3$, c) stężenie hemoglobiny większe lub równe $10,0 \text{ g/dl}$; 10) wskaźniki czynności wątroby i nerek: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta), b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy, c) stężenie kreatyniny w granicach normy, d) nieobecność przeciwwskazań do chemioterapii według schematu FOLFOX-4; | <p>1. Bewacyzumab -10 mg/kg masy ciała dożylnie we wlewie trwającym 30-90 minut (dzień 1) wraz z chemioterapią według schematu FOLFOX-4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oksaliplatyna 85 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 2 godziny – dzień 1; 2) kwas folinowy 200 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wlewie 2 godziny – dzień 1 i 2; 3) fluorouracyl 400 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wstrzyknięciu, a następnie 600 mg/m^2 powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 22-godziny – dzień 1 i 2 (całkowita dawka fluorouracylu – 2000 mg/m^2 powierzchni ciała w ciągu 48 godzin). <p>Lek podaje się raz na dwa tygodnie.</p> <p>W uzasadnionych przypadkach (w szczególności w przypadku wystąpienia polineuropatii) można zredukować dawkę oksaliplatyny do 65 mg/m^2 powierzchni ciała, a także wydłużyć przerwę pomiędzy cyklami leczenia do 3 tygodni (w szczególności w przypadku powikłań hematologicznych).</p> <p>Bewacyzumab nie może być stosowany w monoterapii.</p> <p>2. Cetuksymab:</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia bewacyzumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenie stężenia: <ol style="list-style-type: none"> a) mocznika, b) kreatyniny, c) bilirubiny – w surowicy; 4) oznaczenie aktywności: <ol style="list-style-type: none"> a) transaminaz (AspAT, AlAT), b) dehydrogenazy mleczanowej (LDH) – w surowicy; 5) oznaczenie czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT); 6) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego (PT); 7) badanie ogólne moczu; 8) próba ciążowa – u kobiet w okresie prokreacyjnym; 9) badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań klinicznych; 10) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu w przypadku wskazań klinicznych w celu wykluczenia przerzutów; 11) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy; 12) EKG; 13) pomiar ciśnienia tętniczego; |

| | | |
|--|---|---|
| <p>11) wykluczenie ciąży;</p> <p>12) nieobecność przeciwwskazań do zastosowania bewacyzumabu, którymi są:</p> <ol style="list-style-type: none"> obecna pierwotna zmiana nowotworowa w jelicie grubym (pacjenci kwalifikowani do leczenia bewacyzumabem muszą mieć wykonaną resekcję pierwotnej zmiany w jelicie grubym), czynna choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, niestabilne nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba niedokrwienna serca, obecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego), naczyniowe choroby ośrodkowego układu nerwowego w wywiadzie, wrodzona skaza krwotoczna lub nabyta koagulopatia, stany chorobowe przebiegające ze zwiększonym ryzykiem krwawień, stosowanie leków przeciwkrzepliwych lub antyagregacyjnych, niegojące się rany, zabieg operacyjny przebyty w ciągu mniej niż 4 tygodni od momentu kwalifikacji do leczenia, białkomocz, alergia na lek lub którąkolwiek z substancji pomocniczych. <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> objawy nadwrażliwości na bewacyzumab lub którykolwiek składnik chemioterapii według schematu FOLFOX-4; | <ol style="list-style-type: none"> 400 mg/m² powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 2 godziny – pierwsza dawka; 250 mg/m² powierzchni ciała dożylnie we wlewie trwającym 1 godzinę – kolejne dawki. <p>Lek podaje się raz na tydzień.</p> <p>W przypadku wystąpienia działań niepożądanych dawkowanie leku należy dostosować do wytycznych zawartych w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>3. Panitumumab – 6 mg/kg masy ciała dożylnie we wlewie trwającym 1 godzinę. Lek podaje się raz na dwa tygodnie.</p> <p>W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> opóźnić moment podania leku, zmniejszyć dawkę leku <p>– zgodnie z wytycznymi zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> | <p>14) inne badania w razie wskazań klinicznych.</p> <p>Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>2. Badania przy kwalifikacji do leczenia cetuksymabem lub panitumumabem:</p> <ol style="list-style-type: none"> histologiczne potwierdzenie raka jelita grubego z ekspresją EGFR (w co najmniej 1% komórek nowotworowych) oraz z prawidłowym stanem genu KRAS; morfologia krwi z rozmazem; oznaczenie stężenia: <ol style="list-style-type: none"> mocznika, kreatyniny, bilirubiny – w surowicy; oznaczenie aktywności: <ol style="list-style-type: none"> transaminaz (AspAT, AlAT), dehydrogenazy mleczanowej (LDH) – w surowicy; próba ciążowa – u kobiet w okresie prokreacyjnym; badanie tomografii komputerowej jamy brzusznej oraz innych okolic ciała w zależności od wskazań klinicznych; badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego mózgu w przypadku wskazań klinicznych w celu wykluczenia przerzutów; badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy; EKG; inne badania w razie wskazań klinicznych. <p>Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą</p> |
|--|---|---|

- 2) progresja choroby w trakcie leczenia;
- 3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub większym od 3 według klasyfikacji WHO;
- 4) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 lub 4 według klasyfikacji Zubroda-WHO.

2. Leczenie zaawansowanego raka jelita grubego przy wykorzystaniu substancji czynnych cetuksymab oraz panitumumab.

2.1 Kryteria kwalifikacji:

- 1) histologiczne rozpoznanie raka jelita grubego;
- 2) potwierdzenie uogólnienia nowotworu, tj. obecności przerzutów w narządach odległych na podstawie wyników badań obrazowych;
- 3) brak możliwości wykonania radykalnej metastazektomii;
- 4) udokumentowana nieskuteczność wcześniejszej chemioterapii z udziałem fluoropirymidyny i irynotekanu oraz oksaliplatyny (wszystkie wymienione leki muszą być zastosowane łącznie lub sekwencyjnie);
- 5) niestosowanie wcześniejszej terapii z wykorzystaniem leków anti-EGFR;
- 6) potwierdzenie obecności zmiany lub zmian nowotworowych umożliwiających ocenę odpowiedzi na leczenie według klasyfikacji RECIST;
- 7) stan sprawności ogólnej w stopniach 0-2 według klasyfikacji Zubroda-WHO;
- 8) wiek powyżej 18 roku życia;
- 9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:
 - a) liczba płytek krwi większa lub równa $1,5 \times 10^5/\text{mm}^3$,
 - b) bezwzględna liczba neutrofilów większa lub równa $1500/\text{mm}^3$,
 - c) stężenie hemoglobiny większe lub równe $10,0 \text{ g/dl}$;
- 10) wskaźniki czynności wątroby i nerek:
 - a) stężenie całkowitej bilirubiny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem chorych z zespołem Gilberta),
 - b) aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy,
 - c) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej

obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.

3. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia bewacyzumabem:

- 1) morfologia krwi z rozmazem;
- 2) oznaczenie stężenia:
 - a) kreatyniny,
 - b) bilirubiny– w surowicy;
- 3) oznaczenie aktywności:
 - a) transaminaz (AspAT, AlAT),
 - b) fosfatazy alkalicznej– w surowicy;
- 4) badanie ogólne moczu;
- 5) pomiar ciśnienia tętniczego;
- 6) inne badanie w razie wskazań klinicznych.

Badania wykonuje się co 2 tygodnie lub przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii jeżeli podanie leku było opóźnione.

4. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia cetuksymabem lub panitumumabem:

- 1) morfologia krwi z rozmazem;
- 2) oznaczenie stężenia:
 - a) kreatyniny,
 - b) bilirubiny– w surowicy;
- 3) oznaczenie aktywności:
 - a) transaminaz (AspAT, AlAT),
 - b) fosfatazy alkalicznej– w surowicy;
- 4) ocena powikłań skórnych;
- 5) inne badanie w razie wskazań klinicznych.

Badania wykonuje się:

- 1) co tydzień – w przypadku leczenia cetuksymabem;

| | | |
|--|--|--|
| <p>granicy normy;</p> <ol style="list-style-type: none">11) potwierdzenie prawidłowego stanu genu KRAS (wykluczenie mutacji w kodonach 12 oraz 13 eksonu 1) oraz obecności białka EGFR w co najmniej 1% komórek nowotworowych;12) nieobecność przerzutów w mózgu (w przypadku objawów klinicznych ze strony ośrodkowego układu nerwowego konieczne jest wykluczenie przerzutów na podstawie badania obrazowego);13) wykluczenie ciąży;14) nieobecność przeciwwskazań do zastosowania cetuksymabu lub panitumumabu, którymi są:<ol style="list-style-type: none">a) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc,b) alergia na lek lub każdą substancję pomocniczą. <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>2.3 Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) objawy nadwrażliwości na cetuksymab lub panitumumab;2) progresja choroby w trakcie leczenia;3) długotrwałe działania niepożądane w stopniu równym lub większym od 3 według klasyfikacji WHO;4) włóknienie płuc lub śródmiąższowe zapalenie płuc;5) utrzymujące się pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 lub 4 według klasyfikacji Zubroda-WHO. | | <ol style="list-style-type: none">2) co 2 tygodnie lub przed rozpoczęciem kolejnego cyklu terapii jeżeli podanie leku było opóźnione – w przypadku leczenia panitumumabem. <p>5. Monitorowanie skuteczności leczenia bewacyzumabem, cetuksymabem lub panitumumabem:</p> <ol style="list-style-type: none">1) badanie tomografii komputerowej odpowiednich obszarów ciała w zależności od wskazań klinicznych;2) badanie RTG klatki piersiowej – jeżeli nie jest wykonywana tomografia komputerowa tej okolicy;3) inne badania w razie wskazań klinicznych. <p>Badania wykonuje się:</p> <ol style="list-style-type: none">1) nie rzadziej niż co 12 tygodni;2) w chwili wyłączenia z programu, o ile nastąpiło z innych przyczyn niż udokumentowana progresja choroby;3) zawsze w przypadku wskazań klinicznych. <p>Oceny skuteczności leczenia dokonuje się zgodnie z kryteriami RECIST.</p> |
|--|--|--|

Załącznik B.5.

LECZENIE RAKA WĄTROBOKOMÓRKOWEGO (ICD-10 C 22.0)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne lub cytologiczne rozpoznanie raka wątrobokomórkowego; 2) brak możliwości zastosowania leczenia miejscowego lub jego nieskuteczność; 3) stan sprawności 0-1 według WHO; 4) czynnościowy stan wątroby w kategorii A na podstawie oceny według klasyfikacji Child-Pugh; 5) nieobecność przerzutów poza wątrobą; 6) obecność przynajmniej jednej zmiany mierzalnej, zgodnie z kryteriami RECIST; 7) wskaźniki morfologii krwi: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie hemoglobiny większe lub równe 8,5 g/dl, b) liczba granulocytów większa lub równa $1,0 \times 10^9/l$, c) liczba płytek większa lub równa $60 \times 10^9/l$; 8) wskaźniki czynności nerek - stężenie kreatyniny mniejsze lub równe 1,5-krotności górnej granicy normy; 9) wskaźniki czynności wątroby: <ol style="list-style-type: none"> a) stężenie bilirubiny mniejsze lub równe 3 mg/dl, b) stężenie AspAT i AlAT mniejsze lub równe 5-krotności górnej granicy normy, c) stężenie albumin większe lub równe 3 g/dl, d) INR mniejsze lub równe 2,3 lub czas protrombinowy przedłużony o maksymalnie 6 sekund powyżej górnej granicy normy; 10) niestosowanie w przeszłości farmakologicznego leczenia przeciwnowotworowego z powodu raka wątrobokomórkowego; 11) u kobiet w wieku rozrodczym wykluczenie ciąży na podstawie testu ciążowego. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sorafenib jest stosowany w dobowej dawce 800 mg (2 razy dziennie po 2 tabletki zawierające 200 mg) bez przerw. 2. W przypadkach wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się nasilenia tych objawów oraz należy rozważyć zmniejszenie dobowej dawki sorafenibu do 400 mg dziennie (2 tabletki po 200 mg raz dziennie). 3. Jeżeli istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w okresie 4 tygodni pomimo przerywania podawania leku, należy zakończyć leczenie. 4. Jeżeli pomimo zmniejszenia dawki do 400 mg dziennie istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, należy zredukować dawkę leku do 400 mg podawanych co drugi dzień. 5. Dalsze redukcje dawki leku nie są możliwe - ponowne pojawienie się istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych nakazuje zakończenie leczenia. | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia sorafenibem:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) histologiczne lub cytologiczne potwierdzenie raka wątrobokomórkowego; 2) morfologia krwi z rozmazem; 3) oznaczenie stężenia mocznika, kreatyniny, AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny, wapnia, białka, glukozy, albumin, AFP w surowicy; 4) oznaczenie antygenu HBS oraz przeciwciał anti-HCV w surowicy; 5) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego; 6) tomografia komputerowa jamy brzusznej i klatki piersiowej (w celu wykluczenia przerzutów pozawatrobowych); 7) RTG klatki piersiowej; 8) EKG; 9) próba ciążowa (u kobiet w wieku rozrodczym); 10) pomiar ciśnienia tętniczego. <p>Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) co 4 tygodnie (lub w chwili rozpoczynania kolejnego 28-dniowego kursu jeżeli leczenie było czasowo przerwane): <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem, b) oznaczenie stężenia kreatyniny, AspAT, AlAT, fosfatazy alkalicznej, bilirubiny w surowicy, |

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu:

- 1) brak rozpoznania mikroskopowego raka wątrobokomórkowego;
- 2) przebyta chemioterapia lub innego rodzaju farmakologiczne leczenie z powodu raka wątrobokomórkowego;
- 3) możliwość zastosowania leczenia miejscowego raka wątrobokomórkowego;
- 4) nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze;
- 5) stan sprawności 2-4 według WHO;
- 6) obecność przerzutów poza wątrobą;
- 7) niekontrolowane nadciśnienie tętnicze;
- 8) obecność istotnych schorzeń współistniejących;
- 9) uszkodzenie szpiku kostnego, nerek lub wątroby (brak spełnienia laboratoryjnych kryteriów włączenia do programu);
- 10) utrzymująca się przed włączeniem do programu toksyczność powyżej 3 według WHO;
- 11) ciąża lub karmienie piersią;
- 12) brak zgody na stosowanie efektywnej antykoncepcji (u mężczyzn lub u kobiet w okresie prokreacyjnym).

3. Określenie czasu leczenia w programie:

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w ust. 4.

4. Kryteria wyłączenia z programu:

- 1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sorafenib lub którąkolwiek substancję pomocniczą;
- 2) obiektywna progresja choroby w trakcie stosowania leku;
- 3) wystąpienie działań niepożądanych uniemożliwiających kontynuację leczenia, w tym istotnego pogorszenia stanu sprawności ogólnej;
- 4) istotne, w ocenie lekarza prowadzącego, pogorszenie jakości życia świadczeniobiorcy;
- 5) rezygnacja świadczeniobiorcy.

- c) pomiar ciśnienia tętniczego,
 - d) inne - w razie wskazań klinicznych;
- 2) nie rzadziej niż co 12 tygodni (lub przed zakończeniem co trzeciego 28-dniowego kursu jeżeli leczenie było czasowo przerwane):
- a) oznaczenie poziomu AFP w surowicy,
 - b) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego,
 - c) tomografia komputerowa jamy brzusznej,
 - d) RTG klatki piersiowej,
 - e) EKG,
 - f) inne badania – w razie wskazań klinicznych;
- 3) zawsze w przypadku wskazań klinicznych:
- a) oznaczenie poziomu AFP w surowicy,
 - b) oznaczenie INR lub czasu protrombinowego,
 - c) tomografia komputerowa jamy brzusznej,
 - d) RTG klatki piersiowej,
 - e) EKG.

Załącznik B.6.

LECZENIE NIEDROBNOKOMÓRKOWEGO RAKA PŁUCA (ICD-10 C 34)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1 Pierwsza linia leczenia</p> <p>1.1.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej pemetrekseid:</p> <p>1) rozpoznanie gruczolakoraka, wielkomórkowego raka płuca lub nowotworu z przewagą wymienionych typów histologicznych;</p> <p>2) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV;</p> <p>3) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;</p> <p>4) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;</p> <p>5) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>6) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich stosowania;</p> <p>8) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);</p> <p>9) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego:</p> | <p>1. Pemetrekseid</p> <p>1.1 Zalecana dawka wynosi 500 mg/m² powierzchni ciała.</p> <p>1.2 Podanie leku obejmuje 10-minutowy wlew dożylny w pierwszym dniu każdego 21-dniowego cyklu leczenia.</p> <p>1.3 W dniu poprzedzającym zastosowanie pemetrekseidu oraz w dniu zastosowania leku i w dniu następnym należy stosować lek z grupy kortykosteroidów w dawce równoważnej 4 mg deksametazonu podawanego doustnie 2 razy na dobę.</p> <p>1.4 W celu ograniczenia objawów toksyczności pacjenci otrzymujący pemetrekseid powinni również otrzymywać suplementację witaminową:</p> <p>1) kwas foliowy lub produkt multiwitaminowy zawierający ten związek:</p> <p>a) codziennie, przez cały cykl leczenia i przez 21 dni po podaniu ostatniej dawki pemetrekseidu w dawce od 350 do 1000 mikrogramów doustnie,</p> <p>b) w ciągu 7 dni poprzedzających zastosowanie pierwszej dawki pemetrekseidu - co najmniej 5 dawek kwasu foliowego w ilości od 350 do 1000 mikrogramów doustnie;</p> <p>2) witamina B12:</p> <p>a) w tygodniu poprzedzającym pierwszą dawkę pemetrekseidu - 1000 mikrogramów domięśniowo,</p> <p>b) co 3 cykle leczenia, tj. co 9 tygodni - 1000 mikrogramów domięśniowo w dniu zastosowania pemetrekseidu.</p> <p>1.5 Stosowanie pemetrekseidu w ramach pierwszej linii leczenia obejmuje wyłącznie schemat z cisplatyną podawaną w dawce 75 mg/m², w 2-godzinny wlew, 30 minut po zakończeniu podawania pemetrekseidu, w pierwszym dniu</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia</p> <p>1.1 Pemetrekseid w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej linii leczenia:</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie określonego typu niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami włączenia;</p> <p>2) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>3) oznaczenia stężenia kreatyniny;</p> <p>4) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>5) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>6) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>7) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;</p> <p>8) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>9) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>10) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>1.2 Gefitynib w pierwszej linii leczenia:</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie określonego typu niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami włączenia;</p> <p>2) ocena obecności mutacji genu EGFR w eksonie 19 lub 21;</p> <p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) oznaczenia stężenia kreatyniny;</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³, b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³; 10) prawidłowa czynność nerek: a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min; 11) prawidłowa czynność wątroby: a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie; 12) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego); 13) brak przeciwwskazań do stosowania cisplatyny (lek stosowany w skojarzeniu z pemetreksedem); 14) brak przeciwwskazań do stosowania deksametazonu, kwasu foliowego i witaminy B12. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.1.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej gefitynib:</p> <ol style="list-style-type: none">1) rozpoznanie gruczolakoraka lub nowotworu z przewagą wymienionego typu histologicznego;2) potwierdzona mutacja genu EGFR w eksonie 19 lub 21;3) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV;4) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;5) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;6) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a | <p>każdego cyklu co 21 dni.</p> <p>2. Docetaksel</p> <p>2.1 Zalecana dawka docetakselu wynosi 75 mg/m² powierzchni ciała.</p> <p>2.2 Podanie leku obejmuje 60-minutowy wlew dożylny w pierwszym dniu 21-dniowego cyklu leczenia.</p> <p>2.3 Premedykacja składa się z zastosowania doustnie deksametazonu w dobowej dawce 16 mg przez 3 dni, począwszy od dnia poprzedzającego rozpoczęcie stosowania docetakselu.</p> <p>3. Gefitynib</p> <p>3.1 Zalecana dawka dobową gefitynibu wynosi 250 mg (1 tabletkę) i powinna być przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku, codziennie o tej samej porze dnia.</p> <p>3.2 Każdy cykl leczenia obejmuje 28 dni - 28 tabletek.</p> <p>4. Erlotynib</p> <p>4.1 Zalecana dawka dobową erlotynibu wynosi 150 mg (1 tabletkę) i powinna być przyjmowana przynajmniej 60 minut przed posiłkiem lub przynajmniej 120 minut po posiłku.</p> <p>4.2 Każdy cykl leczenia obejmuje 28 dni - 28 tabletek.</p> | <ol style="list-style-type: none">5) oznaczenie stężenia bilirubiny;6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;9) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;10) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;11) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej. <p>1.3 Erlotynib w drugiej linii leczenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) histologiczne potwierdzenie określonego typu niedrobnokomórkowego raka płuca zgodnie z kryteriami włączenia;2) ocena obecności mutacji genu EGFR w eksonie 19 lub 21;3) morfologia krwi z rozmazem;4) oznaczenia stężenia kreatyniny;5) oznaczenie stężenia bilirubiny;6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;9) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;10) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;11) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej. <p>2. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia Pemetreksed w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej</p> |
|--|---|--|

| | | |
|---|--|---|
| <p>także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich stosowania;</p> <p>7) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>8) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>9) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);</p> <p>10) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego:</p> <p>a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³,</p> <p>b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>11) prawidłowa czynność nerek:</p> <p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;</p> <p>12) prawidłowa czynność wątroby:</p> <p>a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;</p> <p>13) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego);</p> <p>14) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Druga linia leczenia</p> <p>1.2.1 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej pemetrekselem albo substancji czynnej docetaksel:</p> <p>1) rozpoznanie gruczolaka, wielkokomórkowego raka płuca lub nowotworu z przewagą wymienionych typów</p> | | <p>linii leczenia:</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) oznaczenie stężenia kreatyniny - jedynie w przypadku leczenia pemetrekselem.</p> <p>Badania wykonywane są przed każdym podaniem leku.</p> <p>3. Monitorowanie skuteczności leczenia:</p> <p>3.1 Pemetrekselem w pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetaksel w drugiej linii leczenia:</p> <p>1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>Badania wykonywane są po 2, 4 i 6 cyklu leczenia (w przypadku kontynuacji do 6 cykli).</p> <p>3.2 Gefitynib w pierwszej linii leczenia:</p> <p>1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans magnetyczny - MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>Badania wykonywane są co 2 cykle leczenia.</p> <p>3.3 Erlotinib w drugiej linii leczenia:</p> <p>1) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub klasyczne badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) badanie tomografii komputerowej innej lokalizacji lub inne badania obrazowe (ultrasonografia - USG, rezonans</p> |
|---|--|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>histologicznych w przypadku stosowania pemetreksedu albo rozpoznanie niedrobnokomórkowego raka płuca (każdy typ histologiczny) w przypadku stosowania docetakselu;</p> <p>2) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV;</p> <p>3) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia;</p> <p>4) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania;</p> <p>5) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich stosowania;</p> <p>6) wcześniejsze zastosowanie wielolekowej chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (w przypadku pacjentów w wieku powyżej 70 roku życia - wcześniejsza monoterapia lekiem innym niż pochodna platyny);</p> <p>7) potwierdzenie odpowiedzi na leczenie lub stabilizacji choroby po zastosowaniu wcześniejszej chemioterapii (czas trwania odpowiedzi na leczenie lub stabilizacji choroby musi wynosić co najmniej 3 miesiące);</p> <p>8) progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii obejmującej co najmniej jedną linię leczenia;</p> <p>9) nieobecność działań niepożądanych po wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem wyłusienia;</p> <p>10) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>11) sprawność w stopniu 0-1 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>12) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);</p> | | <p>magnetyczny- MR, scyntygrafia) w zależności od sytuacji klinicznej.</p> <p>Badania wykonywane są co 2 cykle leczenia.</p> |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>13) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego: a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³, b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³; 14) prawidłowa czynność nerek: a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min; 15) prawidłowa czynność wątroby: a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy, b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie; 16) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego); 17) brak przeciwwskazań do stosowania deksametazonu oraz - w przypadku pemetreksedu - kwasu foliowego i witaminy B12. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2.2 Leczenie przy wykorzystaniu substancji czynnej erlotynib:</p> <p>1) rozpoznanie gruczolaka lub nowotworu z przewagą wymienionego typu histologicznego; 2) potwierdzona mutacja genu EGFR w eksonie 19 lub 21; 3) zaawansowanie kliniczne w stopniach IIIB (z wyjątkiem przypadków, w których możliwe jest zastosowanie radiochemioterapii lub radioterapii) albo IV; 4) zmiany nowotworowe możliwe do zmierzenia; 5) w przypadku pojedynczej zmiany - umiejscowienie poza obszarem wcześniejszego napromieniania; 6) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym pierwotnie albo po zastosowaniu wcześniejszego leczenia miejscowego oraz nieobecność objawów ze strony ośrodkowego układu nerwowego, a</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>także stała lub zmniejszana dawka kortykosteroidów przez ostatnie 4 tygodnie w przypadku konieczności ich stosowania;</p> <p>7) wcześniejsze zastosowanie wielolekowej chemioterapii z udziałem pochodnych platyny (w przypadku pacjentów w wieku powyżej 70 roku życia - wcześniejsza monoterapia);</p> <p>8) progresja choroby po wcześniejszej chemioterapii obejmującej co najmniej jedną linię leczenia;</p> <p>9) okres od zakończenia wcześniejszej chemioterapii co najmniej 3-4 tygodnie;</p> <p>10) nieobecność działań niepożądanych po wcześniejszej chemioterapii z wyjątkiem wyłysienia;</p> <p>11) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>12) sprawność w stopniu 0-2 wg klasyfikacji Zubroda-WHO lub ECOG;</p> <p>13) nieobecność chorób współistniejących o istotnym klinicznie znaczeniu (niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, niestabilna choroba wieńcowa, zawał mięśnia sercowego w ciągu ostatniego roku, komorowe zaburzenia rytmu wymagające leczenia);</p> <p>14) prawidłowa czynność układu krwiotwórczego:</p> <p>a) liczba granulocytów większa lub równa 1500/mm³,</p> <p>b) liczba trombocytów większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>15) prawidłowa czynność nerek:</p> <p>a) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) klirens kreatyniny większy lub równy 45 ml/min;</p> <p>16) prawidłowa czynność wątroby:</p> <p>a) stężenie bilirubiny nieprzekraczające 1,5-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>b) aktywność transaminaz i zasadowej fosfatazy nieprzekraczająca 3-krotnie górnej granicy normy lub nieprzekraczająca 5-krotnie górnej granicy normy w przypadku wzrostu związanego z przerzutami w wątrobie;</p> <p>17) brak przeciwwskazań do stosowania leku (nadwrażliwość na lek, ciąża, karmienie piersią, inne określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego);</p> | | |
|--|--|--|

18) wykluczone stosowanie jednoczesnej chemioterapii oraz innych leków ukierunkowanych molekularnie. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie:

- 1) z zasadami terapii określonymi w ust. 2.1 i 2.2 oraz
- 2) z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w ust. 3.

2.1 Pemetreksed, docetaksel

2.1.1 Stosowanie pemetreksedu w ramach pierwszej albo drugiej linii leczenia oraz docetakselu w ramach drugiej linii leczenia obejmuje:

- 1) 4 cykle - w sytuacjach innych niż opisane w pkt 2;
 - 2) 6 cykli - w przypadku stwierdzenia:
 - a) odpowiedzi całkowitej lub
 - b) odpowiedzi częściowej, lub
 - c) odpowiedzi większego stopnia, tj. odpowiedzi całkowitej po wcześniejszej odpowiedzi częściowej lub odpowiedzi częściowej po wcześniejszej stabilizacji choroby w kolejnych badaniach po drugim oraz czwartym cyklu leczenia.
- 2.1.2 Stosowanie pemetreksedu lub docetakselu może być krótsze w przypadku wystąpienia poważnych działań niepożądanych.
- 2.1.3 W czasie leczenia konieczne jest trzykrotne wykonanie badań obrazowych (dodatkowe badania obrazowe wykonuje się w zależności od sytuacji klinicznej):
- 1) przed leczeniem - nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej dawki leku;
 - 2) w połowie leczenia - po drugim cyklu;
 - 3) po zakończeniu leczenia - po czwartym cyklu oraz nie później niż 28 dni po podaniu ostatniej dawki leku.

2.1.4 W przypadku uzyskania odpowiedzi na leczenie i kontynuacji chemioterapii do 6 cykli należy wykonać dodatkowe badania obrazowe po szóstym cyklu oraz nie później niż 28 dni po podaniu ostatniej dawki leku.

2.1.5 Badania obrazowe obejmują ocenę:

1) zmiany pierwotnej:

a) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub

b) badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;

2) zmian przerzutowych - w zależności od sytuacji klinicznej i lokalizacji badanie tomografii komputerowej lub inne badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny, scyntygrafia i inne) pozwalające na pomiar zmian mierzalnych.

2.1.6 Jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje (stan po resekcji płuca, nowotwór płuca bez ogniska pierwotnego), konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian niemierzalnych.

2.1.7 Ocenę wyniku leczenia (odpowieź) należy wykonywać według kryteriów skali RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).

2.1.8 Przed rozpoczęciem leczenia konieczne jest wykonanie badania morfologii krwi i badań biochemicznych, a przed kolejnymi cyklami leczenia należy powtarzać badanie morfologii krwi.

2.2 Gefitynib, erlotynib

2.2.1 Stosowanie gefitynibu w ramach pierwszej linii leczenia oraz erlotynibu w ramach drugiej linii leczenia jest prowadzone do stwierdzenia progresji choroby lub wystąpienia poważnych działań niepożądanych.

2.2.2 W czasie leczenia konieczne jest wykonywanie badań obrazowych (dodatkowe badania obrazowe wykonuje się w zależności od sytuacji klinicznej):

| | | |
|--|--|--|
| <p>1) przed leczeniem - nie wcześniej niż 28 dni przed zastosowaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>2) w czasie leczenia - co 2 cykle leczenia, tj. co 56 dni.</p> <p>2.2.3 Badania obrazowe obejmują ocenę:</p> <p>1) zmiany pierwotnej:</p> <p>a) badanie tomografii komputerowej klatki piersiowej z objęciem nadbrzusza lub</p> <p>b) badanie RTG klatki piersiowej w przypadku zmiany dobrze mierzalnej, otoczonej przez prawidłowo upowietrzony miąższ płucny;</p> <p>2) zmian przerzutowych - w zależności od sytuacji klinicznej i lokalizacji badanie tomografii komputerowej lub inne badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczny, scyntygrafia i inne) pozwalające na pomiar zmian mierzalnych.</p> <p>2.2.4 Jeżeli pierwotny guz płuca nie istnieje (stan po resekcji płuca, nowotwór płuca bez ogniska pierwotnego), konieczne jest wykazanie w badaniach obrazowych przerzutowych zmian mierzalnych lub policzalnych zmian niemierzalnych.</p> <p>2.2.5 Ocenę wyniku leczenia (odpowieź) należy wykonywać według kryteriów skali RECIST (Response Evaluation Criteria in Solid Tumors).</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <p>1) progresja choroby:</p> <p>a) powiększenie się istniejących zmian o przynajmniej 20% lub</p> <p>b) pojawienie się przynajmniej jednej nowej zmiany - potwierdzona w badaniu przedmiotowym lub obrazowym;</p> <p>2) pogorszenie stanu pacjenta w związku z nowotworem bez progresji potwierdzonej w badaniu przedmiotowym lub obrazowym;</p> <p>3) toksyczność leczenia z wystąpieniem przynajmniej jednego niepożądanego działania będącego zagrożeniem życia według kryteriów CTC (Common Toxicity Criteria);</p> <p>4) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>stopnia według kryteriów CTC (Common Toxicity Criteria);</p> <p>5) nadwrażliwość na lek lub na substancję pomocniczą;</p> <p>6) obniżenie sprawności do stopnia 3-4 według kryteriów WHO lub ECOG;</p> <p>7) pogorszenie jakości życia o istotnym znaczeniu według oceny lekarza;</p> <p>8) rezygnacja pacjenta - wycofanie zgody na udział w programie.</p> | | |
|---|--|--|

Załącznik B.7.

LECZENIE ZAAWANSOWANEGO WŁÓKNIAKOMIĘSAKA GUZOWATEGO SKÓRY (DFSP) (ICD-10 C 44, C 49)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) potwierdzone histologicznie rozpoznanie zaawansowanego włóknakiomięsaka guzowatego skóry (dermatofibrosarcoma protuberans, DFSP);</p> <p>2) udokumentowana obecność rearanżacji chromosomów 17 i 22 w zakresie genów COL1A1/PDGFB;</p> <p>3) nowotwór w stadium nieresekcyjnym (w przypadku zmian miejscowo złośliwych) lub uogólnionym z obecnością zmian przerzutowych;</p> <p>4) w przypadku zmian ograniczonych do powłok - zmiany nowotworowe udokumentowane z pomocą fotografii z miarką;</p> <p>5) w przypadku zmian przerzutowych - zmiany nowotworowe mierzone w badaniu tomografii komputerowej;</p> <p>6) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>7) stan sprawności 0-2 według klasyfikacji WHO;</p> <p>8) prawidłowe wartości wskaźników czynności wątroby i nerek;</p> <p>9) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <p>a) liczba granulocytów obojętnochłonnych przed leczeniem większa od $1,5 \times 10^9/l$,</p> <p>b) liczba płytek krwi większa od $100 \times 10^9/l$,</p> <p>c) stężenie hemoglobiny większe od 8,5 g/dl.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2. Kryteria uniemożliwiające kwalifikację do programu</p> <p>1) nadwrażliwość na imatynib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;</p> <p>2) obecność istotnych chorób współistniejących lub niewydolności narządowej;</p> <p>3) stan sprawności 3 albo 4 wg WHO;</p> <p>4) ciąża.</p> | <p>1. Imatynib</p> <p>1.1 Dobowa dawka imatynibu wynosi 800 mg (w dwóch dawkach po 400 mg).</p> <p>1.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych dawkę leku można zmniejszyć do 600 mg lub 400 mg/dobę.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia imatynibem</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie rozpoznania zaawansowanego włóknakiomięsaka skóry;</p> <p>2) potwierdzenie rearanżacji chromosomów 17 i 22 w zakresie genów COL1A1/PDGFB;</p> <p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) oznaczenie aktywności transaminaz wątrobowych;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej;</p> <p>7) oznaczenie poziomu albumin;</p> <p>8) badanie ogólne moczu;</p> <p>9) wykonanie tzw. zdjęcia z miarką - w przypadku zmian nowotworowych ograniczonych jedynie do powłok (skóra i tkanka podskórna);</p> <p>10) badanie tomografii komputerowej z podwójnym kontrastem odpowiednich okolic ciała - w przypadku obecności przerzutów;</p> <p>11) RTG klatki piersiowej;</p> <p>12) badanie EKG;</p> <p>13) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym.</p> <p>2. Monitorowanie skuteczności leczenia</p> <p>1) badania wykonywane co 4-6 tygodni w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące:</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>b) oznaczenie aktywności transaminaz wątrobowych,</p> <p>c) oznaczenie stężenia bilirubiny,</p> <p>d) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej,</p> <p>e) oznaczenie poziomu albumin,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>3. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>3.1 Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z zasadami określonymi w ust. 3.2 i 3.3 oraz zgodnie z kryteriami zakończenia udziału w programie, określonymi w ust. 4.</p> <p>3.2 Po co najmniej 14 tygodniach leczenia należy ocenić możliwość wykonania chirurgicznej resekcji wyjściowo nieoperacyjnego nowotworu.</p> <p>3.3 Jeżeli w wyniku tej oceny podjęto próbę chirurgicznego leczenia i w badaniu histopatologicznym po zabiegu operacyjnym marginesy chirurgiczne zostaną ocenione jako wolne od nowotworu należy odstąpić od dalszego stosowania imatynibu.</p> <p>4. Kryteria zakończenia udziału w programie</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na imatynib lub którąkolwiek z substancji pomocniczych;</p> <p>2) progresja choroby w trakcie stosowania leku;</p> <p>3) utrzymywanie się toksyczności w stopniu większym lub równym 3 wg skali WHO, w szczególności:</p> <p>a) 3-krotny wzrost stężenia bilirubiny,</p> <p>b) 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych,</p> <p>c) ciężka niedokrwistość, neutropenia lub małopłytkowość;</p> <p>4) pogorszenie stanu sprawności do stopnia 3 albo 4 według WHO.</p> | | <p>f) badanie ogólne moczu;</p> <p>2) badania wykonywane co 2 miesiące w okresie pierwszych 6 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące:</p> <p>a) wykonanie serii zdjęć z miarką w przypadku zmian nowotworowych ograniczonych jedynie do powłok (skóry i tkanki podskórnej),</p> <p>b) badanie tomografii komputerowej z podwójnym kontrastem odpowiednich okolic ciała:</p> <p>- w przypadku obecności przerzutów oraz</p> <p>- w przypadku podejrzenia progresji choroby nowotworu pierwotnie ograniczonego jedynie do powłok;</p> <p>3) badania wykonywane co 6 miesięcy - RTG klatki piersiowej.</p> <p>Wykonane badania obrazowe muszą umożliwić obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie. Ocena odpowiedzi na leczenie powinna być przeprowadzana zgodnie z kryteriami RECIST.</p> |
|--|--|--|

Załącznik B.8.

LECZENIE MIĘSAKÓW TKANEK MIĘKKICH (ICD-10 C 48, C 49)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznanie zaawansowanego miejscowo (nieresekcyjnego) lub przerzutowego mięsaka o typie histologicznym tłuszczakomięsaka (liposarcoma) lub mięsaka gładkokomórkowego (leiomyosarcoma);</p> <p>2) stopień sprawności 0-1 według klasyfikacji WHO;</p> <p>3) należna masa ciała (dopuszczalny ubytek masy ciała mniejszy niż 10% wartości należnej);</p> <p>4) niewystępowanie poważnych chorób współistniejących o istotnym znaczeniu dla zastosowania chemioterapii;</p> <p>5) możliwość przeprowadzenia obiektywnej oceny odpowiedzi na leczenie według kryteriów klasyfikacji RECIST;</p> <p>6) liczba granulocytów obojętnochłonnych (ANC) większa lub równa 1500/mm³;</p> <p>7) liczba płytek krwi większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>8) stężenie bilirubiny nieprzekraczające górnej granicy normy;</p> <p>9) aktywność fosfatazy zasadowej mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej granicy normy (jeżeli podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego, należy brać pod uwagę izoenzymy wątrobowe 5-nukleotyduazy lub GGT);</p> <p>10) poziom albuminy większy lub równy 25 g/l;</p> <p>11) aktywność aminotransferazy alaninowej (AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej granicy normy;</p> <p>12) klirens kreatyniny większy lub równy 30 ml/min w przypadku monoterapii;</p> <p>13) stężenie kreatyniny w surowicy mniejsze lub równe 1,5 mg/dl (132,6 μmol/l) lub klirens kreatyniny większy lub równy 60 ml/min w przypadku terapii skojarzonej;</p> <p>14) poziom kinazy kreatynowej mniejszy lub równy 2,5-krotności górnej granicy normy;</p> <p>15) stężenie hemoglobiny większe lub równe 9 g/dl;</p> | <p>1. Trabektedyna</p> <p>1.1 Zalecana dawka trabektedyny wynosi 1,5 mg/m² powierzchni ciała.</p> <p>1.2 Podanie leku obejmuje wlew dożylny trwający 24 godziny. Lek podaje się przez cewnik w żyłę centralnej.</p> <p>1.3 Przerwa pomiędzy cyklami leczenia wynosi 3 tygodnie.</p> <p>1.4 W ramach premedykacji należy zastosować kortykosteroidy.</p> <p>1.5 Przed podaniem drugiej i kolejnych dawek leku muszą być spełnione łącznie następujące kryteria dotyczące parametrów biochemicznych:</p> <p>1) liczba granulocytów obojętnochłonnych (ANC) większa lub równa 1500/mm³;</p> <p>2) liczba płytek krwi większa lub równa 100 000/mm³;</p> <p>3) stężenie bilirubiny nieprzekraczające górnej granicy normy;</p> <p>4) aktywność fosfatazy zasadowej mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej granicy normy (jeżeli podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego, należy brać pod uwagę izoenzymy wątrobowe 5-nukleotyduazy lub GGT);</p> <p>5) poziom albuminy większy lub równy 25 g/l;</p> <p>6) aktywność aminotransferazy alaninowej (AIAT) i aminotransferazy asparaginianowej (AspAT) mniejsza lub równa 2,5-krotności górnej</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie określonego typu mięsaka zgodnie z kryteriami włączenia - w przypadku diagnostyki mięsaka gładkokomórkowego konieczne wykonanie immunohistochemicznego oznaczenia desminy;</p> <p>2) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>3) oznaczenie stężenia hemoglobiny;</p> <p>4) oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny;</p> <p>5) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>6) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>7) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>8) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej (w tym 5-nukleotyduazy lub GGT, w przypadku gdy podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego);</p> <p>9) oznaczenie poziomu albumin w surowicy;</p> <p>10) oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej;</p> <p>11) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>12) badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego odpowiednich okolic ciała.</p> <p>2. Monitorowanie skuteczności leczenia</p> <p>2.1 Badania biochemiczne:</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) oznaczenie stężenia hemoglobiny;</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>16) udokumentowana progresja choroby podczas przynajmniej jednej linii chemioterapii z udziałem dokсорubicyny lub ifosfamidu zastosowanej z powodu zaawansowanego miejscowo (nieresekcyjnego) lub przerzutowego mięsaka o typie histologicznym tłuszczakomięsaka (liposarcoma) lub mięsaka gładkokomórkowego (leiomyosarcoma);</p> <p>17) zastosowanie nie więcej niż 3 linii wcześniejszej chemioterapii.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2. Kryteria uniemożliwiające włączenie do programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nadwrażliwość na trabektedynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 2) współistniejące poważne lub niekontrolowane zakażenie; 3) wystąpienie poważnej, nawracającej i trudno odwracalnej toksyczności (stopień 3-4) podczas wcześniejszej chemioterapii; 4) ciąża lub karmienie piersią; 5) jednoczesne podanie szczepionki przeciwko żółtej febrze. <p>3. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia z programu, o których mowa w ust. 4.</p> <p>4. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) progresja choroby - oceniania zgodnie z kryteriami RECIST; 2) działania niepożądane powyżej 2 stopnia według WHO (z wyłączeniem przejściowych objawów typowych dla leczenia trabektedyną); 3) niespełnienie kryteriów wymaganych przy podaniu kolejnej dawki leku; 4) rezygnacja pacjenta. | <p>granicy normy;</p> <ol style="list-style-type: none"> 7) klirens kreatyniny większy lub równy 30 ml/min w przypadku monoterapii; 8) stężenie kreatyniny w surowicy mniejsze lub równe 1,5 mg/dl (132,6 μmol/l) lub klirens kreatyniny większy lub równy 60 ml/min w przypadku terapii skojarzonej; 9) poziom kinazy kreatynowej mniejszy lub równy 2,5-krotności górnej granicy normy; 10) stężenie hemoglobiny większe lub równe 9 g/dl. <p>1.6 W przypadku niespełnienia kryteriów określonych w ust. 1.5 należy opóźnić podanie trabektedyny aż do osiągnięcia przez parametry biochemiczne wymaganych wartości.</p> <p>1.7 Opóźnienie podania drugiej i kolejnych dawek leku nie może wynosić więcej niż 3 tygodnie.</p> <p>Brak spełniania w tym okresie kryteriów określonych w ust. 1.5 nakazuje zakończenie udziału w programie.</p> | <ol style="list-style-type: none"> 3) oznaczenia stężenia kreatyniny w surowicy lub klirens kreatyniny; 4) oznaczenie stężenia bilirubiny; 5) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 6) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 7) oznaczenie aktywności fosfatazy zasadowej (w tym 5-nukleotyduzy lub GGT, w przypadku gdy podwyższenie aktywności fosfatazy zasadowej może być pochodzenia kostnego); 8) oznaczenie poziomu albumin w surowicy; 9) oznaczenie poziomu kinazy kreatynowej. <p>Badania należy wykonywać raz w tygodniu podczas dwóch pierwszych cykli leczenia oraz co najmniej raz między zastosowaniem leku w kolejnych cyklach leczenia.</p> <p>2.2 Badania obrazowe</p> <p>Badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego odpowiednich okolic ciała - wykonywane co 7-9 tygodni oraz nie rzadziej niż co 3 cykle terapii.</p> <p>Odpowiedź na leczenie należy oceniać zgodnie z kryteriami RECIST.</p> |
|---|---|--|

Załącznik B.9.

LECZENIE RAKA PIERSI (ICD-10 C 50)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 1.1 Kryteria kwalifikacji 1) histologiczne rozpoznanie raka piersi; 2) nadekspresja receptora HER2 w komórkach raka (wynik /3+/ w badaniu IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik +/- w badaniu FISH lub CISH); 3) nowotwór pierwotnie operacyjny (wyjściowy stopień zaawansowania (IC - T1c N0, II - T0-2 N0-1 lub IIIA - T3 N1); 4) zaawansowanie umożliwiające leczenie chirurgiczne po zastosowaniu wstępnej chemioterapii i uzyskaniu możliwości chirurgicznego leczenia o założeniu doszczętnym w stopniu IIIA (T0-3 N2); 5) leczenie chirurgiczne o założeniu radykalnym polegające na: a) amputacji piersi oraz wycięciu pachowych węzłów chłonnych, b) wycięciu guza z marginesem tkanek prawidłowych oraz pachowych węzłów chłonnych z uzupełnianą radioterapią całej piersi (leczenie oszczędzające); 6) czynniki ryzyka nawrotu raka wykazane na podstawie histologicznego badania materiału pooperacyjnego obejmujące: a) obecność przerzutów w pachowych węzłach chłonnych dołu pachowego (cecha pN+) lub b) największą średnicę guza powyżej 1,0 cm w przypadku nieobecności przerzutów w pachowych węzłach chłonnych (cecha pN0); 7) wydolność serca wykazana na podstawie oceny klinicznej i badania ECHO lub MUGA (przed rozpoczęciem stosowania trastuzumabu) z frakcją wyrzutu lewej komory serca wynoszącą przynajmniej 50%; 8) wykluczenie ciąży.</p> <p>2. Leczenie przerzutowego raka piersi trastuzumabem albo lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną 2.1 Kryteria kwalifikacji 1) histologiczne rozpoznanie raka piersi z przerzutami (IV stopień) - (dla</p> | <p>1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem Początkowa dawka nasycająca wynosi 8 mg/kg masy ciała, a następnie 6 mg/kg po 3 tygodniach, po czym 6 mg/kg powtarzane w 3 tygodniowych odstępach, podawane we wlewie przez około 90 minut. Jeżeli podanie leku z jakichś powodów spóźniło się o 7 dni lub mniej, należy podać jak najszybciej zwykłą dawkę leku (6 mg/kg) (nie czekając do następnego planowanego cyklu), a następnie należy podawać dawki podtrzymujące 6 mg/kg co 3 tygodnie, zgodnie z uprzednim planem leczenia. Jeżeli podanie leku opóźniło się o więcej niż 7 dni, wtedy należy ponownie podać dawkę nasycającą (8 mg/kg przez około 90 minut), a następnie podawać kolejne podtrzymujące dawki leku (6 mg/kg) co 3 tygodnie od tego momentu. Świadczeniobiorców z wczesnym rakiem piersi należy leczyć przez 1 rok lub do momentu nawrotu choroby. Lek podaje się w 90-minutowym wlewie dożylnym. Świadczeniobiorcy powinni być obserwowani przez co najmniej 6 godzin, od rozpoczęcia pierwszego wlewu i przez 2 godziny od rozpoczęcia kolejnych wlewów, pod kątem wystąpienia objawów takich jak: gorączka, dreszcze lub innych objawów związanych z wlewem dożylnym. Przerwanie wlewu może pomóc w kontrolowaniu tych objawów. Wlew może być wznowiony po zmniejszeniu nasilenia</p> | <p>1. Leczenie adjuwantowe raka piersi trastuzumabem 1.1 Wykaz badań przy kwalifikacji a) badanie immunohistochemiczne lub FISH lub CISH (ocena nadekspresji receptora HER2, obecność receptorów ER i PGR), b) morfologia krwi z rozmazem, c) poziom kreatyniny, d) poziom ALAT, e) poziom AspAT, f) stężenie bilirubiny, g) USG jamy brzusznej, h) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian), i) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej), j) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca), k) konsultacja kardiologiczna. 1.2 Monitorowanie leczenia Badanie przeprowadzane co 3 tygodnie: a) morfologia krwi z rozmazem, b) poziom kreatyniny, c) poziom ALAT, d) poziom AspAT, e) stężenie bilirubiny, f) EKG. Badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca) przeprowadzane w 9, 18, 27, 36 i 45 tygodniu oraz następnie w przypadku kontynuacji leczenia co trzy</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>trastuzumabu i lapatynibu z kapecytabiną);</p> <p>2) udokumentowane niepowodzenie chemioterapii z użyciem antracyklin lub z przeciwwskazaniami do stosowania antracyklin (dla trastuzumabu stosowanego w skojarzeniu z lekiem o działaniu cytotoksycznym);</p> <p>3) udokumentowane niepowodzenie leczenia z użyciem przynajmniej 2 schematów chemioterapii z użyciem antracyklin i taksanów (dla trastuzumabu stosowanego w monoterapii);</p> <p>4) udokumentowana progresja po uprzednim leczeniu trastuzumabem jest kryterium włączenia do leczenia lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną;</p> <p>5) udokumentowana nadekspresja receptora HER2 (wynik /3+/ w badaniu IHC) lub amplifikacja genu HER2 (wynik +/- w badaniu FISH lub CISH);</p> <p>6) stan sprawności 0-2 wg WHO;</p> <p>7) prawidłowe wskaźniki czynności nerek;</p> <p>8) prawidłowe wskaźniki czynności wątroby (możliwość kwalifikowania chorych z umiarkowanym wzrostem aktywności transaminaz to znaczy do 3-krotnego wzrostu aktywności transaminaz w stosunku do wartości prawidłowych);</p> <p>9) prawidłowe wskaźniki czynności szpiku;</p> <p>10) wydolność serca wykazana na podstawie oceny klinicznej i badania ECHO lub MUGA (przed rozpoczęciem stosowania trastuzumabu) z frakcją wyrzutu lewej komory serca wynoszącą przynajmniej 50%;</p> <p>11) nieobecność nasilonej duszności spoczynkowej związanej z zaawansowanym nowotworem;</p> <p>12) wykluczenie ciąży.</p> <p>Nieuzasadnione jest włączanie do leczenia trastuzumabem w ramach leczenia przerzutowego raka piersi świadczeniobiorców, u których zastosowano ten lek w leczeniu adjuwantowym raka piersi.</p> <p>3. Wyłączenie z programu:</p> <p>1) Leczenie adjuwantowe raka piersi:</p> <p>a) rozpoznanie przewodowego raka przedinwazyjnego,</p> <p>b) zaawansowanie w stopniach I A oraz IIIB, IIIC i IV,</p> <p>c) progresja choroby w trakcie stosowania leku,</p> <p>d) niewydolność serca (klasa III lub IV według klasyfikacji NYHA),</p> <p>e) niestabilność hemodynamiczna w przebiegu choroby wieńcowej lub zastawkowej wady serca oraz nadciśnienia tętniczego i innych sytuacji klinicznych (np. wieloletnia lub niekontrolowana cukrzyca),</p> <p>f) frakcja wyrzutu lewej komory serca poniżej 50 % wykazana w badaniu</p> | <p>objawów. Jeżeli pierwsza dawka nasycająca była dobrze tolerowana, dawki kolejne mogą być podawane w 30-minutowym wlewie.</p> <p>Leczenie trastuzumabem powinno być prowadzone do czasu wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia niepożądanych działań o istotnym znaczeniu klinicznym.</p> <p>2. Leczenie przerzutowego raka piersi trastuzumabem</p> <p>Zalecana początkowa dawka nasycająca wynosi 4 mg/kg masy ciała.</p> <p>Następnie podaje się cotygodniową dawkę leku 2 mg/kg masy ciała, rozpoczynając po upływie tygodnia od podania dawki nasycającej.</p> <p>Alternatywnie zalecany jest niższy schemat dawek nasycającej i podtrzymującej w monoterapii i leczeniu skojarzonym z paklitakselem, docetakselem lub inhibitorem aromatazy:</p> <p>Początkowa dawka nasycająca 8 mg/kg masy ciała, a następnie 6 mg/kg po 3 tygodniach, po czym 6 mg/kg powtarzane w 3 tygodniowych odstępach, podawane we wlewie przez około 90 min.</p> <p>Leczenie trastuzumabem powinno być prowadzone do czasu wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia niepożądanych działań o istotnym znaczeniu klinicznym.</p> <p>3. Leczenie uogólnionego raka piersi lapatynibem w skojarzeniu z kapecytabiną</p> <p>Zalecana dawka dobową lapatynibu wynosi 1.250 mg (5 tabletek jednorazowo w ciągu doby - dawki dobowej nie należy dzielić). Leczenie lapatynibem należy prowadzić codziennie do wystąpienia progresji choroby lub wystąpienia poważnych działań niepożądanych.</p> <p>Kapecytabinę w skojarzeniu z lapatynibem należy stosować w dobowej dawce 2.000mg/m²</p> | <p>podania trastuzumabu.</p> <p>2. Paliatywne leczenie raka piersi</p> <p>2.1 Wykaz badań przy kwalifikacji</p> <p>a) badanie immunohistochemiczne lub FISH (ocena nadekspresji receptora HER2, obecność receptorów ER i PGR),</p> <p>b) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>c) poziom kreatyniny,</p> <p>d) poziom ALAT,</p> <p>e) poziom AspAT,</p> <p>f) stężenie bilirubiny,</p> <p>g) USG jamy brzusznej,</p> <p>h) RTG - klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),</p> <p>i) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej),</p> <p>j) EKG, badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca);</p> <p>k) konsultacja kardiologiczna</p> <p>2.2 Monitorowanie leczenia</p> <p>Badanie przeprowadzane co 3 tygodnie</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>b) poziom kreatyniny,</p> <p>c) poziom ALAT,</p> <p>d) poziom AspAT,</p> <p>e) stężenie bilirubiny.</p> <p>Badania przeprowadzane co trzy podania trastuzumabu:</p> <p>a) USG jamy brzusznej,</p> <p>b) RTG klatki piersiowej lub badanie tomografii komputerowej (w zależności od możliwości oceny wymiarów zmian),</p> <p>c) badanie ECHO lub MUGA (scyntygrafia bramkowana serca),</p> <p>d) scyntygrafia kośćca (w zależności od oceny sytuacji klinicznej),</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|--------------|
| <p>ECHO lub MUGA,</p> <p>g) niewydolność oddechowa związana z innymi chorobami współistniejącymi,</p> <p>h) współistnienie innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy i podstawnokomórkowego raka skóry,</p> <p>i) okres ciąży i karmienia piersią,</p> <p>j) przeciwwskazania do stosowania trastuzumabu wynikające z nadwrażliwości na trastuzumab, białko mysie lub substancje pomocnicze.</p> <p>2) Leczenie przerzutowego raka piersi:</p> <p>a) wystąpienie objawów nadwrażliwości na lek podawany w programie,,</p> <p>b) toksyczność według WHO powyżej 3, zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku, objawów niewydolności krążenia,</p> <p>c) stan sprawności 3 - 4 według WHO,</p> <p>d) progresja choroby w trakcie stosowania leku:</p> <ul style="list-style-type: none">- wystąpienie nowych zmian nowotworowych lub- stwierdzenie progresji istniejących zmian - zwiększenie o przynajmniej 20% najmniejszego wymiaru istniejącej zmiany pojedynczej lub sumy najdłuższych wymiarów w przypadku mnogich zmian, <p>e) niewydolność krążenia i niewydolność wieńcowa oraz niekontrolowane nadciśnienie tętnicze,</p> <p>f) ciąża.</p> | <p>powierzchni ciała (dwie dawki podzielone) w dniach 1- 14 w cyklach 21- dniowych.</p> | <p>e)EKG</p> |
|---|---|--------------|

Załącznik B.10.

LECZENIE RAKA NERKI (ICD-10 C 64)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| 1 | 2 | 3 |
| <p>1. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sunitynib</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) histologicznie potwierdzone rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym;</p> <p>2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);</p> <p>3) brak wcześniejszego leczenia farmakologicznego raka nerki;</p> <p>4) uprzednie wykonanie nefrektomii;</p> <p>5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych;</p> <p>6) zmiany możliwe do obiektywnej oceny w badaniach obrazowych metodą komputerowej tomografii (KT) lub magnetycznego rezonansu (MR) z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej rentgenografii (RTG) lub MR;</p> <p>7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (dopuszczalne wcześniejsze usunięcie przerzutów);</p> <p>8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego;</p> <p>9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center);</p> <p>10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;</p> <p>11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego skóry;</p> <p>12) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:</p> <p>a) wyniki badań czynności wątroby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta), - aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy | <p>1. Sunitynib</p> <p>1.1 Zalecana dawka sunitynibu wynosi 50 mg doustnie raz na dobę przez 4 kolejne tygodnie, po czym następuje 14-dniowa przerwa, co stanowi pełny 6-tygodniowy cykl leczenia.</p> <p>1.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się nasilenia wspomnianych objawów oraz w trakcie dalszego leczenia należy rozważyć redukcję dawki do 37,5 mg na dobę podawanej przez 4 kolejne tygodnie z następującą po tym okresie 14-dniową przerwą.</p> <p>1.3 Jeżeli ciężkie objawy niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w ciągu 4 tygodni mimo przerwania podawania leku, to należy definitywnie zakończyć leczenie.</p> <p>1.4 Jeżeli pomimo redukcji dawki do 37,5 mg na dobę istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, to należy zmniejszyć dawkę leku do 25 mg na dobę podawanej przez 4 kolejne tygodnie z następującą po tym okresie 14-dniową przerwą.</p> <p>1.5 Ponowne pojawienie się istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych nakazuje zakończenie leczenia.</p> <p>2. Sorafenib</p> <p>2.1 Sorafenib jest stosowany w dobowej dawce 800 mg (2 razy dziennie po 2 tabletki zawierające 200 mg) bez przerw.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji do leczenia sunitynibem, sorafenibem lub ewerolimusem</p> <p>1) histologiczne potwierdzenie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym;</p> <p>2) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>3) oznaczenie stężenia hemoglobiny;</p> <p>4) oznaczenie stężenia mocznika;</p> <p>5) oznaczenia stężenia kreatyniny;</p> <p>6) oznaczenie stężenia bilirubiny;</p> <p>7) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej;</p> <p>8) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej;</p> <p>9) oznaczenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej (LDH);</p> <p>10) oznaczenie aktywności hormonu tyreotropowego (TSH) - dla sunitynibu i sorafenibu;</p> <p>11) oznaczenie skorygowanego stężenia wapnia w surowicy;</p> <p>12) inne badania laboratoryjne w razie wskazań klinicznych;</p> <p>13) test ciążowy u kobiet w wieku rozrodczym;</p> <p>14) badanie KT klatki piersiowej i jamy brzusznej;</p> <p>15) badanie RTG klatki piersiowej;</p> <p>16) badanie KT lub MR mózgu - w przypadku osób z podejrzeniem przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego (tj. w przypadku objawów ze strony</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, b) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy, c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem: - liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/\text{mm}^3$, - bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/\text{mm}^3$, - poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; 13) czynność tarczycy prawidłowa lub wyrównana farmakologicznie; 14) nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego. Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu 1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sunitynib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą; 3) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO; 4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali Karnofsky'ego; 5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia; 6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku.</p> <p>2. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej sorafenib</p> <p>2.1 Kryteria kwalifikacji 1) rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym potwierdzone badaniem histopatologicznym z materiału operacyjnego, biopsji guza nerki lub ogniska przerzutowego; 2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym); 3) udokumentowane niepowodzenie wcześniejszej immunoterapii z</p> | <p>2.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się ich nasilenia oraz należy rozważyć zmniejszenie dobowej dawki sorafenibu do 400 mg dziennie (2 tabletki po 200 mg 1 raz dziennie).</p> <p>2.3 Jeżeli ciężkie działania niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w ciągu 4 tygodni mimo przerwania podawania leku, należy zakończyć leczenie.</p> <p>2.4 Jeżeli pomimo redukcji dawki do 400 mg dziennie istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, należy zredukować dawkę leku do 400 mg podawanych co drugi dzień.</p> <p>2.5 Ponowne pojawienie się istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych nakazuje zakończenie leczenia.</p> <p>3. Ewerolimus</p> <p>3.1 Ewerolimus jest stosowany w dobowej dawce 10 mg (1 raz dziennie 2 tabletki zawierające 5 mg albo 1 raz dziennie 1 tabletką zawierającą 10 mg) bez przerw.</p> <p>3.2 W przypadku wystąpienia istotnych klinicznie lub ciężkich działań niepożądanych należy przerwać stosowanie leku aż do zmniejszenia się ich nasilenia oraz należy rozważyć zmniejszenie dobowej dawki ewerolimusu do 5 mg dziennie (1 tabletką po 5 mg 1 raz dziennie).</p> <p>3.3 Jeżeli ciężkie działania niepożądane nie zmniejszą swojego nasilenia w ciągu 4 tygodni mimo przerwania podawania leku, należy zakończyć leczenie.</p> <p>3.4 Jeżeli pomimo redukcji dawki do 5 mg dziennie istotne klinicznie lub ciężkie działania niepożądane ponownie wystąpią, należy zakończyć leczenie.</p> | <p>ośrodkowego układu nerwowego oraz u osób po wcześniejszej resekcji przerzutów); 17) elektrokardiogram (EKG); 18) pomiar ciśnienia tętniczego; 19) inne badania obrazowe w razie wskazań klinicznych. Wstępne badania obrazowe muszą umożliwić późniejszą obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie.</p> <p>2. Monitorowanie bezpieczeństwa leczenia 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) oznaczenie stężenia hemoglobiny; 3) oznaczenia stężenia kreatyniny; 4) oznaczenie stężenia bilirubiny; 5) oznaczenie aktywności aminotransferazy alaninowej; 6) oznaczenie aktywności aminotransferazy asparaginianowej; 7) oznaczenie aktywności LDH; 8) oznaczenie aktywności fosfatazy alkalicznej. Badania wykonuje się: 1) co 6 tygodni - w przypadku leczenia sunitynibem; 2) co 4 tygodnie - w przypadku leczenia sorafenibem; 3) co 4 tygodnie - w przypadku leczenia ewerolimusem.</p> <p>3. Monitorowanie skuteczności leczenia 1) badanie KT lub MR odpowiedniego obszaru; 2) badanie RTG klatki piersiowej - jeżeli nie jest wykonywane badanie KT; 3) EKG; 4) inne badania obrazowe w razie wskazań klinicznych. Badania wykonuje się: 1) nie rzadziej niż co 12 tygodni; 2) przed zakończeniem: a) co drugiego kursu leczenia - w przypadku sunitynibu, b) co trzeciego kursu leczenia - w przypadku</p> |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>zastosowaniem interferonu alfa lub udokumentowane przeciwwskazania do dalszego stosowania interferonu alfa;</p> <p>4) uprzednie wykonanie nefrektomii;</p> <p>5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych;</p> <p>6) zmiany możliwe do obiektywnej oceny w badaniach obrazowych metodą KT lub MR z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej RTG lub MR;</p> <p>7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (dopuszczalne wcześniejsze usunięcie przerzutów);</p> <p>8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego;</p> <p>9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center);</p> <p>10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;</p> <p>11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego skóry;</p> <p>12) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:</p> <p>a) wyniki badań czynności wątroby:</p> <ul style="list-style-type: none">- stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),- aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, <p>b) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/\text{mm}^3$,- bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/\text{mm}^3$,- poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; <p>13) czynność tarczycy prawidłowa lub wyrównana farmakologicznie;</p> <p>14) nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego.</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>2.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>2.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> | | <p>sorafenibu,</p> <p>c) co trzeciego kursu leczenia - w przypadku ewerolimusu;</p> <p>3) w chwili wyłączenia z programu, o ile nie nastąpiło z powodu udokumentowanej progresji choroby. Wykonane badania obrazowe muszą umożliwić obiektywną ocenę odpowiedzi na leczenie. Ocena odpowiedzi na leczenie powinna być przeprowadzana zgodnie z kryteriami RECIST lub CHOI.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;</p> <p>2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na sorafe nib lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <p>3) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO;</p> <p>4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali Karnofsky'ego;</p> <p>5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia;</p> <p>6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku.</p> <p>3. Leczenie raka nerki przy wykorzystaniu substancji czynnej ewerolimus</p> <p>3.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) histologicznie potwierdzone rozpoznanie jasnokomórkowego raka nerki lub mieszanego raka nerkowokomórkowego z przeważającym (powyżej 60% utkania) komponentem jasnokomórkowym;</p> <p>2) nowotwór w stadium zaawansowanym (pierwotne uogólnienie lub nawrót po pierwotnym leczeniu chirurgicznym);</p> <p>3) udokumentowane niepowodzenie wcześniejszego leczenia z zastosowaniem wielokinazowych inhibitorów (sunitynib albo sorafe nib) stosowanych jako jedyne leczenie poprzedzające lub po wcześniejszej immunoterapii;</p> <p>4) uprzednie wykonanie nefrektomii;</p> <p>5) udokumentowana obecność przerzutów narządowych;</p> <p>6) zmiany możliwe do obiektywnej oceny w badaniach obrazowych metodą KT lub MR z zastrzeżeniem konieczności potwierdzenia zmian w układzie kostnym przy użyciu konwencjonalnej RTG lub MR;</p> <p>7) nieobecność przerzutów w ośrodkowym układzie nerwowym (dopuszczalne wcześniejsze usunięcie przerzutów);</p> <p>8) stan sprawności 80-100 wg skali Karnofsky'ego;</p> <p>9) korzystne lub pośrednie rokowanie według skali MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center);</p> <p>10) wykluczenie ciąży i okresu karmienia piersią;</p> <p>11) nieobecność innych nowotworów złośliwych z wyjątkiem przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz raka podstawnokomórkowego</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>skóry;</p> <p>12) wykluczenie czynnych zakażeń miejscowych lub ogólnoustrojowych;</p> <p>13) nieobecność niekontrolowanych chorób układu sercowo-naczyniowego;</p> <p>14) adekwatna wydolność narządowa określona na podstawie badań laboratoryjnych krwi:</p> <p>a) wyniki badań czynności wątroby:</p> <ul style="list-style-type: none">- stężenie bilirubiny całkowitej nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy (z wyjątkiem pacjentów z zespołem Gilberta),- aktywność transaminaz (alaninowej i asparaginowej) w surowicy nieprzekraczające 5-krotnie górnej granicy normy, <p>b) stężenie kreatyniny nieprzekraczające 2-krotnie górnej granicy normy,</p> <p>c) wyniki badania morfologii krwi z rozmazem:</p> <ul style="list-style-type: none">- liczba płytek krwi większa lub równa $10^5/\text{mm}^3$,- bezwzględna liczba granulocytów obojętnochłonnych większa lub równa $1500/\text{mm}^3$,- poziom hemoglobiny większy lub równy 9,5 g/dl; <p>15) prawidłowe stężenie glukozy we krwi;</p> <p>16) niestosowanie leków z grupy silnych i umiarkowanych inhibitorów CYP3A4 (w szczególności ketokonazol, itrakonazol, worikonazol, klarytromycyna, telitromycyna, erytromycyna, werapamil, flukonazol, diltiazem, cyklosporyna).</p> <p>Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.</p> <p>3.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none">1) udokumentowana progresja w trakcie stosowania leku;2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na ewerolimus lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;3) nawracająca lub nieakceptowalna toksyczność powyżej 3 stopnia według skali WHO;4) utrzymujący się stan sprawności 70 lub niższy według skali Karnofsky'ego;5) wystąpienie objawów zastoinowej niewydolności serca, ostrych incydentów niewydolności wieńcowej, niekontrolowanego nadciśnienia tętniczego oraz niestabilnych zaburzeń rytmu serca wymagających leczenia; | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| 6) istotne pogorszenie jakości życia w trakcie stosowania leku. | | |
|---|--|--|

Załącznik B.11.

LECZENIE GLEJAKÓW MÓZGU (ICD-10 C 71)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|---|---|---|
| <p>1. Leczenie dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) histologiczne nowe rozpoznanie złośliwego glejaka GIII i GIV (gwiazdździak anaplastyczny lub glejak wielopostaciowy);</p> <p>2) stan sprawności według WHO 0 - 2;</p> <p>3) prawidłowa czynność szpiku (wskaźniki morfologii krwi);</p> <p>4) prawidłowa czynność nerek i wątroby (wskaźniki biochemiczne);</p> <p>5) wykluczona ciąża.</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na temozolomid;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej lub równa 3 (zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku);</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3 - 4;</p> <p>4) brak skuteczności po 2 cyklach stosowania leku- pogorszenie stanu chorego;</p> <p>5) progresja choroby w trakcie stosowania leku (ocena na podstawie stanu klinicznego oraz badania obrazowego w celu rozróżnienia z często występującą pseudoprogresją w obrazie radiologicznym).</p> <p>2. Leczenie dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starszych z glejakiem złośliwym (gwiazdździak anaplastyczny lub glejak wielopostaciowy) wykazującym wznowę lub progresję po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii z udokumentowanymi przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania leczenia chirurgicznego i radioterapii</p> | <p>1. Leczenie dorosłych z nowo zdiagnozowanym glejakiem wileopostaciowym</p> <p>Temozolomid kapsułki twarde podaje się w skojarzeniu z celowaną radioterapią (okres leczenia skojarzonego) a następnie podaje się do 6 cykli temozolomidu w monoterapii (okres monoterapii). Temozolomid w ramach skojarzonego leczenia (radiochemioterapia) chorych na pierwotnie rozpoznanego glejaka wielopostaciowego stosuje się według schematu:</p> <p>1) okres jednoczesnego stosowania chemioterapii i radioterapii - leczenie skojarzone</p> <p>a) temozolomid - codziennie w dawce 75 mg/m² powierzchni ciała przez 42 dni</p> <p>b) radioterapia - 2 Gy dziennie przez 5 dni w tygodniu do dawki całkowitej 60 Gy (30 frakcji) w ciągu 42 dni (6 tygodni)</p> <p>2) okres wyłącznego stosowania chemioterapii (rozpoczęcie po 4 tygodniach od zakończenia radioterapii) - monoterapia</p> <p>a) temozolomid pierwszy cykl - w dniach od 1. do 5. w dawce 150 mg/m² powierzchni ciała, po których następuje 23-dniowa przerwa w podawaniu leku</p> <p>b) temozolomid kolejne cykle (od 2. do 6. cyklu) - w dniach od 1. do 5. cyklu w dawce 200 mg/m² powierzchni ciała co 28 dni.</p> <p>2. Leczenie dorosłych i dzieci w wieku 3 lat i starsze z glejakiem złośliwym wykazującym wznowę lub progresję</p> <p>Cykl leczenia obejmuje 28 dni. Pacjentom niepoddawanym wcześniej chemioterapii temozolomidem podaje się lek doustnie w dawce 200 mg/m² p.c. raz na dobę przez pierwsze 5 dni, po których następuje 23 dniowa przerwa w leczeniu (w sumie 28 dni). U pacjentów poddawanych wcześniej chemioterapii początkowa</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem,</p> <p>b) próby wątrobowe,</p> <p>c) poziom kreatyniny i mocznika we krwi,</p> <p>d) ocena stopnia zapotrzebowania na kortykosteroidy,</p> <p>e) badanie histopatologiczne,</p> <p>f) rezonans magnetyczny głowy lub tomografia komputerowa głowy,</p> <p>g) badanie neurologiczne.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Leczenie skojarzone</p> <p>Raz w tygodniu morfologia krwi z rozmazem</p> <p>2.2 Monoterapia</p> <p>Przed każdym kolejnym cyklem leczenia:</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem</p> <p>b) ocena stopnia zapotrzebowania na kortykosteroidy</p> <p>c) badanie neurologiczne</p> <p>W przypadku pogorszenia wyniku badania neurologicznego lub oceny stopnia zapotrzebowania na kortykosteroidy, należy wykonać badanie obrazowe nieprzewidziane wymienionym wyżej rytmem.</p> <p>2.3 Po każdym kolejnych 2 cyklach:</p> <p>1) kreatynina;</p> <p>2) AspAT;</p> <p>3) AlAT;</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>2.1 Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none">1) nawrót po wcześniejszym leczeniu chirurgicznym lub radioterapii z udokumentowanymi przeciwwskazaniami do ponownego zastosowania leczenia chirurgicznego i radioterapii2) stan sprawności według WHO 0 - 2;3) prawidłowa czynność szpiku (wskaźniki morfologii krwi);4) prawidłowa czynność nerek i wątroby (wskaźniki biochemiczne);5) wykluczona ciąża. <p>2.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz, na podstawie kryteriów wyłączenia.</p> <p>2.3 Kryteria wyłączenia z programu</p> <ol style="list-style-type: none">1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na temozolomid;2) toksyczność według WHO powyżej lub równa 3 (zwłaszcza wystąpienie objawów zahamowania czynności szpiku);3) stan sprawności według WHO 3 - 4;4) brak skuteczności po 2 cyklach stosowania leku- pogorszenie stanu chorego;5) progresja choroby w trakcie stosowania leku (ocena na podstawie stanu klinicznego oraz badania obrazowego w celu rozróżnienia z często występującą pseudoprogresją w obrazie radiologicznym). | <p>dawka wynosi 150mg/m² p.c. na dobę i może być zwiększona w drugim cyklu do 200mg/m² p.c. raz na dobę przez 5 dni pod warunkiem, że całkowita liczba granulocytów obojętnochłonnych wynosi $\geq 1,5 \times 10^9/l$. i liczba płytek krwi wynosi $\geq 100 \times 10^9$.</p> <p>Leczenie temozolomidem prowadzone jest zwykle do 6 cykli, o ile wcześniej nie wystąpi progresja lub do wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności leczenia (najczęściej jest to małopłytkowość).</p> | <p>4) tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny;</p> |
|--|---|--|

Załącznik B.12.

LECZENIE CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH (ICD-10 C 82, C 83)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) potwierdzony histologicznie chłoniak złośliwy typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania, a w przypadku zastosowania monoterapii - oporność na chemioterapię bądź druga lub kolejna wznowa po chemioterapii lub</p> <p>2) potwierdzony histologicznie chłoniak nieziarniczny rozlany z dużych komórek B, z udokumentowaną w badaniu obecnością antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka;</p> <p>3) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>4) stan ogólny według WHO 0 - 2;</p> <p>5) wyrównana niewydolność krążenia lub niewydolność wieńcowa (jeżeli występują);</p> <p>6) dobrze kontrolowane nadciśnienie tętnicze (jeżeli występuje).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów włączenia i kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na rytuksymab, którykolwiek ze składników preparatu lub na białka mysie;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 3;</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3 - 4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 2 cyklach stosowania;</p> <p>5) progresja lub nawrót choroby w okresie 6 miesięcy przy leczeniu rytuksymabem;</p> <p>6) niewydolność serca w IV klasie według NYHA;</p> <p>7) czynne ciężkie zakażenie;</p> <p>8) ciąża.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 U świadczeniobiorców z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania, rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m² pow. ciała, podawanej w postaci wlewu dożylnego raz w tygodniu, przez 4 tygodnie.</p> <p>1.2 U świadczeniobiorców chorych na nieziarnicze chłoniaki grudkowe w fazie nawrotu lub oporności na leczenie, u których uzyskano odpowiedź na leczenie indukcyjne po zastosowaniu chemioterapii bez lub z rytuksymabem wynosi 375 mg/m² powierzchni ciała raz na 3 miesiące do czasu progresji choroby lub przez maksymalnie okres dwóch lat.</p> <p>1.3 U świadczeniobiorców z rozpoznaniem chłoniaka złośliwego typu grudkowego w III lub IV stopniu zaawansowania, rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m² pow. ciała, podawanej w postaci wlewu dożylnego w skojarzeniu z chemioterapią co 21 dni - 8 podań.</p> <p>1.4 U świadczeniobiorców z rozpoznaniem chłoniaka nieziarniczego rozlanego z dużych komórek B, rytuksymab podawany jest w dawce 375 mg/m² pow. ciała, podawanej w postaci wlewu dożylnego w skojarzeniu ze schematem CHOP co 21 dni - 8 podań.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) dehydrogenaza mleczanowa w surowicy;</p> <p>3) gammaglutamylotranspetydaza (GGTP);</p> <p>4) fosfataza zasadowa (AP);</p> <p>5) transaminazy (AspAT, AlAT);</p> <p>6) stężenie bilirubiny całkowitej;</p> <p>7) poziom kwasu moczowego;</p> <p>8) stężenie kreatyniny;</p> <p>9) stężenie wapnia w surowicy;</p> <p>10) stężenie fosforu w surowicy;</p> <p>11) proteinogram;</p> <p>12) pobranie węzła chłonnego bądź wycinka zmienionej tkanki metodą biopsji chirurgicznej;</p> <p>13) badanie histologiczne wycinka;</p> <p>14) badanie na obecność antygenu CD20 na powierzchni komórek chłoniaka;</p> <p>15) radiografia klatki piersiowej;</p> <p>16) RTG przewodu pokarmowego (w przypadku objawów klinicznych);</p> <p>17) tomografia komputerowa głowy;</p> <p>18) tomografia komputerowa klatki piersiowej i szyi;</p> <p>19) tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy;</p> <p>20) MR (diagnostyka zmian w kanale kręgowym, głowie i tkankach miękkich);</p> <p>21) USG w diagnostyce ewentualnych zmian jamy brzusznej, tkanek miękkich, tarczycy, jąder i serca;</p> <p>22) endosonografia (EUS) w diagnostyce chłoniaków żołądka.</p> <p>Badania stosownie do wskazań lekarskich podczas</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>diagnostyki chłoniaka w danej lokalizacji.</p> <p>2.Monitorowanie leczenia Badanie przeprowadzane przed każdym podaniem leku:</p> <ol style="list-style-type: none">1) morfologia krwi z rozmazem;2) poziom kreatyniny;3) poziom kwasu moczowego;4) poziom aktywności aminotransferaz;5) fosfataza alkaliczna;6) bilirubina;7)EKG (jedynie u chorych z chłoniakiem rozlanym). <p>Badanie przeprowadzane po 3 lub 4 cyklu leczenia oraz po 8 cyklach (odpowiednio do ilości cykli w zastosowanym schemacie leczenia):</p> <ol style="list-style-type: none">1) TK lub rezonans magnetyczny zmiany mierzalnej;2) EKG. |
|--|--|--|

Załącznik B.13.

LECZENIE OPORNÝCH POSTACI SZPICZAKA MNOGIEGO PLAZMOCYTOWEGO (ICD-10 C 90)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bortezomibem</p> <p>1.1 Leczenie w ramach II rzutu bortezomibem</p> <p>1) wystąpiła progresja w trakcie leczenia I rzutu stwierdzana po co najmniej 2 cyklach leczenia I rzutu</p> <p>2) brak jest poprawy częściowej po 4 cyklach leczenia I rzutu bez wykorzystania bortezomibu;</p> <p>1.2 Leczenie w ramach III rzutu bortezomibem</p> <p>1) z nawrotem szpiczaka po uzyskaniu, co najmniej remisji częściowej za pomocą chemioterapii wysokodawkowej i przeszczepieniu komórek krwiotwórczych;</p> <p>2) chorych z progresją choroby po roku leczenia I i II rzutu;</p> <p>3) chorych z nawrotem szpiczaka po chemioterapii wysokodawkowej i przeszczepieniu własnych komórek krwiotwórczych bez remisji częściowej kwalifikowanych do przeszczepienia allogenicznych komórek krwiotwórczych;</p> <p>Nieuzasadnione jest włączenie do leczenia bortezomibem w ramach III i następnych rzutów pacjentów, u których zastosowano ten lek w leczeniu II rzutu i nie uzyskano odpowiedzi na leczenie w postaci remisji częściowej.</p> <p>1.3 Leczenie w ramach IV rzutu</p> <p>- z nawrotem szpiczaka po uzyskaniu co najmniej bardzo dobrej remisji częściowej po leczeniu za pomocą chemioterapii wysokodawkowej i przeszczepieniu komórek krwiotwórczych, zastosowanych jako leczenie III rzutu u chorych, którzy uzyskali co najmniej remisję częściową po zastosowaniu bortezomibu w ramach leczenia II rzutu.</p> <p>1.4 Chorzy kwalifikowani do programu muszą charakteryzować się poniższymi parametrami:</p> <p>1) stan ogólny wg Karnowskiego $\geq 60\%$;</p> <p>2) liczba płytek krwi ≥ 50 G/l;</p> <p>3) stężenie Hb $\geq 8,0$ g/dl (także uzyskane przez podanie transfuzji krwi);</p> <p>4) liczba neutrofilii (ANC) $\geq 0,5$ G/l,</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Jeden cykl leczenia obejmuje 21 dni:</p> <p>Podanie leku w dawce $1,3 \text{ mg/m}^2$ przypada na dzień 1, 4, 8, 11 cyklu, natomiast w dniach od 12 do 21 włącznie następuje przerwa w podawaniu leku. W razie wystąpienia istotnych powodów losowych bądź organizacyjnych dopuszcza się przyspieszenie bądź opóźnienie podania konkretnej dawki leku o dwa dni w stosunku do zaplanowanej daty. W razie wystąpienia działania niepożądanego w stopniu II i III według WHO dopuszczalne jest zależnie od sytuacji zmniejszenie dawki o 25 lub 50% (do odpowiednio $1,0 \text{ mg/m}^2$ lub $0,7 \text{ mg/m}^2$) lub czasowe przerwanie podawania leku do czasu ustąpienia danego działania niepożądanego i jego ponowne włączenie w odpowiednio zredukowanej dawce.</p> <p>Lek jest podawany w trwającym od 3 do 5 sekund dożylnym wstrzyknięciu w formie bolusa przez obwodowo lub centralnie umieszczony cewnik. Po podaniu produktu, cewnik należy przepłukać 9 mg/ml (0,9%) roztworem chlorku sodu do wstrzyknięć.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) oznaczenie morfologii krwi</p> <p>2) oznaczenie AspAT, AlAT</p> <p>3) poziom wapnia</p> <p>4) kreatynina</p> <p>5) bilirubina</p> <p>6) klirens kreatyniny</p> <p>7) elektroforeza białek</p> <p>8) oznaczanie białka M</p> <p>9) badania ogólne moczu</p> <p>10) badanie na obecność białka Bence'a - Jonesa w moczu,</p> <p>11) biopsja szpiku lub/i trepanobiopsja szpiku</p> <p>12) RTG kości płaskich i długich</p> <p>13) MR lub TK (w wybranych przypadkach)</p> <p>14) badanie beta2-mikroglobuliny</p> <p>15) badanie wolnych łańcuchów lekkich</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Co najmniej raz w miesiącu badanie neurologiczne (może być wykonane przez internistę)</p> <p>Pomiędzy 35-42 dniem leczenia oznaczenie:</p> <p>1) morfologii krwi;</p> <p>2) proteinogramu</p> <p>3) stężenia kreatyniny;</p> <p>4) stężenia wapnia w surowicy;</p> <p>5) utraty białka w dobowej zbiorce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich)</p> <p>Pomiędzy 54-63 dniem leczenia oznaczenie:</p> <p>1) morfologii krwi;</p> <p>2) stężenia Hb;</p> <p>3) proteinogramu</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>5) całkowita liczba leukocytów $\geq 1,5G/l$; 6) stężenie wapnia w surowicy $< 14 \text{ mg/dl}$; 7) AspAT i AIAT $\leq 2,5$ raza górny zakres normy; 8) bilirubina całkowita $\leq 1,5$ raza górny zakres normy; 9) klirens kreatyniny $\geq 30 \text{ ml/min}$.</p> <p>Chorzy w wieku rozrodczym muszą zobowiązać się do stosowania antykoncepcji.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie: Leczenie bortezomibem trwa 18 tygodni i obejmuje 6 cykli. U pacjentów, którzy odpowiadają na leczenie (remisja częściowa po 4 cyklach), ale u których nie stwierdzono całkowitej remisji można zastosować maksymalnie do 8 cykli leczenia w czasie 24 tygodni. W razie wystąpienia bardzo dobrej reakcji na leczenie umożliwiające wcześniejsze wykonanie przeszczepienia komórek krwiotwórczych dopuszcza się przerwanie leczenia bortezomibem po mniej niż 6 cyklach. Dany chory może następnie otrzymać pozostałe cykle w ramach leczenia poprzyszczepowego. W razie wystąpienia przerwy w leczeniu spowodowanej umiarkowanymi działaniami niepożądanymi leczenie jest wydłużone o tę przerwę.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia 1) nadwrażliwość na bortezomib, boron (bor) lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 2) nietolerancja bortezomibu; wg WHO stopień IV; 3) ciężkie zaburzenia czynności funkcji wątroby lub nerek 4) progresja choroby po dwóch cyklach bortezomibu bądź brak poprawy częściowej po 4 cyklach stosowania bortezomibu.</p> | | <p>4) stężenia kreatyniny; 5) stężenia wapnia w surowicy; 6) aktywności AspAT i AIAT; 7) stężenia bilirubiny całkowitej; 8) utraty białka w dobowej zbiorce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich) Pomiędzy 75-84 dniem leczenia oznaczenie: 1) morfologii krwi; 2) całkowitej liczby płytek krwi 3) całkowitej liczby leukocytów 4) całkowitej liczby neutrofilii; 5) stężenia Hb; 6) proteinogramu 7) stężenia kreatyniny; 8) stężenia wapnia w surowicy; 9) aktywności AspAT i AIAT; 10) stężenia bilirubiny całkowitej; 11) klirens kreatyniny 12) utraty białka w dobowej zbiorce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich) Pomiędzy 96-105 dniem leczenia oznaczenie: 1) morfologii krwi; 2) całkowitej liczby płytek krwi 3) całkowitej liczby leukocytów 4) całkowitej liczby neutrofilii; 5) stężenia Hb; 6) proteinogramu 7) stężenia kreatyniny; 8) stężenia wapnia w surowicy; 9) aktywności AspAT i AIAT; 10) stężenia bilirubiny całkowitej; 11) klirens kreatyniny 12) utraty białka w dobowej zbiorce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich) Pomiędzy 117-126 dniem leczenia oznaczenie: 1) morfologii krwi; 2) całkowitej liczby płytek krwi</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">3) całkowitej liczby leukocytów4) całkowitej liczby neutrofilii;5) stężenia Hb;6) proteinogramu7) stężenia kreatyniny;8) stężenia wapnia w surowicy;9) aktywności AspAT i AlAT;10) stężenia bilirubiny całkowitej;11) klirens kreatyniny12) utraty białka w dobowej zbiórce moczu (dotyczy chorych z chorobą łańcuchów lekkich)13) test immunofiksacji krwi i moczu na obecność białka monoklonalnego;14) mielogram lub trepanobiopsja szpiku;15) badanie radiologiczne kości,16) badanie beta2-mikroglobuliny17) badanie wolnych łańcuchów lekkich |
|--|--|---|

Załącznik B.14.

LECZENIE PRZEWLEKLEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem</p> <p>1.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>Świadczeniobiorcy z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej, z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) spełniający następujące kryteria:</p> <p>1) w fazie przewlekłej:</p> <p>a) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli co najmniej częściową remisję cytogenetyczną po 1 roku leczenia,</p> <p>b) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli całkowitą remisję cytogenetyczną najpóźniej po 18 miesiącach leczenia,;</p> <p>c) nowo zdiagnozowani - świeżo rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa, w trakcie przedłużającego się poszukiwania dawcy szpiku</p> <p>d) wcześniej leczeni hydroksykarbamidem lub interferonem bez uzyskania remisji cytogenetycznej lub z udokumentowaną silną nietolerancją leczenia (III i IV stopień toksyczności według WHO),</p> <p>e) po alogenicznej transplantacji szpiku kostnego, u których wystąpiła wznowa choroby;</p> <p>2) w fazie przyspieszonej:</p> <p>świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu;</p> <p>3) w fazie kryzy blastycznej:</p> <p>świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu.</p> <p>1.2 Kryteria wyłączenia</p> <p>1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na imatinib;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych działań niepożądanych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych działań niepożądanych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość).</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3-4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku (brak remisji</p> | <p>1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem</p> <p>Zalecane dawkowanie imatinibu u świadczeniobiorców w fazie przewlekłej PBSz wynosi 400 mg/dobę.</p> <p>Faza przewlekła jest definiowana jako stan, który spełnia wszystkie podane kryteria: liczba blastów we krwi i szpiku jest poniżej 15%, liczba leukocytów zasadochłonnych we krwi obwodowej jest poniżej 20%, a liczba płytek jest powyżej $100 \times 10^9/l$. W razie wydłużania czasu uzyskiwania remisji cytogenetycznej lub niewielkiego nawrotu cytogenetycznego możliwe jest przejściowe zwiększenie dawki imatinibu w fazie przewlekłej do 600 mg/dobę.</p> <p>Zalecane dawkowanie imatinibu u świadczeniobiorców w fazie przyspieszonej wynosi 600 mg/dobę.</p> <p>Faza akceleracji jest definiowana jako stan, który spełnia którekolwiek z podanych kryteriów: odsetek blastów we krwi i szpiku jest większy bądź równy 15% ale poniżej 30%, liczba blastów i promielocytów we krwi i szpiku jest większa bądź równa 30% (pod warunkiem, że liczba blastów jest mniejsza niż 30%), liczba leukocytów zasadochłonnych we krwi obwodowej jest większa bądź równa 20%, liczba płytek jest mniejsza niż $100 \times 10^9/l$ i jest nie związana z leczeniem. W fazie akceleracji zwiększenie dawki do 800 mg/dobę (podawanych w dwóch dawkach po 400 mg) może</p> | <p>1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem</p> <p>1.1 Badania przy kwalifikacji</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) fosfataza alkaliczna granulocytów,</p> <p>f) badania ogólne moczu,</p> <p>g) badanie cytogenetyczne szpiku,</p> <p>h) badanie cytogenetyczne krwi,</p> <p>i) badanie cytologiczne szpiku,</p> <p>j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie),</p> <p>k) USG wątroby i śledziony.</p> <p>1.2 Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej imatinibem:</p> <p>Raz w miesiącu, przez pierwsze trzy miesiące leczenia, następnie co 90 dni</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) badanie cytogenetyczne szpiku lub krwi obwodowej.</p> <p>Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co pół roku przez pierwszy rok, następnie, po uzyskaniu całkowitej remisji cytogenetycznej, co rok.</p> <p>Badanie ilościowe PCR: po uzyskaniu całkowitej remisji</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>hematologicznej, brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);</p> <p>5) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>6) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> <p>2. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci Imatinibem</p> <p>2.1 Kryteria kwalifikacji</p> <p>Do leczenia imatinibem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z rozpoznaniem przewlekłej białaczki szpikowej, z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+) spełniający następujące kryteria:</p> <p>1) w fazie przewlekłej:</p> <p>a) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli co najmniej częściową remisję cytogenetyczną po 1 roku leczenia,</p> <p>b) dotychczas leczeni imatinibem, którzy osiągnęli całkowitą remisję cytogenetyczną najpóźniej po 18 miesiącach leczenia;</p> <p>c) nowo zdiagnozowani - świeżo rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa w trakcie przedłużającego się poszukiwania dawcy szpiku,</p> <p>d) wcześniej leczeni hydroksykarbamidem lub interferonem bez uzyskania remisji cytogenetycznej lub z udokumentowaną silną nietolerancją leczenia (III i IV stopień toksyczności według WHO),</p> <p>e) po alogenicznej transplantacji szpiku kostnego, u których wystąpiła wznowa choroby;</p> <p>2) w fazie przyspieszonej: świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu;</p> <p>3) w fazie kryzy blastycznej: świadczeniobiorcy wcześniej leczeni bez wykorzystania imatinibu.</p> <p>2.2 Kryteria wyłączenia</p> <p>1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na imatinib;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych (ciężka</p> | <p>nastąpić w następujących przypadkach:</p> <p>a) postęp choroby,</p> <p>b) brak zadowalającej odpowiedzi hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia,</p> <p>c) utrata osiągniętej wcześniej odpowiedzi hematologicznej.</p> <p>Zalecane dawkowanie imatinibu w fazie kryzy blastycznej wynosi 800 mg/dobę. Kryza blastyczna jest definiowana jako stan, w którym odsetek blastów w szpiku lub krwi obwodowej przekracza 30%.</p> <p>2. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci imatinibem</p> <p>Dawkowanie u dzieci należy ustalać na podstawie powierzchni ciała (mg/m² pc.).</p> <p>U dzieci w fazie przewlekłej i fazach zaawansowanych zaleca się dawkę 340 mg/m² pc. na dobę (nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 800 mg). Produkt można podawać w postaci jednej dawki na dobę lub można podzielić dawkę dobową na dwie części - jedną podawaną rano i drugą wieczorem.</p> <p>U dzieci, u których nie występują poważne działania niepożądane oraz poważna neutropenia lub trombocytopenia spowodowane białaczką można rozważyć zwiększenie dawki z 340 mg/m² pc do 570 mg/m² pc na dobę (nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 800 mg) w następujących przypadkach:</p> <p>a) postęp choroby (na każdym jej etapie);</p> <p>b) brak zadowalającej odpowiedzi hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia;</p> <p>c) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia;</p> <p>d) utrata osiągniętej wcześniej odpowiedzi hematologicznej lub cytogenetycznej.</p> <p>3. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u</p> | <p>cytogenetycznej co 90 dni. W razie niemożności wykonania badania ilościowego, badanie jakościowe PCR.</p> <p>2. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dzieci Imatinibem</p> <p>2.1 Badania przy kwalifikacji</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) fosfataza alkaliczna granulocytów,</p> <p>f) badania ogólne moczu,</p> <p>g) badanie cytogenetyczne szpiku,</p> <p>h) badanie cytogenetyczne krwi,</p> <p>i) badanie cytologiczne szpiku,</p> <p>j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie),</p> <p>k) USG wątroby i śledziony.</p> <p>2.3 Monitorowanie leczenia</p> <p>Raz w miesiącu przez pierwsze trzy miesiące leczenia, następnie co 90 dni:</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina,</p> <p>e) fosfataza alkaliczna granulocytów,</p> <p>f) badania ogólne moczu.</p> <p>Raz w miesiącu przez pierwsze trzy miesiące leczenia, następnie co 90 dni - badanie ilościowe PCR (BCR-ABL/ABL ratio).</p> <p>Co 90 dni - badanie cytogenetyczne szpiku.</p> <p>Co 90 dni - USG jamy brzusznej.</p> <p>Co 180 dni - badanie histologiczne szpiku.</p> <p>3. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem</p> <p>3.1 Badania przy kwalifikacji</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|---|---|
| <p>neutropenia lub małopłytkowość) działań niepożądanych;</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3-4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - brak remisji hematologicznej, - brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %); <p>5) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>6) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> <p>3. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem</p> <p>3.1. Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+); 2) wiek: powyżej 18 roku życia; 3) stan ogólny według WHO 0-2; 4) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem: <ol style="list-style-type: none"> a) u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315I, b) którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatinibem, c) u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej w 6 miesiącu leczenia imatinibem d) u których brak jest odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia imatinibem, e) którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną, f) ze stwierdzoną progresją choroby, g) nietolerujący imatinibu h) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni dazatynibem w ramach terapii niestandardowej, u których uzyskano co najmniej całkowitą odpowiedź hematologiczną; | <p>dorosłych dazatynibem</p> <p>Zalecana dawka początkowa produktu w przewlekłej fazie PBSz wynosi 100 mg raz na dobę, podawane doustnie. Zalecana dawka początkowa dazatynibu w zaawansowanych fazach choroby wynosi 140 mg raz na dobę, podawane doustnie. Zaawansowane fazy PBSz obejmują fazę akceleracji, fazę przełomu blastycznego, który może być mieloblastyczny lub limfoblastyczny. Podobnie jest traktowana ostra białaczka limfoblastyczna z chromosomem filadelfijskim (Ph+ALL)</p> <p>W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy dawkę leku zmniejszyć do 80 mg na dobę, Nie wolno rozkruszać lub dzielić tabletek, muszą one być połknięte w całości, niezależnie od posiłków.</p> <p>Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo przynosi ono korzyść kliniczną dla świadczeniobiorcy z uwzględnieniem kryteriów wyłączenia z programu .Jeżeli nie zostało to wcześniej zrobione, a świadczeniobiorcy znajdują się w odpowiednim wieku należy rozpocząć poszukiwanie dawcy szpiku</p> <p>4. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych nilotynibem</p> <p>Zaleca się podawanie dawki 800 mg nilotynibu na dobę, podawanej w dwóch dawkach po 400 mg co około 12 godzin. Nilotynib należy przyjmować na czczo. Nie należy spożywać posiłków na dwie godziny przed i jedną godzinę po przyjęciu leku. Leczenie należy kontynuować tak długo, jak długo przynosi ono korzyść kliniczną dla pacjenta z uwzględnieniem kryteriów wyłączenia z programu. W przypadku wystąpienia toksyczności niehematologicznej lub hematologicznej może być konieczne zaprzestanie podawania nilotynibu przez</p> | <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty), b) AspAT, AIAT, c) kreatynina, d) bilirubina, e) fosfataza alkaliczna granulocytów, f) badania ogólne moczu, g) badanie cytogenetyczne szpiku, h) badanie cytogenetyczne krwi, i) badanie cytologiczne szpiku, j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie), k) USG wątroby i śledziony. <p>3.3 Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem</p> <p>Pierwsze 2 miesiące leczenia- co 7 dni, następnie co 30 dni (po uzyskaniu remisji hematologicznej co 90 dni):</p> <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty), b) AspAT, AIAT, c) kreatynina, d) bilirubina. <p>Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co 90 dni przez pierwszy rok, następnie co pół roku.</p> <p>Badanie ilościowe PCR: po uzyskaniu całkowitej remisji cytogenetycznej co 90 dni.</p> <p>4. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem</p> <p>4.1 Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty), b) AspAT, AIAT, c) kreatynina, d) bilirubina, e) fosfataza alkaliczna granulocytów, f) badania ogólne moczu, g) badanie cytogenetyczne szpiku, h) badanie cytogenetyczne krwi, |
|--|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>5) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczenia nilotynibem nietolerujący nilotynibu lub z niepowodzeniem leczenia nilotynibem</p> <p>6) świadczeniobiorcy w fazie kryzy blastycznej, którzy wcześniej nie otrzymywali dazatynibu, nietolerujący lub nieodpowiadający na imatynib. W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatynibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib albo nilotynib) w oparciu o wskazania medyczne.</p> <p>3.2 Kryteria wyłączenia</p> <p>1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na dazatynib;</p> <p>2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych działań niepożądanych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych działań niepożądanych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość);</p> <p>3) stan sprawności według WHO 3-4;</p> <p>4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku -brak remisji hematologicznej, -brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);</p> <p>5) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 6 miesiącach</p> <p>6) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>7) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> <p>8) toksyczność hematologiczna lub pozahematologiczna w stopniu 3 lub 4 - która przejawia się pomimo przerw w leczeniu</p> <p>4. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem</p> <p>4.1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznana przewlekła białaczka szpikowa z udokumentowaną obecnością genu BCR-ABL lub chromosomu Filadelfia (Ph+);</p> <p>2) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>3) stan ogólny według WHO 0-2;</p> | <p>pewien czas lub zmniejszenie podawanej dawki, zgodnie z wytycznymi zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego</p> | <p>i) badanie cytologiczne szpiku,</p> <p>j) badanie molekularne PCR na obecność genu BCR-ABL (opcjonalnie),</p> <p>k) USG wątroby i śledziony.</p> <p>4.2 Monitorowanie leczenia przewlekłej białaczki szpikowej nilotynibem</p> <p>Raz w miesiącu (po uzyskaniu remisji hematologicznej co 90 dni):</p> <p>a) morfologia krwi z rozmazem (leukocyty, płytki krwi, blasty),</p> <p>b) AspAT, AlAT,</p> <p>c) kreatynina,</p> <p>d) bilirubina.</p> <p>Badanie cytologiczne i cytogenetyczne szpiku: co 90 dni przez pierwszy rok, następnie co pół roku.</p> <p>Badanie ilościowe PCR: po uzyskaniu całkowitej remisji cytogenetycznej co 90 dni.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>4) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni imatinibem:</p> <ul style="list-style-type: none">a) u których występuje oporność na imatinib z obecnością mutacji innej niż T315I,b) którzy nie osiągnęli remisji hematologicznej po co najmniej 3 miesiącach leczenia imatinibem,c) u których brak jest częściowej odpowiedzi cytogenetycznej w 6 miesiącu leczenia imatinibemd) u których brak jest odpowiedzi cytogenetycznej po 12 miesiącach leczenia imatinibem,e) którzy utracili osiągniętą wcześniej odpowiedź hematologiczną lub cytogenetyczną,f) ze stwierdzoną progresją choroby,g) nietolerujący imatinibu,h) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji, dotychczas leczeni nilotynibem w ramach terapii niestandardowej, u których uzyskano co najmniej całkowitą odpowiedź hematologiczną; <p>5) świadczeniobiorcy w fazie przewlekłej i akceleracji dotychczas leczeni dazatynibem nietolerujący dazatynibu lub z niepowodzeniem leczenia dazatynibem.</p> <p>W razie rozpoznania oporności lub nietolerancji imatinibu, do lekarza prowadzącego należy wybór leku drugiego rzutu (dazatynib albo nilotynib) w oparciu o wskazania medyczne.</p> <p>4.2 Kryteria wyłączenia</p> <ul style="list-style-type: none">1) pojawienie się objawów nadwrażliwości na nilotynib;2) toksyczność według WHO powyżej 2, zwłaszcza wystąpienie poważnych pozahematologicznych działań niepożądanych (3-krotny wzrost stężenia bilirubiny, 5-krotny wzrost aktywności aminotransferaz wątrobowych) lub hematologicznych działań niepożądanych (ciężka neutropenia lub małopłytkowość);3) stan sprawności według WHO 3-4;4) brak skuteczności leku po 3 miesiącach stosowania leku:<ul style="list-style-type: none">- brak remisji hematologicznej,- brak remisji cytogenetycznej mniejszej (definiowanej jako sytuacja, w której w szpiku są komórki Ph-, ale jest ich mniej niż 35 %);5) brak odpowiedzi cytogenetycznej po 6 miesiącach;6) znalezienie dawcy szpiku i podjęcie decyzji o wykonaniu zabiegu | | |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>przeszczepienia szpiku u danego świadczeniobiorcy;</p> <p>7) progresja choroby w trakcie stosowania leku wyrażająca się utratą odpowiedzi hematologicznej, utratą całkowitej odpowiedzi cytogenetycznej lub zwiększeniem o 30% odsetka komórek z chromosomem Filadelfia u świadczeniobiorców z remisją cytogenetyczną mniejszą niż całkowita, pojawieniem się nowych aberracji chromosomalnych w klonie białaczkowym.</p> | | |
|--|--|--|

Załącznik B.15.

ZAPOBIEGANIE KRWAWIENIOM U DZIECI Z HEMOFILIĄ A I B (ICD-10 D 66, D 67)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii pierwotnej i wtórnej profilaktyki krwawień oraz leczenia hemofilii powikłanej nowo powstałym krążącym antykoagulantem dokonuje Zespół Koordynujący ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B powołany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Moduł pierwotnej profilaktyki krwawień</p> <p>1.1. Pierwotna profilaktyka krwawień u dzieci od 1 dnia życia z zachowaniem ciągłości leczenia do ukończenia 18 roku życia, z ciężką postacią hemofilii A lub B, o poziomie aktywności czynników krzepnięcia VIII lub IX równym lub poniżej 1% poziomu normalnego. Substancja czynna finansowana w ramach pierwotnej profilaktyki krwawień – koncentraty osoczopochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX.</p> <p>1.2. Pierwotna profilaktyka krwawień nowozdiagnozowanych dzieci z ciężką postacią hemofilii A i B, wcześniej nie leczonych czynnikami osoczopochodnymi (ludzkimi). Substancja czynna finansowana w ramach pierwotnej profilaktyki krwawień – koncentraty rekombinowanych czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX, minimum drugiej generacji.</p> <p>1.3. Zapewnienie koncentratów czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX dla dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego:</p> | <p>1. Pierwotna profilaktyka krwawień:</p> <p>1) czynnik VIII: a) dzieci do ukończenia 2 roku życia – 25- 40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 1-3 razy w tygodniu, b) dzieci powyżej 2 roku życia – 25-40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 2- 3 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem, że podawanie 2 razy w tygodniu dotyczy dzieci dotychczas leczonych 2 razy w tygodniu z dobrym efektem;</p> <p>2) czynnik IX: 25-50 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 1-2 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem, że podawanie 1 raz w tygodniu dotyczy dzieci dotychczas leczonych z dobrym efektem.</p> <p>2. Wtórna profilaktyka krwawień:</p> <p>1) czynnik VIII: a) dzieci do ukończenia 2 roku życia – 25- 40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 2-3 razy w tygodniu, b) dzieci powyżej 2 roku życia – 25-40 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 3 razy w tygodniu;</p> <p>2) czynnik IX: 25-50 jednostek międzynarodowych/kg m.c., 2 razy w tygodniu.</p> <p>3. U dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego, zapewnienie czynnika VIII lub IX do zabiegu, według schematu:</p> | <p>1. W ramach kwalifikacji świadczeniobiorcy do udziału w programie, na podstawie decyzji lekarza lokalnego lub regionalnego centrum leczenia hemofilii, wykonuje się następujące badania:</p> <p>1) badania przesiewowe: a) czas krwawienia (metodą Copley’ a), b) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT), c) czas protrombinowy (PT), d) czas trombinowy (TT);</p> <p>2) wykonanie testu korekcji osoczem prawidłowym;</p> <p>3) ocena aktywności czynników krzepnięcia I, VIII i IX, von Willebranda (vWFRCo), XI, XII;</p> <p>4) antygen czynnika von Willebranda (vWFAg);</p> <p>5) ocena miana inhibitora czynnika VIII i IX u dzieci uprzednio leczonych (test Bethesda w modyfikacji Nijmegen);</p> <p>6) wykonanie badań wirusologicznych (w tym HCV PCR, HBV PCR);</p> <p>7) morfologia krwi.</p> <p>W związku z realizacją modułów programu, inne niż wymienione w pkt 1- 7 badania, są wykonywane na podstawie indywidualnych decyzji Zespołu Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B. Regionalne centra leczenia hemofilii są zobligowane do zapewnienia do nich dostępu.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1. Ocena skuteczności leczenia W zależności od oceny klinicznej należy wykonać:</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>1) dla grupy określonej w ust. 1.1. – czynniki osoczo pochodne (ludzkie);</p> <p>2) dla grupy określonej w ust. 1.2. – czynniki rekombinowane minimum drugiej generacji.</p> <p>2. Moduł wtórnej profilaktyki krwawień</p> <p>2.1. Wtórna profilaktyka krwawień jest prowadzona u dzieci od 1 dnia życia do ukończenia 18 roku życia, chorych na hemofilię A lub B, po wystąpieniu wylewów do stawów.</p> <p>Substancja czynna finansowana w ramach wtórnej profilaktyki krwawień – koncentraty osoczo pochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX.</p> <p>2.2. Zapewnienie koncentratów osoczo pochodnych (ludzkich) czynników krzepnięcia, odpowiednio, czynnika VIII lub czynnika IX dla dzieci, u których konieczne jest założenie centralnego dostępu żylnego.</p> <p>3. Objęcie programem wywoływania tolerancji immunologicznej wszystkich pacjentów z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) (powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania powyżej 6 miesięcy od momentu wykrycia). Finansowanie realizacji wywoływania tolerancji immunologicznej odbywa się poprzez realizację stosownych umów z podmiotami odpowiedzialnymi. Wymóg zawarcia przedmiotowych umów jest zapisywany w specyfikacji przetargowej.</p> <p>Kryteria włączenia do przedmiotowego modułu nowopowstałego inhibitora u dzieci do 18 roku życia:</p> <p>1) pacjenci z hemofilią powikłaną nowopowstałym krążącym antykoagulantem (inhibitorem) (powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania inhibitora powyżej 6 miesięcy) zakwalifikowani na podstawie decyzji Zespołu</p> | <p>1) pierwsza doba: 40 do 70 jednostek międzynarodowych/kg m.c., co 8 godzin;</p> <p>2) od drugiej do piątej doby: 30 do 50 jednostek międzynarodowych/ kg m.c., co 12 godzin;</p> <p>3) szósta doba jednorazowo: 30 do 50 jednostek międzynarodowych/kg m.c.;</p> <p>4) dziesiąta doba (zdjęcie szwów) jednorazowo: 30 do 50 jednostek międzynarodowych/kg m.c.</p> <p>Dawkowanie koncentratów czynnika krzepnięcia u pacjentów, u których stwierdzono utrzymywanie się inhibitora w mianie poniżej 5 B.U. oraz nieskuteczność leczenia w dotychczasowej dawce, może zostać ustalone indywidualnie przez Zespół Koordynujący ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B.</p> | <p>1) RTG stawów - nie częściej niż raz w roku;</p> <p>2) USG stawów - nie rzadziej niż raz w roku;</p> <p>3) NMR - w razie trudności diagnostycznych w ocenie stawów.</p> <p>2.2. W ramach monitorowania leczenia obowiązkowe jest prowadzenie rejestru krwawień dla danego pacjenta oraz rejestracja danych wymaganych w programie do prowadzenia rejestru dla każdego pacjenta.</p> <p>Badania w monitorowaniu leczenia:</p> <p>1) aminotransferaza alaninowa (AlAT) co najmniej raz w roku;</p> <p>2) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) co najmniej raz w roku;</p> <p>3) obecność przeciwciał anti-HBs;</p> <p>4) obecność antygenu HBs (w przypadku braku miana zabezpieczającego przeciwciał anti-HBs), u dodatnich przeciwciała anti-HBc i anti HBe, DNA HBV;</p> <p>5) przeciwciała anti-HCV (raz w roku), u dodatnich RNA HCV;</p> <p>6) przeciwciała anti-HIV (w uzasadnionych przypadkach), u dodatnich RNA HIV;</p> <p>7) USG naczyń w okolicy dojścia żylnego, nie rzadziej niż raz w roku;</p> <p>8) badanie ogólne moczu.</p> <p>2.3. Na podstawie decyzji lekarza lokalnego lub regionalnego centrum leczenia hemofilii możliwe jest, w ramach monitorowania leczenia, wykonanie następujących badań:</p> <p>1) czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT);</p> <p>2) ocena aktywności czynników krzepnięcia VIII i IX (w hemofilii A – czynnika VIII, w hemofilii B – czynnika IX); w zależności od sytuacji klinicznej powyższe badanie należy wykonać w razie braku skuteczności czynnika w dotychczasowej dawce oraz w innych uzasadnionych sytuacjach (np. przed zabiegami i procedurami inwazyjnymi lub po zmianie produktu leczniczego koncentratu czynnika</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|---|
| <p>Koordynującego ds. kwalifikacji i weryfikacji leczenia w programie zapobiegania krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B;</p> <p>2) pacjenci uprzednio zakwalifikowani do programu, jednak stwierdzenie obecności inhibitora dotyczy okresu prowadzonej profilaktyki, która miała miejsce po dniu 15 stycznia 2010 r.</p> <p>4. Kryteria wyłączenia Stwierdzenie obecności inhibitora (krążącego antykoagulantu o mianie powyżej 5 B.U. oraz o mianie niższym lub równym 5 B.U. w przypadku przetrwania inhibitora powyżej 6 miesięcy).</p> <p>5. Kryteria zakończenia udziału w programie lub module programu (dotyczy przyczyn, z powodu których udział pacjenta - uprzednio zakwalifikowanego - w przedmiotowym programie musi zostać zakończony):</p> <p>1) stwierdzenie obecności nowo powstałego inhibitora (powyżej 5 B.U.) lub utrzymywanie się inhibitora w mianie niższym lub równym 5 B.U. przez ponad 6 miesięcy;</p> <p>2) ukończenie 18 roku życia.</p> <p>6. Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do momentu ukończenia 18 roku życia lub do momentu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> | | <p>krzepnięcia na inny).</p> <p>2.4. Oznaczanie inhibitora:</p> <p>1) do 150 przetoczeń - co 3 miesiące lub po każdym 10 przetoczeniach;</p> <p>2) powyżej 150 przetoczeń - co 6 do 12 miesięcy;</p> <p>3) w momencie zmiany produktu leczniczego koncentratu czynnika krzepnięcia na inny;</p> <p>4) w przypadku stwierdzenia braku skuteczności czynnika w dotychczasowej dawce.</p> <p>W przypadku niewykrycia inhibitora kolejne jego oznaczenia powinny być wykonywane zgodnie z powyższym opisem. W przypadku wykrycia inhibitora kolejne jego oznaczenia powinny być wykonywane co miesiąc (możliwa jest zmiana częstotliwości oznaczania inhibitora na podstawie decyzji lekarza regionalnego centrum leczenia hemofilii).</p> |
|--|--|---|

Załącznik B.16.

LECZENIE NADPŁYTKOWOŚCI SAMOISTNEJ (ICD-10 D 75.2)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) rozpoznana nadpłytkowość samoistna;</p> <p>2) wykluczenie innych przyczyn nadpłytkowości;</p> <p>3) stwierdzona toksyczność hydroksymocznika (udokumentowany III stopień toksyczności według WHO);</p> <p>4) stwierdzona niedostateczna reakcja na hydroksymocznik;</p> <p>5) liczba płytek krwi powyżej 1.500 G/l (co najmniej 2 badania w odstępie 1 tygodnia), nawet jeżeli świadczeniobiorca nie ma objawów klinicznych;</p> <p>6) liczba płytek 600 - 1.500 G/l (jeśli liczba płytek w okresie 2 miesięcy zwiększyła się powyżej 300 G/l albo występują objawy, które można wiązać z nadpłytkowością, względnie świadczeniobiorca miał w przeszłości powikłania zakrzepowe lub krwotoczne).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na anagrelid lub którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <p>2) niewydolność układu krążenia stopnia 3 lub 4;</p> <p>3) niestabilna choroba wieńcowa;</p> <p>4) klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min;</p> <p>5) aktywność aminotransferaz 5 razy większa od normy i wyższa;</p> <p>6) brak efektu terapeutycznego po 4 tygodniach leczenia;</p> <p>7) wystąpienie działań niepożądanych wymagające przerwania terapii;</p> <p>8) nietolerancja laktozy;</p> <p>9) ciąża.</p> | <p>Leczenie należy rozpoczynać od dawki anagrelidu 0,5 mg/dobę (1 kaps.) przez pierwszy tydzień, a następnie dawkę należy zwiększać co tydzień o 0,5 mg/dobę, aż do uzyskania normalizacji liczby płytek lub obniżenia ich liczby poniżej 600 G/l lub o 50 % w stosunku od stanu wyjściowego. Terapię należy kontynuować przy użyciu minimalnej skutecznej dawki zabezpieczającej świadczeniobiorcę, kontrolując liczbę płytek krwi co 4 tygodnie.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) morfologia krwi;</p> <p>2) oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych;</p> <p>3) oznaczenie stężenia kreatyniny we krwi;</p> <p>4) badanie podmiotowe i przedmiotowe;</p> <p>5) EKG.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>1) morfologia krwi - oznaczenie liczby płytek krwi przynajmniej raz na 4 tygodnie;</p> <p>2) oznaczenie aktywności aminotransferaz wątrobowych raz na 12 tygodni;</p> <p>3) oznaczenie klirensu kreatyniny raz na 4 tygodnie;</p> <p>4) badanie podmiotowe i przedmiotowe raz na 4 tygodnie;</p> <p>5) EKG raz na 4 tygodnie.</p> |

Załącznik B.17.

LECZENIE PIERWOTNYCH NIEDOBORÓW ODPORNOŚCI U DZIECI (ICD-10 D 80, W TYM: D 80.0, D 80.1, D 80.3, D 80.4, D 80.5, D 80.6, D 80.8, D 80.9; D 81 W CAŁOŚCI; D 82, W TYM: D 82.0, D 82.1, D 82.3, D 82.8, D 82.9; D 83, W TYM: D 83.0, D 83.1, D 83.3, D 83.8, D 83.9; D 89)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji 1) rozpoznanie pierwotnych zaburzeń odporności - według definicji WHO (World Health Organization report on Primary Immunodeficiencies, Clinical and Experimental Immunology, Vol. 99 (Suppl.1), 1995); 2) wykluczenie innych przyczyn zaburzeń odporności; 3) stężenie IgG poniżej 400mg/dl jest wskazaniem do rozpoczęcia terapii substytucyjnej.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia Nadwrażliwość na immunoglobuliny lub inny składnik preparatu. Towarzyszący niedoborowi IgG niedobór IgA z występowaniem przeciwciał przeciwko IgA wymaga leczenia w ośrodku z oddziałem intensywnej terapii.</p> | <p>1. Dawkowanie 1.1 Pierwsze podanie immunoglobulin w dawce 0,6-0,8 g/kg m.c. we wlewie iv. w celu znormalizowania poziomu stężenia IgG w surowicy (dawka może być podzielona na dwa wlewy w odstępie 24 godzin). 1.2 Kontynuacja leczenia substytucyjnego wlewaniami w dawce do 0,4 g/kg m. c. w odstępach 4 tygodniowych (modyfikacja dawki odpowiednio do udokumentowanego, osiągniętego ochronnego poziomu IgG w surowicy) W przypadku postaci farmaceutycznej do podań podskórnych 1,6 g preparat powinien umożliwić osiągnięcie stałego poziomu IgG. Świadczeniobiorca może wymagać podania dawki nasycającej co najmniej 0,2 do 0,5 g/kg m.c. w okresie tygodnia (0,1 do 0,15 g/kg masy ciała w okresie jednego dnia). Po osiągnięciu stałego poziomu skumulowanej dawki miesięcznej rzędu 0,4 do 0,8 g/kg m.c. należy oznaczyć stężenia minimalne w celu dostosowania dawek i odstępu pomiędzy dawkami. Dawkowanie preparatów gammaglobulin do podawania podskórnego: Podskórne preparaty gammaglobulin wydawane są przez szpital (Poradnia Immunologii Klinicznej) do domu. Świadczeniobiorca samodzielnie lub z pomocą podaje je przez pompę infuzyjną 1 raz w tygodniu. Sumaryczna miesięczna dawka odpowiada dawkom preparatów dożylnych. Świadczeniobiorca przetacza sobie ¼ dawki miesięcznej.</p> | <p>2. Badania przy kwalifikacji 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) AIAT; 3) AspAT; 4) oznaczanie subpopulacji limfocytów; 5) oznaczanie poziomu immunoglobulin i podklas IgG lub swoistych przeciwciał; 6) proteinogram; 7) badanie czynności fagocytarnych i neutralizacji patogenów; 8) badanie ekspresji cząstek adhezyjnych; 9) badanie składowych dopełniacza; 10) test stymulacji limfocytów. W przypadku preparatów gammaglobulin do podawania dożylnego lub podskórnego: badania wirusologiczne (zakażenia HBV, HCV) - przed włączeniem leczenia.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia 2.1 Immunoglobuliny dożylne Badanie przeprowadzane przed każdym podaniem leku zgodnie z harmonogramem dawkowania co 4 tyg.: a) morfologia krwi z rozmazem, b) AIAT, c) AspAT, d) poziom IgG w surowicy. Raz na 3 miesiące (przed podaniem immunoglobulin); w przypadku braku komplikacji raz na pół roku: - oznaczanie stężenia immunoglobulin IgG i podklas IgG lub swoistych przeciwciał w surowicy krwi. W przypadku wskazań dodatkowo:</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>a) IgA w surowicy krwi, b) IgM w surowicy krwi. Raz na 6 miesięcy: - USG jamy brzusznej. Powikłania infekcyjne stanowią wskazania do wykonania badań: a) oznaczanie stężenia immunoglobulin IgG i podklas IgG lub swoistych przeciwciał w surowicy krwi. b) IgA w surowicy krwi, c) IgM w surowicy krwi, d) USG jamy brzusznej.</p> <p>2.2 Immunoglobuliny podskórne Badania kontrolne są wykonywane standardowo co 4-6 miesięcy: a) badania efektywności leczenia (stężenie IgG i podklas IgG lub swoistych przeciwciał), b) morfologia krwi z rozmazem, c) AlAT, d) AspAT. Raz na 6 miesięcy: - USG jamy brzusznej. Raz na rok: - badania wirusologiczne (zakażenia HBV, HCV).</p> |
|--|--|--|

Załącznik B.18.

LECZENIE PRZEDWCZESNEGO DOJRZEWANIA PŁCIOWEGO U DZIECI (ICD-10 E 22.8)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji 1) przedwczesne dojrzewanie płciowe typu ośrodkowego u dzieci (objawy dojrzewania płciowego u dziewcząt poniżej 8 roku życia, u chłopców poniżej 10 roku życia) ustalone na podstawie badań laboratoryjnych i obrazowych oraz badania klinicznego; 2) wczesne dojrzewanie płciowe z dużą akceleracją wzrostu kostnego i niskim przewidywanym wzrostem docelowym.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu</p> <p>3. Kryteria wyłączenia 1) osiągnięcie przez świadczeniobiorcę wieku chronologicznego właściwego dla wystąpienia cech dojrzewania płciowego; 2) stwierdzenie określonego zaawansowania wieku kostnego: powyżej 13 lat; 3) zmniejszenie tempa wzrastania poniżej dolnej granicy normy dla okresu prepubertalnego (4 cm na rok).</p> | <p>1. Dawkowanie leuproreliny Co 4 tygodnie podskórnie lub domięśniowo. Jeśli nie osiągnięto zahamowania wydzielania hormonów, dawkę leku należy stopniowo zwiększać o 3,75 mg, co 4 tygodnie. Dawka ta stanowić będzie dawkę podtrzymującą. Każdorazowo należy zmienić miejsce wstrzyknięcia (skóra brzucha, pośladki, udo). 1) masa ciała ≤ 25 kg, dawka 3,75 mg x 2, liczba wstrzyknięć 1, dawka całkowita 7,5 mg; 2) masa ciała większa niż 25 do 37,5 kg, dawka 3,75 mg x 3, liczba wstrzyknięć 2, dawka całkowita 11,25 mg; 3) masa ciała większa niż 37,5 kg, dawka 3,75 mg x 4, liczba wstrzyknięć 2, dawka całkowita 15 mg.</p> <p>2. Dawkowanie triptoreliny U dzieci o masie ciała mniejszej niż 20 kg zazwyczaj podaje się domięśniowo połowę zawartości ampułki 3,75 mg co 28 dni. U dzieci o masie ciała przekraczającej 20 kg zazwyczaj podaje się zawartość 1 ampułki 3,75 mg co 28 dni.</p> | <p>2. Badania przy kwalifikacji 1) stężenie β-gonadotropiny kosmówkowej (β-HCG); 2) stężenie estradiolu; 3) stężenie siarczanu dehydroepiandrosteronu; 4) stężenie 17-hydroksyprogesteronu; 5) stężenie testosteronu; 6) test stymulacyjny na wydzielanie LH i FSH; 7) stężenie luteotropiny; 8) stężenie folikulotropiny; 9) stężenie prolaktyny; 10) profil steroidów w moczu (w zależności od potrzeby w określonych przypadkach); 11) badanie RTG lewej dłoni i nadgarstka w celu oceny wieku kostnego; 12) badanie USG narządów miednicy i nadnerczy; 13) badanie tomografii komputerowej lub rezonans magnetyczny głowy (układu podwzgórzowoprzysadkowego) w celu wykluczenia guza wewnątrzczaszkowego; 14) pomiar wzrostu i masy ciała, należy określić dotychczasowy przebieg wzrastania, dokonać oceny wzrostu rodziców, obliczyć wzrost docelowy dziecka; 15) należy ocenić obecność cech płciowych i stadium dojrzewania płciowego według skali Tannera-Marschalla.</p> <p>3. Monitorowanie leczenia Po 3 miesiącach od rozpoczęcia leczenia lub po zmianie dawkowania: 1) LH; 2) FSH; 3) oznaczyć występowanie cech płciowych według kryteriów Tannera-Marschalla.</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Co 12 miesięcy należy wykonać badanie stanu kośćca RTG lub rezonansu magnetycznego celem oceny wieku kostnego.</p> |
|--|--|---|

Załącznik B.19.

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z SOMATROPINOWĄ NIEDOCZYNNOSCIĄ PRZYSADKI (ICD-10 E 23)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. W przypadku stanów zagrożenia życia w następstwie trudnych do opanowania, nawracających stanów hipoglikemii u noworodków lub niemowląt, świadczeniobiorca kwalifikowany jest do terapii niezwłocznie po jego zgłoszeniu.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) niskorosłość, tj. wysokość ciała poniżej 3 centyla dla płci i wieku, na siatkach centylowych dla populacji dzieci polskich;</p> <p>2) upośledzone tempo wzrastania, poniżej -1 SD w odniesieniu do tempa wzrastania populacji dzieci polskich (wymagany jest co najmniej 6-miesięczny okres obserwacji w ośrodku uprawnionym do terapii hormonem wzrostu), z określeniem przewidywanego wzrostu ostatecznego, metodą Baley-Pineau;</p> <p>3) opóźniony wiek kostny, oceniany metodą Greulich'a-Pyle;</p> <p>4) wykluczenie innych, aniżeli SNP, przyczyn niskorosłości (niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, zaburzenia wchłaniania i trawienia jelitowego, obciążenia dotyczące przebiegu ciąży i porodu, itp.);</p> <p>5) niski wyrzut hormonu wzrostu (poniżej 10 ng/ml) w 2. godzinnym teście nocnego wyrzutu tego hormonu (co najmniej 5 pomiarów stężeń hormonu wzrostu - test przesiewowy);</p> <p>6) obniżony wyrzut hormonu wzrostu (poniżej 10 ng/ml) w dwóch, niezależnych testach stymulacji sekrecji tego hormonu (z uwagi na ryzyko powikłań testy te można wykonywać jedynie u dzieci powyżej 2 roku życia);</p> <p>7) nawracające stany hipoglikemii w okresie noworodkowym lub niemowlęcym, szczególnie u dzieci z wadami linii pośrodkowej twarzoczaszki;</p> <p>8) nieprawidłowości okolicy podwzgórzowo-przysadkowej (TK z</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,1 - 0,33mg (0,3 - 1,0 IU)/kg m.c. /tydzień.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>Badania wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z somatotropinową lub wielohormonalną niedoczynnością przysadki (SNP/ WNP).</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach: pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>2.2 Co 180 dni pomiar stężenia glukozy we krwi z pomiarem odsetka glikowanej hemoglobiny A_{1c} lub co 365 dni: test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii.</p> <p>2.3 Co 90 dni</p> <p>1) krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja;</p> <p>2) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - test stymulacji wydzielania GH insuliną - 8 pomiarów stężeń GH (dotyczy świadczeniobiorców przed przekazaniem pod opiekę poradni endokrynologii dla osób dorosłych (około 20 -25% świadczeniobiorców));</p> <p>3) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - próba zagęszczenia moczu z ewentualną korektą dawki hormonu antydiuretycznego (dotyczy niektórych świadczeniobiorców z WNP - najczęściej po zabiegach neurochirurgicznych z moczówką prostą (około 5-10%));</p> <p>4) w ramach 24 godzinnej hospitalizacji - test stymulacji wydzielania gonadotropin (z użyciem preparatu do stymulacji wydzielania gonadotropin - 4 pomiary stężeń FSH i LH oraz 1 pomiar stężeń estrogenów i androgenów) - dotyczy świadczeniobiorców z opóźnionym lub</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>kontrastem, MRI).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) złuszczenia główki kości udowej;2) pseudo-tumor cerebri;3) cukrzyca;4) ujawnienia lub wznowy choroby rozrostowej;5) brak zgody pacjenta na kontynuację leczenia;6) niezadowalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała świadczeniobiorcy leczonego hormonem wzrostu poniżej 3 cm/rok (nie dotyczy dziewcząt z dojrzałością szkieletu powyżej 14 lat i chłopców z dojrzałością szkieletu powyżej 16 lat);7) osiągnięcie wieku kostnego powyżej 16 lat przez dziewczynkę i powyżej 18 lat przez chłopca. | | <p>przedwczesnym pokwitaniem (około 5-10%).</p> <p>2.4 Co 180 dni</p> <ol style="list-style-type: none">1) pomiar stężenia TSH; pomiar stężenia fT₄;2) jonogram w surowicy krwi (co najmniej pomiar stężenia Na⁺). <p>2.5 Co 365 dni</p> <ol style="list-style-type: none">1) pomiar stężenia IGF-1;2) RTG śródreżcza z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego)3) przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (2-3% leczonych) - konsultacja ortopedyczna, RTG lub USG stawów biodrowych, poszerzone o TK lub MRI stawów biodrowych4) w przypadku wystąpienia objawów pseudo tumor cerebri (około 3-5% leczonych): konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego TK z kontrastem lub MRI.5) konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; konsultacja neurochirurgiczna; morfologia krwi z rozmazem; TK z kontrastem lub MRI OUN (dotyczy świadczeniobiorców z podejrzeniem wznowy choroby rozrostowej lub innych poważnych powikłań (około 10-15%). <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Badania są wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z somatotropinową lub wielohormonalną niedoczynnością przysadki (SNP / WNP).</p> |
|--|--|---|

Załącznik B.20.

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z CIĘŻKIM PIERWOTNYM NIEDOBREM IGF-1 (ICD-10 E-34.3)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Świadczeniobiorców do programu kwalifikuje, według standardów diagnozowania pacjentów z ciężkim pierwotnym niedoborem insulinopodobnego czynnika wzrostu-1, Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) skrajna niskorosłość, tj. wysokość ciała poniżej -3 SD w odniesieniu do płci i wieku, na siatkach centylowych dla populacji dzieci polskich,</p> <p>2) stężenie IGF-1 poniżej -2,5 SDS w odniesieniu do płci i wieku,</p> <p>3) prawidłowe stężenie GH (w teście krótkiego nocnego wyrzutu tego hormonu - co najmniej 5 pomiarów stężeń hormonu wzrostu, w uzasadnionych przypadkach poszerzone o wykonanie dwóch testów stymulacji sekrecji tego hormonu),</p> <p>4) wykluczenie innych, aniżeli ciężki pierwotny niedobór IGF-1, przyczyn niskorosłości (niedokrwistość, choroby wątroby, niedoczynność tarczycy, zaburzenia wchłaniania i trawienia jelitowego, obciążenia dotyczące przebiegu ciąży i porodu, itp.),</p> <p>5) rozpoznanie ciężkiego pierwotnego niedoboru IGF-1 potwierdzone testem generacji somatomedyn,</p> <p>6) w przypadkach wątpliwych badania molekularne w kierunku rozpoznania mutacji w obrębie receptora hormonu wzrostu, mutacji genu kodującego syntezę IGF-1 lub promotora tego genu.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu lub czasowego zaprzestania terapii preparatem rhIGF-1</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Mecaserminum podawane jest w dawce 0,04 - 0,12 mg/kg masy ciała dwa razy na dobę.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) pomiar stężenia IGF-1,</p> <p>2) pomiar stężenia IGFBP₃,</p> <p>3) pomiar stężenia glukozy we krwi,</p> <p>4) Test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii</p> <p>5) Pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny HbA_{1c}</p> <p>6) Krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja</p> <p>7) Pomiar stężenia TSH, pomiar stężenia fT₄</p> <p>8) Jonogram surowicy krwi (co najmniej pomiar stężenia Na⁺)</p> <p>9) Konsultacja laryngologiczna z audiogramem, konsultacja kardiologiczna z USG układu sercowo-naczyniowego</p> <p>10) Konsultacja okulistyczna (w zależności od potrzeb (ok. 10% pacjentów))</p> <p>11) RTG śródreżca z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego)</p> <p>12) Obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI).</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 30 dni po rozpoczęciu leczenia, następnie co 90 dni</p> <p>1) pomiar stężenia IGF-1;</p> <p>2) pomiar stężenia IGFBP₃;</p> <p>3) pomiar stężenia glukozy we krwi.</p> <p>2.2 30 dni po rozpoczęciu leczenia, następnie co 365 dni</p> <p>- test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii lub co 180 dni</p> <p>- pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny HbA_{1c}</p> |

| | | |
|--|--|--|
| <p>1) nawracające, zagrażające życiu stany hipoglikemii;</p> <p>2) złuszczenia główki kości udowej;</p> <p>3) pseudo-tumor cerebri;</p> <p>4) ujawnienia lub wznowy choroby rozrostowej;</p> <p>5) brak zgody pacjenta na kontynuację leczenia;</p> <p>6) niezadowalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała pacjenta leczonego za pomocą rhIGF-1 < 3 cm/rok;</p> <p>7) osiągnięcie wieku kostnego:</p> <p>a) powyżej 14 lat przez dziewczynkę,</p> <p>b) powyżej 16 lat przez chłopca.</p> | | <p>2.3 Co 90 dni (w razie wystąpienia powikłań częścięj) - krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja.</p> <p>2.4 Co 180 dni</p> <p>1) pomiar stężenia TSH;</p> <p>2) pomiar stężenia fT₄;</p> <p>3) jonogram surowicy krwi (co najmniej pomiar stężenia Na⁺).</p> <p>2.5 Co 365 dni</p> <p>1) konsultacja laryngologiczna z audiogramem;</p> <p>2) konsultacja kardiologiczna z USG układu sercowo-naczyniowego.</p> <p>2.6 Co 365 dni</p> <p>1) RTG śródreżca z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego);</p> <p>2) obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI) - w zależności od potrzeb (ok. 20% pacjentów).</p> <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy, co 12 miesięcy, przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do Oddziału Wojewódzkiego NFZ.</p> |
|--|--|--|

Załącznik B.21.

LECZENIE CIĘŻKICH WRODZONYCH HIPERHOMOCYSTEINEMII (ICD-10 E 72.1)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| 1 | 2 | 3 |
| <p>Kwalifikacji pacjentów do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia co 6 miesięcy odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Leczenie następujących niedoborów enzymatycznych: beta-syntazy cystationiny (CBS), reduktazy 5,10-metylenotetrahydrofolianu (MTHFR) oraz niektórych zaburzeń metabolizmu kofaktora kobalaminy (cbl C,D,E,F,G):</p> <p>1) wysoki poziom homocysteiny we krwi, tj. > 50 $\mu\text{mol/l}$, oraz nieprawidłowy poziom metioniny, tj. < 5 lub > 40 $\mu\text{mol/l}$, po wykluczeniu niedoboru witaminy B₁₂ i kwasu foliowego. W przypadku niedoborów witaminy B₁₂ lub kwasu foliowego należy dokonać powtórnej oceny poziomu homocysteiny i metioniny po uzupełnieniu niedoborów;</p> <p>2) w przypadku rozpoznania homocystynurii klasycznej (deficyt CBS) negatywny wynik testu obciążenia witaminą B₆ (pirydoksyną). Za negatywny wynik testu należy rozumieć brak redukcji lub redukcję mniejszą niż 30% od stanu wyjściowego poziomu homocysteiny lub metioniny; kolejno w pierwszej dobie po podaniu doustnym 100 mg pirydoksyny, w przypadku braku reakcji w drugiej dobie należy podać 200 mg pirydoksyny. Jeżeli nadal brak reakcji w trzeciej dobie testu zalecane jest 500 mg (u dzieci do 3 roku życia dawka pirydoksyny w trzeciej dobie testu wynosi 300 mg). Poziomy homocysteiny i metioniny powinny być oznaczane 24 godziny po każdej dawce witaminy B₆;</p> <p>3) w przypadku niejednoznacznych wyników badań biochemicznych wskazane jest potwierdzenie rozpoznania badaniem enzymatycznym, analizą komplementarności w fibroblastach skóry lub analizą DNA.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Zalecana dawka dobową betainy bezwodnej u pacjentów dorosłych i dzieci w wieku powyżej 10 lat wynosi 6 g.</p> <p>1.2 Preparat podaje się doustnie, dwa razy na dobę, w dawkach podzielonych po 3 g.</p> <p>1.3 W ciężkich postaciach deficytu MTHFR może wystąpić konieczność zwiększenia dawki do 9 g betainy na dobę.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poziom homocysteiny całkowitej we krwi; 2) poziom metioniny we krwi (aminoacydogram); 3) morfologia krwi; 4) stężenie witaminy B₁₂ i kwasu foliowego we krwi; 5) profil kwasów organicznych moczu metodą GC/MS z ilościową oceną wydalania kwasu metylomalonowego; 6) profil acylokarnityn metodą MS/MS; 7) MRI OUN; 8) konsultacja neurologiczna; 9) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji; 10) badanie densytometryczne kośćca (dla pacjentów powyżej 5 roku życia); 11) konsultacja okulistyczna, z oceną narządu wzroku w lampie szczelinowej (jeśli pacjent nie przeżył lansektomii). <p>2. Monitorowanie leczenia Raz na 180 dni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) poziom homocysteiny całkowitej we krwi; 2) poziom metioniny we krwi (aminoacydogram); 3) morfologia krwi; 4) stężenie witaminy B₁₂, kwasu foliowego, witaminy 250HD₃ we krwi; 5) poziom Ca, PO₄³⁻, fosfatazy alkalicznej we krwi; 6) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji; 7) badanie densytometryczne kośćca (dla pacjentów powyżej 5 roku życia); 8) konsultacja neurologiczna; 9) konsultacja dietetyczna. <p>W przypadku napadowych objawów neurologicznych konieczne</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wystąpienie nadwrażliwości na betainę;2) pozytywny wynik testu z witaminą B6 - pacjenci z tym typem homocystynurii witaminoB6-zależnej odpowiadają bowiem na leczenie pirydoksyną w stopniu zadowalającym i nie wymagają dodatkowej podaży betainy;3) dyskwalifikacja z powodu działań niepożądanych leku, w tym wystąpienia obrzęku mózgu związanego z wysokim poziomem metioniny we krwi > 1000 $\mu\text{mol/l}$ u pacjentów z homocystynurią klasyczną (deficyt CBS);4) stwierdzenie nieskuteczności leczenia - weryfikacji skuteczności leczenia dokonuje co 6 miesięcy Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii;5) ciąża lub karmienie piersią. | | <p>są aktualne badania MRI OUN lub EEG (zależnie od objawów). Okresowej skuteczności terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich po przedstawieniu przez lekarza prowadzącego wymaganych kart monitorowania pacjenta.</p> |
|--|--|---|

Załącznik B.22.

LECZENIE CHOROBY POMPEGO (ICD-10 E 74.0)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|--|---|--|
| <p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się, co 6 miesięcy, w oparciu o ocenę stanu klinicznego pacjenta oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Wczesna postać (typ niemowlęcy) choroby Pompe, zdiagnozowana na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności alfa glukozydazy w leukocytach krwi obwodowej lub fibroblastach skóry, potwierdzoną badaniem molekularnym.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciąża lub laktacja; 2) obecność poważnych wrodzonych anomalii lub chorób współistniejących, które w ocenie lekarza kwalifikującego do leczenia lub Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, mogą uniemożliwić poprawę stanu zdrowia świadczeniobiorcy; 3) znaczna progresja choroby, pojawiająca się pomimo leczenia. | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Dawka preparatu alglukozydazy alfa wynosi 20 mg/kg masy ciała, podawana raz na dwa tygodnie, w postaci infuzji. Lek należy podawać stopniowo. Zaleca się rozpoczęcie wlewu z szybkością 1 mg/kg m.c./h i stopniowe zwiększanie szybkości podawania leku o 2 mg/kg m.c./h, co 30 minut, do osiągnięcia maksymalnej szybkości 7 mg/kg m.c./h, jeśli nie wystąpią niepożądane reakcje związane z infuzją.</p> <p>Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu choroby Pompe lub dziedzicznych zaburzeń metabolizmu.</p> <p>Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stwierdzenie braku lub głębokiego niedoboru aktywności alfa-glukozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym; 2) ocena miana przeciwciał przeciwko alfa-glukozydazie (nie jest badaniem obligatoryjnym); 3) morfologia krwi z rozmazem; 4) układ krzepnięcia; 5) proteinogram; 6) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, CK-MB, stężenie bilirubiny całkowitej; 7) stężenie fosfatazy alkalicznej; 8) stężenie cholesterolu i frakcji LDL-cholesterolu; 9) ocena równowagi kwasowo-zasadowej; 10) USG jamy brzusznej z oceną wątroby i śledziony; 11) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa; 12) pomiary antropometryczne; 13) konsultacja psychologiczna; 14) ciśnienie tętnicze krwi; 15) EKG; 16) USG układu sercowo-naczyniowego; 17) RTG klatki piersiowej; 18) konsultacja pulmonologiczna; 19) spirometria; 20) konsultacja laryngologiczna; 21) badanie audiometryczne; 22) badanie okulistyczne; 23) konsultacja ortopedyczna; 24) konsultacja neurologiczna; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>25) konsultacja kardiologiczna; 26) test 3/6 minutowego marszu.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Raz na 180 dni (okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie świadczeniobiorców z chorobą Pompe. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarządki, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii):</p> <ol style="list-style-type: none">1) morfologia krwi z rozmazem;2) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, MB, stężenie bilirubiny;3) stężenie fosfatazy alkalicznej;4) ocena równowagi kwasowo-zasadowej;5) układ krzepnięcia;6) proteinogram;7) stężenie cholesterolu i frakcji LDL-cholesterolu;8) konsultacja pulmonologiczna;9) badanie spirometryczne;10) pomiary antropometryczne;11) ciśnienie tętnicze krwi;12) EKG;13) USG układu sercowo-naczyniowego;14) USG jamy brzusznej;15) test 3/6 minutowego marszu;16) RTG klatki piersiowej;17) badanie audiometryczne;18) konsultacja neurologiczna;19) konsultacja kardiologiczna;20) konsultacja laryngologiczna. <p>2.2 Co 365 dni</p> <ol style="list-style-type: none">1) ocena miana przeciwciał przeciwko alglukozydazie alfa (badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o zwiększeniu dawki leku lub braku efektywności dotychczasowej terapii);2) badanie okulistyczne;3) konsultacja psychologiczna; |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | 4) RTG kręgosłupa; 5) konsultacja ortopedyczna. |
|--|--|--|

Załącznik B.23.

LECZENIE CHOROBY GAUCHER'A (ICD-10 E 75)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|---|---|---|
| <p>Kwalifikacji chorych do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia co 6 miesięcy odbywa się, w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) brak lub znaczny niedobór aktywności enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym.</p> <p>Refundowane jest leczenie świadczeniobiorców z typem I choroby oraz z typem III choroby, w przypadku, gdy objawy neurologiczne dotyczą jedynie apraksji okoruchowej, jako jedyne go wykładnika zajęcia OUN. Nie jest refundowane leczenie świadczeniobiorców z asymptomatyczną (bezobjawową) postacią choroby Gauchera.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Przedłużenie leczenia następuje co 6 miesięcy decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii.</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) wystąpienie objawów nadwrażliwości na imiglucerazę;</p> <p>2) znaczna progresja choroby pojawiająca się pomimo podjętego leczenia;</p> <p>3) pacjenci z asymptomatyczną (bezobjawową) postacią choroby Gauchera;</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Dawka imigluceraży zależy od ciężkości objawów i nie przekracza 60 U/kg m.c., podawanych co 2 tygodnie. Dawka początkowa wynosi 30 U/kg m.c., podawanej co 2 tygodnie. Preparat jest podawany w postaci jednogodzinnych wlewów dożylnych.</p> <p>W przypadku braku efektywności zastosowanej dawki po 6 mies. terapii dawkę imigluceraży można zwiększyć do maksymalnej dawki, t.j. do 60 U/kg m.c., podawanej co 2 tygodnie (przed zwiększeniem dawki należy oznaczyć miano przeciwciał przeciw imiglucerazie). W przypadku zwiększenia dawki leku do 60 U/kg m.c., przy braku skuteczności leczenia, w takiej, maksymalnej dawce po 12 miesiącach terapii, lek należy odstawić, ponieważ wskazuje to, iż leczenie jest nieefektywne.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) stwierdzenie braku lub znacznego niedoboru aktywności enzymu β-glukocerebrozydazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone wynikiem badania molekularnego;</p> <p>2) ocena miana przeciwciał przeciwko imiglucerazie (nie jest badaniem obligatoryjnym);</p> <p>3) morfologia krwi pełna, z rozmazem;</p> <p>4) układ krzepnięcia;</p> <p>5) próby wątrobowe: AlAT, AspAT;</p> <p>6) stężenie fosfatazy alkalicznej;</p> <p>7) stężenie witamin B12, E, D;</p> <p>8) stężenie cholesterolu;</p> <p>9) chitotrodydiaza;</p> <p>10) USG jamy brzusznej, z oceną objętości wątroby i śledziony;</p> <p>11) pomiary antropometryczne;</p> <p>12) MRI OUN;</p> <p>13) MRI kości długich lub co najmniej RTG kośćca;</p> <p>14) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji;</p> <p>15) konsultacja okulistyczna;</p> <p>16) EKG;</p> <p>17) USG układu sercowo-naczyniowego;</p> <p>18) konsultacja neurologiczna;</p> <p>19) konsultacja kardiologiczna (w uzasadnionych przypadkach);</p> <p>20) biopsja szpiku (w przypadku podejrzenia choroby Hodgkina.</p> |

- 4) pacjenci z typem II choroby;
5) pacjenci z typem III choroby, u których występują inne aniżeli porażenie nerwu okoruchowego objawy uszkodzenia OUN.

2. Monitorowanie leczenia

2.1 Raz na 180 dni

- 1) ocena miana przeciwciał przeciwko imiglucerazie (badanie obowiązkowe w przypadku decyzji o zwiększeniu dawki leku lub braku efektywności dotychczasowego leczenia);
- 2) morfologia krwi pełna, z rozmazem;
- 3) układ krzepnięcia;
- 4) próby wątrobowe: AlAT, AspAT;
- 5) stężenie fosfatazy alkalicznej;
- 6) chitotrodydaza;
- 7) USG jamy brzusznej, z oceną objętości wątroby i śledziony;
- 8) pomiary antropometryczne;
- 9) konsultacja neurologiczna.

Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjenta z chorobą Gauchera.

2.2 Co 365 dni

- 1) stężenie witamin B12, E, D;
- 2) stężenie cholesterolu;
- 3) MRI kości długich lub co najmniej RTG kośćca (MRI kości długich lub co najmniej RTG kośćca częściej w przypadku nasilenia się objawów ze strony układu kostno-stawowego);
- 4) MRI OUN;
- 5) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji;
- 6) konsultacja okulistyczna;
- 7) EKG;
- 8) USG układu sercowo-naczyniowego (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym w poprzednim badaniu);
- 9) konsultacja kardiologiczna (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym w poprzednim badaniu);
- 10) konsultacja ortopedyczna.

Załącznik B.24.

LECZENIE CHOROBY HURLER (ICD-10 E 76.0)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia co 6 miesięcy odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Brak lub głęboki niedobór aktywności enzymu α-L-iduronidazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Przedłużenie leczenia następuje co 6 miesięcy decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii. Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ciąża lub laktacja; 2) wystąpienie objawów nadwrażliwości na laronidazę; 3) znaczna progresja choroby pomimo podjętego | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Zalecana dawka laronidazy wynosi 100 j./kg masy ciała, podawana raz w tygodniu, we wlewie dożylnym. Początkowa prędkość infuzji wynosi 2 j./kg m.c./h. Prędkość infuzji można stopniowo zwiększać, co 15 minut, przy dobrej tolerancji leku, aż do maksymalnej prędkości 43 j./kg m.c./h. Całkowitą objętość leku należy podać w okresie około 3-4 godzin.</p> <p>Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z mukopolisacharydozą typu 1 lub innych dziedzicznych zaburzeń metabolizmu. Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stwierdzenie braku lub głębokiego niedoboru aktywności α-L-iduronidazy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym.. 2) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem 3) ocena miana przeciwciał przeciwko α-L-iduronidazie (nie jest badaniem obligatoryjnym) 4) morfologia krwi, z rozmazem 5) próby wątrobowe: AlAT, AspAT 6) stężenie fosfatazy alkalicznej 7) stężenie witamin B12, E, D 8) stężenie cholesterolu 9) ocena równowagi kwasowo-zasadowej 10) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony 11) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa 12) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa 13) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji 14) pomiar ciśnienia tętniczego krwi 15) EKG 16) USG układu sercowo-naczyniowego 17) konsultacja laryngologiczna |

| | | |
|-----------|--|---|
| leczenia. | | <p>18) badanie audiometryczne 19) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów 20) EMG, do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka 21) konsultacja neurologiczna 22) konsultacja kardiologiczna 23) test 3/6 minutowego marszu</p> <p>2. Monitorowanie leczenia 2.1 Raz na 180 dni 1) morfologia krwi, z rozmazem 2) próby wątrobowe: AlAT, AspAT 3) stężenie fosfatazy alkalicznej 4) ocena równowagi kwasowo-zasadowej 5) badanie okulistyczne, z oceną w lampie szczelinowej 6) badanie spirometryczne układu oddechowego 7) pomiary antropometryczne 8) pomiar ciśnienia tętniczego krwi 9) test 3/6 minutowego marszu Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjentów z chorobą Hurler. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii.</p> <p>2.2 Co 365 dni 1) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem (po 6 miesiącach od wprowadzenia terapii, a następnie co 365 dni) 2) ocena miana przeciwciał przeciwko α-L-iduronidazie (badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o zwiększeniu dawki leku</p> |
|-----------|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>lub braku efektywności dotychczasowej dawki leku)</p> <ol style="list-style-type: none">3) stężenie witamin B12, E, D4) stężenie cholesterolu5) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony6) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa (MRI OUN w przypadku nieprawidłowości w poprzednim badaniu lub pojawienia się lub nasilenia objawów neurologicznych)7) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa8) Badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji9) EKG10) USG układu sercowo-naczyniowego (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym - konsultacja kardiologiczna - co 180 dni lub częściej)11) konsultacja laryngologiczna12) badanie audiometryczne13) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów14) EMG, do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka15) konsultacja neurologiczna16) konsultacja kardiologiczna |
|--|--|--|

Załącznik B.25.

LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU II (ZESPÓŁ HUNTERA) (ICD-10 E-76.1)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>a) mukopolisacharydoza typu II zdiagnozowana na podstawie udokumentowanego, głębokiego deficytu aktywności enzymu sulfatazy iduronianu w surowicy lub leukocytach krwi obwodowej, lub w fibroblastach skóry,</p> <p>b) powyżej ukończonego 5 roku życia.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) ciąża lub laktacja;</p> <p>2) obecność poważnych wrodzonych anomalii rozwojowych lub chorób współistniejących, które w ocenie lekarza kwalifikującego do leczenia lub Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, mogą uniemożliwić poprawę stanu zdrowia;</p> <p>3) znaczna progresja choroby pomimo leczenia.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Lek podawany jest w dawce 0,5 mg/kg masy ciała, co tydzień, w postaci dożylnego wlewu, trwającego ok. 3 godzin, który może być stopniowo skracany do 1 godziny, jeśli nie występują reakcje niepożądane związane z jego podaniem. Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu świadczeniobiorców z mukopolisacharydozą typu II lub innymi dziedzicznymi zaburzeniami metabolizmu.</p> <p>Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi z rozmazem; 2) układ krzepnięcia; 3) proteinogram; 4) gazometria; 5) AspAT, AlAT, CK, bilirubina; 6) cholesterol, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach; 7) wydalanie mukopolisacharydów z moczem; 8) poziom przeciwciał przeciwko sulfatazie iduronianu (w miarę możliwości); 9) badanie fizykalne; 10) parametry życiowe; 11) pomiary antropometryczne; 12) EKG; 13) echokardiografia; 14) RTG klatki piersiowej; 15) USG jamy brzusznej; 16) MRI OUN z uwzględnieniem odcinka szyjnego kręgosłupa; 17) RTG kręgosłupa; 18) diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka (EMG); 19) badanie pulmonologiczne (wydolność oddechowa, spirometria); 20) badanie audiometryczne; 21) badanie okulistyczne; 22) badanie psychologiczne; 23) badanie narządu ruchu oraz funkcji motorycznych; 24) test 3/6 minutowego marszu; 25) test SF36. |

| | |
|--|---|
| | <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 W pierwszym roku leczenia wykonywanie badań powinno być przeprowadzone co 6 miesięcy</p> <ol style="list-style-type: none">1) morfologia krwi z rozmazem;2) układ krzepnięcia;3) gazometria;4) CK;5) AspAT, AlAT, bilirubina;6) wydalanie mukopolisacharydów z moczem;7) poziom przeciwciał przeciwko sulfatazie iduronianu (w miarę możliwości);8) badanie fizykalne;9) ocena parametrów życiowych;10) pomiary antropometryczne;11) EKG;12) echokardiografia;13) USG jamy brzusznej;14) badanie pulmonologiczne (wydolność oddechowa, spirometria);15) badanie narządu ruchu oraz funkcji motorycznych;16) badanie psychologiczne;17) test 3/6 minutowego marszu;18) test SF36. <p>Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjentów z chorobą Hunter. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii;</p> <p>2.2 Raz na 12 miesięcy</p> <ol style="list-style-type: none">1) cholesterol;2) witaminy rozpuszczalne w tłuszczach;3) RTG klatki piersiowej;4) RTG kręgosłupa;5) MRI OUN wskazane przede wszystkim w przypadku współistniejącego wodogłowia (do decyzji lekarza);6) badanie audiometryczne; |
|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | 7) badanie okulistyczne, z oceną dna oka; 8) diagnostyka zespołu cieśni nadgarstka (EMG). |
|--|--|--|

Załącznik B.26.

LECZENIE MUKOPOLISACHARYDOZY TYPU VI (ZESPÓŁ MAROTEAUX – LAMY) (ICD-10 E-76.2)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|--|--|--|
| <p>Kwalifikacji świadczeniobiorców do terapii dokonuje Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Kwalifikacja do programu oraz weryfikacja skuteczności leczenia odbywa się w oparciu o ocenę stanu klinicznego świadczeniobiorcy oraz ocenę efektywności zastosowanej terapii.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>Mukopolisacharydoza typu VI zdiagnozowana na podstawie udokumentowanego deficytu aktywności enzymu 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Chorób Ultrazadkich lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) ciąża lub laktacja;</p> <p>2) obecność poważnych wrodzonych anomalii lub chorób współistniejących, które w ocenie lekarza kwalifikującego do leczenia lub Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkich, mogą uniemożliwić poprawę stanu zdrowia;</p> <p>3) znaczna progresja choroby pomimo leczenia.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Zalecana dawka galsulfazy wynosi 1 mg/kg masy ciała podawanej raz w tygodniu w postaci wlewu dożylnego przez 4 godziny. Początkową prędkość wlewu można dostosować tak, aby około 2,5% całkowitego roztworu zostało podane w okresie pierwszej godziny, a pozostała jego objętość (około 97,5%) przez kolejne 3 godziny infuzji.</p> <p>Podawanie leku powinno być nadzorowane przez lekarza posiadającego doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów z mukopolisacharydozą typu VI lub innych dziedzicznych zaburzeń metabolizmu.</p> <p>Z uwagi na możliwość występowania objawów niepożądanych, z wstrząsem włącznie, lek należy podawać przy bezpośrednim dostępie do leków, sprzętu i aparatury ratującej życie.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) stwierdzenie braku lub głębokiego niedoboru aktywności 4-sulfatazy N-acetylogalaktozaminy w leukocytach lub fibroblastach skóry, potwierdzone badaniem molekularnym;</p> <p>2) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem;</p> <p>3) ocena miana przeciwciał przeciwko 4-sulfatazie N-acetylogalaktozaminy (nie jest badaniem obligatoryjnym);</p> <p>4) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>5) układ krzepnięcia;</p> <p>6) proteinogram;</p> <p>7) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, stężenie bilirubiny;</p> <p>8) stężenie fosfatazy alkalicznej;</p> <p>9) stężenie witamin A, D, E, K;</p> <p>10) stężenie cholesterolu;</p> <p>11) ocena równowagi kwasowo-zasadowej;</p> <p>12) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony;</p> <p>13) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa;</p> <p>14) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa;</p> <p>15) badanie psychologiczne, z oceną ilorazu inteligencji;</p> <p>16) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;</p> <p>17) EKG;</p> <p>18) USG układu sercowo-naczyniowego;</p> <p>19) RTG klatki piersiowej;</p> <p>20) konsultacja pulmonologiczna, z oceną spirometrii;</p> <p>21) konsultacja laryngologiczna;</p> <p>22) badanie audiometryczne;</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>23) badanie okulistyczne, z oceną oczu w lampie szczelinowej;</p> <p>24) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów;</p> <p>25) EMG, do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka;</p> <p>26) konsultacja neurologiczna;</p> <p>27) konsultacja kardiologiczna;</p> <p>28) test 3/6 minutowego marszu.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Raz na 180 dni</p> <p>1) morfologia krwi, z rozmazem;</p> <p>2) układ krzepnięcia;</p> <p>3) próby wątrobowe: AlAT, AspAT, CK, stężenie bilirubiny;</p> <p>4) stężenie fosfatazy alkalicznej;</p> <p>5) ocena równowagi kwasowo-zasadowej;</p> <p>6) proteinogram;</p> <p>7) pomiar ciśnienia tętniczego krwi;</p> <p>8) pomiary antropometryczne;</p> <p>9) EKG;</p> <p>10) USG jamy brzusznej, z oceną wątroby i śledziony;</p> <p>11) USG układu sercowo-naczyniowego;</p> <p>12) badanie okulistyczne, z oceną w lampie szczelinowej;</p> <p>13) konsultacja pulmonologiczna, z badaniem spirometrycznym;</p> <p>14) konsultacja ortopedyczna, z oceną ruchomości stawów;</p> <p>15) test 3/6 minutowego marszu.</p> <p>Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjentów z chorobą Maroteaux-Lamy. Przedłużenie leczenia następuje, co 6 miesięcy, decyzją Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrazadkowych, na podstawie nadesłanej karty monitorowania terapii;</p> <p>2.2 Co 365 dni</p> |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <ol style="list-style-type: none">1) ocena wydalania glikozaminoglikanów z moczem (po 6 miesiącach od wprowadzenia terapii, a następnie co 365 dni);2) ocena miana przeciwciał przeciwko 4-sulfatazie N-acetylogalaktozaminie (badanie obligatoryjne w przypadku decyzji o zwiększeniu dawki leku lub braku efektywności dotychczasowej terapii);3) stężenie cholesterolu;4) stężenie witamin A, D, E, K;5) RTG klatki piersiowej;6) RTG kośćca, co najmniej RTG kręgosłupa;7) MRI OUN, z oceną odcinka szyjnego kręgosłupa (MRI OUN w przypadku nieprawidłowości w poprzednim badaniu lub pojawienia się lub nasilenia objawów neurologicznych);8) EMG do oceny występowania zespołu cieśni nadgarstka;9) badanie audiometryczne;10) badanie psychologiczne z oceną ilorazu inteligencji;11) konsultacja laryngologiczna;12) konsultacja neurologiczna;13) konsultacja kardiologiczna (w przypadku nieprawidłowości w układzie sercowo-naczyniowym - konsultacja kardiologiczna -co 180 dni lub częściej). |
|--|--|---|

Załącznik B.27.

LECZENIE PRZEWLEKŁYCH ZAKAŻEŃ PŁUC U ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z MUKOWISCYDOZĄ (ICD-10 E 84)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>a) wiek od 6 lat</p> <p>b) udokumentowane przewlekłe zakażenie płuc wywołanym przez <i>Pseudomonas aeruginosa</i></p> <p>c) oporność na kolistynę lub udokumentowana nietolerancja kolistyny (nietolerancję kolistyny można wykazać poprzez spadek FEV1 lub FVC po rozpoczęciu leczenia kolistyną podawaną wziewnie lub dodatni wynik testu degranulacji bazofilów z kolistyną).</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie należy kontynuować cyklicznie dopóki świadczeniobiorca odnosi korzyści z włączenia tobramycyny do schematu leczenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na tobramycynę, inny aminoglikozyd czy substancję pomocniczą;</p> <p>2) upośledzenie słuchu (z dużą ostrożnością należy rozważyć stosowanie leku u świadczeniobiorcy przyjmującego inne leki ototoksyczne);</p> <p>3) uszkodzenie nerek (stężenie kreatyniny w surowicy nie mniejsze niż 2mg/dl lub mocznika nie mniejsze niż 40mg/dl);</p> <p>4) krwioplucie nie mniejsze niż 60 cm³ na dobę w okresie 30 dni przed pierwszym podaniem tobramycyny;</p> <p>5) stwierdzenie ropnia płuca w RTG klatki piersiowej.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Dawka tobramycyny dla dorosłego i dzieci w wieku od 6 lat to zawartość jednego pojemnika (300 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem) przez 28 dni.</p> <p>Odstęp pomiędzy kolejnymi dawkami powinien wynosić 12 godzin.</p> <p>Po 28 dniach leczenia tobramycyną, preparat należy odstawić na okres następnych 28 dni.</p> <p>Należy przestrzegać 28-dniowych naprzemiennych cykli aktywnego leczenia z 28-dniową przerwą w leczeniu (28 dni leczenia na przemian z 28-dniowymi przerwami w podawaniu leku).</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) stężenie kreatyniny;</p> <p>2) stężenie mocznika;</p> <p>3) test degranulacji bazofilów (opcjonalnie);</p> <p>4) badanie mikrobiologiczne potwierdzające oporność <i>P. aeruginosa</i> na kolistynę oraz potwierdzające wrażliwość drobnoustroju na tobramycynę;</p> <p>5) RTG klatki piersiowej;</p> <p>6) badanie spirometryczne przed i po podaniu kolistyny (2 mln j.m.) w celu potwierdzenia nietolerancji leku;</p> <p>7) audiometria</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Badanie przeprowadzane po 2, 3, 5 i 6 cyklu leczenia:</p> <p>1) badanie mikrobiologiczne;</p> <p>2) badanie spirometryczne (badanie spirometryczne należy dodatkowo wykonać w 2 i 4 tygodniu terapii).</p> <p>2.2 Badanie przeprowadzane w 48 tygodniu leczenia (po zakończeniu 6 cykli leczenia) :</p> <p>1) stężenie kreatyniny;</p> <p>2) stężenie mocznika;</p> <p>3) badanie mikrobiologiczne;</p> <p>4) badanie spirometryczne;</p> <p>5) badanie słuchu - audiometria</p> |

Załącznik B.28.

LECZENIE DYSTONII OGNISKOWYCH I POŁOWICZEGO KURCZU TWARZY (ICD-10 G 24.3, G 24.5, G 24.4, G 51.3, G 24.8, G 24.4)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) komplet badań diagnostycznych świadczących o przeprowadzeniu diagnostyki różnicowej i dokumentujących rozpoznanie choroby podstawowej:</p> <p>a) w kręczy karku u świadczeniobiorców poniżej 50 roku życia - badanie TK/MRI głowy, RTG kręgosłupa szyjnego, badanie poziomu miedzi lub ceruloplazminy, ocena przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej,</p> <p>b) w kurczu powiek - w wybranych przypadkach różnicowanie z miastenią (próba nużliwości mięśni),</p> <p>c) w połowicznym kurczu twarzy - badanie TK lub MRI głowy;</p> <p>2) wykluczenie miastenii i zespołu miastenicznego na podstawie wywiadu i badania neurologicznego (wykonanie dodatkowych badań jedynie w uzasadnionych przypadkach);</p> <p>3) brak objawów uogólnionego zakażenia;</p> <p>4) wykluczenie obecności stanu zapalnego w obrębie planowanego miejsca podania;</p> <p>5) wykluczenie ciąży na podstawie wywiadu.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku;</p> <p>2) powstanie oporności na lek;</p> <p>3) stwierdzenie miastenii lub zespołu miastenicznego;</p> <p>4) objawy uogólnionego zakażenia;</p> <p>5) zapalenie okolicy miejsca podania;</p> <p>6) ciąża;</p> <p>7) przyjmowanie leków hamujących transmisję nerwowo-mięśniową (np.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Botulinum A toxin a 500j. (Dysport) Kręcz karku 500 - 1.000 j.m. Kurcz powiek 100 - 250 j.m. Połowiczy kurcz twarzy 50 - 125 j.m. Dystonia krtaniowa 40 - 80 j.m. Dystonia twarzy 100-400 j.m.</p> <p>1.2 Botulinum A toxin a 100j. (Botox) Kręcz karku 100-200 j.m. Kurcz powiek 20 - 50 j.m. Połowiczy kurcz twarzy 10 - 25 j.m. Dystonia krtaniowa 10 - 20 j.m. Dystonia twarzy 20-80 j.m.</p> <p>1.3 Botulinum A toxin a 100j. (Xeomin) Kręcz karku 100 - 200 j.m. Kurcz powiek 20 - 50 j.m.</p> <p>Częstość podawania leku zależy od stanu klinicznego świadczeniobiorcy, maksymalnie 4 razy w okresie roku.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>2) poziom miedzi;</p> <p>3) poziom ceruloplazminy;</p> <p>4) RTG kręgosłupa szyjnego;</p> <p>5) tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny.</p> <p>RTG kręgosłupa szyjnego - w przypadku leczenia świadczeniobiorców z kręczem karku. Tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny - w przypadku leczenia świadczeniobiorców z kręczem karku lub połowicznym kurczem twarzy.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>EMG - badanie przeprowadzane w niektórych przypadkach zgodnie z harmonogramem dawkowania (w niektórych przypadkach uzasadniony jest wybór miejsca podania toksyny botulinowej przy pomocy badania EMG).</p> |

| | | |
|------------------|--|--|
| aminoglikozydy). | | |
|------------------|--|--|

Załącznik B.29.

LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO (ICD-10 G 35)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1.1 Leczenia interferonem beta:</p> <p>1) wiek od 12 roku życia;</p> <p>2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego – oparte na kryteriach diagnostycznych McDonalda (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po kontraście;</p> <p>3) uzyskanie co najmniej 15 punktów według punktowego systemu kwalifikacji określonego w ust. 3;</p> <p>4) pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej opieką świadczeniobiorcę.</p> <p>1.2 Leczenia octanem glatirameru:</p> <p>1) wiek powyżej 18 roku życia;</p> <p>2) rozpoznanie postaci rzutowej stwardnienia rozsianego – oparte na kryteriach diagnostycznych McDonalda (Polman i wsp. 2005); włącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po kontraście;</p> <p>3) uzyskanie co najmniej 15 punktów według punktowego systemu kwalifikacji określonego w ust. 3;</p> <p>4) pisemna deklaracja współpracy przy realizacji programu ze strony pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej obejmującej opieką świadczeniobiorcę;</p> | <p>1. Dawkowanie interferonu beta</p> <p>1.1. Dawkowanie u osób dorosłych:</p> <p>Dawka należna wynosi w przypadku:</p> <p>1) interferonu beta-1b: 0,25 mg podskórnie co drugi dzień;</p> <p>2) interferonu beta-1a: 22µg, 44µg podskórnie lub 30µg domięśniowo w zależności od tolerancji raz lub 3 razy w tygodniu (dawkowanie zależy od Charakterystyki Produktu Leczniczego).</p> <p>1.2. Dawkowanie u dzieci i młodzieży:</p> <p>1) u dzieci i młodzieży o ciężarze ciała poniżej 30 kg leczenie należy rozpocząć od 1/4 dawki należnej dla osoby dorosłej; dawkę należną dla dzieci i młodzieży o ciężarze ciała poniżej 30 kg (1/2 dawki należnej dla osoby dorosłej) należy osiągnąć po miesiącu leczenia;</p> <p>2) u dzieci i młodzieży o ciężarze ciała powyżej 30 kg leczenie należy rozpocząć od 1/2 dawki należnej dla osoby dorosłej; dawkę należną równą dawce dla osoby dorosłej należy osiągnąć po miesiącu leczenia.</p> <p>2. Dawkowanie octanu glatirameru</p> <p>Zalecane dawkowanie wynosi 20 mg octanu glatirameru we wstrzyknięciu podskórnym, raz na dobę.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji:</p> <p>1) badania biochemiczne w tym oceniające funkcję nerek, wątroby, TSH;</p> <p>2) badanie ogólne moczu;</p> <p>3) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>4) rezonans magnetyczny bez i po kontraście; rezonans magnetyczny wykonuje się w okresie kwalifikacji do programu. Jeżeli leczenie nie zostanie rozpoczęte do 30 dni od jego wykonania to badanie powtarza się tuż przed zastosowaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>5) wzrokowe potencjały wywołane (WPW), jeśli wymagane podczas ustalania rozpoznania;</p> <p>6) w przypadkach wątpliwych diagnostycznie wskazane badanie białka oligoklonalnego IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia:</p> <p>1) badania laboratoryjne, o których mowa w ust. 1, przez pierwsze 6 miesięcy leczenia, kontrola co 3 miesiące, następnie co 6 miesięcy, z wyjątkiem morfologii i parametrów wątrobowych, które wykonuje się co 3 miesiące; u dzieci i młodzieży kontrola co miesiąc przez pierwsze 3 miesiące, następnie co 3 miesiące</p> <p>2) rezonans magnetyczny – po każdym 12 miesiącach leczenia bez i po kontraście.</p> |

5) przeciwwskazania do stosowania interferonów beta.

Leczenie octanem glatirameru można rozpocząć w przypadku wystąpienia pierwotnych przeciwwskazań dla stosowania interferonów beta, o których mowa w ust. 2 pkt 1, po uprzedniej kwalifikacji do leczenia, natomiast w przypadku niepowodzenia lub nietolerancji interferonów beta, zgodnie z ust. 2 pkt 2 lub 3 - bez konieczności ponownej kwalifikacji świadczeniobiorcy.

2. Przeciwwskazania do stosowania interferonów beta:

1) pierwotne przeciwwskazania dla stosowania interferonów beta (wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych przeciwwskazań):

- a) nadwrażliwość na interferon beta,
- b) współtowarzysząca inna postać choroby,
- c) zdekompensowana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2 razy powyżej normy),
- d) zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy),
- e) depresja nie poddająca się leczeniu,
- f) padaczka z wyłączeniem napadów, które u dzieci i młodzieży wystąpiły w czasie rzutu stwardnienia rozsianego,

g) przeciwwskazania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego;

2) brak skuteczności leczenia, zgodnie z ust. 5;

3) nietolerancja interferonów beta (wystąpienie przynajmniej jednego z poniższych):

- a) ostre reakcje nadwrażliwości (wstrząs anafilaktyczny, skurcz oskrzeli, pokrzywka),
- b) wzrost poziomu transaminaz (AspAT, ALAT powyżej 2 x GGN) lub kliniczne objawy niewydolności wątroby,
- c) wystąpienie leukopenii (poniżej 3000/ μ l),

trombocytopenii lub niedokrwistości,
d) objawy ciężkiej depresji, próby samobójcze,
padaczka,
e) wystąpienie zaburzeń czynności tarczycy (bez eutyreozy),
f) wielogniskowe zmiany skórne.

3. Punktowy system kwalifikacji do leczenia stwardnienia rozsianego interferonem beta:

1) czas trwania choroby

0 - 3 lat - 6 pkt

3 - 6 lat - 4 pkt

6 - 10 lat - 2 pkt

powyżej 10 lat - 1 pkt

2) postać choroby

rzutowa bez objawów ubytkowych - 5 pkt

3) liczba rzutów choroby w ostatnim roku:

3 i więcej - 5 pkt

1 - 2 - 4 pkt

brak rzutów - 1 pkt

4) stan neurologiczny w okresie międzyrzutowym (przy rozpoczynaniu leczenia) - objawy nieznacznie upośledzające układ ruchu (świadzeniobiorca samodzielnie chodzący)

EDSS 0 – 2 - 6 pkt

EDSS 2,5 – 4 - 5 pkt

EDSS 4,5 – 5 - 2 pkt

EDSS powyżej 5 - 1 pkt

4. Kryteria wyłączenia

4.1 Leczenie interferonem beta:

1) nadwrażliwość na interferon beta;

| | | |
|---|--|--|
| <p>2) współtowarzysząca inna postać choroby; 3) ciąża; 4) zdekompensowana niewydolność wątroby (enzymy wątrobowe 2 razy powyżej normy); 5) zaburzenia czynności tarczycy (bez eutyreozy); 6) depresja niepoddająca się leczeniu; 7) padaczka, z wyłączeniem napadów występujących u dzieci i młodzieży jako objaw rzutu stwardnienia rozsianego; 8) przeciwwskazania wymienione Charakterystyce Produktu Leczniczego.</p> <p>4.2 Leczenie octanem glatirameru:</p> <p>1) nadwrażliwość na octan glatirameru lub mannitol; 2) współtowarzysząca inna postać choroby; 3) obciążenie innymi schorzeniami, które mogą zmniejszyć skuteczność leczenia; 4) ciąża.</p> <p>5. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>5.1. Leczenie trwa do 24 miesięcy, z możliwością przedłużenia do maksymalnie 60 miesięcy. Po 12 miesiącach każdego roku trwania leczenia dokonuje się oceny skuteczności leczenia. Za brak skuteczności wymagający zmiany leczenia przyjmuje się wystąpienie jednej z poniższych sytuacji:</p> <p>1) liczba i ciężkość rzutów: a) 2 lub więcej rzutów umiarkowanych (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub wzrost o 2 pkt w zakresie jednego lub dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych) lub b) 1 ciężki rzut po 6 miesiącach (wzrost w EDSS</p> | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>większy niż w definicji rzutu umiarkowanego);</p> <p>2) progresja choroby mimo leczenia, co oznacza utrzymujące się przez co najmniej 3 miesiące pogorszenie się stanu neurologicznego o co najmniej:</p> <p>a) 2 pkt EDSS, gdy EDSS do 3,5, b) 1 pkt EDSS, gdy EDSS od 4,0;</p> <p>3) zmiany w badaniu rezonansu magnetycznego wykonanym po każdych 12 miesiącach, gdy stwierdza się jedno z poniższych:</p> <p>a) więcej niż jedna nowa zmiana Gd (+), b) więcej niż dwie nowe zmiany w sekwencji T2;</p> <p>4) przejście rzutowo-remisyjnej postaci stwardnienia rozsianego we wtórnie postępujące stwardnienie rozsiane, w skali EDSS powyżej 6 punktów.</p> <p>5.2. Kryteria przedłużenia leczenia interferonem beta lub octanem glatirameru o kolejne 12 miesięcy, nie więcej jednak niż do 60 miesięcy leczenia:</p> <p>1) brak rzutów lub rzuty łagodne (wzrost EDSS o 0.5 pkt lub o 1 pkt w jednym do trzech układów funkcjonalnych) lub 1 rzut umiarkowany (wzrost EDSS o 1 do 2 pkt lub 2 pkt w zakresie jednego do dwóch układów funkcjonalnych lub o 1 pkt w czterech lub większej liczbie układów funkcjonalnych), lub</p> <p>2) brak progresji choroby w okresie ostatniego roku leczenia: różnica w skali EDSS poniżej 1 pkt;</p> <p>3) brak wyraźnych cech aktywności i progresji choroby w badaniu kontrastowym wykonanym rezonansem magnetycznym (nie więcej niż jedna zmiana Gd+ lub dwie nowe zmiany w sekwencji T2) z gadoliną.</p> | | |
|---|--|--|

Załącznik B.30.

LECZENIE SPASTYCZNOŚCI W MÓZGOWYM PORAŻENIU DZIECIĘCYM (ICD-10 G 80)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji Do leczenia toksyną botulinową w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) potwierdzone rozpoznanie mózgowego porażenia dziecięcego z towarzyszącą spastycznością ograniczającą funkcjonowanie dziecka lub zagrażającą rozwojem utrwalonych przykurczy mięśniowych i deformacji kostno-stawowych. 2) wiek 2-17 lat. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie: Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów kwalifikacji i kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nadwrażliwość na kompleks neurotoksyny lub którykolwiek ze składników leku; 2) powstanie oporności na leczenie; 3) myastenia gravis; 4) objawy uogólnionego zakażenia; 5) zapalenie okolicy miejsca podania; 6) ciąża. | <p>1. Dawkowanie Dysportu Dawka całkowita leku, na jedno podanie 30 j/kg, podzielonych na poszczególne mięśnie zgodnie z wzorcem spastyczności i oceną lekarza.</p> <p>2. Dawkowanie Botoxu Maksymalna dawka całkowita leku na rok leczenia to 24 j/kg, podzielonych na poszczególne mięśnie i sesje terapeutyczne zgodnie z wzorcem spastyczności i oceną lekarza.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji Morfologia krwi z rozmazem.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia EMG - badanie przeprowadzane zgodnie z harmonogramem dawkowania (w niektórych przypadkach uzasadniony jest wybór miejsca podania toksyny botulinowej przy pomocy badania EMG).</p> |

Załącznik B.31.

LECZENIE TĘTNICZEGO NADCIŚNIENIA PŁUCNEGO (TNP) (ICD-10 I 27, I 27.0)

Klasyfikacja ICD 10 nie uwzględnia współczesnej klasyfikacji nadciśnienia płucnego. Rozpoczęto procedurę jej modyfikacji.

A. Leczenie TNP u dorosłych**1. Leczenie I rzutu****1.1 Leczenie I rzutu sildenafilem****1.2 Leczenie I rzutu bosentanem****2. Leczenie II rzutu****2.1 Leczenie II rzutu bosentanem****2.2 Leczenie II rzutu iloprostem****2.3 Leczenie II rzutu treprostinilem****2.4 Leczenie II rzutu - terapia skojarzona / iloprost + sildenafil /****B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja****1. Leczenie dzieci - bosentan****2. Kontynuacja leczenia TNP u osób przekraczających wiek 18 lat i wcześniej otrzymujących bosentan w ramach leczenia TNP u dzieci****ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|--|---|--|
| A. Leczenie TNP u dorosłych 1. Leczenie I rzutu 1.1 leczenie sildenafilem: 1.1.1 Kryteria włączenia do programu Do leczenia I rzutu sildenafilem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące kryteria: 1) zdiagnozowana oraz udokumentowana jedna z | A. Leczenie TNP u dorosłych: 1. Leczenie I rzutu 1.1 Dawkowanie sildenafilu Należy stosować dawkę 20 mg 3 razy dziennie. 1.2 Dawkowanie bosentanu Leczenie należy rozpoczynać od dawki 62,5 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie, następnie zwiększać dawkę do dawki podtrzymującej 125 mg dwa razy na dobę. Lek | 1. Badania przy kwalifikacji 1.1 Badania nieinwazyjne: a) ocena klasy czynnościowej według NYHA, b) test 6-minutowego marszu, c) oznaczenie NT-pro-BNP, d) badanie echokardiograficzne; 1.2 Badania inwazyjne: badanie hemodynamiczne - cewnikowanie prawego serca z oceną |

| | | |
|---|---|---|
| <p>poniższych postaci nadciśnienia płucnego:</p> <p>a.) idiopatyczne nadciśnienie płucne, b.) rodzinne tętnicze nadciśnienie płucne, c.) tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu choroby układowej tkanki łącznej (konieczne jest wykluczenie postaci choroby z dominującym włóknieniem płuc) 2) będący w III klasie czynnościowej według WHO; 3) brak spadku ciśnienia w tętnicy płucnej w ostrym teście hemodynamicznym (według aktualnych standardów leczenia) 4) wiek powyżej 18 roku życia.</p> <p>1.1.2. Określenie czasu leczenia sildenafilem w programie Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia.</p> <p>1.1.3. Kryteria wyłączenia z leczenia I rzutu sildenafilem w programie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) nieskuteczność terapii; 2) ciężka niewydolność wątroby; 3) ostatnio przebyty udar mózgu; 4) zawał mięśnia sercowego; 5) ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg; 6) jednoczesne stosowanie azotanów, leków przeciwwirycznych, leków przeciwwirusowych; 7) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; 8) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia; 9) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli; 10) retinitis pigmentosa lub utrata wzroku w wyniku nietętnicznej przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego NAION; 11) ciąża lub laktacja <p>1.2 leczenie I rzutu bosentanem:</p> <p>1.2.1 Kryteria włączenia do programu Do leczenia I rzutu bosentanem w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy spełniający następujące</p> | <p>należy przyjmować rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.</p> <p>2. Leczenie II rzutu</p> <p>2.1 Dawkowanie bosentanu Leczenie należy rozpoczynać od dawki 62,5 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie, następnie zwiększać dawkę do dawki podtrzymującej 125 mg dwa razy na dobę. Tabletki należy przyjmować rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.</p> <p>2.2 Dawkowanie iloprostu Dawka na jedną inhalację: 2,5 mikrograma lub 5,0 mikrogramów iloprostu (podawanego w inhalacji przez ustnik nebulizatora), rozpoczynając od podania mniejszej dawki 2,5 mikrograma w pierwszej inhalacji, a następnie w drugiej inhalacji podając 5,0 mikrogramów. W przypadku słabej tolerancji dawki 5 mikrogramów, dawka ta powinna być zmniejszona do 2,5 mikrograma. 6 do 9 inhalacji na dobę.</p> <p>2.3 Dawkowanie treprostynilu Lek podaje się w postaci ciągłej infuzji podskórnej, za pomocą miniaturowej pompy po umieszczeniu jednorazowej, plastikowej kaniuli w tkance podskórnej brzucha. Operację umieszczenia kaniuli, przygotowanie leku oraz obsługę pompy pacjent wykonuje samodzielnie w warunkach ambulatoryjnych. Dawkowanie leku dostosowane jest do masy ciała - dawka początkowa wynosi 1.25 ng/kg/min. Następnie dawka jest zwiększana w zależności od tolerancji leczenia i efektu klinicznego. Skuteczność leczenia treprostynilem zależy proporcjonalnie od stosowanej dawki leku. Istotny klinicznie efekt leczenia osiąga się zazwyczaj przy dawce około 15 - 20 ng/kg/min</p> <p>2.4 Dawkowanie iloprostu i sildenafilu w terapii skojarzonej Duoterapia stosowana w przypadku wystąpienia progresji choroby u pacjentów leczonych w I rzucie sildenafilem lub u pacjentów znajdujących się w IV klasie</p> | <p>ciśnienia zaklinowania, naczyniowego oporu płucnego, pojemności minutowej i saturacji mieszanej krwi żyłnej (z wyłączeniem pacjentów z zespołem Eisenmengera, jeśli w przeszłości wykonywano już taką ocenę), testy wazodylatacyjne (z wyłączeniem pacjentów z zespołem Eisenmengera) Ocena postępu leczenia powinna być wykonywana w stanie możliwie jak najbardziej stabilnym.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Badania nieinwazyjne:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) ocena klasy czynnościowej według NYHA, b) test 6-minutowego marszu, c) oznaczenie NT-pro-BNP, d) badanie echokardiograficzne (w przypadku rozbieżności wyników badań podstawowych) <p>- wykonuje się co 3 - 6 miesięcy w trakcie uczestnictwa w programie a także w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia zgłoszonego przez świadczeniobiorcę. Interpretacja wyników badań nieinwazyjnych.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) zmiana klasy czynnościowej według NYHA na IV - wskazane jest włączenie terapii II rzutu po wykonaniu badania hemodynamicznego; 2) jeśli spełnione są dwa z trzech wymienionych niżej warunków: <ol style="list-style-type: none"> a) klasa czynnościowa III według NYHA, b) dystans 6-minutowego marszu poniżej 380m; c) NT-pro-BNP powyżej 3.400 pg/ml - świadczeniobiorca powinien mieć wykonane badanie hemodynamiczne. 3) w innych sytuacjach powinna być kontynuowana terapia I rzutu. W przypadku znacznych rozbieżności w wynikach wspomnianych testów należy wykonać badanie echokardiograficzne i po uwzględnieniu jego wyniku podjąć decyzję o cewnikowaniu. <p>2.2 Badania inwazyjne - cewnikowanie prawego serca z oceną ciśnienia zaklinowania, naczyniowego oporu płucnego, pojemności minutowej i saturacji mieszanej krwi żyłnej (również u chorych z zespołem Eisenmengera jeśli terapia II rzutu jest dopuszczalna) wykonuje się:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) co 12 -24 miesiące (z wyjątkiem zespołu Eisenmengera); b) w sytuacji progresji choroby do IV klasy czynnościowej według |
|---|---|---|

| | | |
|--|--|---|
| <p>kryteria:</p> <p>1) świadczeniobiorcy w III klasie czynnościowej według WHO, u których w ostrym teście hemodynamicznym nie stwierdzono spadku ciśnienia w tętnicy płucnej (według aktualnych standardów leczenia, test nie jest wymagany w zespole Eisenmengera);</p> <p>2) zdiagnozowane oraz udokumentowane tętnicze nadciśnienie płucne związane z wrodzonymi wadami serca / zespołem Eisenmengera;</p> <p>3) wiek powyżej 18 roku życia</p> <p>1.2.2 Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>1.2.3. Kryteria wyłączenia z leczenia I rzutu bosentanem u dorosłych:</p> <p>1) nieskuteczność terapii;</p> <p>2) ciężka niewydolność wątroby klasa Child-Pugh B lub C;</p> <p>3) Aktywność AspAT lub AlAT > 3 razy wartość górnej granicy normy (GGN) przed rozpoczęciem leczenia lub aktywność AspAT lub AlAT > 8 razy GGN w trakcie leczenia;</p> <p>4) przebyty udar mózgu;</p> <p>5) zawał mięśnia sercowego;</p> <p>6) ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg;</p> <p>7) jednoczesne stosowanie leków przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, glibenklamidu, rifampicyny;</p> <p>8) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą; nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia;</p> <p>9) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli;</p> <p>10) ciąża lub laktacja.</p> <p>2. Leczenie II rzutu</p> <p>2.1. Kryteria kwalifikacji do leczenia bosentanem, iloprostem, treprostynilem oraz iloprostem wraz z sildenafilem</p> | <p>czynnościowej w chwili rozpoznania choroby</p> <p>Dawka sildenafilu: 20 mg 3 razy dziennie.</p> <p>Dawka iloprostu na jedną inhalację: 2,5 mikrograma lub 5,0 mikrogramów iloprostu (podawanego w inhalacji przez ustnik nebulizatora), rozpoczynając od podania mniejszej dawki 2,5 mikrograma w pierwszej inhalacji, a następnie w drugiej inhalacji podając 5,0 mikrogramów.</p> <p>W przypadku złej tolerancji dawki 5 mikrogramów, dawka ta powinna być zmniejszona do 2,5 mikrograma. Maksymalna liczba inhalacji na dobę wynosi 8.</p> <p>Opcje terapii II rzutu (bosentan; iloprost; treprostynil; iloprost + sildenafil) mogą być stosowane zamiennie w zależności od tolerancji i skuteczności leczenia.</p> <p>B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja ich leczenia po 18 roku życia</p> <p>1) masa ciała od 20 do 40 kg, dawka początkowa (4 tygodnie) 31,25 mg dwa razy na dobę, dawka podtrzymująca 62,5 mg dwa razy na dobę;</p> <p>2) masa ciała większa niż 40 kg, dawka początkowa (4 tygodnie) 62,5 mg dwa razy na dobę, dawka podtrzymująca 125 mg dwa razy na dobę.</p> <p>3) kontynuacja leczenia TNP u osób przekraczających wiek 18 lat i wcześniej otrzymujących bosentan w ramach leczenia TNP u dzieci</p> <p>Leczenie należy rozpoczynać od dawki 62,5 mg dwa razy na dobę przez 4 tygodnie, następnie zwiększać dawkę do dawki podtrzymującej 125 mg dwa razy na dobę. Tabletki należy przyjmować rano i wieczorem, z pokarmem lub bez pokarmu.</p> <p>U dzieci w wieku powyżej 2 lat optymalna dawka podtrzymująca nie została ustalona w dobrze kontrolowanych badaniach. Jednak dane farmakokinetyczne u dzieci wykazały, że stężenie bozentanu w osoczu u dzieci było zwykle mniejsze niż u pacjentów dorosłych i nie wzrastało po zwiększeniu dawki bozentanu do poziomu powyżej 2mg/kg dwa razy na dobę .Na podstawie danych farmakokinetycznych można</p> | <p>NYHA, przed włączeniem terapii II rzutu;</p> <p>c) jeśli panel badań nieinwazyjnych wskazuje na pogorszenie lub jeśli obraz kliniczny i wyniki badań nieinwazyjnych są niejednoznaczne.</p> <p>Interpretacja wyników badań inwazyjnych:</p> <p>Na pogorszenie wskazujące na potrzebę zmiany terapii na II rzut składa się spełnienie 2 z 3 poniższych warunków w trakcie leczenia lekiem I rzutu:</p> <p>a)indeks sercowy $\leq 2,4 \text{ l/min/m}^2$.</p> <p>b)średnie ciśnienie w prawym przedsionku -powyżej 10 mm Hg,</p> <p>c)saturacja mieszanej krwi żyłnej$\leq 65\%$</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>Do leczenia II rzutu u dorosłych w ramach programu kwalifikują się świadczeniobiorcy z tętnicznym nadciśnieniem płucnym:</p> <ol style="list-style-type: none">1) po nieskutecznym leczeniu I rzutu lub2) będący w IV klasie czynnościowej w momencie rozpoznania choroby. <p>2.2. Określenie czasu leczenia w programie Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>2.3. Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu iloprostem u dorosłych:</p> <ol style="list-style-type: none">1) ciężka choroba niedokrwienna serca lub niestabilna dławica piersiowa;2) zawał mięśnia sercowego przebyty w okresie ostatnich 6 miesięcy;3) niewyrównana niewydolność serca; niekontrolowana przez lekarza;4) ciężkie zaburzenia rytmu serca,5) zaburzenia naczyniowo-mózgowe (np. przejściowe niedokrwienie mózgu, udar) przebyte w ciągu ostatnich 3 miesięcy;6) wrodzone wady zastawkowe z istotnymi klinicznie zaburzeniami czynności mięśnia sercowego niezwiązane z nadciśnieniem płucnym;7) stany, w których wpływ iloprostu na płytki krwi może zwiększyć ryzyko krwotoku (np.: aktywne wrzody trawienne, uraz, krwotok wewnątrzczaszkowy);8) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;9) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia;10) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli;11) ciąża lub laktacja <p>2.4 Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu treprostinilem</p> <ol style="list-style-type: none">1) nadciśnienie płucne związane z chorobą zarostową żył;2) zastoinowa niewydolność serca spowodowana ciężkim | <p>stwierdzić, że jest mało prawdopodobne, by większe dawki były bardziej skuteczne. Nie można także wykluczyć, że po zwiększeniu dawki u dzieci wzrośnie prawdopodobieństwo wystąpienia działań niepożądanych. Nie przeprowadzono badań klinicznych porównujących stosunek skuteczności do bezpieczeństwa dawki 2 mg/kg i 4 mg/kg dwa razy na dobę u dzieci. Doświadczenie kliniczne, dotyczące dzieci w wieku poniżej 2 lat jest ograniczone.</p> | |
|---|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>zaburzeniem czynności lewej komory serca;</p> <p>3) ciężka niewydolność wątroby klasa Child-Pugh C;</p> <p>4) czynna choroba wrzodowa przewodu pokarmowego, krwawienie śródczaszkowe, zranienie, inny rodzaj krwawienia;</p> <p>5) wrodzone lub nabyte wady zastawkowe serca z klinicznie znaczącymi zaburzeniami czynności mięśnia sercowego niezwiązanymi z nadciśnieniem płucnym;</p> <p>6) ciężka postać choroby niedokrwiennej serca lub niestabilna postać dławicy piersiowej;</p> <p>7) zawał mięśnia sercowego przeżyty w okresie ostatnich 6 miesięcy;</p> <p>8) nieleczona niewydolność serca;</p> <p>9) ciężkie zaburzenia rytmu serca;</p> <p>10) ciśnienie tętnicze krwi poniżej 90/50 mmHg</p> <p>11) epizody naczyniowo-mózgowe (np. przejściowe niedokrwienie mózgu, udar) w ciągu ostatnich 3 miesięcy;</p> <p>12) nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <p>13) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia;</p> <p>14) brak współpracy z strony świadczeniobiorcy w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli;</p> <p>15) ciąża lub laktacja.</p> <p>2.5 Kryteria wyłączenia z leczenia II rzutu sildenafilem i bosentanem - określono odpowiednio w pkt 1.1.3 oraz 1.2.3</p> <p>B. Leczenie TNP u dzieci i kontynuacja ich leczenia po 18 roku życia</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji dzieci do leczenia bosentanem</p> <p>1) wiek</p> <p>a) od 2 do 18 roku życia</p> <p>b) kontynuacja ich leczenia po 18 roku życia</p> <p>2) pierwotne (idiopatyczne i rodzinne) tętnicze nadciśnienie płucne;</p> <p>3) wtórne tętnicze nadciśnienie płucne związane z chorobą tkanki łącznej;</p> <p>4) tętnicze nadciśnienie płucne w przebiegu wrodzonych</p> | | |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>wad serca;</p> <p>5) zespół Eisenmengera;</p> <p>6) III klasa czynnościowa według WHO;</p> <p>7) zastosowanie skutecznej metody antykoncepcji u miesiączkujących dziewcząt</p> <p>1.2 Określenie czasu leczenia dzieci w programie Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>1.3 Kryteria wyłączenia dzieci z programu</p> <p>1) nadciśnienie płucne o innej etiologii niż podano w kryteriach włączenia;</p> <p>2) wrodzona wada serca z nadciśnieniem płucnym, w której istnieje możliwość leczenia operacyjnego;</p> <p>3) brak współpracy ze strony pacjenta w zakresie prowadzenia terapii oraz okresowej kontroli leczenia;</p> <p>4) nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;</p> <p>5) umiarkowane do ciężkiego zaburzenie czynności wątroby;</p> <p>6) aktywność AspAT lub AlAT > 3 razy wartość górnej granicy normy (GGN) przed rozpoczęciem leczenia lub aktywność AspAT lub AlAT > 8 razy GGN w trakcie leczenia;</p> <p>7) jednoczesne stosowanie leków przeciwgrzybiczych, przeciwwirusowych, immunosupresyjnych, glibenklamidu, rifampicyny;</p> <p>8) ciąża;</p> <p>9) miesiączkujące dziewczęta niestosujące skutecznych metod antykoncepcji.</p> | | |
|---|--|--|

Załącznik B.32.

LECZENIE CHOROBY LEŚNIEWSKIEGO-CROHNA (chLC) (ICD-10 K 50)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Leczenie ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna (chLC) u dzieci do 18 roku życia</p> <p>1.1 Kryteria włączenia</p> <p>1) świadczeniobiorcy w wieku od 7 lat do momentu ukończenia 18 roku życia</p> <p>2) ciężka, aktywna postać choroby Leśniowskiego-Crohna (wynik w skali PCDAI powyżej 51 punktów),</p> <p>3) brak lub utrata odpowiedzi na dotychczas stosowane leczenie z wyjątkiem leczenia biologicznego</p> <p>4) wysokie stężenie markerów stanu zapalnego jak np. CRP, oraz wysoki OB.</p> <p>5) kobiety w wieku rozrodczym, muszą wyrazić zgodę na świadomą kontrolę urodzeń w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu</p> <p>1.2 Leczenie podtrzymujące infliksimabem</p> <p>W 71 dniu leczenia należy dokonać oceny odpowiedzi na leczenie przy użyciu skali PCDAI. Świadczeniobiorcy z odpowiedzią kliniczną przechodzą do leczenia podtrzymującego.</p> <p>Odpowiedź kliniczna definiowana jest jako zmniejszenie PCDAI o 15 lub więcej punktów oraz PCDAI niższe niż 30 punktów.</p> <p>2. Leczenie ciężkiej postaci choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych</p> <p>2.1 Kryteria włączenia</p> <p>a) wiek powyżej 18 roku życia,</p> <p>b) stwierdzenie ciężkiej czynnej postaci choroby lub CDAI powyżej 300 punktów lub przetoki okołoodbytowe, które nie zagoiły się pod wpływem antybiotyków i leczenia chirurgicznego w połączeniu z leczeniem</p> | <p>1. Leczenie choroby Leśniowskiego-Croha u dzieci do 18 roku życia</p> <p>Infliksymab należy podać w dawce 5 mg/kg mc w infuzji dożylnnej trwającej ponad 2 godziny. Następne dawki należy podać po 14 i 42 dniach od pierwszej infuzji.</p> <p>Leczenie podtrzymujące należy prowadzić w schemacie infliksymab w dawce 5 mg/kg m.c. co 8 tygodni.</p> <p>2. Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna u dorosłych</p> <p>2.1 Infliksymab należy podać w dawce 5 mg/kg mc w infuzji dożylnnej trwającej ponad 2 godziny. Następne dawki należy podać po 14 i 42 dniach od pierwszej infuzji.</p> <p>W leczeniu podtrzymującym należy podawać infliksymab w dawce 5 mg/kg m.c. co 8 tygodni.</p> <p>Dopuszczalne są uzasadnione 1-2 dniowe odstępstwa od podanego schematu</p> <p>2.2 Adalimumab należy podać we wstrzyknięciu podskórnym, w dawce 160 mg, po 14 dniach w dawce 80 mg, a następnie w dawce 40 mg po każdym kolejnych 14 dniach do 12 tygodnia włącznie.</p> <p>W leczeniu podtrzymującym adalimumabem należy go podawać w dawce 40 mg podskórnie co 2 tygodnie.</p> <p>Dopuszczalne są uzasadnione 1-, 2-dniowe odstępstwa od podanego schematu.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) ilość krwinek białych;</p> <p>2) ilość krwinek czerwonych;</p> <p>3) poziom hemoglobiny;</p> <p>4) płytki krwi;</p> <p>5) odczyn Biernackiego;</p> <p>6) aminotransferaza alaninowa;</p> <p>7) aminotransferaza asparaginianowa;</p> <p>8) poziom kreatyniny w surowicy;</p> <p>9) białko C-reaktywne;</p> <p>10) badanie ogólne moczu;</p> <p>11) próba tuberkulinowa;</p> <p>12) antygen HBs;</p> <p>13) przeciwciała anty HCV;</p> <p>14) antygen wirusa HIV(HIV Ag/Ab Combo);</p> <p>15) stężenie elektrolitów w surowicy;</p> <p>16) hematokryt;</p> <p>17) RTG klatki piersiowej;</p> <p>18) EKG z opisem;</p> <p>19) badanie endoskopowe;</p> <p>20) obliczenie wartości wskaźnika CDAI / PCDAI.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>W przypadku stosowania adalimumabu świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać, co najmniej po 2 tygodniach od podania ostatniej dawki leku następujące badania: morfologia krwi, OB, Ht, CRP, AlAT i AspAT. Wtedy też należy przeprowadzić ocenę wskaźnika CDAI.</p> <p>W przypadku stosowania infliksymabu, świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać, co najmniej po 2 tygodniach od podania 3 dawki leku, następujące badania: morfologia krwi, OB, Ht, CRP,</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>immunosupresyjnym,</p> <p>c) utarta masy ciała (BMI poniżej 18 kg/m²),</p> <p>d) wielokrotne, niekontrolowane oddawanie stolca w ciągu dnia,</p> <p>e) obecność czynników prognostycznych przemawiających za ciężkim przebiegiem choroby takich jak: wczesne pojawienie się przetok, zapalenie naczyń, zapalenie naczyńówki oka, zajęcie stawów, wtórna skrobiawica, kacheksja, wysokie stężenie biochemicznych markerów stanu zapalnego takich jak białko C-reaktywne (CRP) oraz wysokie OB.;</p> <p>f) brak reakcji na dotychczasowe leczenie lub przeciwwskazania do dotychczasowego leczenia lub przeciwwskazania do leczenia chirurgicznego,</p> <p>g) w przypadku kobiet w okresie rozrodczym konieczne jest wyrażenie zgody na świadomą kontrolę urodzeń do 5 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki adalimumabu i do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki infliksymabu.</p> <p>3. Określenie czasu leczenia dzieci i dorosłych w programie</p> <p>1) infliksymab - terapia inicjująca 43 dni;</p> <p>2) adalimumab : - terapia inicjująca do 12 tygodnia włącznie;</p> <p>Leczenie podtrzymujące adalimumabem lub infliksymabem powinno trwać aż do momentu stwierdzenia braku odpowiedzi na leczenie (w tym również stwierdzenie konieczności wykonania zabiegu chirurgicznego związanego z chorobą) jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od momentu podania pierwszej dawki.</p> <p>4. Kryteria wyłączenia dzieci i dorosłych z programu</p> <p>1) nadwrażliwość na leki stosowane w programie,</p> <p>2) ciężkie zakażenia wirusowe, grzybicze lub bakteryjne,</p> <p>3) umiarkowana lub ciężka niewydolność mięśnia sercowego,</p> <p>4) niestabilna choroba wieńcowa</p> | | <p>AlAT i AspAT. Wtedy też należy przeprowadzić ocenę wskaźnika CDAI / PCDAI.</p> <p>W przypadku dzieci leczonych infliksimabem w 71 dniu leczenia należy dokonać oceny odpowiedzi na leczenie przy użyciu skali PCDAI.</p> <p>Odpowiedź kliniczna definiowana jest jako zmniejszenie PCDAI o 15 lub więcej punktów oraz PCDAI niższe niż 30 punktów.</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>5) przewlekła niewydolność oddechowa 6) przewlekła niewydolność nerek 7) przewlekła niewydolność wątroby 8) zespół demielinizacyjny lub objawy przypominające ten zespół, 9) choroba alkoholowa, poalkoholowe uszkodzenie wątroby lub każda czynna postępująca choroba wątroby, 10) ciąża lub karmienie piersią 11) rozpoznanie stanów przednowotworowych lub nowotworów złośliwych w okresie 5 lat poprzedzających moment kwalifikowania do programu, 12) powikłania wymagające innego postępowania (np. leczenia operacyjnego).</p> <p>5. Zakończenie leczenia dzieci i dorosłych</p> <p>1) uzyskanie remisji, 2) brak efektów leczenia, 3) pogorszenia stanu zdrowia świadczeniobiorcy, 4) wystąpienia powikłań wymagających innego specyficznego leczenia.</p> | | |
|--|--|--|

Załącznik B.33.

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>I. LEKI BIOLOGICZNE</p> <p>A. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej), zostają przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu (z wyjątkiem metotreksatu podskórnego dla pacjentów uprzednio zakwalifikowanych do programu leczenia tą formą leku) następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się:</p> <p>1) pacjentów z RZS i MIZS, u których nastąpiło niepowodzenie w stosowaniu terapii co najmniej dwoma tradycyjnymi lekami modyfikującymi przebieg choroby:</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Adalimumab należy podawać w dawce 40 mg, we wstrzyknięciu podskórnym co dwa tygodnie</p> <p>1.2 Etanercept należy podać:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) dorośli – w dawce 50 mg podskórnym co tydzień; 2) dzieci – w dawce 0,4 mg/kg masy ciała (do dawki maksymalnej 25 mg) podskórnym 2 razy w tygodniu; po decyzji lekarza prowadzącego możliwe jest podawanie całej dawki tygodniowej raz w tygodniu, pod warunkiem utrzymywania się dotychczasowej skuteczności. <p>1.3 Infliksymab należy podać w dawce 3 mg/kg masy ciała w infuzji dożylny w dniach 0, 14 i 42, a następnie w każdym kolejnym 56 dniu (co 8 tygodni).</p> <p>1.4 Rytuksymab należy podać w formie dwóch infuzji dożylnych po 1000 mg w dniach 0 i 14. Kolejny cykl leczenia nie wcześniej niż po ocenie efektywności leczenia po 180 dniach terapii.</p> <p>Leczenie powyższymi lekami wymaga</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji (leczenie biologiczne):</p> <p>W ramach kwalifikacji świadczeniobiorcy do udziału w programie konieczne jest wykonanie następujących badań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1)czynnik reumatoidalny w surowicy – u pacjentów z RZS; 2)morfologia krwi; 3) płytki krwi (PLT); 4)odczyn Biernackiego (OB); 5)aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 6)aminotransferaza alaninowa (AlAT); 7)stężenie kreatyniny w surowicy; 8)stężenie białka C-reaktywnego (CRP); 9)badanie ogólne moczu; 10) próba tuberkulinowa lub Quantiferon test; 11) obecność antygenu HBS; 12) przeciwciała anti-HCV; 13) obecność antygenu wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo); 14) stężenie elektrolitów w surowicy; 15) stężenie immunoglobulin w surowicy u pacjentów kwalifikowanych do leczenia rytuksymabem; 16) RTG klatki piersiowej z opisem (maksymalnie do 3 m-cy przed kwalifikacją); |

| | | |
|--|---|--|
| <p>a) w przypadku RZS przez okres co najmniej 6 miesięcy każdym, w tym terapii maksymalnymi dawkami metotreksatu (ewentualnie w postaci podskórnej) wskazanymi w opisie programu przez okres przynajmniej 3 miesięcy (o ile nie było objawów nietolerancji, zmuszających do ich zmniejszenia),</p> <p>b) w przypadku MIZS przez okres co najmniej 3 miesięcy każdym, w tym terapii maksymalnymi dawkami metotreksatu (ewentualnie w postaci podskórnej) wskazanymi w opisie programu (o ile nie było objawów nietolerancji, zmuszających do ich zmniejszenia).</p> <p>Okres leczenia metotreksatem, jako jednym z dwóch leków, musi uwzględniać dodatkowo okres dochodzenia do dawkowania maksymalnego.</p> <p>2) pacjentów z RZS i MIZS o agresywnym przebiegu choroby, w przypadku RZS stopień aktywności schorzenia określony jako DAS 28 większy niż 5,1, którego wartość była określona dwukrotnie w odstępie 1 miesiąca (w trakcie 2 badań lekarskich); nie dotyczy kwalifikacji do leczenia RZS lekiem drugiej linii, w przypadku niepowodzenia w leczeniu lub nietolerancji pierwszoliniowego leku biologicznego;</p> <p>3) pacjentów z RZS z dominującym zajęciem kończyn dolnych, u których aktywność choroby wyrażona współczynnikiem DAS jest wyższa niż 3,7;</p> <p>4) pacjentów z MIZS z co najmniej 5 obrzękniętymi stawami i co najmniej 3 stawami o ograniczonej ruchomości, z towarzyszącym bólem, tkliwością lub obiema tymi cechami;</p> <p>5) pacjentów z innymi niż wymienione w pkt 1 – 4 postaciami RZS i MIZS, niezależnie od wartości DAS 28 i DAS:</p> <ul style="list-style-type: none">a) z zapaleniem błony naczyniowej oka,b) z postacią uogólnioną (Zespół Stilla),c) z RZS powikłanym krioglobulinemią,d) z postacią skąpostawową rozszerzającą się i przetrwałą ponad 6 miesięcy mimo leczenia metotreksatem,e) w innych uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych. | <p>równoczesnego podawania metotreksatu. Jednak w przypadku niemożności podania metotreksatu, etanercept i adalimumab może być podany jako monoterapia.</p> <p>1.5 Metotreksat (w formie doustnej lub podskórnej) należy podawać w dawce 25 mg/tydzień, jeżeli taka dawka jest tolerowana. U dzieci do 16 roku życia stosowana dawka metotreksatu powinna wynosić 10-20 mg/m² na tydzień (maksymalnie 25 mg/m² na tydzień).</p> | <p>17) EKG z opisem;</p> <p>18) dwukrotne obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub DAS w RZS, w odstępie 1 miesiąca; ostatnie oznaczenie nie wcześniej niż dwa tygodnie przed podaniem pierwszej dawki leku;</p> <p>19) u kobiet zaleca się wykonanie mammografii lub USG piersi.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia (leki biologiczne):</p> <p>W celu monitorowania leczenia wykonuje się nie rzadziej, niż w wyznaczonych terminach następujące badania:</p> <p>1) u pacjentów z RZS po 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki terapii pierwszoliniowej należy oznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none">a) morfologię krwi,b) odczyn Biernackiego (OB),c) stężenie białka C-reaktywnego (CRP),d) stężenie kreatyniny w surowicy <p>oraz obliczyć wartość wskaźnika DAS 28 lub DAS;</p> <p>2) u pacjentów z RZS w przypadku zastosowania terapii drugiej linii inhibitorem anty TNF alfa po kolejnych 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki leku drugiej linii należy oznaczyć:</p> <ul style="list-style-type: none">a) morfologię krwi,b) odczyn Biernackiego (OB),c) stężenie białka C-reaktywnego (CRP),d) stężenie kreatyniny w surowicy <p>oraz obliczyć wartość wskaźnika DAS 28 lub DAS.</p> |
|--|---|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>W przypadkach, w których pacjentowi grozi kalectwo lub zagrożone jest jego życie, decyzją Zespołu Koordynującego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, leczenie biologiczne może być rozpoczęte jeszcze przed zakończeniem obowiązkowego dla pozostałych postaci RZS i MIZS okresu leczenia klasycznymi lekami DMARD.</p> <p>W przypadku kobiet wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu, a w przypadku rytuksymabu do 12 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki.</p> <p>B. Zasady kwalifikacji do leczenia lekami biologicznymi</p> <p>1. RZS</p> <p>1.1. Leczeniem pierwszoliniowym w ramach programu u pacjentów chorych na RZS jest inhibitor TNF alfa.</p> <p>1.2. Leczeniem drugoliniowym w ramach programu u pacjentów chorych na RZS jest inhibitor TNF alfa lub rytuksymab. Rytuksymab jest wskazany do stosowania w leczeniu dorosłych pacjentów z ciężkim, aktywnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, u których stwierdzono niewystarczającą odpowiedź na leczenie lub nietolerancję innych leków modyfikujących proces zapalny (ang. DMARD), w tym jednego lub kilku inhibitorów czynnika martwicy nowotworów.</p> <p>1.3. Leczeniem trzecioliniowym w ramach programu u pacjentów chorych na RZS jest rytuksymab.</p> <p>W ramach programu dopuszcza się zastosowanie kolejno nie więcej niż dwóch inhibitorów TNF alfa u jednego pacjenta.</p> <p>2. MIZS</p> <p>2.1 Świadczeniobiorcy z MIZS zakwalifikowani do programu, kwalifikowani są do leczenia inhibitorami TNF alfa:</p> <ol style="list-style-type: none">1) w przypadku adalimumabu - pacjenci w wieku 13 lat i powyżej;2) w przypadku etanerceptu – pacjenci powyżej 4 roku życia. <p>C. Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach</p> | | <p>W przypadku kontynuowania terapii badania należy powtarzać po każdym kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni).</p> <p>W przypadku stosowania rytuksymabu w 180 dniu (+/- 14 dni) od podania każdej kolejnej dawki należy wykonać badania laboratoryjne jak w punkcie 2.2. – monitorowanie leczenia oraz dokonać oceny skuteczności leczenia.</p> <p>W przypadku stosowania rytuksymabu w 180 dniu od podania pierwszej dawki należy ponadto zbadać stężenie immunoglobulin w surowicy oraz wykonać badanie EKG.</p> <p>Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać EKG i RTG klatki piersiowej.</p> <p>3) w przypadku chorych na MIZS po 180 dniach od początku terapii należy:</p> <ol style="list-style-type: none">a) oznaczyć:<ul style="list-style-type: none">- morfologię krwi,- odczyn Biernackiego (OB),- stężenie białka C-reaktywnego (CRP),- stężenie kreatyniny w surowicy,b) dokonać:<ul style="list-style-type: none">- określenia liczby zajętych stawów,- określenia liczby stawów z ograniczeniem ich ruchomości,- oceny aktywności choroby przez lekarza na 10 cm skali VAS,- oceny ogólnego samopoczucia przez rodzica lub pacjenta na 10 cm skali VAS. <p>W przypadku kontynuowania terapii badania należy powtarzać po każdym kolejnych 180 dniach (+/- 14 dni).</p> <p>Co najmniej raz na 365 dni należy wykonać</p> |
|--|--|--|

| | | |
|---|--|------------------------------|
| <p>farmakoterapii niestandardowej .</p> <p>Do programu kwalifikowani są również pacjenci uprzednio leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej, częściami leków - inhibitorów TNF alfa (adalimumabem, etanerceptem lub infliksimabem), nieujętych wcześniej w opisach programów lub rytuksymabem, zgodnie ze wskazaniami wymienionymi w programie.</p> <p>Pacjent jest kwalifikowany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.</p> <p>W przypadku gdy uprzednio zastosowane leczenie było zbyt krótkie, aby spowodowało niski poziom aktywności choroby lub remisję, w przypadku wystąpienia przerwy zmuszającej do zastosowania terapii od początku, należy ją kontynuować z użyciem leku wskazanego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>Warunkiem kwalifikacji do programu jest wykazanie w dokumentacji medycznej adekwatnej odpowiedzi na leczenie, rozumianej jako zmniejszenie DAS28 lub DAS o wartość większą niż 1,2, po pierwszych 3 miesiącach terapii inhibitorem TNF alfa lub 6 miesiącach w przypadku zastosowania rytuksymabu oraz stwierdzana w trakcie każdego następnego badania lekarskiego wykonywanego po każdym następnym 6 miesiącach terapii, począwszy od pierwszego badania, podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie.</p> <p>D. Kryteria ponownego włączenia do programu</p> <p>Świadczeniobiorca, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami, z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono nawrót choroby (u chorych na RZS wzrost wartości DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2 w stosunku do wartości obliczonej w momencie odstawienia leku, z tym że DAS 28 nie może być mniejsze niż 3,2, a DAS niż 2,4), jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji.</p> <p>Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.</p> <p>E. Kryteria i warunki zamiany terapii :</p> | | EKG i RTG klatki piersiowej. |
|---|--|------------------------------|

| | | |
|---|--|--|
| <p>1. Pacjent będący w trakcie terapii przy użyciu leku - inhibitora TNF alfa i u którego występuje adekwatna odpowiedź na prowadzoną terapię, nie ma zamienianej aktualnie stosowanej terapii na inną.</p> <p>2. Terapia pierwszoliniowa jest prowadzona w najniższej dawce, zarejestrowanej jako skuteczna.</p> <p>3. Każdorazowo zmiana terapii na terapię innym lekiem wymaga uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>4. Zamiana terapii pierwszoliniowej na terapię inną cząsteczką leku - inhibitora TNF alfa, stosowaną razem z metotreksatem, lub jako monoterapia wymienioną w terapeutycznym programie zdrowotnym, możliwa jest tylko w następujących sytuacjach:</p> <ol style="list-style-type: none">1) brak skuteczności stosowania terapii pierwszoliniowej po 3 miesiącach jej stosowania;2) u chorych na MIZS brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 6 miesiącach leczenia pierwszym zastosowanym lekiem (z uwzględnieniem ograniczeń wskazanych w pkt. B.2.1);3) wystąpienie nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze;4) wystąpienie nadwrażliwości na cząsteczkę metotreksatu lub wystąpienie działań niepożądanych związanych z podaniem metotreksatu i w związku z tym brak możliwości zastosowania aktywnej cząsteczki leku biologicznego jeżeli ta musi być stosowana wraz z metotreksatem;5) wystąpienie istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po podaniu innej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa;6) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem lekarskim pacjenta (wykonanym w związku z realizacją programu) przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego lub metotreksatu. <p>F. Kryteria wyłączenia z programu i przeciwwskazania do kwalifikacji i ponownego włączenia do programu:</p> <ol style="list-style-type: none">1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;3) niewydolność serca (powyżej II klasy NYHA);4) przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc, odmiedniczkowe zapalenie | | |
|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>nerek w okresie ostatnich 3 miesięcy;</p> <p>5) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, odporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenia gruźlicze;</p> <p>6) udokumentowana infekcja HIV;</p> <p>7) nasilenie się objawów niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby w trakcie leczenia;</p> <p>8) stwierdzone choroby demielinizacyjne;</p> <p>9) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;</p> <p>10) stwierdzone stany przedrakowe, choroby nowotworowe, także rozpoznane i wyleczone w okresie ostatnich 5 lat;</p> <p>11) obecność aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub obecność każdej innej przewlekłej choroby wątroby.</p> <p>G. Kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej lub zakończenia udziału w danym rzucie terapii biologicznej:</p> <p>1) w przypadku pacjentów z RZS:</p> <p>a) uzyskanie przez pacjenta niskiej aktywności choroby, stwierdzonej w trakcie badania monitorującego, utrzymującej się przez okres przekraczający 6 miesięcy; miernikiem uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji jest, zgodnie z kryteriami EULAR, DAS 28 mniejszy niż 3,2, w przypadku konieczności zastosowania użytego w programie wskaźnika DAS, miernikiem niskiej aktywności choroby jest, zgodnie z kryteriami EULAR, DAS mniejszy lub równy 2,4; po tym okresie zaprzestaje się podawania pacjentowi leku biologicznego oraz wykonuje się badania zgodne z opisem programu, celem potwierdzenia wystąpienia niskiej aktywności choroby; w powyższej sytuacji, u pacjenta z niskim poziomem aktywności choroby lub w remisji należy utrzymać lub wdrożyć terapię innym lekiem modyfikującym przebieg choroby; częsteczką preferowaną jest metotreksat,</p> <p>b) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po pierwszych 3 miesiącach terapii pierwszoliniowej lub innym lekiem - inhibitorem TNF alfa braku zmniejszenia DAS 28 lub DAS o więcej niż 1,2),</p> <p>c) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie stwierdzone po pierwszych 3 miesiącach terapii lekiem - inhibitorem TNF alfa, licząc od momentu zastosowania pierwszej dawki po ponownym włączeniu pacjenta do leczenia po</p> | | |
|---|--|--|

zakończeniu okresu remisji (stwierdzenie braku zmniejszenia DAS28 lub DAS o więcej niż 1,2),

d) w przypadku uprzedniego dokonania zmiany terapii pierwszoliniowej z powodu nieskuteczności po 3 miesiącach na inny lek - inhibitor TNF alfa - brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po kolejnych 3 miesiącach terapii braku zmniejszenia DAS 28 lub DAS o więcej niż 1,2),

e) w przypadku zastosowania rytuksymabu brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzenie po 6 miesiącach od podania leku braku zmniejszenia DAS 28 lub DAS o więcej niż 1,2),

f) utrata adekwatnej odpowiedzi na leczenie (stwierdzona w trakcie każdego kolejnego badania lekarskiego wykonywanego po każdym następnym 6 miesiącach terapii, począwszy od pierwszego badania, podczas którego stwierdzono adekwatną odpowiedź na leczenie), rozumiana jako brak zmniejszenia DAS28 lub DAS o wartość równą lub większą niż 1,2, w stosunku do wartości stwierdzonej podczas przeprowadzonej wcześniejszej kontroli,

g) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- reakcja alergiczna na lek,
- zakażenie o ciężkim przebiegu,
- objawy niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby,
- pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,
- stwierdzenie choroby nowotworowej.

Po stwierdzeniu uzyskania niskiego poziomu aktywności choroby lub wejścia pacjenta w remisję, po 30 dniach od jej stwierdzenia należy wykonać:

- 1) morfologię krwi;
- 2) OB;
- 3) oznaczenie białka C-reaktywnego;
- 4) obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub DAS.

2) w przypadku pacjentów z MIZS:

a) brak adekwatnej odpowiedzi na leczenie - stwierdzenie po 6 miesiącach terapii braku efektów terapii lub ponowne zaostrzenie aktywności choroby, określane na podstawie kryteriów poprawy według Gianiniego (przynajmniej 30% polepszenie w 3 z 6 parametrów, z tym że w pozostałych parametrach nie może dojść do pogorszenia o 30% więcej niż w jednym parametrze),

b) utrata adekwatnej odpowiedzi na leczenie - stwierdzenie po każdym kolejnych 6 miesiącach terapii dalszego postępu efektów terapii lub ponowne

zaostrzenie aktywności choroby, określane na podstawie kryteriów poprawy według Gianiniego (przynajmniej 30% polepszenie w 3 z 6 parametrów, z tym że w pozostałych parametrach nie może dojść do pogorszenia o 30% więcej niż w jednym parametrze), ewentualne dalsze leczenie lekiem biologicznym jest możliwe jedynie po uzyskaniu zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych,

c) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- reakcja alergiczna na lek,
- zakażenie o ciężkim przebiegu,
- objawy niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby,
- wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej,
- stwierdzenie choroby nowotworowej.

Po stwierdzeniu uzyskania niskiego poziomu aktywności choroby lub wejścia pacjenta w remisję, po 30 dniach od jej stwierdzenia należy wykonać:

- 1) morfologię krwi;
- 2) OB;
- 3) białko C-reaktywne;
- 4) obliczenie wartości wskaźnika DAS 28 lub DAS.

Po 18 miesiącach utrzymywania się niskiej aktywności choroby należy rozważyć zaprzestanie terapii lekiem biologicznym. W powyższej sytuacji należy utrzymać lub wdrożyć terapię innym lekiem modyfikującym przebieg choroby. Częsteczką preferowaną jest metotreksat.

Ewentualne dalsze leczenie lekiem biologicznym jest możliwe jedynie po uzyskaniu indywidualnej zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

Po ukończeniu przez pacjenta 18 roku życia stosuje się program dla dorosłych z ograniczeniami rejestracyjnymi dotyczącymi MIZS, po zgłoszeniu i dokonaniu poprawnej rejestracji w aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

H. Określenie czasu leczenia w programie

Kryteria kwalifikacji i wyłączenia z programu (kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej lub zakończenia udziału w danej linii terapii

biologicznej) określają czas leczenia w programie.

II. METOTREKSAT

A. Kryteria kwalifikacji do leczenia metotreksatem podskórnym w ramach programu

1. Do leczenia metotreksatem podskórnym mogą zostać zakwalifikowani chorzy z RZS zakwalifikowani do programu, u których wystąpiły działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie w dawce wskazywanej w programie i uniemożliwiającego dalsze jego podawanie tą drogą, ale niestanowiące przeciwwskazania do jego stosowania. Rozpoczęcie leczenia metotreksatem podskórnym musi zostać poprawnie zarejestrowane w ewidencji RZS i MIZS (nie wymaga kwalifikacji przez Zespół Koordynujący do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).
2. Do leczenia metotreksatem podskórnym mogą zostać zakwalifikowani chorzy z MIZS zakwalifikowani do programu, u których wystąpiły objawy nietolerancji uniemożliwiające stosowanie metotreksatu doustnego w dawce wskazywanej w programie. Rozpoczęcie leczenia metotreksatem podskórnym musi zostać poprawnie zarejestrowane w ewidencji RZS i MIZS (nie wymaga kwalifikacji przez Zespół Koordynujący do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych).

B. Określenie czasu leczenia w programie

Kryteria kwalifikacji i wyłączenia z programu określają czas leczenia w programie.

C. Kryteria wyłączenia z programu i przeciwwskazania do kwalifikacji do programu:

- 1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;
- 2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;
- 3) niewydolność serca (powyżej II klasy NYHA);
- 4) przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek, w okresie ostatnich 3 miesięcy;
- 5) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane
Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, oporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenia gruźlicze;

| | | |
|--|--|--|
| <p>6) udokumentowana infekcja HIV;</p> <p>7) nasilenie się objawów niewydolności serca, płuc, nerek, wątroby w trakcie leczenia;</p> <p>8) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;</p> <p>9) stwierdzone stany przedrakowe, choroby nowotworowe, także rozpoznane i wyleczone w okresie ostatnich 5 lat;</p> <p>10) stwierdzenie aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub innej przewlekłej choroby wątroby;</p> <p>11) źle kontrolowane nadciśnienie tętnicze.</p> | | |
|--|--|--|

Załącznik B.34.

LECZENIE REUMATOIDALNEGO ZAPALENIA STAWÓW (RZS) I MŁODZIEŃCZEGO IDIOPATYCZNEGO ZAPALENIA STAWÓW (MIZS) O DUŻEJ I UMIARKOWANEJ AKTYWNOŚCI CHOROBY LEKAMI MODYFIKUJĄCYMI PRZEBIEG CHOROBY (ICD-10 M 05, M 06, M 08)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji:</p> <p>Do leczenia metotreksatem podskórnym kwalifikują się pacjenci z RZS o dużej oraz umiarkowanej aktywności choroby (określonej jako DAS 28 większy niż 3,2 lub DAS większy niż 2,4), u których wystąpiły działania niepożądane w trakcie terapii metotreksatem podawanym doustnie, uniemożliwiające dalsze jego stosowanie tą drogą, ale niestanowiące przeciwwskazania do jego zastosowania.</p> <p>W przypadku MIZS do programu kwalifikuje się pacjentów, u których wystąpiły objawy nietolerancji uniemożliwiające stosowanie metotreksatu doustnego.</p> <p>Włączenie pacjenta do programu nie wymaga kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Warunkiem kwalifikacji pacjenta do programu jest dokonanie poprawnej rejestracji w aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Do programu włączani są także świadczeniobiorcy z innymi niż wyżej wymienione postaci RZS i MIZS (niezależnie od wartości DAS 28 i DAS):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) z zapaleniem błony naczyniowej oka, 2) z postacią uogólnioną (Zespół Stilla), 3) z RZS powikłanym krioglobulinemią, 4) z postacią skąpostawową rozszerzającą się i przetrwałą ponad 6 miesięcy | <p>W przypadku RZS metotreksat jest podawany podskórnym w dawce do 25 mg na tydzień.</p> <p>W przypadku MIZS metotreksat jest podawany podskórnym w dawce 10 mg do 20 mg na m² powierzchni ciała na tydzień (maks. dawka 25 mg na tydzień).</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi; 2) płytki krwi (PLT); 3) odczyn Biernackiego (OB); 4) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 5) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 6) stężenie kreatyniny w surowicy; 7) obecność antygenu HBs; 8) przeciwciała anty-HCV; 9) obecność antygenu wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo). <p>Badania wymienione w pkt 7-9 należy wykonać w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przed kwalifikacją.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) po każdym 90 dniach (+/- 14 dni) od podania pierwszej dawki należy oznaczyć: <ol style="list-style-type: none"> a) morfologię krwi, b) OB, c) poziom transaminaz w surowicy; 2) w przypadku zaostrzenia aktywności choroby należy oznaczyć wartość DAS lub DAS 28. |

- u których wystąpiła nietolerancja leku podawanego doustnie.

2. Określenie czasu leczenia w programie

Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia (kryteriami zakończenia terapii metotreksatem podskórnym).

3. Wyłączenie z programu

Do programu nie można kwalifikować świadczeniobiorców w następujących przypadkach:

- 1) stwierdzenie ciąży, okres karmienia;
- 2) nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą;
- 3) świeżo przebyte infekcje, takie jak zapalenie wątroby, płuc, odmiedniczkowe zapalenie nerek;
- 4) przebyte zakażenia oportunistyczne w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywne infekcje spowodowane Cytomegalowirusem, Pneumocystis carini, odporne na leki atypowych mykobakterii, zakażenie gruźlicze;
- 5) udokumentowana infekcja HIV;
- 6) wystąpienie pancytopenii i niedokrwistości aplastycznej;
- 7) obecność aktywnej choroby alkoholowej, poalkoholowego uszkodzenia wątroby lub obecność każdej innej przewlekłej choroby wątroby.

4. Kryteria zakończenia terapii metotreksatem podskórnym - wystąpienie działań niepożądanych:

- 1) uszkodzenie wątroby (wzrost aktywności transaminaz trzykrotnie powyżej normy);
- 2) zaburzenia hematologiczne, które mogą być związane z leczeniem;
- 3) narastające włóknienie płuc;
- 4) inne ciężkie powikłania związane z leczeniem.

Załącznik B.35.

LECZENIE ŁUSZCZYCOWEGO ZAPALENIA STAWÓW O PRZEBIEGU AGRESYWNYM (ŁZS) (ICD-10 L 40.5, M 07.1, M 07.2, M 07.3)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>A. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu lub do terapii alternatywnej przewidzianej w programie przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej), zostają przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się:</p> <p>3.1 pacjentów z ustalonym rozpoznaniem ŁZS: Rozpoznanie ŁZS należy postawić na podstawie kryteriów Benneta lub CASPAR, jak poniżej: 1) kryteria diagnostyczne Benneta: a) kryterium obowiązkowe: wywiad dotyczący łuszczycy (skóry lub paznokci) potwierdzonej klinicznie i skojarzonej z bólem oraz obrzękiem tkanek miękkich lub ograniczeniem</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) adalimumab należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 40 mg co 2 tygodnie; 2) etanercept należy podawać 50 mg podskórnym co tydzień; 3) infliksymab należy podać w dawce 5 mg/kg masy ciała w infuzji dożylną trwającą ponad 2 godziny w dniach 0, 14 i 42, a następnie co 8 tygodni. <p>Terapia powyższymi lekami nie wymaga równoczesnego podawania metotreksatu, ale u chorego z zapaleniem stawów obwodowych zalecane jest równoczesne jego podawanie w pełnej dawce 25 mg/tydzień, jeżeli nie ma przeciwwskazań.</p> <p>2. Kryteria i warunki zamiany terapii na inną:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pacjent, będący w trakcie terapii u którego występuje adekwatna odpowiedź na prowadzoną terapię, nie ma zamienianej aktualnie stosowanej terapii na inną; 2) terapia będzie prowadzona w najniższej, zarejestrowanej jako skuteczna dawce; 3) każdorazowo zmiana terapii wymaga uzyskania zgody Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych; 4) zamiana terapii na terapię inną częsteczką inhibitora TNF alfa, wymienioną w przedmiotowym terapeutycznym programie | <p>1. Badania przy kwalifikacji:</p> <p>W ramach kwalifikacji chorego do udziału w programie konieczne jest wykonanie następujących badań:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) morfologia krwi; 2) płytki krwi (PLT); 3) odczyn Biernackiego (OB); 4) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 5) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 6) stężenie kreatyniny w surowicy; 7) białko C-reaktywne; 8) badanie ogólne moczu; 9) próba tuberkulinowa lub Quantiferone; 10) obecność czynnika reumatoidalnego (RF); 11) obecność antygeny HBs; 12) przeciwciała HCV; 13) obecność antygeny wirusa HIV (HIV Ag/ Ab Combo). <p>Ponadto wymagane jest wykonanie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) RTG klatki piersiowej do 3 miesięcy przed kwalifikacją; 2) wskazane jest, aby u kobiet przed rozpoczęciem terapii było wykonane badanie ginekologiczne, mammograficzne lub badanie USG piersi. <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Chory powinien być poddany dokładnej ocenie skuteczności zastosowanego leczenia po 12 tygodniach od rozpoczęcia</p> |

| | | |
|--|---|---|
| <p>ruchomości co najmniej 1 stawu, utrzymującym się 6 tygodni lub dłużej,</p> <p>b) kryteria dodatkowe:</p> <ul style="list-style-type: none"> – obecność zapalenia stawów międzypaliczkowych dalszych (wykluczenie: guzki Heberdena i Boucharda), – obecność palców „kielbaskowatych” głównie stóp (dactylitis), – niesymetryczne zapalenie stawów rąk i stóp, – nieobecność guzków reumatoidalnych, – negatywne testy na obecność czynnika reumatoidalnego w surowicy, – nadżerkowe zapalenie małych stawów, stwierdzone w badaniu radiologicznym, bez cech współistniejącej osteoporozy (wykluczenie nadżerkowej postaci choroby zwyrodnieniowej rąk), – obecność zapalenia stawów krzyżowo-biodrowych lub syndesmotów (czasami nietypowych) lub kostnienia okołokręgosłupowego stwierdzona w badaniu radiologicznym. <p>Chorobę można rozpoznać, gdy spełnione jest kryterium obowiązkowe i co najmniej 3 kryteria dodatkowe.</p> <p>2) kryteria klasyfikacyjne łuszczycowego zapalenia stawów wg CASPAR Należy ustalić zapalną chorobę stawów oraz co najmniej 3 punkty według systemu punktacji przedstawionej poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) łuszczyca obecnie – 2 pkt, b) wywiad łuszczycy – 1 pkt, c) wywiad rodzinny w kierunku łuszczycy – 1 pkt, d) dactylitis – 1 pkt, e) brak czynnika reumatoidalnego – 1 pkt, f) dystrofia paznokci – 1 pkt. <p>3.2 pacjentów z aktywną i ciężką postacią choroby:</p> <p>W przypadku zajęcia stawów obwodowych aktywna i ciężka postać choroby musi być udokumentowana podczas dwóch różnych wizyt w odstępie przynajmniej 4 tygodni przy stabilnym leczeniu, po zastosowaniu w terapii przynajmniej dwóch leków modyfikujących podawanych przez okres 4 miesięcy (lub krócej, jeżeli wystąpiły objawy nietolerancji) w monoterapii lub kombinacji, jak w punkcie 3.3.1.</p> <p>Należy aktywną postać choroby udokumentować tak, aby były spełnione wszystkie z 5 wymienionych poniżej kryteriów zapalenia stawów lub wszystkie kryteria dermatologiczne:</p> <p>1) kryteria reumatologiczne:</p> | <p>zdrowotnym, możliwa jest tylko w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z sytuacji wymienionych poniżej:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wystąpienia nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze, b) wystąpienia istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po podaniu innej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa, c) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniami klinicznym pacjenta, przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego. | <p>leczenia inhibitorami TNF-alfa.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) W przypadku zajęcia stawów obwodowych za adekwatną odpowiedź na leczenie należy uznać zmniejszenie przynajmniej o 30% liczby bolesnych lub obrzękniętych stawów oraz zmniejszenie w skali Likerta o przynajmniej jedną jednostkę w aktywności choroby według chorego, jak i lekarza. 2) U chorych z zajęciem kręgosłupa za adekwatną odpowiedź na leczenie, której uzyskanie warunkuje powodzenie dalszej kontynuacji terapii, należy uznać zmniejszenie wartości BASDAI przynajmniej o 50% w stosunku do wartości sprzed leczenia lub o 2 jednostki, ale wówczas jego wartość nie może być wyższa jak 4. 3) Analizie należy również poddać w tym okresie: <ul style="list-style-type: none"> a) zmniejszenie wskaźników ostrej fazy we krwi (OB i CRP), b) dane z badania przedmiotowego. <p>Wizyty monitorujące powinny się odbywać co 12 tygodni. W celu monitorowania leczenia świadczeniodawca jest zobowiązany wykonać następujące czynności:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) pobranie krwi i wykonanie następujących badań: morfologia krwi, OB, CRP, Aspat, Alat; 2) wywiad lekarski dotyczący efektów leczenia i możliwych działań niepożądanych; 3) badanie przedmiotowe lekarskie; 4) na podstawie oceny skuteczności i bezpieczeństwa podawanego leku zadecydowanie o kontynuowaniu lub wyłączeniu chorego z programu. |
|--|---|---|

- a) co najmniej 5 obrzękniętych stawów z 66 możliwych – w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 4 tygodni ,
- b) co najmniej 5 tkliwych stawów z 68 możliwych – w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 4 tygodni,
- c) ogólna ocena przez pacjenta aktywności choroby jest określana jako aktywność w dużym lub bardzo dużym stopniu, co odpowiada wartości 4 lub 5 w pięciostopniowej skali Likerta,
- d) ogólna ocena przez lekarza aktywności choroby jest określana jako aktywność w dużym lub bardzo dużym stopniu, co odpowiada wartości 4 lub 5 w pięciostopniowej skali Likerta,
- e) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która wynosi więcej niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; taka ocena powinna być dokonana również przez lekarza-eksperta doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób zapalnych stawów;
- w tej ocenie ekspert opiera się w szczególności na takich parametrach, jak: czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużego stężenia we krwi CRP lub wartości OB, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, liczbą podawanych uprzednio leków modyfikujących i możliwością alternatywnych sposobów leczenia, współistnieniem zapalenia przyczepów ścięgniastych, początkiem choroby przed 16 rokiem życia, statusem aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zaostrzeniami zapalenia błony naczyniowej, oceną progresji zmian radiologicznych oraz dawki podawanych jednocześnie kortykosteroidów; ocenę należy przeprowadzić jednokrotnie po drugim pomiarze liczby bolesnych i obrzękniętych stawów oraz aktywności choroby wg pacjenta i lekarza opiekującego się chorym;

2) kryteria dermatologiczne:

- a) zmiany skórne spełniające kryteria; PASI więcej niż 10,
- b) DLQI więcej niż 10,
- c) BSA więcej niż 10,
- d) przy spełnieniu wszystkich powyższych kryteriów dermatologicznych wymagane dla kwalifikacji jest zajęcie 3 stawów; ocena powinna być dokonana przez lekarza-eksperta doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób zapalnych stawów,
- e) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która wynosi więcej niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; taka ocena powinna być dokonana również przez lekarza -

eksperta doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób zapalnych stawów;

w tej ocenie ekspert opiera się w szczególności na takich parametrach, jak: czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużego stężenia we krwi CRP lub wartości OB, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, liczbą podawanych uprzednio leków modyfikujących i możliwością alternatywnych sposobów leczenia, współistnieniem zapalenia przyczepów ścięgniastych, początkiem choroby przed 16 rokiem życia, statusem aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zaostrzeniami zapalenia błony naczyniowej, oceną progresji zmian radiologicznych oraz dawki podawanych jednocześnie kortykosteroidów; ocenę należy przeprowadzić jednokrotnie po drugim pomiarze liczby bolesnych i obrzękniętych stawów oraz aktywności choroby według pacjenta i lekarza opiekującego się chorym.

W przypadku dominującego obrazu zajęcia stawów osiowych należy kwalifikować chorych z:

- 1) zajęciem stawów krzyżowo – biodrowych odpowiadającym nowojorskim kryteriom rozpoznania zeszywniającego zapalenia stawów kręgosłupa;
- 2) aktywną i ciężką postacią choroby, która musi być udokumentowana podczas dwóch różnych wizyt w odstępie przynajmniej 12 tygodni, przy braku zmian leczenia w tym okresie; należy wykazać niezadowolającą odpowiedź na co najmniej 2 tradycyjnie stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane przez przynajmniej 3 miesiące każdy (nie podawane w tym samym czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce; aby wykazać, że odpowiedź na tradycyjnie stosowane leki jest niezadowolająca należy udokumentować nieskuteczność leczenia objawów zajęcia kręgosłupa, stawów obwodowych lub przyczepów ścięgniastych.

Aktywną postać choroby należy udokumentować tak, aby były spełnione wszystkie 3 poniższe kryteria:

- 1) wartość BASDAI większy lub równy 4 – w dwukrotnych pomiarach, w odstępie co najmniej 12 tygodni;
- 2) ból kręgosłupa na wizualnej skali 10 cm większy lub równy 4 cm - w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 12 tygodni;

- 3) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która powinna być większa niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; takiej oceny dokonuje również lekarz doświadczony w leczeniu blokerami TNF – alfa chorób zapalnych stawów; w tej ocenie ekspert powinien oprzeć się w szczególności na takich parametrach, jak czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużych stężeń CRP we krwi lub wartości OB, kielbaskowatych palców stóp, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ograniczenia ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zajęcia stawów obwodowych, początku choroby przed 16 rokiem życia, wartością BASFI, BASMI, statusu aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zapaleniami błony naczyniowej, oceny postępujących zmian radiologicznych ze zwróceniem uwagi na ankylozę kręgosłupa, czy skostnienie mostków międzykręgowych; ocena ta powinna być przeprowadzona jednokrotnie po drugim pomiarze wartości BASDAI i VAS bólu kręgosłupa.

3.3 pacjentów z niezadawalającą odpowiedzią na tradycyjnie stosowane leki

Aby wykazać, że odpowiedź na tradycyjnie stosowane leki modyfikujące jest niezadawalająca, należy udokumentować nieskuteczność takiego leczenia:

- 1) w zakresie stawów obwodowych - nieskuteczność leczenia stwierdza się, gdy podawano co najmniej dwa leki modyfikujące chorobę, w tym metotreksat, z których każdy powinien być stosowany przez przynajmniej 4 miesiące w monoterapii lub w przypadku leczenia kombinowanego nie krócej niż 6 miesięcy, chyba że wystąpiły objawy nietolerancji; rekomendowane dawki dla metotreksatu wynoszą 25 mg jeden raz w tygodniu, sulfasalazyny 3 g/dobę, leflunomidu 20 mg jeden raz dziennie, a cyklosporyny od 3-5mg/kg m.c./dobę;
- 2) w przypadku dominującego obrazu zajęcia stawów osiowych - jako nieskuteczność leczenia przyjmuje się niezadawalającą odpowiedź na co najmniej 2 tradycyjnie stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane przez przynajmniej 3 miesiące każdy (nie podawane w tym samym czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce.

W przypadku kobiet wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń w okresie do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu.

B. Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach

farmakoterapii niestandardowej, świadczenia za zgodą płatnika lub w ramach jednorodnych grup pacjentów

Do programu włączani są również chorzy, którzy uprzednio byli już leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej lub według świadczeń za zgodą płatnika, lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) częsteczkami leków - inhibitorów TNF alfa, pod warunkiem, że spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli terapia ta była nieprzerwana do momentu wejścia w życie programu i wykazano w tym czasie skuteczność podawanego leku, wtedy terapia powinna być realizowana z wykorzystaniem tej samej cząsteczki leku z grupy inhibitorów TNF alfa.

W przypadku wystąpienia przerwy w leczeniu trwającej dłużej niż 12 tygodni, a krótszej niż 26 tygodni, należy u chorego wykonać jedynie badania pozwalające na określenie bezpieczeństwa podawanego leku oraz parametry aktywności i ciężkości choroby zgodnie z warunkami zawartymi w podrozdziale aktywna i ciężka postać choroby (punkt A.3.2 – kryteria kwalifikacji) i określić, czy chory spełnia nadal warunki udziału w programie terapeutycznym. Terapia jest realizowana lekiem stosowanym uprzednio, jeżeli był skuteczny.

Jeżeli przerwa była dłuższa niż 26 tygodni chory wymaga ponownej kwalifikacji do programu.

C. Kryteria niepozwalające na włączenie do programu ze względu na bezpieczeństwo

Do programu nie można kwalifikować chorych w następujących przypadkach (przeciwwskazania bezwzględne):

- 1) okresu ciąży i laktacji;
- 2) aktywnego zakażenia (ostrego lub przewlekłego) bakteryjnego, wirusowego, grzybiczego lub pasożytniczego (szczególnie gruźlicy, infekcji wirusem HIV lub przewlekłego zapalenia wątroby typu B);
- 3) przebycia zakażenia oportunistycznego w okresie ostatnich 2 miesięcy (np. półpasiec), aktywnej infekcji cytomegalowirusem, Pneumocystis carinii;
- 4) infekcyjnego zapalenia stawu w okresie ostatnich 12 miesięcy;
- 5) zakażenia endoprotezy w okresie ostatnich 12 miesięcy lub w nieokreślonym czasie, jeżeli sztuczny staw nie został wymieniony;
- 6) ciężkiej niewydolności krążenia (klasa III lub IV wg NYHA);
- 7) udokumentowanego zespołu demielinizacyjnego lub w przypadkach wystąpienia objawów przypominających ten zespół;
- 8) przebycia w okresie ostatnich 5 lat chorób nowotworowych, w tym raków litych i układu krwiotwórczego lub chłonnego z możliwością progresji choroby lub jej wznowy.

Względnymi przeciwwskazaniami do stosowania leków - inhibitorów TNF alfa, w

których podawanie tych leków jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych, są:

- 1) okoliczności związane z dużym ryzykiem zakażenia;
- 2) przewlekłe owrzodzenia podudzi;
- 3) wcześniej przebyta gruźlica - w okresie ostatnich 12 miesięcy lub niedawny kontakt z osobą chorą na gruźlicę;
- 4) cewnik w drogach moczowych utrzymywany na stałe;
- 5) u chorych, u których w okresie ostatnich 12 miesięcy występowały nawracające infekcje w wywiadzie (co najmniej 4); należy zwrócić uwagę na infekcje dróg moczowych, zatok i zębopochodne;
- 6) źle kontrolowana cukrzyca;
- 7) przewlekła obturacyjna choroba płuc;
- 8) przebycie w okresie dłuższym niż 5 lat choroby nowotworowej, leczonej skutecznie i która uważana jest za wyleczoną;
- 9) zmiany przednowotworowe, w tym polipy jelita grubego, pęcherza moczowego, dysplazji szyjki macicy, mielodysplazji;
- 10) duże miano przeciwciał przeciwwjadrowych, w tym dodatnie miano przeciwno natywnemu DNA.

U chorych leczonych inhibitorami TNF alfa należy liczyć się z możliwością uaktywnienia przebytej wcześniej gruźlicy. W grupie chorych z przebytym kiedykolwiek w przeszłości procesem gruźliczym lub wówczas, gdy podejmowane jest profilaktyczne leczenie tuberkulostatykami, należy rozważyć wykonanie kontrolnego badania klatki piersiowej po 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia inhibitorami TNF alfa.

Leczenie inhibitorami TNF alfa kobiet w okresie przed menopauzą powinno być prowadzone, gdy jest stosowana przez nie skuteczna antykoncepcja.

D. Kryteria zakończenia udziału w programie

W przypadku zajęcia stawów obwodowych:

- 1) nie uzyskano u chorego adekwatnej dobrej odpowiedzi na leczenie po 12 tygodniach leczenia (zgodnie z pkt 2 – monitorowanie leczenia);
- 2) jeżeli u chorego w trakcie zaplanowanych wizyt co 12 tygodni stwierdza się w następujących po sobie dwóch badaniach kontrolnych (w odstępie nie dłuższym niż 3 miesiące) ponowne zwiększenie któregokolwiek z czterech parametrów (liczby bolesnych, obrzękniętych stawów, aktywności choroby wg chorego i lekarza) tak, że chory ponownie nie spełnia warunków poprawy określonych w punkcie 2 - monitorowania leczenia;

3) uzyskaniu przez chorego małej aktywności choroby wyrażonej 50% zmniejszeniem czterech mierzonych parametrów (liczby bolesnych, obrzękniętych stawów, aktywności choroby według chorego i lekarza), utrzymującej się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy;

4) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- a) reakcja alergiczna na lek,
- b) zakażenie o ciężkim przebiegu,
- c) objawy niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby (nie związanych z amyloidozą),
- d) pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna
- e) stwierdzenie choroby nowotworowej,
- f) zespołu toczniopodobnego,
- g) wystąpienia innych objawów wymienionych poprzednio jako bezwzględne przeciwwskazania.

W przypadku zajęcia stawów osiowych:

1) nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 12 tygodniach leczenia (zgodnie z pkt 2 – monitorowanie leczenia);

2) jeżeli w trakcie zaplanowanych wizyt po każdym, dwóch kolejnych okresach 12 tygodniowych stwierdza się nieutrzymanie kryteriów zgodnych z definicją adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia jest przerywana i pacjent kończy udział w programie;

3) uzyskaniu przez chorego małej aktywności choroby wyrażonej wartością BASDAI mniejszą niż 3, która będzie utrzymywała się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy;

4) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:

- a) reakcja alergiczna na lek,
- b) zakażenie o ciężkim przebiegu,
- c) objawy niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby (nie związanych z amyloidozą),
- d) pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,
- e) stwierdzenie choroby nowotworowej,
- f) zespołu toczniopodobnego,
- g) wystąpienia innych objawów wymienionych poprzednio jako

bezwzględne przeciwwskazania.

E. Kryteria kontynuacji programu terapii biologicznej lub zamiany jednej cząsteczki inhibitora TNF alfa na inną:

Po 9-12 miesiącach terapii inhibitorami TNF alfa i uzyskaniu przez chorego małej aktywności choroby:

a) wyrażonej 50% zmniejszeniem czterech mierzonych parametrów (liczby bolesnych, obrzękniętych stawów, aktywności choroby według chorego i lekarza), utrzymującej się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy w przypadku zapalenia stawów obwodowych

lub

b) wyrażonej wartością BASDAI mniejszym niż 3 utrzymującym się dłużej niż przez okres 6 miesięcy w przypadku zapalenia stawów osiowych

- leczenie należy odstawić.

W przypadku pacjenta, u którego stwierdzono nietolerancję na lek - inhibitor TNF alfa, od którego rozpoczęto leczenie, można rozważyć zastosowanie innego inhibitora TNF alfa wskazanego jako terapia alternatywna, ale jest to możliwe wyłącznie w przypadku udokumentowania uzyskania adekwatnej odpowiedzi na lek, który spowodował nietolerancję oraz nie utracenia jej po kolejnych 12 tygodniowych okresach oceny wyników leczenia. Wymagane jest też udokumentowanie dokonania zgłoszenia działania niepożądanego zastosowanego leku, które spowodowało zaprzestanie jego stosowania.

Nie należy zamieniać jednego leku - inhibitora TNF alfa na drugi w przypadku braku skuteczności pierwszego.

F . Kryteria ponownego włączenia do programu

Pacjent, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami, z powodu uzyskania małej aktywności choroby i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono zaostrzenie choroby o 30% w każdym z kryteriów podanych w punkcie 2 – monitorowanie leczenia w stosunku do stanu chorego na wizycie kończącej leczenie w programie w przypadku dominującego zajęcia stawów obwodowych,
lub pacjent, który spełnia kryteria włączenia do programu w przypadku dominującego

| | | |
|--|--|--|
| <p>zajęcia stawów osiowych, jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji. Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało małą aktywność choroby.</p> | | |
|--|--|--|

Załącznik B.36.

LECZENIE INHIBITORAMI TNF ALFA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z CIĘŻKĄ, AKTYWNĄ POSTACIĄ ZESZTYWNIAJĄCEGO ZAPALENIA STAWÓW KRĘGOSŁUPA (ZZSK) (ICD-10 M 45)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|--|--|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Kryteria kwalifikacji:</p> <p>1. Pacjent jest kwalifikowany do programu i kolejnych linii leczenia biologicznego przewidzianych przez program przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych kwalifikuje do programu pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>2. Wymagane dane pacjentów zgłoszonych do kwalifikacji, w tym zakodowane dane osobowe (wskazane w aplikacji komputerowej) oraz dane opisujące stan kliniczny (wymienione w opisie programu i powtórzone w aplikacji komputerowej) muszą zostać przekazane do Zespołu Koordynacyjnego do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych za pośrednictwem aplikacji komputerowej wskazanej przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Finansowanie zastosowania substancji czynnych wymienionych w opisie programu następuje po dokonaniu kwalifikacji przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>3. Do programu kwalifikuje się pacjentów z:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpoznaniem ZZSK ustalonym na podstawie zmodyfikowanych kryteriów nowojorskich; 2) aktywną i ciężką postacią choroby, która musi być udokumentowana dwukrotnie w odstępie przynajmniej 12 tygodni, przy braku zmian leczenia w tym okresie, którzy wykazują niezadowolającą odpowiedź na co najmniej dwa tradycyjnie | <p>Adalimumab należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 40 mg co 2 tygodnie.</p> <p>Etanercept należy podawać we wstrzyknięciu podskórnym w dawce 50 mg co tydzień.</p> <p>Infliksymab należy podawać w dawce 5 mg/kg masy ciała w infuzji dożylniej trwającej ponad 2 godziny w dniach 0, 14 i 42, a następnie co 8 tygodni.</p> <p>Kryteria i warunki zamiany terapii na inną</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. U pacjenta będącego w trakcie terapii przy użyciu cząsteczki leku - inhibitora TNF-alfa u którego występuje adekwatna odpowiedź na leczenie nie dokonuje się zmiany terapii. 2. Zmiana terapii każdorazowo wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zespołu Koordynującego. 3. Zmiana terapii na inną, wymienioną w programie, możliwa jest tylko w następujących sytuacjach: <ol style="list-style-type: none"> 1) wystąpienia nadwrażliwości na aktywną cząsteczkę leku biologicznego lub substancje pomocnicze; 2) wystąpienia istotnych działań niepożądanych związanych z podaniem aktywnej cząsteczki leku biologicznego, których uniknięcie jest możliwe oraz potwierdzone naukowo po | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) oznaczenie antygeny HLA B27 kiedykolwiek w przeszłości; 2) morfologia krwi; 3) płytki krwi (PLT); 4) odczyn Biernackiego (OB); 5) aminotransferaza asparaginianowa (AspAT); 6) aminotransferaza alaninowa (AlAT); 7) stężenie kreatyniny w surowicy; 8) białko C-reaktywne; 9) badanie ogólne moczu; 10) próba tuberkulinowa lub Quantiferone; 11) obecność antygeny HBs; 12) przeciwciała HCV; 13) obecność antygeny wirusa HIV (HIV Ag/Ab Combo) – po uzyskaniu zgody pacjenta; 14) stężenie elektrolitów w surowicy. <p>Ponadto wymagane jest wykonanie przed kwalifikacją do programu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rtg klatki piersiowej (maksymalnie do 3 miesięcy przed kwalifikacją); 2) EKG z opisem; 3) badanie stawów krzyżowo-biodrowych, które potwierdza rozpoznanie ZZSK; 4) opcjonalnie wykonanie rezonansu magnetycznego lub tomografii stawów |

| | | |
|---|---|--|
| <p>stosowane leki niesteroidowe przeciwzapalne, stosowane przez co najmniej 3 miesiące (niepodawane w tym samym czasie), w maksymalnej rekomendowanej lub tolerowanej przez chorego dawce; aby wykazać, że odpowiedź na tradycyjnie stosowane leki jest niezadowalająca należy udokumentować nieskuteczność leczenia objawów zajęcia kręgosłupa lub stawów obwodowych, lub przyczepów ścięgniastych.</p> <p>Aktywną postać choroby należy udokumentować tak, aby były spełnione wszystkie 3 poniższe kryteria:</p> <ol style="list-style-type: none">1) wartość BASDAI (Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index) większy lub równy 4 – w dwukrotnych pomiarach, w odstępie co najmniej 12 tygodni;2) ból kręgosłupa na wizualnej skali 10 cm większy lub równy 4 cm - w dwukrotnych pomiarach w odstępie przynajmniej 12 tygodni;3) ogólna ocena stanu choroby (aktywności, ciężkości i dalszej prognozy choroby oraz aktywności zawodowej), która powinna być większa niż 5 cm na skali od 0 do 10 cm; taka ocena powinna być dokonana również przez drugiego lekarza doświadczonego w leczeniu inhibitorami TNF alfa chorób z kręgu spondyloartropatii zapalnych; w tej ocenie ekspert powinien oprzeć się w szczególności na takich parametrach, jak czynniki ryzyka szybkiej progresji choroby, ze szczególnym uwzględnieniem zapalenia stawu biodrowego, dużych stężeń CRP we krwi lub wartości OB, kielbaskowatych palców stóp, słabej skuteczności niesteroidowych leków przeciwzapalnych, ograniczenia ruchomości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, zajęcia stawów obwodowych, początku choroby przed 16 rokiem życia, wartością BASFI, BASMI, statusu aktywności zawodowej, występowaniem powikłań narządowych, w tym wtórnej amyloidozy potwierdzonej badaniem biopsyjnym tkanki tłuszczowej, zajęciem narządu wzroku z częstymi zapaleniami błony naczyniowej, oceny postępujących zmian radiologicznych ze zwróceniem uwagi na ankylozę kręgosłupa czy skostnienie mostków międzykręgowych; ocena ta powinna być przeprowadzona jednokrotnie po drugim pomiarze wartości | <p>podaniu innej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa;</p> <ol style="list-style-type: none">3) stwierdzenie innych, potwierdzonych badaniem pacjenta, przeciwwskazań do podawania aktywnej cząsteczki leku biologicznego. | <p>krzyżowo-biodrowych jeżeli wynik RTG stawów krzyżowo-biodrowych jest niejednoznaczny a objawy kliniczne wskazują na ich zajęcie;</p> <ol style="list-style-type: none">5) wskazane wykonanie u kobiet przed rozpoczęciem terapii badania ginekologicznego, mammograficznego lub badania USG piersi. <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>Pacjenta poddaje się dokładnej ocenie skuteczności zastosowanego leczenia po 12 tygodniach od rozpoczęcia leczenia inhibitorami TNF alfa, celem ustalenia, czy została osiągnięta adekwatna odpowiedź na leczenie.</p> <p>Za adekwatną odpowiedź na leczenie, której uzyskanie warunkuje powodzenie dalszej kontynuacji terapii, należy uznać zmniejszenie wartości BASDAI przynajmniej o 50% w stosunku do wartości sprzed leczenia lub o 2 cm oraz zmniejszenie bólu kręgosłupa na skali VAS o co najmniej 2 cm.</p> <p>Wizyty monitorujące mają się odbywać po każdym kolejnych 12 tygodniach.</p> <p>W celu monitorowania leczenia świadczeniodawca jest obowiązany wykonać następujące czynności:</p> <ol style="list-style-type: none">1) badanie morfologii z rozmazem, OB, CRP, AspAT, AlAT;2) wypełnienie przez pacjenta skali VAS bólu kręgosłupa i kwestionariusza BASDAI oraz obliczenie przez lekarza wartości BASDAI. |
|---|---|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>BASDAI i VAS bólu kręgosłupa.</p> <p>Kryteria kwalifikacji do programu pacjentów z ZZSK leczonych uprzednio w ramach farmakoterapii niestandardowej, świadczeń za zgodą płatnika lub w ramach jednorodnych grup pacjentów:</p> <p>Do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy uprzednio byli już leczeni w ramach farmakoterapii niestandardowej, świadczeń za zgodą płatnika lub w ramach hospitalizacji według jednorodnych grup pacjentów (JGP) cząsteczkami leków - inhibitorów TNF alfa. Jeżeli terapia ta była nieprzerwana i trwała dłużej niż 12 tygodni oraz wykazano w tym czasie wystąpienie i utrzymanie adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia powinna być realizowana z wykorzystaniem tej samej cząsteczki leku - inhibitora TNF alfa.</p> <p>W przypadku wystąpienia przerwy w leczeniu trwającej dłużej niż 12 tygodni, a krótszej niż 26 tygodni, należy u pacjenta wykonać badania pozwalające na określenie bezpieczeństwa podawanego leku oraz parametry aktywności i ciężkości choroby zgodnie z warunkami dotyczącymi aktywnej i ciężkiej postaci choroby i określić, czy u pacjenta wystąpiła i utrzymała się adekwatna odpowiedź na leczenie oraz czy spełnia nadal warunki udziału w programie.</p> <p>Kontynuacja terapii w tym przypadku powinna odbywać się z zastosowaniem leku wskazanego przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.</p> <p>Kryteria ponownej kwalifikacji do programu pacjentów z ZZSK:</p> <p>Świadczeniobiorca, u którego zaprzestano podawania leku wymienionego w programie i zastosowanego zgodnie z jego zapisami z powodu uzyskania niskiej aktywności choroby lub remisji i u którego w trakcie badania kontrolnego stwierdzono nawrót choroby (wzrost BASDAI do wartości większej lub równej 4), jest włączany do leczenia w ramach programu bez wstępnej kwalifikacji. Pacjent jest włączany do ponownego leczenia lekiem, którego zastosowanie wywołało niski poziom aktywności choroby lub remisję.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie.</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o</p> | | |
|---|--|--|

wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.

3. Wyłączenie z leczenia

Kryteria stanowiące przeciwwskazania do kwalifikacji do programu:

1) przeciwwskazania bezwzględne:

- a) okres ciąży i laktacji,
- b) aktywne zakażenie (ostre lub przewlekłe) bakteryjne, wirusowe, grzybicze lub pasożytnicze (szczególnie gruźlica, infekcji wirusem HIV lub przewlekłego zapalenia wątroby typu B),
- c) przebycia zakażenia oportunistycznego w okresie ostatnich 2 miesięcy, aktywnej infekcji Cytomegalowirusem, Pneumocystis carinii,
- d) infekcyjnego zapalenia stawu w okresie ostatnich 12 miesięcy,
- e) zakażenia endoprotezy w okresie ostatnich 12 miesięcy lub w nieokreślonym czasie, jeżeli sztuczny staw nie został wymieniony,
- f) ciężkiej niewydolności krążenia (klasa III lub IV według NYHA),
- g) udokumentowanego zespołu demielinizacyjnego lub w przypadkach wystąpienia objawów przypominających ten zespół,
- h) przebycia w okresie ostatnich 5 lat chorób nowotworowych, w tym raków litych i układu krwiotwórczego lub chłonnego z możliwością progresji choroby lub jej wznowy;

2) przeciwwskazania względne do stosowania leków - inhibitorów TNF alfa, w których ich podawanie jest obarczone dużym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych:

- a) okoliczności związane z dużym ryzykiem zakażenia:
 - przewlekłe owrzodzenia podudzi,
 - wcześniej przebyta gruźlica - w okresie ostatnich 12 miesięcy lub niedawny kontakt z osobą chorą na gruźlicę,
 - cewnik w drogach moczowych utrzymywany na stałe,
 - nawracające infekcje (co najmniej 4) w okresie ostatnich 12 miesięcy, w szczególności infekcje dróg moczowych, zatok i zębopochodne,
 - źle kontrolowana cukrzyca,
 - przewlekła obturacyjna choroba płuc,

- b) przebycie w okresie dłuższym niż 5 lat choroby nowotworowej, leczonej skutecznie i która uważana jest za wyleczoną,
- c) zmiany przednowotworowe, w tym polipy jelita grubego pęcherza moczowego, dysplazji szyjki macicy, mielodysplazji.
- d) wysokie miano przeciwciał przeciwnuklearycznych, w tym dodatnie miano przeciwko natywnemu DNA.

U świadczeniobiorców leczonych inhibitorami TNF alfa należy liczyć się z możliwością uaktywnienia przebytej wcześniej gruźlicy. W grupie świadczeniobiorców z przebyłym kiedykolwiek w przeszłości procesem gruźliczym lub wówczas, gdy podejmowane jest profilaktyczne leczenie tuberkulostatykami, należy rozważyć wykonanie kontrolnego badania klatki piersiowej po 4 miesiącach od rozpoczęcia leczenia inhibitorami TNF alfa.

Leczenie inhibitorami TNF alfa kobiet w okresie przed menopauzą powinno być prowadzone, gdy stosowana jest przez nie skuteczna antykoncepcja. Wymagana jest zgoda na świadomą kontrolę urodzeń do 6 miesięcy po zastosowaniu ostatniej dawki etanerceptu, infliximabu i adalimumabu.

3) kryteria zakończenia udziału w programie terapii biologicznej:

- a) nie uzyskano adekwatnej odpowiedzi na leczenie po pierwszych 12 tygodniach leczenia (zgodnie z definicją),
- b) stwierdzenie w trakcie zaplanowanych wizyt po każdym dwóch kolejnych okresach 12 tygodniowych nieutrzymania kryteriów zgodnych z definicją adekwatnej odpowiedzi na leczenie, terapia jest przerywana i świadczeniobiorca kończy udział w programie,
- c) uzyskanie przez świadczeniobiorcę małej aktywności choroby wyrażonej wartością BASDAI < 3, która będzie utrzymywała się nieprzerwanie przez okres 6 miesięcy,
- d) wystąpienie działań niepożądanych, takich jak:
 - reakcja alergiczna na lek,
 - zakażenie o ciężkim przebiegu,
 - objawy niewydolności serca, płuc, nerek i wątroby (niezwiązanych z amyloidozą),
 - pancytopenia i niedokrwistość aplastyczna,
 - stwierdzenie choroby nowotworowej,

| | | |
|---|--|--|
| e) wystąpienie innych objawów wymienionych w pkt 1 jako bezwzględne przeciwwskazania. | | |
|---|--|--|

Załącznik B.37.

LECZENIE NIEDOKRWISTOŚCI W PRZEBIEGU PRZEWLEKŁEJ NIWYDOLNOŚCI NEREK (ICD-10 N 18)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|---|--|--|
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) niedokrwistość ze stężeniem hemoglobiny poniżej 11 g/dl. (hematokryt poniżej 30%) pod warunkiem wykluczenia innych przyczyn, takich jak niedobór żelaza, krwawienia, hemoliza, zakażenia, ciężka nadczynność przytarczyc, zatrucie glinem i inne;</p> <p>2) upośledzenie funkcji nerek wykazane w badaniu GFR poniżej 30ml/min. u świadczeniobiorców bez cukrzycy, a u świadczeniobiorców z cukrzycą mniej niż 45 ml/min.;</p> <p>3) wiek powyżej 3 roku życia w przypadku preparatów zawierających alkohol benzylowy;</p> <p>4) wiek powyżej 18 roku życia w przypadku glikolu metoksy polietylenowego epoetyny beta;</p> <p>5) świadczeniobiorcy niedializowani.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie: Czas leczenia w programie określa lekarz na podstawie kryteriów wyłączenia z programu.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) nadwrażliwość na składniki stosowanego preparatu;</p> <p>2) ciąża;</p> <p>3) wystąpienie ciężkiego, opornego na leczenie nadciśnienia tętniczego;</p> <p>4) schyłkowa niewydolność nerek.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>1.1 Darbepoetyna alfa 10 µg - 1 raz w tygodniu, 20 µg - 1 raz na dwa tygodnie, 40 µg - 1 raz w miesiącu iv. lub sc. (średnia dawka tygodniowa/ dwutygodniowa/ miesięczna dla świadczeniobiorcy w danym ośrodku prowadzącym program).</p> <p>1.2 Erytropoetyna beta 2.000 j.m. raz na tydzień lub 2.000 j.m. raz na 2 tygodnie sc. (średnia dawka tygodniowa/ dwutygodniowa dla świadczeniobiorcy w danym ośrodku prowadzącym program).</p> <p>1.3 Epoetyna alfa średnia dawka tygodniowa dla świadczeniobiorcy w danym ośrodku prowadzącym program 2.000 j.m. 1 raz w tygodniu, iv. lub sc. (sc. w przypadku braku stałego dostępu do żyły).</p> <p>1.4 Epoetyna beta (PEG) 50 µg sc. / miesiąc (średnia dawka miesięczna). Leczenie trwa do czasu rozwinięcia schyłkowej niewydolności nerek .</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>1) poziom hemoglobiny;</p> <p>2) hematokryt;</p> <p>3) GFR;</p> <p>4) TSAT;</p> <p>5) CRP.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia Badania przeprowadzane co 2 tygodnie, po rozpoczęciu terapii oraz w okresie dostosowywania dawki:</p> <p>1) poziom hemoglobiny;</p> <p>2) hematokryt.</p> <p>Po osiągnięciu stabilnego docelowego Hb/Ht oznaczane raz w miesiącu:</p> <p>1) poziom hemoglobiny;</p> <p>2) hematokryt.</p> |

Załącznik B.38.

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN) (ICD-10 N 18)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|--|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia..</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <p>1) klirens kreatyniny niższy aniżeli 75 ml/1,73m²/min.;</p> <p>2) wysokość ciała dziecka poniżej -1,88 odchylenia standardowego (SDS), dla płci i wieku metrykalnego lub tempo wzrastania SDS poniżej - 2.0;</p> <p>3) opóźniony wiek szkieletowy, poniżej 12,5 lat dla chłopców i poniżej 11,5 lat dla dziewczynek, według norm Greulich'a i Pyle;</p> <p>4) wykluczenie innych przyczyn niskorosłości.</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <p>1) inna aniżeli PNN przyczyna niskorosłości;</p> <p>2) zaburzenia przemian węglowodanowych;</p> <p>3) choroba nowotworowa,</p> <p>4) niezadowalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała świadczeniobiorcy leczonego hormonem wzrostu poniżej 3cm na rok (nie dotyczy dziewcząt z wiekiem kostnym powyżej 14 lat oraz chłopców z wiekiem kostnym powyżej 16 lat);</p> <p>5) osiągnięcie wieku kostnego powyżej 16 lat przez dziewczynkę i powyżej 18 lat przez chłopca.</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,33 mg-0,37 mg (1,0-1,1 IU)/kg masy ciała/tydzień.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać: pomiar stężenia IGF-1, badania densytometryczne, RTG stawów biodrowych.</p> <p>Badania wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z przewlekłą niewydolnością nerek.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach</p> <p>- pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>2.2 Przed rozpoczęciem leczenia</p> <p>1) badania densytometryczne;</p> <p>2) RTG stawów biodrowych.</p> <p>2.3 Co 90 dni</p> <p>1) krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja</p> <p>2) konsultacja dietetyka (w ramach hospitalizacji).</p> <p>2.4 Co 30 dni (pomiar 4 krotnie wykonywane w ośrodku uprawnionym do terapii hormonem wzrostu, a pozostałe pomiary (8 razy) wykonywane w ośrodkach terenowych; w 3 - 4 stadium choroby co 30 dni, a w 2 stadium choroby co 90 dni)</p> <p>a) jonogram w surowicy krwi (Na+, K+, Ca++, Ca zjonizowany+, P-);</p> <p>b) morfologia krwi z rozmazem;</p> <p>c) gazometria.</p> <p>2.5 Co 365 dni</p> <p>1) w uzasadnionych przypadkach: badania densytometryczne; RTG stawów biodrowych;</p> <p>2) przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (u około 2-3% leczonych), u innych w zależności od potrzeb:</p> <p>a) konsultacja ortopedyczna,</p> |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>b) RTG/USG stawów biodrowych, c) TK z kontrastem stawów biodrowych.</p> <p>2.6 Co 90 dni (dotyczy dzieci z wadami układu moczowo-płciowego (około 10%), u innych w zależności od potrzeb):</p> <ol style="list-style-type: none">1) konsultacja urologiczna;2) USG jamy brzusznej. <p>2.7 Co 365 dni (dotyczy dzieci z wadami układu moczowo-płciowego (około 10%) u innych w zależności od potrzeb)</p> <ol style="list-style-type: none">1) badanie ogólne i posiew moczu <p>2.8 Co 30 dni (w 3 - 4 stadium choroby co 30 dni, a w 2 stadium choroby co 90 dni)</p> <ol style="list-style-type: none">1) pomiar stężenia parathormonu (intact PTH)2) pomiar fosfatazy alkalicznej;3) proteinogram;4) pomiar stężenia glukozy we krwi;5) pomiar stężenia kreatyniny;6) pomiar stężenia mocznika. <p>2.9 Co 365 dni</p> <ol style="list-style-type: none">1) pomiar stężeń triglicerydów;2) pomiar stężeń całkowitego cholesterolu;3) pomiar stężenia IGF-1;4) RTG śródreżca z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego) <p>2.10 Co 365 dni (w zależności od potrzeb):</p> <ol style="list-style-type: none">1) konsultacja okulistyczna;2) konsultacja ortopedyczna;3) cystouretografia <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania wykonywane według standardów monitorowania terapii hormonem wzrostu świadczeniobiorców PNN.</p> |
|--|--|--|

Załącznik B.39.

LECZENIE WTÓRNEJ NADCZYNNOSCI PRZYTARCZYC U PACJENTÓW HEMODIALIZOWANYCH**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|--|---|--|
| <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wtórna nadczynność przytarczyc; 2) długotrwałe leczenie hemodializą z powodu schyłkowej niewydolności nerek; 3) przeciwwskazania do zastosowania innych opcji terapeutycznych (np. dla paratyroidektomii); 4) stężenie iPTH > 500pg/ml. <p>2. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) osiągnięcie normalizacji wskaźników gospodarki wapniowo - fosforanowej zgodnie z aktualnymi wytycznymi K/DOQI (Kidney Disease Outcome Quality Initiative - US National Kidney Foundation); 2) przeszczepienie nerki; 3) nadwrażliwość na lek lub substancje pomocnicze; 4) wystąpienie ciężkich działań niepożądanych w trakcie leczenia. | <p>Zalecana dawka początkowa cynakalcetu u dorosłych wynosi 30 mg raz na dobę. Dawkę cynakalcetu można zwiększać co 2-4 tygodnie aż do maksymalnej dawki 180 mg raz na dobę w celu osiągnięcia pożądanego stężenia hormonu przytarczyc (PTH) u dializowanych pacjentów, czyli 150-300pg/ml (15,9-31,8 pmol/l) w teście intact PTH (iPTH).</p> | <p>1. Monitorowanie leczenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stężenie iPTH - przez 1-4 tygodnie od rozpoczęcia leczenia następnie kontrola co 1-3 miesiące; 2) stężenie w surowicy Ca x P; 3) stężenie wapnia w surowicy; 4) stężenie fosforu w surowicy. |

(ICD-10 N 25.8)

Załącznik B.40.

PROFILAKTYKA ZAKAŻEŃ WIRUSEM RS U DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ CHOROBA PŁUC (DYSPLAZJĄ OSKRZELOWO-PŁUCNĄ) (ICD-10 P 27.1)

| ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO | | |
|---|---|---|
| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
| <p>1. Kryteria kwalifikacji do leczenia paliwizumabem: Do udziału w programie kwalifikację zatwierdza konsultant wojewódzki w dziedzinie neonatologii w porozumieniu z konsultantem krajowym na podstawie dokumentacji z ośrodka. Kryterium definiujące przewlekłą chorobę płuc (dysplazję oskrzelowo-płucną): - tlenoterapia ze stężeniem > 21 % do co najmniej 28 doby życia oraz spełnienie dodatkowych kryteriów: -nieukończony 3 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS (data urodzenia od 1 sierpnia do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 30 tygodnia lub -nieukończony 6 miesiąc życia w chwili rozpoczęcia sezonu zakażeń wirusem RS (data urodzenia od 1 maja do zakończenia sezonu zakażeń) oraz wiek ciążowy poniżej 28 tygodnia</p> <p>2. Określenie czasu leczenia w programie Lek podawany jest co miesiąc - 5 razy podczas sezonu spodziewanego zagrożenia zakażeniem RSV (od listopada do kwietnia).</p> <p>3. Kryteria wyłączenia z programu 1) objawy nadwrażliwości na paliwizumab lub jakiegokolwiek ze składników występujących w preparacie; 2) objawy nadwrażliwości na inne humanizowane przeciwciała monoklonalne; 3) brak zgody pacjenta.</p> | <p>1. Dawkowanie paliwizumabu Lek podawany jest w dawce 15mg/kg masy ciała raz w miesiącu.</p> | <p>1.Badania przy kwalifikacji Kliniczne potwierdzenie dysplazji oskrzelowo-płucnej</p> <p>2.Monitorowanie leczenia: Dzieci zakwalifikowane do leczenia paliwizumabem wymagają comiesięcznych wizyt w ośrodku realizującym program do końca sezonu zakażeń RSV celem oceny stanu ogólnego pacjenta (wywiad i badanie fizykalne) przed otrzymaniem kolejnej dawki leki. Dane dotyczące monitorowania pacjenta należy przesyłać do konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii po zakończeniu sezonu zakażeń.</p> |

Załącznik B.41.

LECZENIE DZIECI Z ZESPOŁEM PRADER – WILLI (ICD-10 Q 87.1)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|---|---|--|
| <p>Do Programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozpoznanie zespołu Prader-Willi, na podstawie cech klinicznych potwierdzonych badaniem genetycznym; 2) wiek poniżej 18 roku życia, optymalnie między 2. a 4. rokiem życia; 3) dojrzałość szkieletu (wiek kostny), poniżej 16 lat u dziewcząt i poniżej 18 lat u chłopców; 4) stan odżywienia, mierzony wielkością wskaźnika BMI, poniżej 97 centyla dla płci i wieku (wymagany co najmniej 6 miesięczny okres obserwacji w ośrodku prowadzącym terapię hormonem wzrostu); 5) wyrównane przemiany węglowodanowe, wymagane wykonanie testu obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii; 6) konsultacja laryngologiczna, z uwagi na możliwość nasilenia lub wystąpienia nocnych bezdechów; 7) wprowadzone leczenie dietetyczne i rehabilitacja (wymagany co najmniej 6 miesięczny okres obserwacji w ośrodku prowadzącym terapię hormonem wzrostu); 8) inne badania i konsultacje zależne od stanu świadczeniobiorcy i innych powikłań choroby zasadniczej lub innych towarzyszących PWS chorób; 9) brak innych przeciwwskazań do stosowania hormonu wzrostu. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,18 - 0,47 mg/kg/tydzień (0,54 - 1,4 IU/kg/tydzień).</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać: pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>Badania laboratoryjne i inne według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z zespołem Prader-Willi.</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach: pomiar stężenia IGF-1</p> <p>2.2 Po 30 dniach</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konsultacja laryngologiczna, 2) po 90 dniach kolejne konsultacje laryngologiczne w zależności od potrzeb <p>2.3 Co 90 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja 2) konsultacja dietetyka (w ramach hospitalizacji); 3) konsultacja rehabilitanta (w ramach hospitalizacji). <p>2.4 Co 180 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pomiar stężenia glukozy we krwi; 2) pomiar stężenia TSH; 3) pomiar stężenia fT₄. 4) jonogram w surowicy krwi. <p>Okresowej oceny skuteczności terapii dokonuje lekarz niezaangażowany w leczenie pacjenta z zespołem Prader-Willi.</p> <p>2.5 Co 365 dni (dotyczy dziewcząt)</p> <p>- konsultacja przez ginekologa zajmującego się dziećmi (dotyczy dziewcząt powyżej 10 roku życia, a u dziewcząt poniżej 10 roku życia - w zależności od potrzeb).</p> |

| | | |
|---|--|--|
| <p>1) brak współpracy z rodzicami lub świadczeniobiorcą;</p> <p>2) wystąpienie powikłań zastosowanej terapii;</p> <p>3) zaniechanie systematycznego leczenia rehabilitacyjnego lub dietetycznego;</p> <p>4) narastanie otyłości, pomimo stosowania kompleksowego leczenia hormonem wzrostu, leczenia dietetycznego i rehabilitacji (wzrost wielkości wskaźnika BMI w odniesieniu do norm populacyjnych przyjętych dla wieku i płci o 2 odchylenia standardowe lub więcej);</p> <p>5) pojawienie się lub nasilenie nocnych bezdechów;</p> <p>6) cukrzyca lub ujawnienie się tej choroby w czasie prowadzonej terapii hormonem wzrostu.</p> | | <p>2.6 Co 365 dni (dotyczy dzieci z wadami układu sercowo-naczyniowego - około 5%):</p> <p>1) konsultacja kardiologiczna;</p> <p>2) USG serca.</p> <p>2.7 Co 365 dni (dotyczy dzieci powyżej 7 roku życia - około 1/3 leczonych, a u dzieci poniżej 7 roku życia - ocena rozwoju psychoruchowego)</p> <p>- konsultacja psychologa z oceną rozwoju intelektualnego</p> <p>2.8 Co 365 dni</p> <p>1) pomiar stężeń triglicerydów;</p> <p>2) pomiar stężeń całkowitego cholesterolu;</p> <p>3) pomiar frakcji HDL cholesterolu;</p> <p>4) pomiar frakcji LDL cholesterolu;</p> <p>5) pomiar odsetka glikowanej hemoglobiny (HbA_{1c});</p> <p>6) test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii;</p> <p>7) pomiar stężenia IGF-1;</p> <p>8) konsultacja laryngologiczna;</p> <p>9) konsultacja ortopedyczna;</p> <p>10) RTG śródreżcza z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego).</p> <p>2.9 Co 365 dni (dotyczy świadczeniobiorców z zaburzeniami pokwitania - około 10-15% leczonych)</p> <p>- test stymulacji wydzielania gonadotropin, z użyciem preparatu do stymulacji wydzielania gonadotropin (4 pomiary stężeń FSH i LH oraz 1 pomiar stężeń estrogenów i androgenów).</p> <p>2.10 Co 365 dni (w przypadku nawracających zakażeń układu moczowego lub wad wrodzonych tego układu)</p> <p>1) konsultacja nefrologiczna;</p> <p>2) konsultacja urologiczna; 3) USG jamy brzusznej;</p> <p>4) badanie ogólne i posiew moczu.</p> <p>2.11 Co 365 dni - przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (2-3% leczonych):</p> <p>1) konsultacja ortopedyczna;</p> <p>2) RTG lub USG stawów biodrowych, poszerzone o TK lub MRI stawów biodrowych;</p> |
|---|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>2.12 Co 365 dni (w przypadku wystąpienia objawów pseudo tumor cerebri - około 3-5% leczonych):</p> <ol style="list-style-type: none">1) konsultacja okulistyczna;2) konsultacja neurologiczna;3) obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI). <p>Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>Badania według standardów monitorowania świadczeniobiorców z zespołem Prader-Willi.</p> |
|--|--|---|

Załącznik B.42.

LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z ZESPOŁEM TURNERA (ZT) (ICD-10 Q 96)**ZAKRES ŚWIADCZENIA GWARANTOWANEGO**

| ŚWIADCZENIOBIORCY I SUBSTANCJE CZYNNIE STOSOWANE W RAMACH PROGRAMU | SCHEMAT DAWKOWANIA LEKÓW W PROGRAMIE | KWALIFIKACJA I BADANIA DIAGNOSTYCZNE WYKONYWANE W RAMACH PROGRAMU |
|---|---|--|
| <p>Do programu kwalifikuje Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.</p> <p>1. Kryteria kwalifikacji</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) stygmaty Zespołu Turnera; 2) niskorosłość, tj. wysokość ciała poniżej 3 centyla dla wieku, na siatkach centylogowych dla populacji dziewcząt polskich; 3) upośledzone tempo wzrastania, poniżej -1 SD w odniesieniu do tempa wzrastania populacji dziewcząt polskich (wymagany co najmniej 6. miesięczny okres obserwacji w ośrodku uprawnionym do terapii hormonem wzrostu), z określeniem przewidywanego wzrostu ostatecznego metodą Baley- Pineau; 4) opóźniony wiek kostny, oceniany metodą Greulich'a-Pyle; 5) wykluczenie innych, aniżeli ZT, przyczyn niskorosłości (niedokrwistość, niedoczynność tarczycy, zaburzenia wchłaniania i trawienia jelitowego, obciążenia dotyczące przebiegu ciąży i porodu, itp.); 6) inne nieprawidłowości, szczególnie nieprawidłowości anatomiczne układu sercowonaczyniowego i moczowo-płciowego; 7) konsultacja genetyczna, potwierdzona dodatnim wynikiem badania kariotypu. <p>2. Określenie czasu leczenia w programie</p> <p>Leczenie trwa do czasu podjęcia przez Zespół Koordynacyjny ds. Stosowania Hormonu Wzrostu lub lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu świadczeniobiorcy z programu, zgodnie z kryteriami wyłączenia.</p> <p>3. Kryteria wyłączenia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wystąpienie objawów złuszczenia główki kości udowej; | <p>1. Dawkowanie</p> <p>Somatotropina podawana codziennie wieczorem w dawce: 0,33 - 0,47 mg (1,0-1,4 IU)/kg m.c. /tydzień.</p> | <p>1. Badania przy kwalifikacji</p> <p>Przed rozpoczęciem leczenia należy wykonać pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>Badania laboratoryjne wykonywane według standardów diagnozowania świadczeniobiorców z zespołem Turnera (ZT).</p> <p>2. Monitorowanie leczenia</p> <p>2.1 Przed rozpoczęciem leczenia, po 90 dniach: pomiar stężenia IGF-1.</p> <p>2.2 Co 180 dni: pomiar stężenia glukozy we krwi i odsetka glikowanej hemoglobiny HbA_{1c} lub co 365 dni: test obciążenia glukozą z pomiarem glikemii i insulinemii.</p> <p>2.3 Co 90 dni</p> <p>- krótka 24- lub 48-godzinna hospitalizacja</p> <p>2.4 Co 180 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pomiar stężenia glukozy we krwi: pomiar stężenia TSH; pomiar stężenia fT₄; 2) jonogram w surowicy krwi. <p>2.5 Co 365 dni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) konsultacja przez ginekologa zajmującego się dziećmi (dotyczy przede wszystkim dziewcząt powyżej 10 roku życia (około 90%); 2) konsultacja kardiologiczna, USG serca (dotyczy dzieci z wadami układu sercowo-naczyniowego (około 5%)); 3) konsultacja nefrologiczna; konsultacja urologiczna; USG jamy brzusznej; badanie ogólne i posiew moczu (dzieci z wadami układu moczowo-płciowego (około |

| | | |
|--|--|--|
| <p>2) wystąpienie objawów pseudo-tumor cerebri; 3) wystąpienie lub ujawnienie się cukrzycy; 4) ujawnienie lub wznowa choroby rozrostowej; 5) osiągnięcie przez świadczeniobiorcę niewyróżniającej wysokości ciała, tj. wysokości ciała równej lub większej aniżeli 158 cm; 6) zakończenie procesów wzrastania (brak przyrostu wysokości ciała między dwiema kolejnymi wizytami przeprowadzonymi w odstępach 6 miesięcznych); 7) niezadawalający efekt leczenia, tj. przyrost wysokości ciała świadczeniobiorcy leczonego hormonem wzrostu poniżej 3 cm na rok; 8) osiągnięcie wieku kostnego powyżej 14 lat.</p> | | <p>10%)); 4) pomiar stężenia IGF-1; 5) RTG śródreżcza z bliższą przynasadą kości przedramienia (do oceny wieku kostnego); 6) przy podejrzeniu złuszczenia główki kości udowej (2-3% leczonych): konsultacja ortopedyczna; RTG lub USG stawów biodrowych, poszerzone o TK lub MRI stawów biodrowych; 7) w przypadku wystąpienia objawów pseudo tumor cerebri (około 3-5% leczonych): konsultacja okulistyczna; konsultacja neurologiczna; obrazowanie ośrodkowego układu nerwowego (TK z kontrastem lub MRI). Dane dotyczące monitorowania terapii należy co 12 miesięcy przysyłać na adres Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu oraz do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Badania wykonywane według standardów monitorowania terapii hormonem wzrostu świadczeniobiorców z ZT.</p> |
|--|--|--|

C. Leki, stosowane w ramach chemioterapii w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń oraz we wskazaniu określonym stanem klinicznym

| lp. | Substancja czynna | Nazwa, postać i dawka leku | Zawartość opakowania | Kod EAN lub inny kod odpowiadający kodowi EAN | Termin wejścia w życie decyzji | Okres obowiązywania decyzji | Grupa limitowa | Urządowa cena zbytu | Cena hurtowa brutto | Wysokość limitu finansowania | Oznaczenie załącznika zawierającego zakres wskazań objętych refundacją (wg ICD-10) | Poziom odpłatność | Wysokość dopłaty wliczeniowej |
|-----|----------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Acidum levofolinicum | Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 4 ml | 5909990648818 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 56,16 | 60,09 | 60,09 | C.0.01. | bezpłatne | 0 zł |
| 2 | Acidum levofolinicum | Levofolic, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 9 ml | 5909990648825 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 126,36 | 135,21 | 135,21 | C.0.01. | bezpłatne | 0 zł |
| 3 | Asparaginasum | Asparaginase 10000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 10000 j.m. | 5 fiol.s.subs. | 5909990945528 | 2012-01-01 | 2 lata | 1001.0, Asparaginasum | 1 933,20 | 2 068,52 | 2 068,52 | C.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 4 | Asparaginasum | Asparaginase 5000 medac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 5000 j.m. | 5 fiol.s.subs. | 5909990945429 | 2012-01-01 | 2 lata | 1001.0, Asparaginasum | 1 393,20 | 1 490,72 | 1 034,26 | C.1. | bezpłatne | 0 zł |
| 5 | Bicalutamidum | BICALUTAMIDE KABI, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (2 blist. po 14 szt.) | 5909990870950 | 2012-01-01 | 2 lata | 1002.0, Bicalutamidum | 16,20 | 17,33 | 17,33 | C.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 6 | Bicalutamidum | Bicalutamide Polpharma 50 mg, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990052981 | 2012-01-01 | 2 lata | 1002.0, Bicalutamidum | 98,28 | 105,16 | 105,16 | C.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 7 | Bicalutamidum | Bicalutamide Teva, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. (4 blist. po 7 szt.) | 5909990057436 | 2012-01-01 | 2 lata | 1002.0, Bicalutamidum | 67,44 | 72,16 | 72,16 | C.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 8 | Bicalutamidum | BICASTAD, tabl. powł., 50 mg | 28 tabl. | 5909990651368 | 2012-01-01 | 2 lata | 1002.0, Bicalutamidum | 27,22 | 29,13 | 29,13 | C.2. | bezpłatne | 0 zł |
| 9 | Bleomycini sulphas | Bleomedac, proszek do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 15000 IU/fiolka | 1 fiolka a 10 ml | 5909990946983 | 2012-07-01 | 2 lata | 1003.0, Bleomycinum | 97,20 | 104,00 | 104,00 | C.3. | bezpłatne | 0 zł |
| 10 | Busulfanum | Myleran, tabl. powł., 2 mg | 100 tabl. powł. | 5909990277926 | 2012-07-01 | 2 lata | 1101.0, Busulfanum | 1 105,92 | 1 183,33 | 1 183,33 | C.4. | bezpłatne | 0 zł |
| 11 | Calcii folinas | Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990885077 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 27,86 | 29,81 | 17,45 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 12 | Calcii folinas | Calcium folinate Actavis, roztwór do wstrzykiwań i infuzji, 10 mg/ml | 5 fiolek a 10 ml | 5909990885084 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 139,32 | 149,07 | 87,25 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 13 | Calcii folinas | Calcium folinate Hospira, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990425891 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 8,64 | 9,24 | 8,73 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 14 | Calcii folinas | Calcium folinate Hospira, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990425907 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 16,20 | 17,33 | 17,33 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 15 | Calcii folinas | Calcium folinate Hospira, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990425938 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 30,24 | 32,36 | 32,36 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 16 | Calcii folinas | Calcium folinate Hospira, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | 1 fiol. a 30 ml | 5909990425945 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 42,12 | 45,07 | 45,07 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 17 | Calcii folinas | Calcium folinate Hospira, roztwór do wstrzykiwań, 10 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990425952 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 73,44 | 78,58 | 78,58 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 18 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml | 1 fiol. a 35 ml | 5909990042043 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 48,82 | 52,24 | 52,24 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 19 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml | 1 fiol. a 60 ml | 5909990042050 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 72,04 | 77,08 | 77,08 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 20 | Calcii folinas | Calciumfolinat-Ebewe, roztwór do wstrzykiwań, 0,01 g/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990750412 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 101,60 | 108,71 | 108,71 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|----------------|---|------------------|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 21 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 10 fiol. | 5909990123421 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 69,12 | 73,96 | 17,45 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 22 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, proszek do sporz. dzienia roztworu do wstrzykiwa , 25 mg | 10 fiol. | 5909990123520 | 2012-07-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 77,76 | 83,20 | 43,63 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 23 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909991117511 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 21,06 | 22,53 | 17,45 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 24 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909991117528 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 36,72 | 39,29 | 34,90 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 25 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909991117566 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 90,72 | 97,07 | 87,25 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 26 | Calcii folinas | Leucovorin Ca Teva, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909991117597 | 2012-01-01 | 2 lata | 1093.0, pochodne i sole kwasu folinowego | 163,08 | 174,50 | 174,50 | C.0.02. | bezpłatne | 0 zł |
| 27 | Capecitabinum | Xeloda, tabl. powl., 150 mg | 60 tabl. | 5909990893416 | 2012-07-01 | 2 lata | 1006.0, Capecitabinum | 267,79 | 286,54 | 285,10 | C.5. | bezpłatne | 0 zł |
| 28 | Capecitabinum | Xeloda, tabl. powl., 500 mg | 120 tabl. | 5909990893515 | 2012-07-01 | 2 lata | 1006.0, Capecitabinum | 1 776,33 | 1 900,67 | 1 900,67 | C.5. | bezpłatne | 0 zł |
| 29 | Carboplatinum | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990450015 | 2012-07-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 22,68 | 24,27 | 20,80 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 30 | Carboplatinum | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 150 mg | 1 fiol. a 15 ml | 5909990450022 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 58,32 | 62,40 | 62,40 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 31 | Carboplatinum | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 450 mg | 1 fiol. a 45 ml | 5909990450039 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 168,48 | 180,27 | 180,27 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 32 | Carboplatinum | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 600 mg | 1 fiol. a 60 ml | 5909990662753 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 194,40 | 208,01 | 208,01 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 33 | Carboplatinum | Carboplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1000 mg | 1 fiol. a 100 ml | 5909990662760 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 270,00 | 288,90 | 288,90 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 34 | Carboplatinum | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 45 ml | 5909990787371 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 172,80 | 184,90 | 184,90 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 35 | Carboplatinum | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990787388 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 19,44 | 20,80 | 20,80 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 36 | Carboplatinum | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 15 ml | 5909990787395 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 37 | Carboplatinum | Carboplatin Actavis, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 60 ml | 5909990787401 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 216,00 | 231,12 | 231,12 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 38 | Carboplatinum | Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990477418 | 2012-07-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 24,84 | 26,58 | 20,80 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 39 | Carboplatinum | Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 15 ml | 5909990477425 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 41,91 | 44,84 | 44,84 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 40 | Carboplatinum | Carboplatin Pfizer, roztwór do wstrzykiwa , 10 mg/ml | 1 fiol. a 45 ml | 5909990477432 | 2012-01-01 | 2 lata | 1005.0, Carboplatinum | 102,29 | 109,45 | 109,45 | C.6. | bezpłatne | 0 zł |
| 41 | Chlorambucilum | Leukeran, tabl. powl., 2 mg | 25 tabl. | 5909990345618 | 2012-07-01 | 2 lata | 1099.0, Chlorambucilum | 259,20 | 277,34 | 277,34 | C.8. | bezpłatne | 0 zł |
| 42 | Ciclosporinum | Sandimmun , koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 50 mg/ml | 10 amp. a 1 ml | 5909990119813 | 2012-01-01 | 2 lata | 1007.0, Ciclosporinum | 140,40 | 150,23 | 150,23 | C.10. | bezpłatne | 0 zł |
| 43 | Cisplatinum | Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 20 ml | 5909990180813 | 2012-01-01 | 2 lata | 1008.0, Cisplatinum | 9,03 | 9,66 | 9,66 | C.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 44 | Cisplatinum | Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 25 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990180820 | 2012-01-01 | 2 lata | 1008.0, Cisplatinum | 21,60 | 23,11 | 23,11 | C.11. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------------|---|--|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 45 | Cisplatinum | Cisplatin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 100 ml | 5909990180837 | 2012-01-01 | 2 lata | 1008.0, Cisplatinum | 37,80 | 40,45 | 40,45 | C.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 46 | Cisplatinum | Cisplatin Teva, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990722600 | 2012-01-01 | 2 lata | 1008.0, Cisplatinum | 8,64 | 9,24 | 9,24 | C.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 47 | Cisplatinum | Cisplatin Teva, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990722631 | 2012-01-01 | 2 lata | 1008.0, Cisplatinum | 34,56 | 36,98 | 36,98 | C.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 48 | Cisplatinum | Cisplatin Teva, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990722648 | 2012-01-01 | 2 lata | 1008.0, Cisplatinum | 67,50 | 72,23 | 72,23 | C.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 49 | Cladribinum | BIODRIBIN, roztwór do infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990713417 | 2012-07-01 | 2 lata | 1009.0, Cladribinum | 232,20 | 248,45 | 248,45 | C.12. | bezpłatne | 0 zł |
| 50 | Cyclophosphamidum | Endoxan, dra etki, 50 mg | 50 dra . | 5909990240814 | 2012-01-01 | 2 lata | 1010.2, Cyclophosphamidum p.o. | 72,52 | 77,60 | 77,60 | C.13. | bezpłatne | 0 zł |
| 51 | Cyclophosphamidum | Endoxan, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 200 mg | 1 fiol.s.subs. | 5909990240913 | 2012-01-01 | 2 lata | 1010.1, Cyclophosphamidum inj. | 14,58 | 15,60 | 15,60 | C.13. | bezpłatne | 0 zł |
| 52 | Cyclophosphamidum | Endoxan, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1 g | 1 fiol.s.subs. | 5909990241019 | 2012-01-01 | 2 lata | 1010.1, Cyclophosphamidum inj. | 54,96 | 58,81 | 58,81 | C.13. | bezpłatne | 0 zł |
| 53 | Cytarabinum | Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 500 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990181216 | 2012-01-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 42,12 | 45,07 | 45,07 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 54 | Cytarabinum | Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 1000 mg | 1 fiol. a 20 ml | 5909990181223 | 2012-01-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 84,24 | 90,14 | 90,14 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 55 | Cytarabinum | Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 0,05 g/ml | 1 fiol. a 40 ml | 5909990624935 | 2012-01-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 168,48 | 180,27 | 180,27 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 56 | Cytarabinum | Alexan, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/5ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990640188 | 2012-01-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 8,42 | 9,01 | 9,01 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 57 | Cytarabinum | Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 100 mg | 1 amp. (+1 rozp.) | 5909990154715 | 2012-07-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 11,03 | 11,80 | 9,01 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 58 | Cytarabinum | Cytosar, proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 500 mg | 1 fiol.s.subs. (+ rozp.) | 5909990314515 | 2012-01-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 42,12 | 45,07 | 45,07 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 59 | Cytarabinum | Cytosar, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1 g | 1 fiol.s.subs. | 5909990314614 | 2012-01-01 | 2 lata | 1011.1, Cytarabinum | 84,24 | 90,14 | 90,14 | C.14. | bezpłatne | 0 zł |
| 60 | Cytarabinum | DepoCyt, zawiesina do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990219278 | 2012-07-01 | 2 lata | 1011.2, Cytarabinum depocyte | 6 318,00 | 6 760,26 | 6 760,26 | C.15. | bezpłatne | 0 zł |
| 61 | Dacarbazinum | DACARBAZIN TEVA, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 100 mg | 10 fiol. | 5909990466924 | 2012-07-01 | 2 lata | 1012.0, Dacarbazinum | 196,73 | 210,50 | 210,50 | C.16. | bezpłatne | 0 zł |
| 62 | Dacarbazinum | DACARBAZIN TEVA, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 200 mg | 10 fiol. | 5909990467020 | 2012-07-01 | 2 lata | 1012.0, Dacarbazinum | 310,07 | 331,77 | 331,77 | C.16. | bezpłatne | 0 zł |
| 63 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 10 mcg/0,4ml | 1 amp.-strz. a 0,4 ml (b/op/blist.) | 5909990007608 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoet - darbepoetyna | 68,04 | 72,80 | 72,80 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 64 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml | 1 wstrz. 1 ml | 5909990340330 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoet - darbepoetyna | 3 402,00 | 3 640,14 | 3 640,13 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 65 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 15 mcg/0,375ml | 1 amp.-strz. (z zab.igty(blist.)) 0,375 ml | 5909990738755 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoet - darbepoetyna | 102,06 | 109,20 | 109,20 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 66 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 20 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strz. (z zab.igty(blist.)) 0,5 ml | 5909990738779 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoet - darbepoetyna | 136,08 | 145,61 | 145,61 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 67 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 30 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. (z zab.igty(blist.)) 0,3 ml | 5909990738793 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoet - darbepoetyna | 204,12 | 218,41 | 218,41 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|----|--------------------|--|--|---------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 68 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 40 mcg/0,4ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,4 ml | 5909990738847 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 272,16 | 291,21 | 291,21 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 69 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 50 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml | 5909990738861 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 340,20 | 364,01 | 364,01 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 70 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 60 mcg/0,3ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,3 ml | 5909990738885 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 408,24 | 436,82 | 436,82 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 71 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 80 mcg/0,4ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,4 ml | 5909990738908 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 544,32 | 582,42 | 582,42 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 72 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 100 mcg/0,5 ml | 1 amp.-strz. (z zab.igly(blist.)) 0,5 ml | 5909990738939 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 680,40 | 728,03 | 728,03 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 73 | Darbepoetinum alfa | Aranesp, roztwór do wstrzykiwa , 500 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 1 ml | 5909990739035 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.1, czynniki stymuluj ce erytropoecz - darbepoetyna | 3 402,00 | 3 640,14 | 3 640,13 | C.0.03. | bezpłatne | 0 zł |
| 74 | Docetaxelum | Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 1 ml | 5909990810987 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 228,42 | 244,41 | 244,41 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 75 | Docetaxelum | Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 4 ml | 5909990810994 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 857,84 | 917,89 | 917,89 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 76 | Docetaxelum | Camitotic, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 7 ml | 5909990811007 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 2 247,70 | 2 405,04 | 2 405,04 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 77 | Docetaxelum | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg | 1 fiol. a 2 ml | 5909990777006 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 246,02 | 263,24 | 263,24 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 78 | Docetaxelum | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg | 1 fiol. a 8 ml | 5909990777020 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 997,27 | 1 067,08 | 1 067,08 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 79 | Docetaxelum | Docetaxel - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 160 mg | 1 fiol. a 16 ml | 5909990850280 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 1 053,97 | 1 127,75 | 1 127,75 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 80 | Docetaxelum | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml | 5909990786466 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 64,80 | 69,34 | 69,34 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 81 | Docetaxelum | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. á 8 ml | 5909990786473 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 259,20 | 277,34 | 277,34 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 82 | Docetaxelum | Docetaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 1 fiol. á 16 ml | 5909990786480 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 486,00 | 520,02 | 520,02 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 83 | Docetaxelum | Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml | 1 fiol. 0,5 ml + 1 fiol. rozp. 1,5 ml | 5909990744688 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 70,92 | 75,88 | 75,88 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 84 | Docetaxelum | Docetaxel TEVA, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml | 1 fiol. a 2 ml +1fiol. rozp. a 6 ml | 5909990744695 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 283,69 | 303,55 | 303,55 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 85 | Docetaxelum | Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/0,5ml | 1 fiol. a 0,5 ml (+ rozp.1,5 ml) | 5909990863662 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 97,98 | 104,84 | 104,84 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 86 | Docetaxelum | Taxegis, koncentrat i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do infuzji, 80 mg/2ml | 1 fiol. a 2 ml (+1fiol. rozp. a 6 ml) | 5909990863679 | 2012-07-01 | 2 lata | 1013.0, Docetaxelum | 538,92 | 576,64 | 576,64 | C.19. | bezpłatne | 0 zł |
| 87 | Doxorubicinum | Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990471010 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 10,93 | 11,70 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 88 | Doxorubicinum | Adriblastina PFS, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990471027 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 36,72 | 39,29 | 39,29 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|----------------------------|---|--|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|-------|-----------|------|
| 89 | Doxorubicinum | Adriblastina R.D., proszek i rozpuszczalnik do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol.liof. (+ rozp.5 ml) | 5909990235612 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 10,93 | 11,70 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 90 | Doxorubicinum | Adriblastina R.D., proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol.liof. | 5909990235711 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 36,72 | 39,29 | 39,29 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 91 | Doxorubicinum | BIORUBINA , proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990129515 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 8,96 | 9,59 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 92 | Doxorubicinum | BIORUBINA, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol. a 36 ml | 5909990842216 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 37,80 | 40,45 | 40,45 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 93 | Doxorubicinum | BIORUBINA , roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909991128517 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 8,96 | 9,59 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 94 | Doxorubicinum | BIORUBINA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 25 ml | 5909991128524 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 34,56 | 36,98 | 36,98 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 95 | Doxorubicinum | Caelyx, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990983018 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.3, Doxorubicinum liposomanum pegylatum | 1 836,00 | 1 964,52 | 1 964,52 | C.22. | bezpłatne | 0 zł |
| 96 | Doxorubicinum | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990429011 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 9,01 | 9,64 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 97 | Doxorubicinum | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 25 ml | 5909990429028 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 98 | Doxorubicinum | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990614837 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 99 | Doxorubicinum | Doxorubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 100 ml | 5909990614844 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 172,80 | 184,90 | 184,90 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 100 | Doxorubicinum | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990859405 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 16,09 | 17,22 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 101 | Doxorubicinum | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990859443 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 30,24 | 32,36 | 18,49 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 102 | Doxorubicinum | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990859474 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 38,88 | 41,60 | 41,60 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 103 | Doxorubicinum | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 75 ml | 5909990859481 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 103,68 | 110,94 | 110,94 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 104 | Doxorubicinum | Doxorubicin medac, roztwór do infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990859535 | 2012-01-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 138,24 | 147,92 | 147,92 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 105 | Doxorubicinum | Myocet, proszek, dyspersja i rozpuszczalnik do sporz. dziania koncentratu dyspersji do infuzji (proszek i składniki do sporz. dziania koncentratu dyspersji liposomalnej do infuzji), 50 mg | 2 zest. a 3 fiol. (1 proszek + 1 liposomy + 1 bufor), (2 zest. a 1 fiol. dla ka. dego z 3 komponentów) | 5909990213559 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.2, Doxorubicinum liposomanum nonpegylatum | 4 297,32 | 4 598,13 | 4 598,13 | C.21. | bezpłatne | 0 zł |
| 106 | Doxorubicinum | Xorucin, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol. | 5909990838103 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 24,06 | 25,74 | 9,25 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 107 | Doxorubicinum | Xorucin, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol. | 5909990838134 | 2012-07-01 | 2 lata | 1014.1, Doxorubicinum | 95,25 | 101,92 | 46,23 | C.20. | bezpłatne | 0 zł |
| 108 | Epirubicini hydrochloridum | BIOEPICYNA, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990129416 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 39,96 | 42,76 | 36,03 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 109 | Epirubicini hydrochloridum | BIOEPICYNA , proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 50 mg | 1 fiol. a 36 ml | 5909991114213 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 169,56 | 181,43 | 180,15 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|----------------------------|--|--------------------------|---------------|------------|--------|---|--------|--------|--------|---------|-----------|------|
| 110 | Epirubicini hydrochloridum | BIOEPICYNA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 5 ml | 590999114312 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 30,78 | 32,93 | 32,93 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 111 | Epirubicini hydrochloridum | BIOEPICYNA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 25 ml | 590999114329 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 141,48 | 151,38 | 151,38 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 112 | Epirubicini hydrochloridum | Epimedac, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990661497 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 43,20 | 46,22 | 36,03 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 113 | Epirubicini hydrochloridum | Epimedac, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990661503 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 64,80 | 69,34 | 69,34 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 114 | Epirubicini hydrochloridum | Epimedac, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990661527 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 97,20 | 104,00 | 104,00 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 115 | Epirubicini hydrochloridum | Epimedac, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990661534 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 189,00 | 202,23 | 202,23 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 116 | Epirubicini hydrochloridum | Epimedac, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990661541 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 378,00 | 404,46 | 404,46 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 117 | Epirubicini hydrochloridum | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909991104313 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 41,19 | 44,07 | 36,03 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 118 | Epirubicini hydrochloridum | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 25 ml | 5909991104320 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 205,95 | 220,37 | 180,15 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 119 | Epirubicini hydrochloridum | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909991104337 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 410,40 | 439,13 | 360,30 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 120 | Epirubicini hydrochloridum | Epirubicin - Ebewe, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 100 ml | 5909991104344 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 810,00 | 866,70 | 720,60 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 121 | Epirubicini hydrochloridum | EPIRUBICIN KABI, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990779864 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 122 | Epirubicini hydrochloridum | EPIRUBICIN KABI, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990779871 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 334,80 | 358,24 | 358,24 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 123 | Epirubicini hydrochloridum | Episindan, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990645275 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 33,67 | 36,03 | 36,03 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 124 | Epirubicini hydrochloridum | Episindan, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990645299 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 181,15 | 193,83 | 180,15 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 125 | Epirubicini hydrochloridum | Episindan, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990645305 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 199,15 | 213,09 | 213,09 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 126 | Epirubicini hydrochloridum | Episindan, roztwór do wstrzykiwa, 2 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990645312 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 370,83 | 396,79 | 396,79 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 127 | Epirubicini hydrochloridum | Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml (szklana) | 5909990752416 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 32,40 | 34,67 | 34,67 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 128 | Epirubicini hydrochloridum | Farmorubicin PFS, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 2 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990752515 | 2012-01-01 | 2 lata | 1015.0, Epirubicinum | 138,24 | 147,92 | 147,92 | C.23. | bezpłatne | 0 zł |
| 129 | Epoetinum alfa | Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 1000 j.m./0,5 ml | 6 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990654062 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 130 | Epoetinum alfa | Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 2000 j.m./ml | 6 amp.-strz. a 1 ml | 5909990654086 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 172,80 | 184,90 | 184,90 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 131 | Epoetinum alfa | Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 3000 j.m./0,3 ml | 6 amp.-strz. a 0,3 ml | 5909990654109 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 259,20 | 277,34 | 277,34 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 132 | Epoetinum alfa | Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 4000 j.m./0,4 ml | 6 amp.-strz. a 0,4 ml | 5909990654123 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 345,60 | 369,79 | 369,79 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 133 | Epoetinum alfa | Abseamed, roztwór do wstrzykiwa w ampułko-strzykawce, 5000 j.m./0,5 ml | 6 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990654147 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 432,00 | 462,24 | 462,24 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|----------------|--|-----------------------|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 134 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 6000 j.m./0,6 ml | 6 amp.-strz. a 0,6 ml | 5909990654161 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 518,40 | 554,69 | 554,69 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 135 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 8000 j.m./0,8 ml | 6 amp.-strz. a 0,8 ml | 5909990654185 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 691,20 | 739,58 | 739,58 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 136 | Epoetinum alfa | Abseamed , roztwór do wstrzykiwa w ampulkostrzykawce, 10000 j.m./1 ml | 6 amp.-strz. a 1 ml | 5909990654208 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 864,00 | 924,48 | 924,48 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 137 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 1000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072378 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 172,80 | 184,90 | 92,45 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 138 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 2000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072392 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 345,60 | 369,79 | 184,90 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 139 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 3000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072439 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 518,40 | 554,69 | 277,34 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 140 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 4000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072453 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 691,20 | 739,58 | 369,79 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 141 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 5000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072477 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 864,00 | 924,48 | 462,24 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 142 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 6000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072491 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 036,80 | 1 109,38 | 554,69 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 143 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 8000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072538 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 382,40 | 1 479,17 | 739,58 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 144 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 10000 j.m. | 6 amp-strz. | 5909990072552 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 728,00 | 1 848,96 | 924,48 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 145 | Epoetinum alfa | Binocrit, roztwór do wstrzykiwa , 40000 j.m./ml | 6 amp-strz. a 1 ml | 5909990845170 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 6 912,00 | 7 395,84 | 3 697,90 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 146 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 2000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 0,5 ml | 5909990670956 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 183,12 | 195,94 | 92,45 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 147 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 4000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 0,5 ml | 5909990670963 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 366,25 | 391,89 | 184,90 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 148 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml | 6 amp.-strz 0,3 ml | 5909990670970 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 549,37 | 587,83 | 277,34 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 149 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 0,4 ml | 5909990670987 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 732,50 | 783,78 | 369,79 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 150 | Epoetinum alfa | Epex, roztwór do wstrzykiwa podskórnych i do ylnych, 10000 j.m./ml | 6 amp.-strz a 1 ml | 5909990671045 | 2012-01-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 831,25 | 1 959,44 | 924,48 | C.0.04. | bezpłatne | 0 zł |
| 151 | Epoetinum beta | NeoRecomon, roztwór do wstrzykiwa , 30000 j.m. | 1 amp.-strz. | 5909990007134 | 2012-07-01 | 2 lata | 1043.0, czynniki stymuluj ce erytropoez | 1 081,40 | 1 157,10 | 462,24 | C.0.05. | bezpłatne | 0 zł |
| 152 | Etoposidum | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 2,5 ml | 5909990776016 | 2012-07-01 | 2 lata | 1016.0, Etoposidum | 15,12 | 16,18 | 11,56 | C.24. | bezpłatne | 0 zł |
| 153 | Etoposidum | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990776115 | 2012-07-01 | 2 lata | 1016.0, Etoposidum | 21,60 | 23,11 | 23,11 | C.24. | bezpłatne | 0 zł |
| 154 | Etoposidum | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990776214 | 2012-07-01 | 2 lata | 1016.0, Etoposidum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.24. | bezpłatne | 0 zł |
| 155 | Etoposidum | Etoposid - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 400 mg | 1 fiol. a 20 ml | 5909990776313 | 2012-07-01 | 2 lata | 1016.0, Etoposidum | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.24. | bezpłatne | 0 zł |
| 156 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 300 mcg/ml | 5 fiol. a 1 ml | 5909990312214 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 607,50 | 650,03 | 650,03 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 157 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 600 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990830510 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 121,50 | 130,01 | 130,01 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|----------------------|--|---|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 158 | Filgrastimum | Neupogen, roztwór do wstrzykiwa , 960 mcg/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990830619 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 194,40 | 208,01 | 208,01 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 159 | Filgrastimum | Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 12 mln j./0,2 ml | 5 amp.-strz. á 0,2 ml | 5909990904747 | 2012-07-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 486,00 | 520,02 | 260,02 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 160 | Filgrastimum | Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 30 mln j.m./0,5 ml | 5 amp.-strz. á 0,5 ml | 5909990904778 | 2012-07-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 621,00 | 664,47 | 650,05 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 161 | Filgrastimum | Nivestim, roztwór do wstrzykiwa lub infuzji, 48 mln j.m./0,5 ml | 5 amp.-strz. á 0,5 ml | 5909990904808 | 2012-07-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 1 026,00 | 1 097,82 | 1 040,08 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 162 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 30 mln j.m./0,5ml | 1 amp.-strz a 0,5 ml z oslon zabezpieczaj c igl | 5909990739387 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 130,13 | 139,24 | 130,01 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 163 | Filgrastimum | Tevagrastim, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 48 mln j.m./0,8ml | 1 amp.-strz a 0,8 ml z oslon zabezpieczaj c igl | 5909990739448 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 214,79 | 229,83 | 208,02 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 164 | Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 60 mln j/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990687763 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 127,44 | 136,36 | 130,01 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 165 | Filgrastimum | Zarzio, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 96 mln j/ml | 1 amp.-strz. a 0,5 ml | 5909990687800 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 215,27 | 230,34 | 208,02 | C.0.06. | bezpłatne | 0 zł |
| 166 | Fludarabini phosphas | Fludalym, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg | 5 fiol. | 5909990683567 | 2012-01-01 | 2 lata | 1017.1, Fludarabinum inj | 406,08 | 434,51 | 434,51 | C.25. | bezpłatne | 0 zł |
| 167 | Fludarabini phosphas | Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg | 15 tabl. | 5909991183318 | 2012-07-01 | 2 lata | 1017.2, Fludarabinum p.o. | 1 247,81 | 1 335,16 | 1 335,16 | C.25. | bezpłatne | 0 zł |
| 168 | Fludarabini phosphas | Fludara Oral, tabl. powl., 10 mg | 20 tabl. | 5909991183325 | 2012-07-01 | 2 lata | 1017.2, Fludarabinum p.o. | 1 663,74 | 1 780,20 | 1 780,20 | C.25. | bezpłatne | 0 zł |
| 169 | Fludarabini phosphas | Fludarabin - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa lub infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 2 ml | 5909990661466 | 2012-01-01 | 2 lata | 1017.1, Fludarabinum inj | 432,00 | 462,24 | 462,24 | C.25. | bezpłatne | 0 zł |
| 170 | Fludarabini phosphas | Fludarabine Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 25 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml | 5909990082377 | 2012-01-01 | 2 lata | 1017.1, Fludarabinum inj | 324,00 | 346,68 | 346,68 | C.25. | bezpłatne | 0 zł |
| 171 | Fluorouracilum | 5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 50 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990336258 | 2012-01-01 | 2 lata | 1018.0, Fluorouracilum | 72,36 | 77,43 | 77,43 | C.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 172 | Fluorouracilum | 5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 1000 mg | 1 fiol. a 20 ml | 5909990450633 | 2012-07-01 | 2 lata | 1018.0, Fluorouracilum | 14,57 | 15,59 | 15,59 | C.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 173 | Fluorouracilum | 5 Fluorouracil - Ebewe, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 250 mg | 5 amp. a 5 ml | 5909990450657 | 2012-07-01 | 2 lata | 1018.0, Fluorouracilum | 18,21 | 19,48 | 19,48 | C.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 174 | Fluorouracilum | Fluorouracil 1000 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990477913 | 2012-01-01 | 2 lata | 1018.0, Fluorouracilum | 14,57 | 15,59 | 15,59 | C.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 175 | Fluorouracilum | Fluorouracil 500 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990477814 | 2012-01-01 | 2 lata | 1018.0, Fluorouracilum | 7,56 | 8,09 | 8,09 | C.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 176 | Fluorouracilum | Fluorouracil 5000 medac, roztwór do wstrzykiwa , 50 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990478019 | 2012-01-01 | 2 lata | 1018.0, Fluorouracilum | 72,85 | 77,95 | 77,95 | C.26. | bezpłatne | 0 zł |
| 177 | Fulvestrantum | Faslodex, roztwór do wstrzykiwa , 250 mg/5ml | 2 amp.-strz. a 5 ml+2igly z syst.osł. | 5909990768875 | 2012-07-01 | 2 lata | 1019.0, Fulvestrant | 2 700,00 | 2 889,00 | 2 889,00 | C.27. | bezpłatne | 0 zł |
| 178 | Gemcitabinum | Gembin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990832941 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 170,50 | 182,44 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--------------|---|------------------|---------------|------------|--------|----------------------|--------|--------|--------|-------|-----------|------|
| 179 | Gemcitabinum | Gembin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990832958 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 36,78 | 39,35 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 180 | Gemcitabinum | Gembin, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 0,04 g/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990832965 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 493,13 | 527,65 | 208,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 181 | Gemcitabinum | GEMCIT, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990775200 | 2012-07-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 19,44 | 20,80 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 182 | Gemcitabinum | GEMCIT, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990775224 | 2012-07-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 72,36 | 77,43 | 77,43 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 183 | Gemcitabinum | GEMCIT, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 2 g | 5909990818143 | 2012-07-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 140,40 | 150,23 | 150,23 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 184 | Gemcitabinum | Gemcitabine medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990766390 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 32,40 | 34,67 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 185 | Gemcitabinum | Gemcitabine medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990766406 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 108,00 | 115,56 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 186 | Gemcitabinum | Gemcitabine medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990766437 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 162,00 | 173,34 | 156,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 187 | Gemcitabinum | Gemcitabine Polfa Łód , proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. | 5909990850297 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 20,74 | 22,19 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 188 | Gemcitabinum | Gemcitabine Polfa Łód , proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 g | 1 fiol. | 5909990850365 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 64,10 | 68,59 | 68,59 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 189 | Gemcitabinum | Gemcitabine Polpharma, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990697069 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 52,92 | 56,62 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 190 | Gemcitabinum | Gemcitabine Polpharma, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 g | 1 fiol. a 50 ml | 5909990697076 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 264,60 | 283,12 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 191 | Gemcitabinum | Gemliquid, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 20 ml | 5909990770052 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 54,00 | 57,78 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 192 | Gemcitabinum | Gemliquid, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990770069 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 135,00 | 144,45 | 52,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 193 | Gemcitabinum | Gemliquid, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg | 1 fiol. a 100 ml | 5909990770076 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 270,00 | 288,90 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 194 | Gemcitabinum | Gemsol, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990870998 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 54,00 | 57,78 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 195 | Gemcitabinum | Gemsol, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg | 1 fiol. a 25 ml | 5909990871032 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 270,00 | 288,90 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 196 | Gemcitabinum | Gemsol, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 2000 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990871049 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 540,00 | 577,80 | 208,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 197 | Gemcitabinum | Gitrafin, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 0,2 g | 5909990714612 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 36,78 | 39,35 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 198 | Gemcitabinum | Gitrafin, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 1g | 5909990783434 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 170,50 | 182,44 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|--|--|---------------|------------|--------|---|----------|----------|----------|-------|-----------|------|
| 199 | Gemcitabinum | Gitribin, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 38 mg/ml | 1 fiol. a 2 g | 5909990783441 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 341,00 | 364,87 | 208,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 200 | Gemcitabinum | Symtabin, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 200 mg | 1 fiol. a 0,2 g | 5909990828128 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 43,20 | 46,22 | 20,80 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 201 | Gemcitabinum | Symtabin, proszek do sporz. dziania roztworu do infuzji, 1000 mg | 5 fiol. a 0,2g | 5909990828142 | 2012-01-01 | 2 lata | 1020.0, Gemcitabinum | 216,00 | 231,12 | 104,00 | C.28. | bezpłatne | 0 zł |
| 202 | Hydroxycarbamidum | Hydroxycarbamid Teva, kaps., 500 mg | 100 kaps. | 5909990836758 | 2012-01-01 | 2 lata | 1021.0, Hydroxycarbamidum | 64,58 | 69,10 | 69,10 | C.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 203 | Hydroxycarbamidum | Hydroxyurea medac, kaps. twarde, 500 mg | 100 kaps. | 5909990944927 | 2012-01-01 | 2 lata | 1021.0, Hydroxycarbamidum | 86,12 | 92,15 | 69,10 | C.29. | bezpłatne | 0 zł |
| 204 | Idarubicini hydrochloridum | Zavedos, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 5 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990236114 | 2012-01-01 | 2 lata | 1022.0, Idarubicinum | 410,40 | 439,13 | 439,13 | C.30. | bezpłatne | 0 zł |
| 205 | Idarubicini hydrochloridum | Zavedos, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990236213 | 2012-01-01 | 2 lata | 1022.0, Idarubicinum | 766,80 | 820,48 | 820,48 | C.30. | bezpłatne | 0 zł |
| 206 | Ifosfamidum | Holoxan, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 1 g | 1 fiol. | 5909990241118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1023.0, Ifosfamidum | 120,42 | 128,85 | 128,85 | C.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 207 | Ifosfamidum | Holoxan, proszek do sporz. dziania roztworu do wstrzykiwa , 2 g | 1 fiol. | 5909990241217 | 2012-07-01 | 2 lata | 1023.0, Ifosfamidum | 217,62 | 232,85 | 232,85 | C.31. | bezpłatne | 0 zł |
| 208 | Interferonum alfa | Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 3000000 j.m. | 1 amp. a 1 ml | 5909990861118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.1, interferonum alfa | 105,84 | 113,25 | 113,25 | C.32. | bezpłatne | 0 zł |
| 209 | Interferonum alfa | Alfaferone, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 6000000 j.m./ml | 1 amp. a 1 ml | 5909990861217 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.1, interferonum alfa | 211,68 | 226,50 | 226,50 | C.32. | bezpłatne | 0 zł |
| 210 | Interferonum alfa-2a | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 3 mln j.m./0,5 ml | 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) | 5909990465118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a | 50,33 | 53,85 | 53,85 | C.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 211 | Interferonum alfa-2a | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 6 mln j.m./0,5 ml | 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) | 5909990465316 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a | 100,67 | 107,72 | 107,72 | C.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 212 | Interferonum alfa-2a | Roferon-a, roztwór do wstrzykiwa , 9 mln j.m./0,5 ml | 1 strzyk. a 0,5 ml (+igła) | 5909990465415 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.2, interferonum alfa recombinatum 2a | 150,99 | 161,56 | 161,56 | C.33. | bezpłatne | 0 zł |
| 213 | Interferonum alfa-2b | IntronA, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 25 mln j.m./2,5 ml | 1 fiol. a 2,5 ml + 6 zest. (1 zest.: strzykawka + igła do wstrzykiwa + 2 waciki) | 5909990004805 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b | 419,58 | 448,95 | 448,95 | C.34. | bezpłatne | 0 zł |
| 214 | Interferonum alfa-2b | IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 15 mln j.m./ml | 1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik) | 5909990858118 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b | 302,10 | 323,25 | 323,25 | C.34. | bezpłatne | 0 zł |
| 215 | Interferonum alfa-2b | IntronA, roztwór do wstrzykiwa , 25 mln j.m./ml | 1 doz. a 1,2 ml + 12 zest. (1 zest.: igła do wstrzyk. + wacik) | 5909990858217 | 2012-07-01 | 2 lata | 1024.3, interferonum alfa recombinatum 2b | 503,49 | 538,73 | 538,73 | C.34. | bezpłatne | 0 zł |
| 216 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Campto, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 15 ml (propyl.) | 5909990645060 | 2012-07-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 1 965,96 | 2 103,58 | 2 089,77 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 217 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Campto, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml (propyl.) | 5909990645176 | 2012-07-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 237,39 | 254,01 | 254,01 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 218 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Campto, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml (propyl.) | 5909990645183 | 2012-07-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 651,02 | 696,59 | 696,59 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 219 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan Hospira, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml | 5909990013869 | 2012-07-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 34,56 | 36,98 | 36,98 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 220 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan Hospira, koncentrat do sporz. dziania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990013876 | 2012-07-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 64,80 | 69,34 | 69,34 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--|---|---|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 221 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan Kabi , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml | 5909990726943 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 21,06 | 22,53 | 22,53 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 222 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan Kabi , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990726950 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 48,60 | 52,00 | 52,00 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 223 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan Kabi , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 15 ml | 5909990796946 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 145,80 | 156,01 | 156,01 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 224 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan Kabi , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990796953 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 248,40 | 265,79 | 265,79 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 225 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 2 ml | 5909990766482 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 37,80 | 40,45 | 40,45 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 226 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990766499 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 75,60 | 80,89 | 80,89 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 227 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 20 mg/ml | 1 fiol. a 15 ml | 5909990766505 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 189,00 | 202,23 | 202,23 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 228 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 40 mg | 1 fiol. a 2 ml | 5909990871056 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 36,18 | 38,71 | 38,71 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 229 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990871087 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 81,00 | 86,67 | 86,67 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 230 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 150 mg | 1 fiol a 7,5 ml | 5909990871124 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 129,60 | 138,67 | 138,67 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 231 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 300 mg | 1 fiol. a 15 ml | 5909990871155 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 253,80 | 271,57 | 271,57 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 232 | Irinotecani hydrochloridum trihydricum | Irinotecan-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg | 1 fiol a 25 ml | 5909990871162 | 2012-01-01 | 2 lata | 1025.0, Irinotecanum | 426,60 | 456,46 | 456,46 | C.35. | bezpłatne | 0 zł |
| 233 | Isotretinoinum | Isoderm, kaps. mi kkie, 10 mg | 30 kaps. | 5909990864409 | 2012-07-01 | 2 lata | 1097.0, Isotretinoinum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.36. | bezpłatne | 0 zł |
| 234 | Isotretinoinum | Isoderm, kaps. mi kkie, 20 mg | 30 kaps. | 5909990864447 | 2012-07-01 | 2 lata | 1097.0, Isotretinoinum | 64,80 | 69,34 | 69,34 | C.36. | bezpłatne | 0 zł |
| 235 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 60 mg | 1 amp.-strz. | 5909991094416 | 2012-01-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 2 703,73 | 2 892,99 | 2 892,99 | C.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 236 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 90 mg | 1 amp.-strz. | 5909991094515 | 2012-01-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 3 604,62 | 3 856,94 | 3 856,94 | C.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 237 | Lanreotidum | Somatuline Autogel , roztwór do wstrzykiwa , 120 mg | 1 amp.-strz a 0,5 ml | 5909991094614 | 2012-01-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 4 514,86 | 4 830,90 | 4 830,90 | C.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 238 | Lanreotidum | SOMATULINE PR, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 30 mg | 1 fiol.s.subs. (+zest.) | 5909990420711 | 2012-07-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 2 148,12 | 2 298,49 | 1 727,85 | C.37. | bezpłatne | 0 zł |
| 239 | Lenograstimum | Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU | 1 fiol. z prosz. + 1 amp.-strz. z rozp. + 1 igła 19G + 1 igła 26G | 5909990742059 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 121,76 | 130,28 | 113,98 | C.0.07. | bezpłatne | 0 zł |
| 240 | Lenograstimum | Granocyte 34, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa podskórnych i infuzji do ylnych, 33,6 MIU | 5 fiol. z prosz. + 5 amp.-strz. z rozp. + 5 igieł 19G + 5 igieł 26G | 5909990742066 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 608,76 | 651,37 | 569,88 | C.0.07. | bezpłatne | 0 zł |
| 241 | Melphalanum | Alkeran, tabl.powl., 2 mg | 25 tabl. | 5909990283514 | 2012-07-01 | 2 lata | 1098.0, Melphalanum | 311,04 | 332,81 | 332,81 | C.39. | bezpłatne | 0 zł |
| 242 | Mercaptopurinum | MERCAPTOPURINUM VIS, tabl. , 50 mg | 30 tabl. | 5909990186112 | 2012-01-01 | 2 lata | 1027.0, Mercaptopurinum | 21,22 | 22,71 | 22,71 | C.40. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---------------|---|------------------------------------|---------------|------------|--------|-------------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 243 | Mesnum | Uromitexan, roztwór do wstrzykiwa , 100 mg/ml | 15 amp. a 4 ml | 5909990265831 | 2012-07-01 | 2 lata | 1046.0, Mesnum | 201,10 | 215,18 | 215,18 | C.0.08. | bezpłatne | 0 zł |
| 244 | Methotrexatum | Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990333936 | 2012-01-01 | 2 lata | 1028.2, Methotrexatum inj. | 378,00 | 404,46 | 404,46 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 245 | Methotrexatum | Methotrexat - Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1000 mg | 1 fiol. a 10 ml | 5909990615742 | 2012-01-01 | 2 lata | 1028.2, Methotrexatum inj. | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 246 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 2,5 mg | 50 tabl. | 5909990453726 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.3, Methotrexatum p.o | 8,09 | 8,66 | 8,66 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 247 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 5 mg | 50 tabl. | 5909990453825 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.3, Methotrexatum p.o | 16,18 | 17,31 | 17,31 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 248 | Methotrexatum | Methotrexat-Ebewe, tabl. , 10 mg | 50 tabl. | 5909990453924 | 2012-07-01 | 2 lata | 1028.3, Methotrexatum p.o | 32,36 | 34,63 | 34,62 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 249 | Methotrexatum | Trexan, tabl. , 2,5 mg | 100 tabl. | 5909990111619 | 2012-01-01 | 2 lata | 1028.3, Methotrexatum p.o | 16,19 | 17,32 | 17,31 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 250 | Methotrexatum | Trexan, tabl. , 10 mg | 100 tabl. (1 poj.) | 5909990730346 | 2012-01-01 | 2 lata | 1028.3, Methotrexatum p.o | 64,80 | 69,34 | 69,24 | C.41. | bezpłatne | 0 zł |
| 251 | Mitomycinum | Mitomycin C Kyowa, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol. | 5909990098118 | 2012-01-01 | 2 lata | 1029.0, Mitomycinum | 62,60 | 66,98 | 64,72 | C.42. | bezpłatne | 0 zł |
| 252 | Mitomycinum | Mitomycin C Kyowa, proszek do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 20 mg | 1 fiol. | 5909990098217 | 2012-01-01 | 2 lata | 1029.0, Mitomycinum | 120,96 | 129,43 | 129,43 | C.42. | bezpłatne | 0 zł |
| 253 | Mitotatum | Lysodren , tabl. , 500 mg | 100 tabl. | 5909990335237 | 2012-07-01 | 2 lata | 1030.0, Mitotatum | 2 764,80 | 2 958,34 | 2 958,34 | C.43. | bezpłatne | 0 zł |
| 254 | Octreotidum | Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 50 µg/ml | 5 amp. a 1 ml | 5909990042715 | 2012-01-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 37,80 | 40,45 | 40,45 | C.45. | bezpłatne | 0 zł |
| 255 | Octreotidum | Sandostatin, roztwór do wstrzykiwa , 100 µg/ml | 5 amp. a 1 ml | 5909990042913 | 2012-01-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 48,60 | 52,00 | 52,00 | C.45. | bezpłatne | 0 zł |
| 256 | Octreotidum | Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 30 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459513 | 2012-07-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 5 241,24 | 5 608,13 | 5 608,13 | C.45. | bezpłatne | 0 zł |
| 257 | Octreotidum | Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 20 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459612 | 2012-07-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 3 763,04 | 4 026,45 | 4 026,45 | C.45. | bezpłatne | 0 zł |
| 258 | Octreotidum | Sandostatin LAR, Proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania zawiesiny do wstrzykiwa , 10 mg | 1 fiol., amp.-strz. z rozp. 2,5 ml | 5909990459711 | 2012-01-01 | 2 lata | 1026.0, analogi somatostatyny | 2 306,88 | 2 468,36 | 2 468,36 | C.45. | bezpłatne | 0 zł |
| 259 | Ondansetronum | Atossa, tabl. powl., 8 mg | 10 tabl. | 5909990744510 | 2012-07-01 | 2 lata | 1047.2, ondansetronum p.o. | 39,96 | 42,76 | 41,22 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 260 | Ondansetronum | Emetron, tabl. powl., 8 mg | 10 tabl. | 5909990902811 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.2, ondansetronum p.o. | 42,21 | 45,16 | 41,22 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 261 | Ondansetronum | ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 1 amp. a 2 ml | 5909990055180 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 1,38 | 1,48 | 1,48 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 262 | Ondansetronum | ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 5 amp. a 2 ml | 5909990055197 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 6,91 | 7,39 | 7,38 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 263 | Ondansetronum | ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 10 amp. a 2 ml | 5909990055203 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 13,82 | 14,79 | 14,75 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 264 | Ondansetronum | ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 1 amp. a 4 ml | 5909990055227 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 2,76 | 2,95 | 2,95 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 265 | Ondansetronum | ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 5 amp. a 4 ml | 5909990055234 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 13,82 | 14,79 | 14,75 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 266 | Ondansetronum | ONDANSETRON KABI, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 10 amp. a 4 ml | 5909990055241 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 27,65 | 29,59 | 29,50 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---------------|--|-------------------------|---------------|------------|--------|----------------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|------|
| 267 | Ondansetronum | SETRONON, tabl. powł., 8 mg | 10 tabl. | 5909990994717 | 2012-07-01 | 2 lata | 1047.2, ondansetronum p.o. | 38,52 | 41,22 | 41,22 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 268 | Ondansetronum | ZOFRAN, tabl. powł., 4 mg | 10 tabl. powł. | 5909990001811 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.2, ondansetronum p.o. | 31,86 | 34,09 | 20,61 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 269 | Ondansetronum | ZOFRAN, tabl. powł., 8 mg | 10 tabl. powł. | 5909990001910 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.2, ondansetronum p.o. | 64,80 | 69,34 | 41,22 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 270 | Ondansetronum | ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 5 amp. a 2 ml | 5909990002016 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 6,91 | 7,39 | 7,38 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 271 | Ondansetronum | ZOFRAN, roztwór do wstrzykiwa , 2 mg/ml | 5 amp. a 4 ml | 5909990002023 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.1, ondansetronum inj. | 13,82 | 14,79 | 14,75 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 272 | Ondansetronum | ZOFRAN, syrop, 4 mg/5ml | 50 ml | 5909990810611 | 2012-01-01 | 2 lata | 1047.2, ondansetronum p.o. | 72,65 | 77,74 | 20,61 | C.0.09. | bezpłatne | 0 zł |
| 273 | Oxaliplatinum | Oksaliplatyna medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml (50mg) | 5909990018369 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 45,54 | 48,73 | 48,73 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 274 | Oxaliplatinum | Oksaliplatyna medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml (100mg) | 5909990018376 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 91,09 | 97,47 | 97,47 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 275 | Oxaliplatinum | Oksaliplatyna medac, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 0,15 g | 5909990080656 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 136,63 | 146,19 | 146,19 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 276 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990641437 | 2012-07-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 277 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990641444 | 2012-07-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 278 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 40 ml | 5909990686179 | 2012-07-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 162,00 | 173,34 | 173,34 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 279 | Oxaliplatinum | OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990798247 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 280 | Oxaliplatinum | OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990798254 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 86,40 | 92,45 | 92,45 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 281 | Oxaliplatinum | OXALIPLATIN KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 40 ml | 5909990827381 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 162,00 | 173,34 | 173,34 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 282 | Oxaliplatinum | OXALIPLATIN KABI, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml (50mg) | 5909990859146 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 40,50 | 43,34 | 43,34 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 283 | Oxaliplatinum | OXALIPLATIN KABI, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml (100mg) | 5909990859153 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 81,00 | 86,67 | 86,67 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 284 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 10 ml | 5909990084852 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 43,20 | 46,22 | 46,22 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 285 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 20 ml | 5909990084869 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 81,00 | 86,67 | 86,67 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 286 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 5 mg/ml | 1 fiol. a 40 ml | 5909990683291 | 2012-01-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 151,20 | 161,78 | 161,78 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 287 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 10 ml (50mg) | 5909990018345 | 2012-07-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 194,40 | 208,01 | 202,23 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 288 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. a 20 ml (100mg) | 5909990018352 | 2012-07-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 378,00 | 404,46 | 404,46 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |
| 289 | Oxaliplatinum | Oxaliplatin-Ebewe, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 150 mg | 1 fiol. a 30 ml (150mg) | 5909990081424 | 2012-07-01 | 2 lata | 1031.0, Oxaliplatinum | 540,00 | 577,80 | 577,80 | C.46. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|-----------------|---|------------------------------------|---------------|------------|--------|--|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 290 | Paclitaxelum | Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 5ml | 5909990216406 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 32,40 | 34,67 | 34,67 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 291 | Paclitaxelum | Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 25ml | 5909990216482 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 145,80 | 156,01 | 156,01 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 292 | Paclitaxelum | Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 50ml | 5909990216499 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 291,60 | 312,01 | 312,01 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 293 | Paclitaxelum | Paclitaxel Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 16,7ml | 5909990935406 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 97,20 | 104,00 | 104,00 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 294 | Paclitaxelum | PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 5 ml | 5909990874347 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 31,32 | 33,51 | 33,51 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 295 | Paclitaxelum | PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 16,7 ml | 5909990874361 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 54,00 | 57,78 | 57,78 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 296 | Paclitaxelum | PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 25 ml | 5909990874385 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 75,60 | 80,89 | 80,89 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 297 | Paclitaxelum | PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990874408 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 151,20 | 161,78 | 161,78 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 298 | Paclitaxelum | PACLITAXEL KABI, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 100 ml | 5909990874446 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 313,20 | 335,12 | 335,12 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 299 | Paclitaxelum | Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 30 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990018383 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 48,12 | 51,49 | 51,49 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 300 | Paclitaxelum | Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. a 16,7 ml | 5909990018390 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 160,41 | 171,64 | 171,64 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 301 | Paclitaxelum | Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 150 mg | 1 fiol. a 25 ml | 5909990018406 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 240,61 | 257,45 | 257,45 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 302 | Paclitaxelum | Paclitaxel-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 300 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990018420 | 2012-01-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 481,23 | 514,92 | 514,92 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 303 | Paclitaxelum | Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 szt. - 1 fiol. a 30mg | 5909991060619 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 68,04 | 72,80 | 72,80 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 304 | Paclitaxelum | Paclitaxelum TEVA, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1sz. - 1 fiol. a 100mg | 5909991060633 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 226,80 | 242,68 | 242,68 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 305 | Paclitaxelum | Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 50 ml | 5909990668878 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 1 026,86 | 1 098,74 | 514,92 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 306 | Paclitaxelum | Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990976010 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 100,22 | 107,24 | 51,49 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 307 | Paclitaxelum | Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 16,67 ml | 5909990976027 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 313,63 | 335,58 | 171,64 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 308 | Paclitaxelum | Sindaxel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 6 mg/ml | 1 fiol. a 43,33 ml | 5909990976034 | 2012-07-01 | 2 lata | 1032.0, Paclitaxelum | 843,48 | 902,52 | 446,26 | C.47. | bezpłatne | 0 zł |
| 309 | Pegasparagasum | Oncaspar, roztwór do wstrzykiwa i infuzji, 750 j.m./ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990950812 | 2012-07-01 | 2 lata | 1033.0, Pegasparagasum | 5 238,00 | 5 604,66 | 5 604,66 | C.48. | bezpłatne | 0 zł |
| 310 | Pegfilgrastimum | Neulasta, roztwór do wstrzykiwa , 6 mg/0,6ml | 1 amp.-strz. a 0,6 ml (z zab.igły) | 5909990007523 | 2012-01-01 | 2 lata | 1045.0, czynniki stymuluj ce granulopoez | 3 286,98 | 3 517,07 | 3 033,57 | C.0.10. | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|---------------|---|----------------------------------|---------------|------------|--------|--------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------|------|
| 311 | Pemetreksedum | Alimta 100 mg, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol.s.subs. | 5909990080205 | 2012-07-01 | 2 lata | 1034.0, Pemetreksed | 764,10 | 817,59 | 817,59 | C.49. | bezpłatne | 0 zł |
| 312 | Pemetreksedum | Alimta 500 mg, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 500 mg | 1 fiol.s.subs. | 5909990009664 | 2012-07-01 | 2 lata | 1034.0, Pemetreksed | 3 822,12 | 4 089,67 | 4 089,67 | C.49. | bezpłatne | 0 zł |
| 313 | Rasburicasum | Fasturtec, proszek i rozpuszczalnik do przygotowania koncentratu do sporz dzania roztworu do infuzji, 1,5 mg/ml | 3 fiol. a 1,5mg (+ 3 amp. rozp.) | 5909990943111 | 2012-01-01 | 2 lata | 1048.0, Rasburicasum | 692,84 | 741,34 | 741,34 | C.0.11. | bezpłatne | 0 zł |
| 314 | Rituximabum | MabThera, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 100 mg | 2 fiol. a 10 ml | 5909990418817 | 2012-07-01 | 2 lata | 1035.0, Rituximabum | 2 445,01 | 2 616,16 | 2 616,16 | C.51. | bezpłatne | 0 zł |
| 315 | Rituximabum | MabThera, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 500 mg | 1 fiol. a 50 ml | 5909990418824 | 2012-07-01 | 2 lata | 1035.0, Rituximabum | 6 112,52 | 6 540,40 | 6 540,40 | C.51. | bezpłatne | 0 zł |
| 316 | Tamoxifenum | Nolvadex D, tabl. powl., 20 mg | 30 tabl. | 5909990127412 | 2012-01-01 | 2 lata | 1036.0, Tamoxifenum | 17,28 | 18,49 | 10,70 | C.52. | bezpłatne | 0 zł |
| 317 | Tamoxifenum | Tamoxifen-Ebewe 10, tabl., 10 mg | 30 tabl. | 5909990722518 | 2012-01-01 | 2 lata | 1036.0, Tamoxifenum | 5,35 | 5,72 | 5,35 | C.52. | bezpłatne | 0 zł |
| 318 | Tamoxifenum | Tamoxifen-Ebewe 20, tabl., 20 mg | 30 tabl. | 5909990722419 | 2012-01-01 | 2 lata | 1036.0, Tamoxifenum | 10,00 | 10,70 | 10,70 | C.52. | bezpłatne | 0 zł |
| 319 | Tamoxifenum | Tamoxifen-EGIS, tabl., 20 mg | 30 tabl. (3 blist.po 10 szt.) | 5909990775316 | 2012-01-01 | 2 lata | 1036.0, Tamoxifenum | 10,01 | 10,71 | 10,70 | C.52. | bezpłatne | 0 zł |
| 320 | Thiotepa | Tepadina, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 15 mg | 1 fiol. | 5909990893546 | 2012-07-01 | 2 lata | 1037.0, Thiotepa | 577,80 | 618,25 | 618,25 | C.55. | bezpłatne | 0 zł |
| 321 | Thiotepa | Tepadina, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 100 mg | 1 fiol. | 5909990893553 | 2012-07-01 | 2 lata | 1037.0, Thiotepa | 3 499,20 | 3 744,14 | 3 744,14 | C.55. | bezpłatne | 0 zł |
| 322 | Tioguaninum | Lanvis, tabl., 40 mg | 25 tabl. | 5909990185214 | 2012-07-01 | 2 lata | 1100.0, Tioguaninum | 706,32 | 755,76 | 755,76 | C.56. | bezpłatne | 0 zł |
| 323 | Topotecanum | HYCAMTIN, proszek do sporz dzania koncentratu do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg | 5 fiol. | 5909990223244 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 1 193,40 | 1 276,94 | 866,70 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 324 | Topotecanum | HYCAMTIN, proszek do sporz dzania koncentratu do sporz dzania roztworu do infuzji, 4 mg | 1 fiol. a 17 ml | 5909990489626 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 954,72 | 1 021,55 | 693,36 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 325 | Topotecanum | HYCAMTIN, kaps. twarde, 0,25 mg | 10 kaps. | 5909990643134 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.2, Topotecanum p.o. | 386,10 | 413,13 | 413,13 | C.57.1 | bezpłatne | 0 zł |
| 326 | Topotecanum | HYCAMTIN, kaps. twarde, 1 mg | 10 kaps. | 5909990643141 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.2, Topotecanum p.o. | 1 544,40 | 1 652,51 | 1 652,51 | C.57.1 | bezpłatne | 0 zł |
| 327 | Topotecanum | Potactasol, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 1 mg | 1 fiol. | 5909990845187 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 97,20 | 104,00 | 104,00 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 328 | Topotecanum | Potactasol, proszek do sporz dzania roztworu do infuzji, 4 mg | 1 fiol. | 5909990845194 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 625,03 | 668,78 | 668,78 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 329 | Topotecanum | Topotecan Hospira, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 4 mg/4ml | 5 fiolek a 4 ml | 5909990904297 | 2012-07-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 1 836,00 | 1 964,52 | 1 964,52 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 330 | Topotecanum | TOPOTECAN KABI, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg | 1 fiol. a 6 ml | 5909990896448 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 321,30 | 343,79 | 343,79 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 331 | Topotecanum | TOPOTECAN KABI, proszek do sporz dzania koncentratu roztworu do infuzji, 4 mg | 5 fiol. a 6 ml | 5909990896455 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 1 606,50 | 1 718,96 | 1 718,96 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 332 | Topotecanum | Topotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiołka a 1ml | 5909990924660 | 2012-07-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 102,60 | 109,78 | 109,78 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-----|--------------------|--|---------------------------|---------------|------------|--------|---------------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|------|
| 333 | Topotecanum | Topotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiolka a 2ml | 5909990924677 | 2012-07-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 205,20 | 219,56 | 219,56 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 334 | Topotecanum | Topotecan medac, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 1 fiolka a 4ml | 5909990924684 | 2012-07-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 313,20 | 335,12 | 335,12 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 335 | Topotecanum | Topotecan Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 5 fiol. a 1 ml | 5909990717125 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 864,00 | 924,48 | 866,70 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 336 | Topotecanum | Topotecan Teva, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 1 mg/ml | 5 fiol. a 4 ml | 5909990717149 | 2012-01-01 | 2 lata | 1038.1, Topotecanum inj. | 3 240,00 | 3 466,80 | 3 466,80 | C.57.2 | bezpłatne | 0 zł |
| 337 | Tretinoinum | Vesanoid, kaps. mi kkie, 10 mg | 100 kaps. | 5909990668311 | 2012-07-01 | 2 lata | 1039.0, Tretinoinum | 1 046,74 | 1 120,01 | 1 120,01 | C.58. | bezpłatne | 0 zł |
| 338 | Vinblastini sulfas | Vinbalstin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 5 mg | 10 fiol.s.subs. (+ rozp.) | 5909990117321 | 2012-01-01 | 2 lata | 1040.0, Vinblastinum | 216,00 | 231,12 | 231,12 | C.60. | bezpłatne | 0 zł |
| 339 | Vincristini sulfas | Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwa , 1 mg/ml | 1 fiol. a 1 ml | 5909990669493 | 2012-07-01 | 2 lata | 1041.0, Vincristinum | 26,19 | 28,02 | 28,02 | C.61. | bezpłatne | 0 zł |
| 340 | Vincristini sulfas | Vincristine Teva, roztwór do wstrzykiwa , 1 mg/ml | 1 fiol. a 5 ml | 5909990669523 | 2012-07-01 | 2 lata | 1041.0, Vincristinum | 125,71 | 134,51 | 134,51 | C.61. | bezpłatne | 0 zł |
| 341 | Vincristini sulfas | Vincristin-Richter, proszek i rozpuszczalnik do sporz dzania roztworu do wstrzykiwa , 1 mg | 10 fiol.s.subs. (+ rozp.) | 5909990117413 | 2012-01-01 | 2 lata | 1041.0, Vincristinum | 259,20 | 277,34 | 277,34 | C.61. | bezpłatne | 0 zł |
| 342 | Vinorelbinum | Navelbine , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 10 amp. a 1 ml | 5909990173617 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 740,84 | 792,70 | 792,69 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 343 | Vinorelbinum | Navelbine , koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 10 amp. a 5 ml | 5909990173624 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 3 704,17 | 3 963,46 | 3 963,46 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 344 | Vinorelbinum | Navelbine , kaps. mi kkie, 20 mg | 1 kaps. | 5909990945016 | 2012-07-01 | 2 lata | 1042.2, Vinorelbinum p.o. | 174,59 | 186,81 | 186,81 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 345 | Vinorelbinum | Navelbine , kaps. mi kkie, 30 mg | 1 kaps. | 5909990945115 | 2012-07-01 | 2 lata | 1042.2, Vinorelbinum p.o. | 261,88 | 280,21 | 280,21 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 346 | Vinorelbinum | Navirel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 10 fiol. a 1 ml | 5909990573325 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 745,20 | 797,36 | 792,69 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 347 | Vinorelbinum | Navirel, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 10 fiol. a 5 ml | 5909990573349 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 1 490,40 | 1 594,73 | 1 594,73 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 348 | Vinorelbinum | Vinorelbine Polpharma, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg/ml | 10 fiol. a 5 ml | 5909990731374 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 1 058,40 | 1 132,49 | 1 132,49 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 349 | Vinorelbinum | Vinorelbin-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 10 mg | 1 fiol. a 1 ml | 5909990573172 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 64,80 | 69,34 | 69,34 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |
| 350 | Vinorelbinum | Vinorelbin-Ebewe, koncentrat do sporz dzania roztworu do infuzji, 50 mg | 1 fiol. a 5 ml | 5909990573189 | 2012-01-01 | 2 lata | 1042.1, Vinorelbinum inj | 291,60 | 312,01 | 312,01 | C.63. | bezpłatne | 0 zł |

Załącznik C.0.01.

ACIDUM LEVOFOLINICUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | ACIDUM LEVOFOLINICUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.02.

CALCII FOLINAS

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | CALCII FOLINAS | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.03.

DARBEPOETIN ALFA

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | DARBEPOETIN ALFA | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.04.

EPOETINUM ALPHA

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | EPOETINUM ALPHA | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.05.

EPOETINUM BETA

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | EPOETINUM BETA | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.06.

FILGRASTIMUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | FILGRASTIMUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.07.

LENOGRASTIMUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | LENOGRASTIMUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.08.

MESNUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | MESNUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.09.

ONDANSETRONUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | ONDANSETRONUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.10.

PEGFILGRASTIMUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | PEGFILGRASTIMUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.0.11

RASBURICASUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | ZAKRES WSKAZAŃ OBJĘTYCH REFUNDACJĄ |
|----|---|---|
| 1 | RASBURICASUM | WE WSZYSTKICH ZAREJESTROWANYCH WSKAZANIACH NA DZIEŃ WYDANIA DECYZJI |

Załącznik C.1.

ASPARAGINASUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 1 | ASPARAGINASUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 2 | ASPARAGINASUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 3 | ASPARAGINASUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 4 | ASPARAGINASUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 5 | ASPARAGINASUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 6 | ASPARAGINASUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 7 | ASPARAGINASUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 8 | ASPARAGINASUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 9 | ASPARAGINASUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 10 | ASPARAGINASUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 11 | ASPARAGINASUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY) |
| 12 | ASPARAGINASUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 13 | ASPARAGINASUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 14 | ASPARAGINASUM | C83.6 | NIEZRÓZNICOWANY (ROZLANY) |
| 15 | ASPARAGINASUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 16 | ASPARAGINASUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 17 | ASPARAGINASUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 18 | ASPARAGINASUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 19 | ASPARAGINASUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 20 | ASPARAGINASUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 21 | ASPARAGINASUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 22 | ASPARAGINASUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 23 | ASPARAGINASUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 24 | ASPARAGINASUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 25 | ASPARAGINASUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 26 | ASPARAGINASUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 27 | ASPARAGINASUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 28 | ASPARAGINASUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 29 | ASPARAGINASUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 30 | ASPARAGINASUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 31 | ASPARAGINASUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 32 | ASPARAGINASUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 33 | ASPARAGINASUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 34 | ASPARAGINASUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 35 | ASPARAGINASUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 36 | ASPARAGINASUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 37 | ASPARAGINASUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 38 | ASPARAGINASUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 39 | ASPARAGINASUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 40 | ASPARAGINASUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 41 | ASPARAGINASUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 42 | ASPARAGINASUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 43 | ASPARAGINASUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 44 | ASPARAGINASUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 45 | ASPARAGINASUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 46 | ASPARAGINASUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 47 | ASPARAGINASUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.2.

BICALUTAMIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--------------------------------------|
| 1 | BICALUTAMIDUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |

Załącznik C.3.

BLEOMYCIN SULPHATE

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | BLEOMYCIN SULPHATE | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | BLEOMYCIN SULPHATE | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | BLEOMYCIN SULPHATE | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | BLEOMYCIN SULPHATE | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | BLEOMYCIN SULPHATE | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | BLEOMYCIN SULPHATE | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | BLEOMYCIN SULPHATE | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | BLEOMYCIN SULPHATE | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | BLEOMYCIN SULPHATE | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | BLEOMYCIN SULPHATE | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | BLEOMYCIN SULPHATE | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | BLEOMYCIN SULPHATE | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | BLEOMYCIN SULPHATE | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | BLEOMYCIN SULPHATE | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | BLEOMYCIN SULPHATE | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | BLEOMYCIN SULPHATE | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | BLEOMYCIN SULPHATE | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | BLEOMYCIN SULPHATE | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | BLEOMYCIN SULPHATE | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | BLEOMYCIN SULPHATE | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | BLEOMYCIN SULPHATE | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | BLEOMYCIN SULPHATE | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | BLEOMYCIN SULPHATE | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | BLEOMYCIN SULPHATE | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | BLEOMYCIN SULPHATE | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | BLEOMYCIN SULPHATE | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | BLEOMYCIN SULPHATE | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | BLEOMYCIN SULPHATE | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | BLEOMYCIN SULPHATE | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | BLEOMYCIN SULPHATE | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | BLEOMYCIN SULPHATE | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | BLEOMYCIN SULPHATE | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | BLEOMYCIN SULPHATE | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | BLEOMYCIN SULPHATE | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | BLEOMYCIN SULPHATE | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | BLEOMYCIN SULPHATE | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | BLEOMYCIN SULPHATE | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | BLEOMYCIN SULPHATE | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | BLEOMYCIN SULPHATE | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69 | BLEOMYCIN SULPHATE | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | BLEOMYCIN SULPHATE | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | BLEOMYCIN SULPHATE | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | BLEOMYCIN SULPHATE | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | BLEOMYCIN SULPHATE | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | BLEOMYCIN SULPHATE | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | BLEOMYCIN SULPHATE | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | BLEOMYCIN SULPHATE | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | BLEOMYCIN SULPHATE | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 78 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |
| 79 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 80 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 81 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 82 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 83 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 84 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 85 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 86 | BLEOMYCIN SULPHATE | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 87 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 88 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38.0 | SERCE |
| 89 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 90 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 91 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 92 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38.4 | OPLUCNA |
| 93 | BLEOMYCIN SULPHATE | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 94 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 95 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 96 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 97 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 98 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 99 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 100 | BLEOMYCIN SULPHATE | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 101 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 102 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 103 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.1 | ŻUCHWA |
| 104 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 105 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 106 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 107 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 108 | BLEOMYCIN SULPHATE | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 109 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 110 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 111 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 112 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 113 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 114 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 115 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 116 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 117 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 118 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 119 | BLEOMYCIN SULPHATE | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 120 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44 | INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY |
| 121 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.0 | SKÓRA WARGI |
| 122 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.1 | SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 123 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.2 | SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 124 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.3 | SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 125 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.4 | SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI |
| 126 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.5 | SKÓRA TUŁOWIA |
| 127 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.6 | SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 128 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.7 | SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 129 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI |
| 130 | BLEOMYCIN SULPHATE | C44.9 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 131 | BLEOMYCIN SULPHATE | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNIEJ |
| 132 | BLEOMYCIN SULPHATE | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | BLEOMYCIN SULPHATE | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 134 | BLEOMYCIN SULPHATE | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 135 | BLEOMYCIN SULPHATE | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 136 | BLEOMYCIN SULPHATE | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ |
| 137 | BLEOMYCIN SULPHATE | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 138 | BLEOMYCIN SULPHATE | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 139 | BLEOMYCIN SULPHATE | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 140 | BLEOMYCIN SULPHATE | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 141 | BLEOMYCIN SULPHATE | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 142 | BLEOMYCIN SULPHATE | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 143 | BLEOMYCIN SULPHATE | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 144 | BLEOMYCIN SULPHATE | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 145 | BLEOMYCIN SULPHATE | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 146 | BLEOMYCIN SULPHATE | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 147 | BLEOMYCIN SULPHATE | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 148 | BLEOMYCIN SULPHATE | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 149 | BLEOMYCIN SULPHATE | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 150 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 151 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 152 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 153 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 154 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 155 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 156 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 157 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 158 | BLEOMYCIN SULPHATE | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 159 | BLEOMYCIN SULPHATE | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 160 | BLEOMYCIN SULPHATE | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 161 | BLEOMYCIN SULPHATE | C60.0 | NAPLETEK |
| 162 | BLEOMYCIN SULPHATE | C60.1 | ZOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 163 | BLEOMYCIN SULPHATE | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 164 | BLEOMYCIN SULPHATE | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |
| 165 | BLEOMYCIN SULPHATE | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 166 | BLEOMYCIN SULPHATE | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 167 | BLEOMYCIN SULPHATE | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 168 | BLEOMYCIN SULPHATE | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 169 | BLEOMYCIN SULPHATE | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 170 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 171 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 172 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 173 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63.2 | MOSZNA |
| 174 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 175 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 176 | BLEOMYCIN SULPHATE | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 177 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 178 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 179 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 180 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 181 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 182 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 183 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 184 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.6 | MÓZDZEK |
| 185 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 186 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 187 | BLEOMYCIN SULPHATE | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 188 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 189 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 190 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 191 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.2 | BRZUCH |
| 192 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.3 | MIEDNICA |
| 193 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 194 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 195 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 196 | BLEOMYCIN SULPHATE | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 197 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 198 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 199 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 200 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 201 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 202 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 203 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 204 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 205 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 206 | BLEOMYCIN SULPHATE | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 207 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 208 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 209 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 210 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 211 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 212 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 213 | BLEOMYCIN SULPHATE | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 214 | BLEOMYCIN SULPHATE | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 215 | BLEOMYCIN SULPHATE | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 216 | BLEOMYCIN SULPHATE | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 217 | BLEOMYCIN SULPHATE | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 218 | BLEOMYCIN SULPHATE | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 219 | BLEOMYCIN SULPHATE | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 220 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 221 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 222 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 223 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 224 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY, (ROZLANY) |
| 225 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 226 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 227 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 228 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 229 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 230 | BLEOMYCIN SULPHATE | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 231 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 232 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 233 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 234 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 235 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 236 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 237 | BLEOMYCIN SULPHATE | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 238 | BLEOMYCIN SULPHATE | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 239 | BLEOMYCIN SULPHATE | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 240 | BLEOMYCIN SULPHATE | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 241 | BLEOMYCIN SULPHATE | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 242 | BLEOMYCIN SULPHATE | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 243 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 244 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 245 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 246 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 247 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 248 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 249 | BLEOMYCIN SULPHATE | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 250 | BLEOMYCIN SULPHATE | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 251 | BLEOMYCIN SULPHATE | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 252 | BLEOMYCIN SULPHATE | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 253 | BLEOMYCIN SULPHATE | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 254 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 255 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 256 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 257 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 258 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 259 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 260 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 261 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 262 | BLEOMYCIN SULPHATE | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 263 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 264 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 265 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 266 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 267 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 268 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 269 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 270 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 271 | BLEOMYCIN SULPHATE | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 272 | BLEOMYCIN SULPHATE | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 273 | BLEOMYCIN SULPHATE | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 274 | BLEOMYCIN SULPHATE | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 275 | BLEOMYCIN SULPHATE | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 276 | BLEOMYCIN SULPHATE | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 277 | BLEOMYCIN SULPHATE | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 278 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 279 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 280 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 281 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 282 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 283 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 284 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 285 | BLEOMYCIN SULPHATE | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 286 | BLEOMYCIN SULPHATE | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 287 | BLEOMYCIN SULPHATE | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 288 | BLEOMYCIN SULPHATE | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 289 | BLEOMYCIN SULPHATE | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 290 | BLEOMYCIN SULPHATE | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 291 | BLEOMYCIN SULPHATE | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 292 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 293 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 294 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 295 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 296 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 297 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 298 | BLEOMYCIN SULPHATE | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 299 | BLEOMYCIN SULPHATE | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 300 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 301 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 302 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 303 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 304 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 305 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 306 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 307 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 308 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 309 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 310 | BLEOMYCIN SULPHATE | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 311 | BLEOMYCIN SULPHATE | D39.1 | JAJNIK |
| 312 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 313 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 314 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 315 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 316 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 317 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.4 | OTRZEWNA |
| 318 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.5 | SKÓRA |
| 319 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.6 | SUTEK |
| 320 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 321 | BLEOMYCIN SULPHATE | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 322 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 323 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 324 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 325 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 326 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 327 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 328 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 329 | BLEOMYCIN SULPHATE | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.4.

BUSULFANUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | BUSULFANUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 2 | BUSULFANUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 3 | BUSULFANUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 4 | BUSULFANUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 5 | BUSULFANUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 6 | BUSULFANUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 7 | BUSULFANUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 8 | BUSULFANUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 9 | BUSULFANUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 10 | BUSULFANUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 11 | BUSULFANUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 12 | BUSULFANUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 13 | BUSULFANUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 14 | BUSULFANUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 15 | BUSULFANUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 16 | BUSULFANUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 17 | BUSULFANUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 18 | BUSULFANUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 19 | BUSULFANUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 20 | BUSULFANUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 21 | BUSULFANUM | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 22 | BUSULFANUM | D75.2 | NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA |

Załącznik C.5.

CAPECITABINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | CAPECITABINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 2 | CAPECITABINUM | C16.0 | WPUST |
| 3 | CAPECITABINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 4 | CAPECITABINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 5 | CAPECITABINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 6 | CAPECITABINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 7 | CAPECITABINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 8 | CAPECITABINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 9 | CAPECITABINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 10 | CAPECITABINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 11 | CAPECITABINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 12 | CAPECITABINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 13 | CAPECITABINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 14 | CAPECITABINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 15 | CAPECITABINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 16 | CAPECITABINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 17 | CAPECITABINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 18 | CAPECITABINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 19 | CAPECITABINUM | C18.7 | ESICA |
| 20 | CAPECITABINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 21 | CAPECITABINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 22 | CAPECITABINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 23 | CAPECITABINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--------------------------------------|
| 24 | CAPECITABINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 25 | CAPECITABINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 26 | CAPECITABINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 27 | CAPECITABINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 28 | CAPECITABINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 29 | CAPECITABINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 30 | CAPECITABINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 31 | CAPECITABINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 32 | CAPECITABINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 33 | CAPECITABINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.6.

CARBOPLATINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|--|------------|---|
| 1 | CARBOPLATINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | CARBOPLATINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | CARBOPLATINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | CARBOPLATINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | CARBOPLATINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | CARBOPLATINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | CARBOPLATINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | CARBOPLATINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | CARBOPLATINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | CARBOPLATINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | CARBOPLATINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | CARBOPLATINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | CARBOPLATINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | CARBOPLATINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | CARBOPLATINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | CARBOPLATINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | CARBOPLATINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | CARBOPLATINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | CARBOPLATINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | CARBOPLATINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | CARBOPLATINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | CARBOPLATINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | CARBOPLATINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | CARBOPLATINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | CARBOPLATINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | CARBOPLATINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | CARBOPLATINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | CARBOPLATINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | CARBOPLATINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | CARBOPLATINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | CARBOPLATINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | CARBOPLATINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | CARBOPLATINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | CARBOPLATINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | CARBOPLATINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | CARBOPLATINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | CARBOPLATINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | CARBOPLATINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | CARBOPLATINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | CARBOPLATINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | CARBOPLATINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | CARBOPLATINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | CARBOPLATINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | CARBOPLATINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | CARBOPLATINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | CARBOPLATINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | CARBOPLATINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | CARBOPLATINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | CARBOPLATINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | CARBOPLATINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | CARBOPLATINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | CARBOPLATINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | CARBOPLATINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | CARBOPLATINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | CARBOPLATINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | CARBOPLATINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | CARBOPLATINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | CARBOPLATINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | CARBOPLATINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | CARBOPLATINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | CARBOPLATINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | CARBOPLATINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | CARBOPLATINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | CARBOPLATINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | CARBOPLATINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | CARBOPLATINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | CARBOPLATINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | CARBOPLATINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69 | CARBOPLATINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | CARBOPLATINUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | CARBOPLATINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | CARBOPLATINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | CARBOPLATINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | CARBOPLATINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | CARBOPLATINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | CARBOPLATINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | CARBOPLATINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | CARBOPLATINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79 | CARBOPLATINUM | C16.0 | WPUST |
| 80 | CARBOPLATINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81 | CARBOPLATINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82 | CARBOPLATINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83 | CARBOPLATINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84 | CARBOPLATINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85 | CARBOPLATINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86 | CARBOPLATINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87 | CARBOPLATINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88 | CARBOPLATINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89 | CARBOPLATINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90 | CARBOPLATINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91 | CARBOPLATINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92 | CARBOPLATINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93 | CARBOPLATINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94 | CARBOPLATINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95 | CARBOPLATINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96 | CARBOPLATINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97 | CARBOPLATINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98 | CARBOPLATINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99 | CARBOPLATINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100 | CARBOPLATINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101 | CARBOPLATINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 102 | CARBOPLATINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103 | CARBOPLATINUM | C18.7 | ESICA |
| 104 | CARBOPLATINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105 | CARBOPLATINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | CARBOPLATINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107 | CARBOPLATINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108 | CARBOPLATINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109 | CARBOPLATINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110 | CARBOPLATINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111 | CARBOPLATINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112 | CARBOPLATINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113 | CARBOPLATINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114 | CARBOPLATINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115 | CARBOPLATINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116 | CARBOPLATINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117 | CARBOPLATINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118 | CARBOPLATINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119 | CARBOPLATINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120 | CARBOPLATINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121 | CARBOPLATINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122 | CARBOPLATINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123 | CARBOPLATINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124 | CARBOPLATINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125 | CARBOPLATINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126 | CARBOPLATINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127 | CARBOPLATINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 128 | CARBOPLATINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129 | CARBOPLATINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130 | CARBOPLATINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131 | CARBOPLATINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132 | CARBOPLATINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | CARBOPLATINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134 | CARBOPLATINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135 | CARBOPLATINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136 | CARBOPLATINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137 | CARBOPLATINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138 | CARBOPLATINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139 | CARBOPLATINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140 | CARBOPLATINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141 | CARBOPLATINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142 | CARBOPLATINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143 | CARBOPLATINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144 | CARBOPLATINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145 | CARBOPLATINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146 | CARBOPLATINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147 | CARBOPLATINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148 | CARBOPLATINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149 | CARBOPLATINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150 | CARBOPLATINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151 | CARBOPLATINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 152 | CARBOPLATINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 153 | CARBOPLATINUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 154 | CARBOPLATINUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 155 | CARBOPLATINUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 156 | CARBOPLATINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 157 | CARBOPLATINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 158 | CARBOPLATINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 159 | CARBOPLATINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 160 | CARBOPLATINUM | C38.0 | SERCE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 161 | CARBOPLATINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 162 | CARBOPLATINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 163 | CARBOPLATINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 164 | CARBOPLATINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 165 | CARBOPLATINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 166 | CARBOPLATINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 167 | CARBOPLATINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 168 | CARBOPLATINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 169 | CARBOPLATINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBREMBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 170 | CARBOPLATINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 171 | CARBOPLATINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 172 | CARBOPLATINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 173 | CARBOPLATINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 174 | CARBOPLATINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 175 | CARBOPLATINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 176 | CARBOPLATINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 177 | CARBOPLATINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 178 | CARBOPLATINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 179 | CARBOPLATINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 180 | CARBOPLATINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 181 | CARBOPLATINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 182 | CARBOPLATINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 183 | CARBOPLATINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 184 | CARBOPLATINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 185 | CARBOPLATINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 186 | CARBOPLATINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 187 | CARBOPLATINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 188 | CARBOPLATINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 189 | CARBOPLATINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 190 | CARBOPLATINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 191 | CARBOPLATINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 192 | CARBOPLATINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 193 | CARBOPLATINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 194 | CARBOPLATINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 195 | CARBOPLATINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 196 | CARBOPLATINUM | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 197 | CARBOPLATINUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ |
| 198 | CARBOPLATINUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 199 | CARBOPLATINUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 200 | CARBOPLATINUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 201 | CARBOPLATINUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 202 | CARBOPLATINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 203 | CARBOPLATINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 204 | CARBOPLATINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 205 | CARBOPLATINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 206 | CARBOPLATINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 207 | CARBOPLATINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 208 | CARBOPLATINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 209 | CARBOPLATINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 210 | CARBOPLATINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 211 | CARBOPLATINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 212 | CARBOPLATINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNEJ I OTRZEWNEJ |
| 213 | CARBOPLATINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 214 | CARBOPLATINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 215 | CARBOPLATINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 216 | CARBOPLATINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 217 | CARBOPLATINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 218 | CARBOPLATINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 219 | CARBOPLATINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 220 | CARBOPLATINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 221 | CARBOPLATINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 222 | CARBOPLATINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 223 | CARBOPLATINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 224 | CARBOPLATINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 225 | CARBOPLATINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 226 | CARBOPLATINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 227 | CARBOPLATINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 228 | CARBOPLATINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 229 | CARBOPLATINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 230 | CARBOPLATINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 231 | CARBOPLATINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 232 | CARBOPLATINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 233 | CARBOPLATINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 234 | CARBOPLATINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 235 | CARBOPLATINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 236 | CARBOPLATINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 237 | CARBOPLATINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 238 | CARBOPLATINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 239 | CARBOPLATINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 240 | CARBOPLATINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 241 | CARBOPLATINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 242 | CARBOPLATINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 243 | CARBOPLATINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 244 | CARBOPLATINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 245 | CARBOPLATINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 246 | CARBOPLATINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 247 | CARBOPLATINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 248 | CARBOPLATINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 249 | CARBOPLATINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 250 | CARBOPLATINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 251 | CARBOPLATINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 252 | CARBOPLATINUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 253 | CARBOPLATINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 254 | CARBOPLATINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 255 | CARBOPLATINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 256 | CARBOPLATINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 257 | CARBOPLATINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 258 | CARBOPLATINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 259 | CARBOPLATINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 260 | CARBOPLATINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 261 | CARBOPLATINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 262 | CARBOPLATINUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 263 | CARBOPLATINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 264 | CARBOPLATINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 265 | CARBOPLATINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 266 | CARBOPLATINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 267 | CARBOPLATINUM | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |
| 268 | CARBOPLATINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 269 | CARBOPLATINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 270 | CARBOPLATINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 271 | CARBOPLATINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 272 | CARBOPLATINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 273 | CARBOPLATINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 274 | CARBOPLATINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 275 | CARBOPLATINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 276 | CARBOPLATINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 277 | CARBOPLATINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 278 | CARBOPLATINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 279 | CARBOPLATINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 280 | CARBOPLATINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 281 | CARBOPLATINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 282 | CARBOPLATINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 283 | CARBOPLATINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 284 | CARBOPLATINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 285 | CARBOPLATINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 286 | CARBOPLATINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 287 | CARBOPLATINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 288 | CARBOPLATINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 289 | CARBOPLATINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 290 | CARBOPLATINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 291 | CARBOPLATINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 292 | CARBOPLATINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 293 | CARBOPLATINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 294 | CARBOPLATINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 295 | CARBOPLATINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 296 | CARBOPLATINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 297 | CARBOPLATINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 298 | CARBOPLATINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 299 | CARBOPLATINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 300 | CARBOPLATINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 301 | CARBOPLATINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 302 | CARBOPLATINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 303 | CARBOPLATINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 304 | CARBOPLATINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 305 | CARBOPLATINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 306 | CARBOPLATINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 307 | CARBOPLATINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 308 | CARBOPLATINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 309 | CARBOPLATINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 310 | CARBOPLATINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 311 | CARBOPLATINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 312 | CARBOPLATINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 313 | CARBOPLATINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 314 | CARBOPLATINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 315 | CARBOPLATINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 316 | CARBOPLATINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 317 | CARBOPLATINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 318 | CARBOPLATINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 319 | CARBOPLATINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 320 | CARBOPLATINUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 321 | CARBOPLATINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 322 | CARBOPLATINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 323 | CARBOPLATINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 324 | CARBOPLATINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 325 | CARBOPLATINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 326 | CARBOPLATINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 327 | CARBOPLATINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 328 | CARBOPLATINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 329 | CARBOPLATINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 330 | CARBOPLATINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 331 | CARBOPLATINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 332 | CARBOPLATINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 333 | CARBOPLATINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 334 | CARBOPLATINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 335 | CARBOPLATINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 336 | CARBOPLATINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 337 | CARBOPLATINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 338 | CARBOPLATINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 339 | CARBOPLATINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 340 | CARBOPLATINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 341 | CARBOPLATINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 342 | CARBOPLATINUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 343 | CARBOPLATINUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 344 | CARBOPLATINUM | C75.5 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 345 | CARBOPLATINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 346 | CARBOPLATINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 347 | CARBOPLATINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 348 | CARBOPLATINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 349 | CARBOPLATINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 350 | CARBOPLATINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 351 | CARBOPLATINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 352 | CARBOPLATINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 353 | CARBOPLATINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 354 | CARBOPLATINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 355 | CARBOPLATINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 356 | CARBOPLATINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 357 | CARBOPLATINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 358 | CARBOPLATINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 359 | CARBOPLATINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 360 | CARBOPLATINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 361 | CARBOPLATINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 362 | CARBOPLATINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 363 | CARBOPLATINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 364 | CARBOPLATINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 365 | CARBOPLATINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 366 | CARBOPLATINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 367 | CARBOPLATINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 368 | CARBOPLATINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 369 | CARBOPLATINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 370 | CARBOPLATINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 371 | CARBOPLATINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 372 | CARBOPLATINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 373 | CARBOPLATINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 374 | CARBOPLATINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 375 | CARBOPLATINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 376 | CARBOPLATINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 377 | CARBOPLATINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 378 | CARBOPLATINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 379 | CARBOPLATINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 380 | CARBOPLATINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 381 | CARBOPLATINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 382 | CARBOPLATINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 383 | CARBOPLATINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 384 | CARBOPLATINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 385 | CARBOPLATINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 386 | CARBOPLATINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 387 | CARBOPLATINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 388 | CARBOPLATINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 389 | CARBOPLATINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 390 | CARBOPLATINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 391 | CARBOPLATINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 392 | CARBOPLATINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 393 | CARBOPLATINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 394 | CARBOPLATINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 395 | CARBOPLATINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 396 | CARBOPLATINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 397 | CARBOPLATINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 398 | CARBOPLATINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 399 | CARBOPLATINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 400 | CARBOPLATINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 401 | CARBOPLATINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 402 | CARBOPLATINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 403 | CARBOPLATINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 404 | CARBOPLATINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 405 | CARBOPLATINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 406 | CARBOPLATINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 407 | CARBOPLATINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 408 | CARBOPLATINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 409 | CARBOPLATINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 410 | CARBOPLATINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 411 | CARBOPLATINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 412 | CARBOPLATINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 413 | CARBOPLATINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 414 | CARBOPLATINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 415 | CARBOPLATINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 416 | CARBOPLATINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 417 | CARBOPLATINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 418 | CARBOPLATINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 419 | CARBOPLATINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 420 | CARBOPLATINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 421 | CARBOPLATINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 422 | CARBOPLATINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 423 | CARBOPLATINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 424 | CARBOPLATINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 425 | CARBOPLATINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 426 | CARBOPLATINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 427 | CARBOPLATINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 428 | CARBOPLATINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 429 | CARBOPLATINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 430 | CARBOPLATINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 431 | CARBOPLATINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 432 | CARBOPLATINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 433 | CARBOPLATINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 434 | CARBOPLATINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 435 | CARBOPLATINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 436 | CARBOPLATINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 437 | CARBOPLATINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 438 | CARBOPLATINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 439 | CARBOPLATINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 440 | CARBOPLATINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 441 | CARBOPLATINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 442 | CARBOPLATINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 443 | CARBOPLATINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 444 | CARBOPLATINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 445 | CARBOPLATINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 446 | CARBOPLATINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 447 | CARBOPLATINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 448 | CARBOPLATINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 449 | CARBOPLATINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 450 | CARBOPLATINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 451 | CARBOPLATINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 452 | CARBOPLATINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 453 | CARBOPLATINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 454 | CARBOPLATINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 455 | CARBOPLATINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 456 | CARBOPLATINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 457 | CARBOPLATINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 458 | CARBOPLATINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 459 | CARBOPLATINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 460 | CARBOPLATINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 461 | CARBOPLATINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 462 | CARBOPLATINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 463 | CARBOPLATINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 464 | CARBOPLATINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 465 | CARBOPLATINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 466 | CARBOPLATINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 467 | CARBOPLATINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 468 | CARBOPLATINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 469 | CARBOPLATINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 470 | CARBOPLATINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 471 | CARBOPLATINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 472 | CARBOPLATINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 473 | CARBOPLATINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 474 | CARBOPLATINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 475 | CARBOPLATINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 476 | CARBOPLATINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 477 | CARBOPLATINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 478 | CARBOPLATINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 479 | CARBOPLATINUM | D00.2 | ŻOŁĄDEK |
| 480 | CARBOPLATINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 481 | CARBOPLATINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 482 | CARBOPLATINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 483 | CARBOPLATINUM | D01.2 | ODBYTNICA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 484 | CARBOPLATINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 485 | CARBOPLATINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 486 | CARBOPLATINUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 487 | CARBOPLATINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 488 | CARBOPLATINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 489 | CARBOPLATINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 490 | CARBOPLATINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 491 | CARBOPLATINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 492 | CARBOPLATINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 493 | CARBOPLATINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 494 | CARBOPLATINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 495 | CARBOPLATINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 496 | CARBOPLATINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 497 | CARBOPLATINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 498 | CARBOPLATINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 499 | CARBOPLATINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 500 | CARBOPLATINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 501 | CARBOPLATINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 502 | CARBOPLATINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 503 | CARBOPLATINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 504 | CARBOPLATINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 505 | CARBOPLATINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 506 | CARBOPLATINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 507 | CARBOPLATINUM | D07.1 | SROM |
| 508 | CARBOPLATINUM | D07.2 | POCHWA |
| 509 | CARBOPLATINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 510 | CARBOPLATINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 511 | CARBOPLATINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 512 | CARBOPLATINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 513 | CARBOPLATINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 514 | CARBOPLATINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 515 | CARBOPLATINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 516 | CARBOPLATINUM | D09.2 | OKO |
| 517 | CARBOPLATINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 518 | CARBOPLATINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 519 | CARBOPLATINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 520 | CARBOPLATINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 521 | CARBOPLATINUM | D10.0 | WARGA |
| 522 | CARBOPLATINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 523 | CARBOPLATINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 524 | CARBOPLATINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 525 | CARBOPLATINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 526 | CARBOPLATINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 527 | CARBOPLATINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 528 | CARBOPLATINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 529 | CARBOPLATINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 530 | CARBOPLATINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 531 | CARBOPLATINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 532 | CARBOPLATINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 533 | CARBOPLATINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 534 | CARBOPLATINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 535 | CARBOPLATINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 536 | CARBOPLATINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 537 | CARBOPLATINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 538 | CARBOPLATINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 539 | CARBOPLATINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 540 | CARBOPLATINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 541 | CARBOPLATINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 542 | CARBOPLATINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 543 | CARBOPLATINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 544 | CARBOPLATINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 545 | CARBOPLATINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 546 | CARBOPLATINUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 547 | CARBOPLATINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 548 | CARBOPLATINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 549 | CARBOPLATINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 550 | CARBOPLATINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 551 | CARBOPLATINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 552 | CARBOPLATINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 553 | CARBOPLATINUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 554 | CARBOPLATINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 555 | CARBOPLATINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 556 | CARBOPLATINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 557 | CARBOPLATINUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 558 | CARBOPLATINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 559 | CARBOPLATINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 560 | CARBOPLATINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 561 | CARBOPLATINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 562 | CARBOPLATINUM | D15.0 | GRASICA |
| 563 | CARBOPLATINUM | D15.1 | SERCE |
| 564 | CARBOPLATINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 565 | CARBOPLATINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 566 | CARBOPLATINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 567 | CARBOPLATINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 568 | CARBOPLATINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 569 | CARBOPLATINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 570 | CARBOPLATINUM | D16.2 | KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 571 | CARBOPLATINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 572 | CARBOPLATINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 573 | CARBOPLATINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 574 | CARBOPLATINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 575 | CARBOPLATINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 576 | CARBOPLATINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 577 | CARBOPLATINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 578 | CARBOPLATINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 579 | CARBOPLATINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 580 | CARBOPLATINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 581 | CARBOPLATINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 582 | CARBOPLATINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 583 | CARBOPLATINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 584 | CARBOPLATINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 585 | CARBOPLATINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 586 | CARBOPLATINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 587 | CARBOPLATINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 588 | CARBOPLATINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 589 | CARBOPLATINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 590 | CARBOPLATINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 591 | CARBOPLATINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 592 | CARBOPLATINUM | D28.0 | SROM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 593 | CARBOPLATINUM | D28.1 | POCHWA |
| 594 | CARBOPLATINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 595 | CARBOPLATINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 596 | CARBOPLATINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 597 | CARBOPLATINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 598 | CARBOPLATINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 599 | CARBOPLATINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 600 | CARBOPLATINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 601 | CARBOPLATINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 602 | CARBOPLATINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 603 | CARBOPLATINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 604 | CARBOPLATINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 605 | CARBOPLATINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 606 | CARBOPLATINUM | D30.0 | NERKA |
| 607 | CARBOPLATINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 608 | CARBOPLATINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 609 | CARBOPLATINUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 610 | CARBOPLATINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 611 | CARBOPLATINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 612 | CARBOPLATINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 613 | CARBOPLATINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 614 | CARBOPLATINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 615 | CARBOPLATINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 616 | CARBOPLATINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 617 | CARBOPLATINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 618 | CARBOPLATINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 619 | CARBOPLATINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 620 | CARBOPLATINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 621 | CARBOPLATINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 622 | CARBOPLATINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 623 | CARBOPLATINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 624 | CARBOPLATINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 625 | CARBOPLATINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 626 | CARBOPLATINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 627 | CARBOPLATINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 628 | CARBOPLATINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 629 | CARBOPLATINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 630 | CARBOPLATINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 631 | CARBOPLATINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 632 | CARBOPLATINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 633 | CARBOPLATINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 634 | CARBOPLATINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 635 | CARBOPLATINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 636 | CARBOPLATINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 637 | CARBOPLATINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 638 | CARBOPLATINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 639 | CARBOPLATINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 640 | CARBOPLATINUM | D35.4 | SZYSZYŃKA |
| 641 | CARBOPLATINUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 642 | CARBOPLATINUM | D35.6 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 643 | CARBOPLATINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 644 | CARBOPLATINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 645 | CARBOPLATINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 646 | CARBOPLATINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 647 | CARBOPLATINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 648 | CARBOPLATINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 649 | CARBOPLATINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 650 | CARBOPLATINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 651 | CARBOPLATINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 652 | CARBOPLATINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 653 | CARBOPLATINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 654 | CARBOPLATINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 655 | CARBOPLATINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 656 | CARBOPLATINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 657 | CARBOPLATINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 658 | CARBOPLATINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 659 | CARBOPLATINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 660 | CARBOPLATINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 661 | CARBOPLATINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 662 | CARBOPLATINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 663 | CARBOPLATINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 664 | CARBOPLATINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 665 | CARBOPLATINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 666 | CARBOPLATINUM | D38.4 | GRASICA |
| 667 | CARBOPLATINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 668 | CARBOPLATINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 669 | CARBOPLATINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 670 | CARBOPLATINUM | D39.0 | MACICA |
| 671 | CARBOPLATINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 672 | CARBOPLATINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 673 | CARBOPLATINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 674 | CARBOPLATINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 675 | CARBOPLATINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 676 | CARBOPLATINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 677 | CARBOPLATINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 678 | CARBOPLATINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 679 | CARBOPLATINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 680 | CARBOPLATINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 681 | CARBOPLATINUM | D41.0 | NERKA |
| 682 | CARBOPLATINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 683 | CARBOPLATINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 684 | CARBOPLATINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 685 | CARBOPLATINUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 686 | CARBOPLATINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 687 | CARBOPLATINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 688 | CARBOPLATINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 689 | CARBOPLATINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 690 | CARBOPLATINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 691 | CARBOPLATINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 692 | CARBOPLATINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 693 | CARBOPLATINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMBIOTOWE |
| 694 | CARBOPLATINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMBIOTOWE |
| 695 | CARBOPLATINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 696 | CARBOPLATINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 697 | CARBOPLATINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 698 | CARBOPLATINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 699 | CARBOPLATINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 700 | CARBOPLATINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 701 | CARBOPLATINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 702 | CARBOPLATINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 703 | CARBOPLATINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 704 | CARBOPLATINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 705 | CARBOPLATINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 706 | CARBOPLATINUM | D44.5 | SZYSZYNKI |
| 707 | CARBOPLATINUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 708 | CARBOPLATINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 709 | CARBOPLATINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 710 | CARBOPLATINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 711 | CARBOPLATINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 712 | CARBOPLATINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 713 | CARBOPLATINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 714 | CARBOPLATINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 715 | CARBOPLATINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 716 | CARBOPLATINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 717 | CARBOPLATINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 718 | CARBOPLATINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNA |
| 719 | CARBOPLATINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 720 | CARBOPLATINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 721 | CARBOPLATINUM | D48.6 | SUTEK |
| 722 | CARBOPLATINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 723 | CARBOPLATINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 724 | CARBOPLATINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 725 | CARBOPLATINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 726 | CARBOPLATINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 727 | CARBOPLATINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 728 | CARBOPLATINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 729 | CARBOPLATINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 730 | CARBOPLATINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 731 | CARBOPLATINUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 732 | CARBOPLATINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 733 | CARBOPLATINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.8.

CHLORAMBUCILUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 1 | CHLORAMBUCILUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 2 | CHLORAMBUCILUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 3 | CHLORAMBUCILUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 4 | CHLORAMBUCILUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 5 | CHLORAMBUCILUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 6 | CHLORAMBUCILUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 7 | CHLORAMBUCILUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 8 | CHLORAMBUCILUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 9 | CHLORAMBUCILUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 10 | CHLORAMBUCILUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 11 | CHLORAMBUCILUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 12 | CHLORAMBUCILUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 13 | CHLORAMBUCILUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 14 | CHLORAMBUCILUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 15 | CHLORAMBUCILUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 16 | CHLORAMBUCILUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 17 | CHLORAMBUCILUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 18 | CHLORAMBUCILUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 19 | CHLORAMBUCILUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 20 | CHLORAMBUCILUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 21 | CHLORAMBUCILUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 22 | CHLORAMBUCILUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 23 | CHLORAMBUCILUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 24 | CHLORAMBUCILUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 25 | CHLORAMBUCILUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 26 | CHLORAMBUCILUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 27 | CHLORAMBUCILUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 28 | CHLORAMBUCILUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 29 | CHLORAMBUCILUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 30 | CHLORAMBUCILUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 31 | CHLORAMBUCILUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 32 | CHLORAMBUCILUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 33 | CHLORAMBUCILUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 34 | CHLORAMBUCILUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 35 | CHLORAMBUCILUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 36 | CHLORAMBUCILUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 37 | CHLORAMBUCILUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 38 | CHLORAMBUCILUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 39 | CHLORAMBUCILUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 40 | CHLORAMBUCILUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 41 | CHLORAMBUCILUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 42 | CHLORAMBUCILUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 43 | CHLORAMBUCILUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 44 | CHLORAMBUCILUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 45 | CHLORAMBUCILUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 46 | CHLORAMBUCILUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 47 | CHLORAMBUCILUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.10.

CICLOSPORINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | CICLOSPORINUM | D61 | INNE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE |
| 2 | CICLOSPORINUM | D61.0 | NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA KONSTYTUCJONALNA |
| 3 | CICLOSPORINUM | D61.1 | NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA WYWOŁANA LEKAMI |
| 4 | CICLOSPORINUM | D61.2 | NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA SPOWODOANA INNYMI CZYNNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI |
| 5 | CICLOSPORINUM | D61.3 | NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA IDIOPATYCZNA |
| 6 | CICLOSPORINUM | D61.8 | INNE OKREŚLONE NIEDOKRWISTOŚCI APLASTYCZNE |
| 7 | CICLOSPORINUM | D61.9 | NIEOKREŚLONA NIEDOKRWISTOŚĆ APLASTYCZNA |
| 8 | CICLOSPORINUM | D76 | NIEKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO |
| 9 | CICLOSPORINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 10 | CICLOSPORINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 11 | CICLOSPORINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 12 | CICLOSPORINUM | D76.3 | INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE |
| 13 | CICLOSPORINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 14 | CICLOSPORINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 15 | CICLOSPORINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 16 | CICLOSPORINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |

Załącznik C.11.

CISPLATINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | CISPLATINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | CISPLATINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | CISPLATINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | CISPLATINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | CISPLATINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | CISPLATINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | CISPLATINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | CISPLATINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | CISPLATINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | CISPLATINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | CISPLATINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | CISPLATINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | CISPLATINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | CISPLATINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | CISPLATINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | CISPLATINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | CISPLATINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | CISPLATINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | CISPLATINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | CISPLATINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | CISPLATINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | CISPLATINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | CISPLATINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | CISPLATINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | CISPLATINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | CISPLATINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | CISPLATINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | CISPLATINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | CISPLATINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | CISPLATINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | CISPLATINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | CISPLATINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | CISPLATINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | CISPLATINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | CISPLATINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | CISPLATINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | CISPLATINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | CISPLATINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | CISPLATINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | CISPLATINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | CISPLATINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | CISPLATINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | CISPLATINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | CISPLATINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | CISPLATINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | CISPLATINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | CISPLATINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | CISPLATINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | CISPLATINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | CISPLATINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | CISPLATINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | CISPLATINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | CISPLATINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | CISPLATINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | CISPLATINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | CISPLATINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | CISPLATINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZELOWA |
| 58 | CISPLATINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | CISPLATINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | CISPLATINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | CISPLATINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | CISPLATINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | CISPLATINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | CISPLATINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | CISPLATINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | CISPLATINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | CISPLATINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | CISPLATINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69 | CISPLATINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | CISPLATINUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | CISPLATINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | CISPLATINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | CISPLATINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | CISPLATINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | CISPLATINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | CISPLATINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHLONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | CISPLATINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78 | CISPLATINUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 79 | CISPLATINUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 80 | CISPLATINUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 81 | CISPLATINUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 82 | CISPLATINUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 83 | CISPLATINUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 84 | CISPLATINUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 85 | CISPLATINUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 86 | CISPLATINUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 87 | CISPLATINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 88 | CISPLATINUM | C16.0 | WPUST |
| 89 | CISPLATINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 90 | CISPLATINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 91 | CISPLATINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 92 | CISPLATINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 93 | CISPLATINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 94 | CISPLATINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 95 | CISPLATINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 96 | CISPLATINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 97 | CISPLATINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 98 | CISPLATINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 99 | CISPLATINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 100 | CISPLATINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 101 | CISPLATINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 102 | CISPLATINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 103 | CISPLATINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 104 | CISPLATINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 105 | CISPLATINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 106 | CISPLATINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 107 | CISPLATINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 108 | CISPLATINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 109 | CISPLATINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 110 | CISPLATINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 111 | CISPLATINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 112 | CISPLATINUM | C18.7 | ESICA |
| 113 | CISPLATINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 114 | CISPLATINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 115 | CISPLATINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 116 | CISPLATINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 117 | CISPLATINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 118 | CISPLATINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 119 | CISPLATINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 120 | CISPLATINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 121 | CISPLATINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 122 | CISPLATINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 123 | CISPLATINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 124 | CISPLATINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 125 | CISPLATINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 126 | CISPLATINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 127 | CISPLATINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 128 | CISPLATINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 129 | CISPLATINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 130 | CISPLATINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 131 | CISPLATINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 132 | CISPLATINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 133 | CISPLATINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 134 | CISPLATINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 135 | CISPLATINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 136 | CISPLATINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 137 | CISPLATINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 138 | CISPLATINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 139 | CISPLATINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 140 | CISPLATINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 141 | CISPLATINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 142 | CISPLATINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 143 | CISPLATINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 144 | CISPLATINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 145 | CISPLATINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 146 | CISPLATINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 147 | CISPLATINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 148 | CISPLATINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 149 | CISPLATINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 150 | CISPLATINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 151 | CISPLATINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 152 | CISPLATINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 153 | CISPLATINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 154 | CISPLATINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 155 | CISPLATINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 156 | CISPLATINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 157 | CISPLATINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 158 | CISPLATINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 159 | CISPLATINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 160 | CISPLATINUM | C32 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI |
| 161 | CISPLATINUM | C32.0 | GŁOŚNIA |
| 162 | CISPLATINUM | C32.1 | NAGŁOŚNIA |
| 163 | CISPLATINUM | C32.2 | JAMA PODGŁOŚNIOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 164 | CISPLATINUM | C32.3 | CHRZĄSTKI KRTANI |
| 165 | CISPLATINUM | C32.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI |
| 166 | CISPLATINUM | C32.9 | KRTAŃ, NIEOKREŚLONA |
| 167 | CISPLATINUM | C33 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY |
| 168 | CISPLATINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 169 | CISPLATINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 170 | CISPLATINUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 171 | CISPLATINUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 172 | CISPLATINUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 173 | CISPLATINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 174 | CISPLATINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 175 | CISPLATINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 176 | CISPLATINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 177 | CISPLATINUM | C38.0 | SERCE |
| 178 | CISPLATINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 179 | CISPLATINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 180 | CISPLATINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 181 | CISPLATINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 182 | CISPLATINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 183 | CISPLATINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 184 | CISPLATINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 185 | CISPLATINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 186 | CISPLATINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 187 | CISPLATINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 188 | CISPLATINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 189 | CISPLATINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 190 | CISPLATINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 191 | CISPLATINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 192 | CISPLATINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 193 | CISPLATINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 194 | CISPLATINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 195 | CISPLATINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 196 | CISPLATINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 197 | CISPLATINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 198 | CISPLATINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 199 | CISPLATINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 200 | CISPLATINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 201 | CISPLATINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 202 | CISPLATINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 203 | CISPLATINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 204 | CISPLATINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 205 | CISPLATINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 206 | CISPLATINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 207 | CISPLATINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 208 | CISPLATINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 209 | CISPLATINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 210 | CISPLATINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 211 | CISPLATINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 212 | CISPLATINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 213 | CISPLATINUM | C44 | INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY |
| 214 | CISPLATINUM | C44.0 | SKÓRA WARGI |
| 215 | CISPLATINUM | C44.1 | SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 216 | CISPLATINUM | C44.2 | SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 217 | CISPLATINUM | C44.3 | SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 218 | CISPLATINUM | C44.4 | SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI |
| 219 | CISPLATINUM | C44.5 | SKÓRA TUŁOWIA |
| 220 | CISPLATINUM | C44.6 | SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 221 | CISPLATINUM | C44.7 | SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 222 | CISPLATINUM | C44.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI |
| 223 | CISPLATINUM | C44.9 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 224 | CISPLATINUM | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 225 | CISPLATINUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ |
| 226 | CISPLATINUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 227 | CISPLATINUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 228 | CISPLATINUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 229 | CISPLATINUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 230 | CISPLATINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 231 | CISPLATINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 232 | CISPLATINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 233 | CISPLATINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 234 | CISPLATINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 235 | CISPLATINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 236 | CISPLATINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 237 | CISPLATINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 238 | CISPLATINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 239 | CISPLATINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 240 | CISPLATINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 241 | CISPLATINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 242 | CISPLATINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 243 | CISPLATINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 244 | CISPLATINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 245 | CISPLATINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 246 | CISPLATINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 247 | CISPLATINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 248 | CISPLATINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 249 | CISPLATINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 250 | CISPLATINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 251 | CISPLATINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 252 | CISPLATINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 253 | CISPLATINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 254 | CISPLATINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 255 | CISPLATINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 256 | CISPLATINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 257 | CISPLATINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 258 | CISPLATINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 259 | CISPLATINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 260 | CISPLATINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 261 | CISPLATINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 262 | CISPLATINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 263 | CISPLATINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 264 | CISPLATINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 265 | CISPLATINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 266 | CISPLATINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 267 | CISPLATINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 268 | CISPLATINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 269 | CISPLATINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 270 | CISPLATINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 271 | CISPLATINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 272 | CISPLATINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 273 | CISPLATINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 274 | CISPLATINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 275 | CISPLATINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 276 | CISPLATINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 277 | CISPLATINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 278 | CISPLATINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 279 | CISPLATINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 280 | CISPLATINUM | C54.2 | MIĘŚNIOWKA MACICY |
| 281 | CISPLATINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 282 | CISPLATINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 283 | CISPLATINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 284 | CISPLATINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 285 | CISPLATINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 286 | CISPLATINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 287 | CISPLATINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 288 | CISPLATINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 289 | CISPLATINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 290 | CISPLATINUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 291 | CISPLATINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 292 | CISPLATINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 293 | CISPLATINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 294 | CISPLATINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 295 | CISPLATINUM | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |
| 296 | CISPLATINUM | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 297 | CISPLATINUM | C60.0 | NAPLETEK |
| 298 | CISPLATINUM | C60.1 | ŻOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 299 | CISPLATINUM | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 300 | CISPLATINUM | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 301 | CISPLATINUM | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 302 | CISPLATINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 303 | CISPLATINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 304 | CISPLATINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 305 | CISPLATINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 306 | CISPLATINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 307 | CISPLATINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 308 | CISPLATINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 309 | CISPLATINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 310 | CISPLATINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 311 | CISPLATINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 312 | CISPLATINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 313 | CISPLATINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 314 | CISPLATINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 315 | CISPLATINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 316 | CISPLATINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 317 | CISPLATINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 318 | CISPLATINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 319 | CISPLATINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 320 | CISPLATINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 321 | CISPLATINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 322 | CISPLATINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 323 | CISPLATINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 324 | CISPLATINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 325 | CISPLATINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 326 | CISPLATINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 327 | CISPLATINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 328 | CISPLATINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 329 | CISPLATINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 330 | CISPLATINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 331 | CISPLATINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 332 | CISPLATINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 333 | CISPLATINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 334 | CISPLATINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 335 | CISPLATINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 336 | CISPLATINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 337 | CISPLATINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 338 | CISPLATINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 339 | CISPLATINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 340 | CISPLATINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 341 | CISPLATINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 342 | CISPLATINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 343 | CISPLATINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 344 | CISPLATINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 345 | CISPLATINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 346 | CISPLATINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 347 | CISPLATINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 348 | CISPLATINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 349 | CISPLATINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 350 | CISPLATINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 351 | CISPLATINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 352 | CISPLATINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 353 | CISPLATINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 354 | CISPLATINUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 355 | CISPLATINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 356 | CISPLATINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 357 | CISPLATINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 358 | CISPLATINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 359 | CISPLATINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 360 | CISPLATINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 361 | CISPLATINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 362 | CISPLATINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 363 | CISPLATINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 364 | CISPLATINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 365 | CISPLATINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 366 | CISPLATINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 367 | CISPLATINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 368 | CISPLATINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 369 | CISPLATINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 370 | CISPLATINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 371 | CISPLATINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 372 | CISPLATINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 373 | CISPLATINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 374 | CISPLATINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 375 | CISPLATINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 376 | CISPLATINUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 377 | CISPLATINUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 378 | CISPLATINUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 379 | CISPLATINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 380 | CISPLATINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 381 | CISPLATINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 382 | CISPLATINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 383 | CISPLATINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 384 | CISPLATINUM | C76.2 | BRZUCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 385 | CISPLATINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 386 | CISPLATINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 387 | CISPLATINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 388 | CISPLATINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 389 | CISPLATINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 390 | CISPLATINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 391 | CISPLATINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 392 | CISPLATINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 393 | CISPLATINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 394 | CISPLATINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 395 | CISPLATINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 396 | CISPLATINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 397 | CISPLATINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 398 | CISPLATINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 399 | CISPLATINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 400 | CISPLATINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 401 | CISPLATINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 402 | CISPLATINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ |
| 403 | CISPLATINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 404 | CISPLATINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 405 | CISPLATINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 406 | CISPLATINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 407 | CISPLATINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 408 | CISPLATINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 409 | CISPLATINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 410 | CISPLATINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 411 | CISPLATINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 412 | CISPLATINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 413 | CISPLATINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 414 | CISPLATINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 415 | CISPLATINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 416 | CISPLATINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 417 | CISPLATINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 418 | CISPLATINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 419 | CISPLATINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 420 | CISPLATINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 421 | CISPLATINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 422 | CISPLATINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 423 | CISPLATINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 424 | CISPLATINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 425 | CISPLATINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 426 | CISPLATINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 427 | CISPLATINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 428 | CISPLATINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 429 | CISPLATINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 430 | CISPLATINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 431 | CISPLATINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 432 | CISPLATINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 433 | CISPLATINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 434 | CISPLATINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 435 | CISPLATINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 436 | CISPLATINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 437 | CISPLATINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 438 | CISPLATINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 439 | CISPLATINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 440 | CISPLATINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 441 | CISPLATINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 442 | CISPLATINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 443 | CISPLATINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 444 | CISPLATINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 445 | CISPLATINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 446 | CISPLATINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 447 | CISPLATINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 448 | CISPLATINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 449 | CISPLATINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 450 | CISPLATINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 451 | CISPLATINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 452 | CISPLATINUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 453 | CISPLATINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 454 | CISPLATINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 455 | CISPLATINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 456 | CISPLATINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 457 | CISPLATINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 458 | CISPLATINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 459 | CISPLATINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 460 | CISPLATINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 461 | CISPLATINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 462 | CISPLATINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 463 | CISPLATINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 464 | CISPLATINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 465 | CISPLATINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 466 | CISPLATINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 467 | CISPLATINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 468 | CISPLATINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 469 | CISPLATINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 470 | CISPLATINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 471 | CISPLATINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 472 | CISPLATINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 473 | CISPLATINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 474 | CISPLATINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 475 | CISPLATINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 476 | CISPLATINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 477 | CISPLATINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 478 | CISPLATINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 479 | CISPLATINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 480 | CISPLATINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 481 | CISPLATINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 482 | CISPLATINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 483 | CISPLATINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 484 | CISPLATINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 485 | CISPLATINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 486 | CISPLATINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 487 | CISPLATINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 488 | CISPLATINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 489 | CISPLATINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 490 | CISPLATINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 491 | CISPLATINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 492 | CISPLATINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 493 | CISPLATINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 494 | CISPLATINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 495 | CISPLATINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 496 | CISPLATINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 497 | CISPLATINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 498 | CISPLATINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 499 | CISPLATINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 500 | CISPLATINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 501 | CISPLATINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 502 | CISPLATINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 503 | CISPLATINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 504 | CISPLATINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 505 | CISPLATINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 506 | CISPLATINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 507 | CISPLATINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 508 | CISPLATINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 509 | CISPLATINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 510 | CISPLATINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 511 | CISPLATINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 512 | CISPLATINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 513 | CISPLATINUM | D00.2 | ŻOŁĄDEK |
| 514 | CISPLATINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 515 | CISPLATINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 516 | CISPLATINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 517 | CISPLATINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 518 | CISPLATINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 519 | CISPLATINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 520 | CISPLATINUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 521 | CISPLATINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 522 | CISPLATINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 523 | CISPLATINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 524 | CISPLATINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 525 | CISPLATINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 526 | CISPLATINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 527 | CISPLATINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 528 | CISPLATINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 529 | CISPLATINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 530 | CISPLATINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 531 | CISPLATINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 532 | CISPLATINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 533 | CISPLATINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 534 | CISPLATINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 535 | CISPLATINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 536 | CISPLATINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 537 | CISPLATINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 538 | CISPLATINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 539 | CISPLATINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 540 | CISPLATINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 541 | CISPLATINUM | D07.1 | SROM |
| 542 | CISPLATINUM | D07.2 | POCHWA |
| 543 | CISPLATINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 544 | CISPLATINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 545 | CISPLATINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 546 | CISPLATINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 547 | CISPLATINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 548 | CISPLATINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 549 | CISPLATINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 550 | CISPLATINUM | D09.2 | OKO |
| 551 | CISPLATINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 552 | CISPLATINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 553 | CISPLATINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 554 | CISPLATINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 555 | CISPLATINUM | D10.0 | WARGA |
| 556 | CISPLATINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 557 | CISPLATINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 558 | CISPLATINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 559 | CISPLATINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 560 | CISPLATINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 561 | CISPLATINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 562 | CISPLATINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 563 | CISPLATINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 564 | CISPLATINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 565 | CISPLATINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 566 | CISPLATINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 567 | CISPLATINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 568 | CISPLATINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 569 | CISPLATINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 570 | CISPLATINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 571 | CISPLATINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 572 | CISPLATINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 573 | CISPLATINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 574 | CISPLATINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 575 | CISPLATINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 576 | CISPLATINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 577 | CISPLATINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 578 | CISPLATINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 579 | CISPLATINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 580 | CISPLATINUM | D13.0 | PRZELYK |
| 581 | CISPLATINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 582 | CISPLATINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 583 | CISPLATINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 584 | CISPLATINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 585 | CISPLATINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 586 | CISPLATINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 587 | CISPLATINUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 588 | CISPLATINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 589 | CISPLATINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 590 | CISPLATINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 591 | CISPLATINUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 592 | CISPLATINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 593 | CISPLATINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 594 | CISPLATINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 595 | CISPLATINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 596 | CISPLATINUM | D15.0 | GRASICA |
| 597 | CISPLATINUM | D15.1 | SERCE |
| 598 | CISPLATINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 599 | CISPLATINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 600 | CISPLATINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 601 | CISPLATINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 602 | CISPLATINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 603 | CISPLATINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 604 | CISPLATINUM | D16.2 | KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 605 | CISPLATINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 606 | CISPLATINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 607 | CISPLATINUM | D16.5 | ZUCHWA |
| 608 | CISPLATINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 609 | CISPLATINUM | D16.7 | ZĘBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 610 | CISPLATINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 611 | CISPLATINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 612 | CISPLATINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 613 | CISPLATINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 614 | CISPLATINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 615 | CISPLATINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 616 | CISPLATINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 617 | CISPLATINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 618 | CISPLATINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 619 | CISPLATINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 620 | CISPLATINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 621 | CISPLATINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 622 | CISPLATINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 623 | CISPLATINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 624 | CISPLATINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 625 | CISPLATINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 626 | CISPLATINUM | D28.0 | SROM |
| 627 | CISPLATINUM | D28.1 | POCHWA |
| 628 | CISPLATINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 629 | CISPLATINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 630 | CISPLATINUM | D28.9 | ZEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 631 | CISPLATINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 632 | CISPLATINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 633 | CISPLATINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 634 | CISPLATINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 635 | CISPLATINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 636 | CISPLATINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 637 | CISPLATINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 638 | CISPLATINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 639 | CISPLATINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 640 | CISPLATINUM | D30.0 | NERKA |
| 641 | CISPLATINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 642 | CISPLATINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 643 | CISPLATINUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 644 | CISPLATINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 645 | CISPLATINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 646 | CISPLATINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 647 | CISPLATINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 648 | CISPLATINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 649 | CISPLATINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 650 | CISPLATINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 651 | CISPLATINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 652 | CISPLATINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 653 | CISPLATINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 654 | CISPLATINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 655 | CISPLATINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 656 | CISPLATINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 657 | CISPLATINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 658 | CISPLATINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 659 | CISPLATINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 660 | CISPLATINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 661 | CISPLATINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 662 | CISPLATINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 663 | CISPLATINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 664 | CISPLATINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 665 | CISPLATINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 666 | CISPLATINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 667 | CISPLATINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 668 | CISPLATINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 669 | CISPLATINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 670 | CISPLATINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 671 | CISPLATINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 672 | CISPLATINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 673 | CISPLATINUM | D35.4 | SZYSZYŃKA |
| 674 | CISPLATINUM | D35.5 | KLĘBEK SZYJNY |
| 675 | CISPLATINUM | D35.6 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 676 | CISPLATINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 677 | CISPLATINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 678 | CISPLATINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 679 | CISPLATINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 680 | CISPLATINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 681 | CISPLATINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 682 | CISPLATINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 683 | CISPLATINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 684 | CISPLATINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 685 | CISPLATINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 686 | CISPLATINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 687 | CISPLATINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 688 | CISPLATINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 689 | CISPLATINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 690 | CISPLATINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 691 | CISPLATINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 692 | CISPLATINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 693 | CISPLATINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 694 | CISPLATINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 695 | CISPLATINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 696 | CISPLATINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 697 | CISPLATINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 698 | CISPLATINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 699 | CISPLATINUM | D38.4 | GRASICA |
| 700 | CISPLATINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 701 | CISPLATINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 702 | CISPLATINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 703 | CISPLATINUM | D39.0 | MACICA |
| 704 | CISPLATINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 705 | CISPLATINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 706 | CISPLATINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 707 | CISPLATINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 708 | CISPLATINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 709 | CISPLATINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 710 | CISPLATINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 711 | CISPLATINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 712 | CISPLATINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 713 | CISPLATINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 714 | CISPLATINUM | D41.0 | NERKA |
| 715 | CISPLATINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 716 | CISPLATINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 717 | CISPLATINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 718 | CISPLATINUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 719 | CISPLATINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 720 | CISPLATINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 721 | CISPLATINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 722 | CISPLATINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 723 | CISPLATINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 724 | CISPLATINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 725 | CISPLATINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 726 | CISPLATINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMBIOTOWE |
| 727 | CISPLATINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMBIOTOWE |
| 728 | CISPLATINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 729 | CISPLATINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 730 | CISPLATINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 731 | CISPLATINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 732 | CISPLATINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 733 | CISPLATINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 734 | CISPLATINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 735 | CISPLATINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 736 | CISPLATINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 737 | CISPLATINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 738 | CISPLATINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 739 | CISPLATINUM | D44.5 | SZYSZYNKI |
| 740 | CISPLATINUM | D44.6 | KLĘBEK SZYJNY |
| 741 | CISPLATINUM | D44.7 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 742 | CISPLATINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 743 | CISPLATINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 744 | CISPLATINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 745 | CISPLATINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 746 | CISPLATINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE |
| 747 | CISPLATINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 748 | CISPLATINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 749 | CISPLATINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 750 | CISPLATINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 751 | CISPLATINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 752 | CISPLATINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 753 | CISPLATINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 754 | CISPLATINUM | D48.6 | SUTEK |
| 755 | CISPLATINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 756 | CISPLATINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 757 | CISPLATINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 758 | CISPLATINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 759 | CISPLATINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 760 | CISPLATINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 761 | CISPLATINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 762 | CISPLATINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 763 | CISPLATINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 764 | CISPLATINUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 765 | CISPLATINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--------------------------|
| 766 | CISPLATINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.12.

CLADRIBINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 1 | CLADRIBINUM | D76 | NIKTÓRE CHOROBY DOTYCZĄCE UKŁADU SIATECZKWO-ŚRÓDBŁONKOWEGO I CHŁONNEGO |
| 2 | CLADRIBINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 3 | CLADRIBINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 4 | CLADRIBINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 5 | CLADRIBINUM | D76.3 | INNE ZESPOŁY HISTIOCYTOWE |
| 6 | CLADRIBINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 7 | CLADRIBINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 8 | CLADRIBINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 9 | CLADRIBINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 10 | CLADRIBINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 11 | CLADRIBINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 12 | CLADRIBINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 13 | CLADRIBINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 14 | CLADRIBINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 15 | CLADRIBINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 16 | CLADRIBINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 17 | CLADRIBINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 18 | CLADRIBINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 19 | CLADRIBINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 20 | CLADRIBINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 21 | CLADRIBINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 22 | CLADRIBINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 23 | CLADRIBINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 24 | CLADRIBINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 25 | CLADRIBINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 26 | CLADRIBINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 27 | CLADRIBINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 28 | CLADRIBINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 29 | CLADRIBINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 30 | CLADRIBINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 31 | CLADRIBINUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 32 | CLADRIBINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 33 | CLADRIBINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 34 | CLADRIBINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 35 | CLADRIBINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 36 | CLADRIBINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 37 | CLADRIBINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 38 | CLADRIBINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 39 | CLADRIBINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 40 | CLADRIBINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 41 | CLADRIBINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 42 | CLADRIBINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 43 | CLADRIBINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 44 | CLADRIBINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 45 | CLADRIBINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 46 | CLADRIBINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 47 | CLADRIBINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 48 | CLADRIBINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 49 | CLADRIBINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 50 | CLADRIBINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 51 | CLADRIBINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 52 | CLADRIBINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 53 | CLADRIBINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 54 | CLADRIBINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 55 | CLADRIBINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 56 | CLADRIBINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 57 | CLADRIBINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 58 | CLADRIBINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 59 | CLADRIBINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | CLADRIBINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 61 | CLADRIBINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 62 | CLADRIBINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 63 | CLADRIBINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 64 | CLADRIBINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 65 | CLADRIBINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 66 | CLADRIBINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 67 | CLADRIBINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 68 | CLADRIBINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 69 | CLADRIBINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 70 | CLADRIBINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 71 | CLADRIBINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 72 | CLADRIBINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 73 | CLADRIBINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 74 | CLADRIBINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 75 | CLADRIBINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 76 | CLADRIBINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 77 | CLADRIBINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 78 | CLADRIBINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 79 | CLADRIBINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 80 | CLADRIBINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 81 | CLADRIBINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 82 | CLADRIBINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 83 | CLADRIBINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 84 | CLADRIBINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 85 | CLADRIBINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 86 | CLADRIBINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 87 | CLADRIBINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 88 | CLADRIBINUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 89 | CLADRIBINUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 90 | CLADRIBINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSZA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |

Załącznik C.13.

CYKLOPHOSPHAMIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.0 | WPUST |
| 80 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 102 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.7 | ESICA |
| 104 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 128 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C33 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY |
| 152 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 153 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 154 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34.1 | PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 155 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 156 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 157 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 158 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 159 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 160 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 161 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38.0 | SERCE |
| 162 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 163 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 164 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 165 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 166 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 167 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 168 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 169 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 170 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 171 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 172 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 173 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 174 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 175 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 176 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 177 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 178 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 179 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 180 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 181 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 182 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 183 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 184 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 185 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 186 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 187 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 188 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 189 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 190 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 191 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 192 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 193 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 194 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 195 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 196 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 197 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44 | INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY |
| 198 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.0 | SKÓRA WARGI |
| 199 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.1 | SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 200 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.2 | SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 201 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.3 | SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 202 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.4 | SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI |
| 203 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.5 | SKÓRA TUŁOWIA |
| 204 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.6 | SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 205 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.7 | SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 206 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI |
| 207 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C44.9 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 208 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 209 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 210 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 211 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 212 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 213 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 214 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 215 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 216 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 217 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 218 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 219 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 220 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 221 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 222 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 223 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 224 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 225 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 226 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 227 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 228 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 229 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 230 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 231 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 232 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 233 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 234 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 235 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 236 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 237 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 238 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 239 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 240 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 241 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 242 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 243 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 244 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 245 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 246 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 247 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 248 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 249 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 250 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 251 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 252 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 253 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 254 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 255 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 256 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 257 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 258 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54.2 | MIEŚNIÓWKA MACICY |
| 259 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 260 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 261 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 262 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 263 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 264 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 265 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 266 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 267 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 268 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.3 | PRZYMACICZA |
| 269 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 270 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 271 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 272 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 273 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |
| 274 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 275 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C60.0 | NAPLETEK |
| 276 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C60.1 | ŻOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 277 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 278 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |
| 279 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 280 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 281 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 282 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 283 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 284 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 285 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 286 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 287 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 288 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63.2 | MOSZNA |
| 289 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 290 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 291 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 292 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 293 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 294 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 295 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 296 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 297 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 298 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 299 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 300 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 301 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 302 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 303 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 304 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 305 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 306 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 307 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 308 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 309 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 310 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 311 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 312 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 313 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 314 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 315 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 316 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 317 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 318 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 319 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 320 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 321 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 322 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 323 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 324 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 325 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 326 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 327 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 328 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 329 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 330 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 331 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 332 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 333 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 334 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 335 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 336 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 337 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 338 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 339 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 340 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 341 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 342 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 343 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 344 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 345 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 346 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 347 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 348 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 349 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 350 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 351 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 352 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 353 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 354 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 355 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 356 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.5 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 357 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 358 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 359 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 360 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 361 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 362 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.2 | BRZUCH |
| 363 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 364 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 365 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 366 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 367 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 368 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 369 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 370 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 371 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 372 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 373 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 374 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 375 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 376 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 377 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 378 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 379 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 380 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 381 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 382 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 383 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 384 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 385 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 386 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 387 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 388 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 389 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 390 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 391 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 392 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 393 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 394 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 395 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 396 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 397 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 398 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 399 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 400 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 401 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 402 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 403 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 404 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 405 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 406 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 407 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 408 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 409 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 410 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 411 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 412 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 413 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 414 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 415 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 416 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 417 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 418 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 419 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 420 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 421 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 422 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 423 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 424 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 425 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 426 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 427 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 428 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 429 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 430 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 431 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 432 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 433 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 434 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 435 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 436 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 437 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 438 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 439 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 440 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 441 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 442 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 443 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 444 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 445 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 446 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 447 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 448 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 449 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 450 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 451 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 452 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 453 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 454 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 455 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 456 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 457 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 458 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 459 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 460 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 461 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 462 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 463 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 464 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 465 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 466 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 467 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 468 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 469 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 470 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 471 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 472 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 473 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 474 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 475 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 476 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 477 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 478 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 479 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 480 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 481 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 482 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 483 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓTRCZEJ I TKANEK POKREWNÝCH |
| 484 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 485 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 486 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 487 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 488 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 489 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 490 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 491 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 492 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 493 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 494 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 495 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 496 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 497 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 498 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 499 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 500 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 501 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 502 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 503 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 504 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 505 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 506 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 507 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 508 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 509 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 510 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 511 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 512 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 513 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 514 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 515 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 516 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 517 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 518 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.1 | SRÓM |
| 519 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.2 | POCHWA |
| 520 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 521 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 522 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 523 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 524 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 525 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 526 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 527 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09.2 | OKO |
| 528 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 529 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 530 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 531 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 532 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.0 | WARGA |
| 533 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.1 | JĘZYK |
| 534 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 535 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 536 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 537 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 538 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 539 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 540 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 541 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 542 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 543 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 544 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 545 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 546 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 547 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 548 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 549 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 550 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 551 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 552 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 553 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 554 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 555 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 556 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 557 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 558 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 559 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 560 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 561 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 562 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 563 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 564 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 565 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 566 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 567 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 568 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 569 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 570 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 571 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 572 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 573 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D15.0 | GRASICA |
| 574 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D15.1 | SERCE |
| 575 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 576 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 577 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 578 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 579 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 580 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 581 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 582 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 583 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 584 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 585 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 586 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.7 | ZEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 587 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 588 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 589 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 590 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D18.0 | NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 591 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D18.1 | NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 592 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D19 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE MIĘDZYBŁONKA |
| 593 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D19.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ |
| 594 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D19.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 595 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D19.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 596 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D19.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 597 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 598 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 599 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 600 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 601 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 602 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 603 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 604 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 605 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 606 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 607 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 608 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 609 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 610 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 611 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D28.0 | SROM |
| 612 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D28.1 | POCHWA |
| 613 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 614 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 615 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 616 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 617 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 618 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 619 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.2 | JĄDRO |
| 620 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.3 | NAJĄDRZE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 621 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.4 | MOSZNA |
| 622 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 623 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 624 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 625 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.0 | NERKA |
| 626 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 627 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 628 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 629 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 630 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 631 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 632 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 633 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 634 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 635 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 636 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 637 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 638 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 639 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 640 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 641 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 642 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 643 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 644 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 645 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 646 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 647 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 648 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 649 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 650 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 651 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 652 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 653 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 654 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 655 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 656 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 657 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 658 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 659 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.4 | SZYSZYNKĄ |
| 660 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 661 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.6 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 662 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 663 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 664 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 665 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 666 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 667 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 668 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 669 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 670 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 671 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 672 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 673 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 674 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 675 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 676 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 677 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 678 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 679 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 680 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 681 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 682 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 683 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 684 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 685 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.4 | GRASICA |
| 686 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 687 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 688 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 689 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D39.0 | MACICA |
| 690 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D39.1 | JAJNIK |
| 691 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 692 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 693 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 694 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 695 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 696 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D40.1 | JĄDRO |
| 697 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 698 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 699 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 700 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.0 | NERKA |
| 701 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 702 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 703 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 704 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 705 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 706 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 707 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 708 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 709 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 710 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 711 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 712 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 713 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 714 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 715 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 716 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 717 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 718 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 719 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 720 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 721 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 722 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 723 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 724 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 725 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.5 | SZYSZYNKA |
| 726 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 727 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 728 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 729 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 730 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 731 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 732 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 733 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 734 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 735 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 736 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 737 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 738 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 739 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 740 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 741 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 742 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 743 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 744 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 745 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 746 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 747 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.5 | SKÓRA |
| 748 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.6 | SUTEK |
| 749 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 750 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 751 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 752 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 753 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 754 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 755 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 756 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 757 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 758 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 759 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 760 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 761 | CYKLOPHOSPHAMIDUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.14.

CYTARABINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | CYTARABINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 2 | CYTARABINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 3 | CYTARABINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 4 | CYTARABINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 5 | CYTARABINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 6 | CYTARABINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 7 | CYTARABINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 8 | CYTARABINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 9 | CYTARABINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 10 | CYTARABINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 11 | CYTARABINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 12 | CYTARABINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 13 | CYTARABINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 14 | CYTARABINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 15 | CYTARABINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 16 | CYTARABINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 17 | CYTARABINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 18 | CYTARABINUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 19 | CYTARABINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 20 | CYTARABINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 21 | CYTARABINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 22 | CYTARABINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 23 | CYTARABINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 24 | CYTARABINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 25 | CYTARABINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 26 | CYTARABINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 27 | CYTARABINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 28 | CYTARABINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 29 | CYTARABINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 30 | CYTARABINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 31 | CYTARABINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 32 | CYTARABINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 33 | CYTARABINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 34 | CYTARABINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | CYTARABINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 36 | CYTARABINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 37 | CYTARABINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 38 | CYTARABINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 39 | CYTARABINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 40 | CYTARABINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 41 | CYTARABINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 42 | CYTARABINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 43 | CYTARABINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 44 | CYTARABINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 45 | CYTARABINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 46 | CYTARABINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 47 | CYTARABINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 48 | CYTARABINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 49 | CYTARABINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 50 | CYTARABINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 51 | CYTARABINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 52 | CYTARABINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 53 | CYTARABINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 54 | CYTARABINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 55 | CYTARABINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 56 | CYTARABINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 57 | CYTARABINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 58 | CYTARABINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 59 | CYTARABINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 60 | CYTARABINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 61 | CYTARABINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 62 | CYTARABINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 63 | CYTARABINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 64 | CYTARABINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 65 | CYTARABINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 66 | CYTARABINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 67 | CYTARABINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 68 | CYTARABINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 69 | CYTARABINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 70 | CYTARABINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 71 | CYTARABINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 72 | CYTARABINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 73 | CYTARABINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 74 | CYTARABINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 75 | CYTARABINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 76 | CYTARABINUM | C85.0 | MIEŚAK LIMFATYCZNY |
| 77 | CYTARABINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | CYTARABINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 79 | CYTARABINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 80 | CYTARABINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 81 | CYTARABINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 82 | CYTARABINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 83 | CYTARABINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 84 | CYTARABINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 85 | CYTARABINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 86 | CYTARABINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 87 | CYTARABINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 88 | CYTARABINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 89 | CYTARABINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 90 | CYTARABINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 91 | CYTARABINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 92 | CYTARABINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 93 | CYTARABINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 94 | CYTARABINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 95 | CYTARABINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 96 | CYTARABINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 97 | CYTARABINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 98 | CYTARABINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 99 | CYTARABINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 100 | CYTARABINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 101 | CYTARABINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 102 | CYTARABINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 103 | CYTARABINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 104 | CYTARABINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 105 | CYTARABINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | CYTARABINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 107 | CYTARABINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 108 | CYTARABINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 109 | CYTARABINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 110 | CYTARABINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 111 | CYTARABINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 112 | CYTARABINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 113 | CYTARABINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 114 | CYTARABINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 115 | CYTARABINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 116 | CYTARABINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 117 | CYTARABINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 118 | CYTARABINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 119 | CYTARABINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 120 | CYTARABINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 121 | CYTARABINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 122 | CYTARABINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 123 | CYTARABINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 124 | CYTARABINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 125 | CYTARABINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 126 | CYTARABINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 127 | CYTARABINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 128 | CYTARABINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 129 | CYTARABINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 130 | CYTARABINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 131 | CYTARABINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 132 | CYTARABINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 133 | CYTARABINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 134 | CYTARABINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 135 | CYTARABINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 136 | CYTARABINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 137 | CYTARABINUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 138 | CYTARABINUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 139 | CYTARABINUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 140 | CYTARABINUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 141 | CYTARABINUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 142 | CYTARABINUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 143 | CYTARABINUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 144 | CYTARABINUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 145 | CYTARABINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDEJ |
| 146 | CYTARABINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 147 | CYTARABINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 148 | CYTARABINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE, POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 149 | CYTARABINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 150 | CYTARABINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 151 | CYTARABINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 152 | CYTARABINUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIAWATYCH |
| 153 | CYTARABINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 154 | CYTARABINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.15.

CYTARABINUM DEPOCYTE

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 1 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 2 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 3 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 4 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 5 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 6 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 7 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 8 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 9 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 10 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 11 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 12 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 13 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 14 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 15 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 16 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 17 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 18 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 19 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 20 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 21 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 22 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 23 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 24 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 25 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 26 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 27 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 28 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 29 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 30 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 31 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 32 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 33 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 34 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 35 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 36 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 37 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 38 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 39 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 40 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 41 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 42 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 43 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C85.0 | MIEŚAK LIMFATYCZNY |
| 44 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 45 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 46 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 47 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 48 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 49 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 50 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 51 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 52 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 53 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 54 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 55 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 56 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 57 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 58 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 59 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 60 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 61 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 62 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 63 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 64 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 65 | CYTARABINUM DEPOCYTE | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |

Załącznik C.16.

DACARBAZINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | DACARBAZINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | DACARBAZINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | DACARBAZINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | DACARBAZINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | DACARBAZINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | DACARBAZINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | DACARBAZINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | DACARBAZINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | DACARBAZINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | DACARBAZINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | DACARBAZINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | DACARBAZINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | DACARBAZINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | DACARBAZINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | DACARBAZINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | DACARBAZINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | DACARBAZINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | DACARBAZINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | DACARBAZINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | DACARBAZINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | DACARBAZINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | DACARBAZINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | DACARBAZINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | DACARBAZINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | DACARBAZINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | DACARBAZINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | DACARBAZINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | DACARBAZINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | DACARBAZINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | DACARBAZINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | DACARBAZINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | DACARBAZINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | DACARBAZINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | DACARBAZINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | DACARBAZINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | DACARBAZINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | DACARBAZINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | DACARBAZINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | DACARBAZINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | DACARBAZINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | DACARBAZINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | DACARBAZINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | DACARBAZINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | DACARBAZINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | DACARBAZINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | DACARBAZINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | DACARBAZINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | DACARBAZINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | DACARBAZINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | DACARBAZINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | DACARBAZINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | DACARBAZINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | DACARBAZINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | DACARBAZINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | DACARBAZINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | DACARBAZINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | DACARBAZINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | DACARBAZINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | DACARBAZINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | DACARBAZINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | DACARBAZINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | DACARBAZINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | DACARBAZINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | DACARBAZINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | DACARBAZINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | DACARBAZINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | DACARBAZINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | DACARBAZINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69 | DACARBAZINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | DACARBAZINUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | DACARBAZINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | DACARBAZINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | DACARBAZINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | DACARBAZINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | DACARBAZINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | DACARBAZINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | DACARBAZINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | DACARBAZINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79 | DACARBAZINUM | C16.0 | WPUST |
| 80 | DACARBAZINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81 | DACARBAZINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82 | DACARBAZINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83 | DACARBAZINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84 | DACARBAZINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85 | DACARBAZINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86 | DACARBAZINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87 | DACARBAZINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88 | DACARBAZINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89 | DACARBAZINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90 | DACARBAZINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91 | DACARBAZINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92 | DACARBAZINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93 | DACARBAZINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94 | DACARBAZINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95 | DACARBAZINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96 | DACARBAZINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97 | DACARBAZINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98 | DACARBAZINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99 | DACARBAZINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100 | DACARBAZINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101 | DACARBAZINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 102 | DACARBAZINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103 | DACARBAZINUM | C18.7 | ESICA |
| 104 | DACARBAZINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105 | DACARBAZINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | DACARBAZINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107 | DACARBAZINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108 | DACARBAZINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109 | DACARBAZINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110 | DACARBAZINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111 | DACARBAZINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112 | DACARBAZINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113 | DACARBAZINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114 | DACARBAZINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115 | DACARBAZINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116 | DACARBAZINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117 | DACARBAZINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118 | DACARBAZINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119 | DACARBAZINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120 | DACARBAZINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121 | DACARBAZINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122 | DACARBAZINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123 | DACARBAZINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124 | DACARBAZINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125 | DACARBAZINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126 | DACARBAZINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127 | DACARBAZINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 128 | DACARBAZINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129 | DACARBAZINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130 | DACARBAZINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131 | DACARBAZINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132 | DACARBAZINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | DACARBAZINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134 | DACARBAZINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135 | DACARBAZINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136 | DACARBAZINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137 | DACARBAZINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138 | DACARBAZINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139 | DACARBAZINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140 | DACARBAZINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141 | DACARBAZINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142 | DACARBAZINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143 | DACARBAZINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144 | DACARBAZINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145 | DACARBAZINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146 | DACARBAZINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147 | DACARBAZINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148 | DACARBAZINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149 | DACARBAZINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150 | DACARBAZINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151 | DACARBAZINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 152 | DACARBAZINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 153 | DACARBAZINUM | C38.0 | SERCE |
| 154 | DACARBAZINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 155 | DACARBAZINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 156 | DACARBAZINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 157 | DACARBAZINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 158 | DACARBAZINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 159 | DACARBAZINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 160 | DACARBAZINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 161 | DACARBAZINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 162 | DACARBAZINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 163 | DACARBAZINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 164 | DACARBAZINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 165 | DACARBAZINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 166 | DACARBAZINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 167 | DACARBAZINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 168 | DACARBAZINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 169 | DACARBAZINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 170 | DACARBAZINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 171 | DACARBAZINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 172 | DACARBAZINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 173 | DACARBAZINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 174 | DACARBAZINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 175 | DACARBAZINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 176 | DACARBAZINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 177 | DACARBAZINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 178 | DACARBAZINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 179 | DACARBAZINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 180 | DACARBAZINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 181 | DACARBAZINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 182 | DACARBAZINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 183 | DACARBAZINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 184 | DACARBAZINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 185 | DACARBAZINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 186 | DACARBAZINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 187 | DACARBAZINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 188 | DACARBAZINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 189 | DACARBAZINUM | C44 | INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY |
| 190 | DACARBAZINUM | C44.0 | SKÓRA WARGI |
| 191 | DACARBAZINUM | C44.1 | SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 192 | DACARBAZINUM | C44.2 | SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 193 | DACARBAZINUM | C44.3 | SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 194 | DACARBAZINUM | C44.4 | SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI |
| 195 | DACARBAZINUM | C44.5 | SKÓRA TUŁOWIA |
| 196 | DACARBAZINUM | C44.6 | SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 197 | DACARBAZINUM | C44.7 | SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 198 | DACARBAZINUM | C44.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI |
| 199 | DACARBAZINUM | C44.9 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 200 | DACARBAZINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 201 | DACARBAZINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 202 | DACARBAZINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 203 | DACARBAZINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 204 | DACARBAZINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 205 | DACARBAZINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 206 | DACARBAZINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 207 | DACARBAZINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 208 | DACARBAZINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 209 | DACARBAZINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 210 | DACARBAZINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 211 | DACARBAZINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 212 | DACARBAZINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 213 | DACARBAZINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 214 | DACARBAZINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 215 | DACARBAZINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 216 | DACARBAZINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 217 | DACARBAZINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 218 | DACARBAZINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 219 | DACARBAZINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 220 | DACARBAZINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 221 | DACARBAZINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 222 | DACARBAZINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 223 | DACARBAZINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 224 | DACARBAZINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 225 | DACARBAZINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 226 | DACARBAZINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 227 | DACARBAZINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 228 | DACARBAZINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 229 | DACARBAZINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 230 | DACARBAZINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 231 | DACARBAZINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 232 | DACARBAZINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 233 | DACARBAZINUM | C53.1 | BLONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 234 | DACARBAZINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 235 | DACARBAZINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 236 | DACARBAZINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 237 | DACARBAZINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 238 | DACARBAZINUM | C54.1 | BLONA ŚLUZOWA MACICY |
| 239 | DACARBAZINUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 240 | DACARBAZINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 241 | DACARBAZINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 242 | DACARBAZINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 243 | DACARBAZINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 244 | DACARBAZINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 245 | DACARBAZINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 246 | DACARBAZINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 247 | DACARBAZINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 248 | DACARBAZINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 249 | DACARBAZINUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 250 | DACARBAZINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 251 | DACARBAZINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 252 | DACARBAZINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 253 | DACARBAZINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 254 | DACARBAZINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 255 | DACARBAZINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 256 | DACARBAZINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 257 | DACARBAZINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 258 | DACARBAZINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 259 | DACARBAZINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 260 | DACARBAZINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 261 | DACARBAZINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 262 | DACARBAZINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 263 | DACARBAZINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 264 | DACARBAZINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 265 | DACARBAZINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 266 | DACARBAZINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 267 | DACARBAZINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 268 | DACARBAZINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 269 | DACARBAZINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 270 | DACARBAZINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 271 | DACARBAZINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 272 | DACARBAZINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 273 | DACARBAZINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 274 | DACARBAZINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 275 | DACARBAZINUM | C67.5 | SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 276 | DACARBAZINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 277 | DACARBAZINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 278 | DACARBAZINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 279 | DACARBAZINUM | C67.9 | PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 280 | DACARBAZINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 281 | DACARBAZINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 282 | DACARBAZINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 283 | DACARBAZINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 284 | DACARBAZINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 285 | DACARBAZINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 286 | DACARBAZINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 287 | DACARBAZINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 288 | DACARBAZINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 289 | DACARBAZINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 290 | DACARBAZINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 291 | DACARBAZINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 292 | DACARBAZINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 293 | DACARBAZINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 294 | DACARBAZINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 295 | DACARBAZINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 296 | DACARBAZINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 297 | DACARBAZINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 298 | DACARBAZINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 299 | DACARBAZINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 300 | DACARBAZINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 301 | DACARBAZINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 302 | DACARBAZINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 303 | DACARBAZINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 304 | DACARBAZINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 305 | DACARBAZINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 306 | DACARBAZINUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 307 | DACARBAZINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 308 | DACARBAZINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 309 | DACARBAZINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 310 | DACARBAZINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 311 | DACARBAZINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 312 | DACARBAZINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 313 | DACARBAZINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 314 | DACARBAZINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 315 | DACARBAZINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 316 | DACARBAZINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 317 | DACARBAZINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 318 | DACARBAZINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 319 | DACARBAZINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 320 | DACARBAZINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 321 | DACARBAZINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 322 | DACARBAZINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 323 | DACARBAZINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 324 | DACARBAZINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 325 | DACARBAZINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 326 | DACARBAZINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 327 | DACARBAZINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 328 | DACARBAZINUM | C75.3 | SZYSZYNKA |
| 329 | DACARBAZINUM | C75.4 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 330 | DACARBAZINUM | C75.5 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 331 | DACARBAZINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 332 | DACARBAZINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 333 | DACARBAZINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 334 | DACARBAZINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 335 | DACARBAZINUM | C76.1 | KŁATKA PIERSIOWA |
| 336 | DACARBAZINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 337 | DACARBAZINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 338 | DACARBAZINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 339 | DACARBAZINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 340 | DACARBAZINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 341 | DACARBAZINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 342 | DACARBAZINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 343 | DACARBAZINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 344 | DACARBAZINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KŁATKI PIERSIOWEJ |
| 345 | DACARBAZINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 346 | DACARBAZINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 347 | DACARBAZINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 348 | DACARBAZINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 349 | DACARBAZINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 350 | DACARBAZINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 351 | DACARBAZINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEGO I TRAWIENNEGO |
| 352 | DACARBAZINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 353 | DACARBAZINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 354 | DACARBAZINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 355 | DACARBAZINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 356 | DACARBAZINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 357 | DACARBAZINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 358 | DACARBAZINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 359 | DACARBAZINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 360 | DACARBAZINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 361 | DACARBAZINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 362 | DACARBAZINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 363 | DACARBAZINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 364 | DACARBAZINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 365 | DACARBAZINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 366 | DACARBAZINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 367 | DACARBAZINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 368 | DACARBAZINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 369 | DACARBAZINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 370 | DACARBAZINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 371 | DACARBAZINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 372 | DACARBAZINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 373 | DACARBAZINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 374 | DACARBAZINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 375 | DACARBAZINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 376 | DACARBAZINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 377 | DACARBAZINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 378 | DACARBAZINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 379 | DACARBAZINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 380 | DACARBAZINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 381 | DACARBAZINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 382 | DACARBAZINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 383 | DACARBAZINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 384 | DACARBAZINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 385 | DACARBAZINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 386 | DACARBAZINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 387 | DACARBAZINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 388 | DACARBAZINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 389 | DACARBAZINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 390 | DACARBAZINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 391 | DACARBAZINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 392 | DACARBAZINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 393 | DACARBAZINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 394 | DACARBAZINUM | C83.8 | INNE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 395 | DACARBAZINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 396 | DACARBAZINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 397 | DACARBAZINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 398 | DACARBAZINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 399 | DACARBAZINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 400 | DACARBAZINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 401 | DACARBAZINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 402 | DACARBAZINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 403 | DACARBAZINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 404 | DACARBAZINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 405 | DACARBAZINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 406 | DACARBAZINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 407 | DACARBAZINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 408 | DACARBAZINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 409 | DACARBAZINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 410 | DACARBAZINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 411 | DACARBAZINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 412 | DACARBAZINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 413 | DACARBAZINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 414 | DACARBAZINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 415 | DACARBAZINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 416 | DACARBAZINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 417 | DACARBAZINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 418 | DACARBAZINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 419 | DACARBAZINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 420 | DACARBAZINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 421 | DACARBAZINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 422 | DACARBAZINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 423 | DACARBAZINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 424 | DACARBAZINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 425 | DACARBAZINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 426 | DACARBAZINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 427 | DACARBAZINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 428 | DACARBAZINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 429 | DACARBAZINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 430 | DACARBAZINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 431 | DACARBAZINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 432 | DACARBAZINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 433 | DACARBAZINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 434 | DACARBAZINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 435 | DACARBAZINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 436 | DACARBAZINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 437 | DACARBAZINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 438 | DACARBAZINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 439 | DACARBAZINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 440 | DACARBAZINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 441 | DACARBAZINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 442 | DACARBAZINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 443 | DACARBAZINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 444 | DACARBAZINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 445 | DACARBAZINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 446 | DACARBAZINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 447 | DACARBAZINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 448 | DACARBAZINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 449 | DACARBAZINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 450 | DACARBAZINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 451 | DACARBAZINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 452 | DACARBAZINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 453 | DACARBAZINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 454 | DACARBAZINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 455 | DACARBAZINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 456 | DACARBAZINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 457 | DACARBAZINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 458 | DACARBAZINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 459 | DACARBAZINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 460 | DACARBAZINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 461 | DACARBAZINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 462 | DACARBAZINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 463 | DACARBAZINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 464 | DACARBAZINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 465 | DACARBAZINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 466 | DACARBAZINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 467 | DACARBAZINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 468 | DACARBAZINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 469 | DACARBAZINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 470 | DACARBAZINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 471 | DACARBAZINUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 472 | DACARBAZINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 473 | DACARBAZINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 474 | DACARBAZINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 475 | DACARBAZINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 476 | DACARBAZINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 477 | DACARBAZINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 478 | DACARBAZINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 479 | DACARBAZINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 480 | DACARBAZINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 481 | DACARBAZINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 482 | DACARBAZINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 483 | DACARBAZINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 484 | DACARBAZINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 485 | DACARBAZINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 486 | DACARBAZINUM | D06.0 | BLONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 487 | DACARBAZINUM | D06.1 | BLONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 488 | DACARBAZINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 489 | DACARBAZINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 490 | DACARBAZINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 491 | DACARBAZINUM | D07.0 | BLONA ŚLUZOWA MACICY |
| 492 | DACARBAZINUM | D07.1 | SROM |
| 493 | DACARBAZINUM | D07.2 | POCHWA |
| 494 | DACARBAZINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 495 | DACARBAZINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 496 | DACARBAZINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 497 | DACARBAZINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 498 | DACARBAZINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 499 | DACARBAZINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 500 | DACARBAZINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 501 | DACARBAZINUM | D09.2 | OKO |
| 502 | DACARBAZINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 503 | DACARBAZINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 504 | DACARBAZINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 505 | DACARBAZINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 506 | DACARBAZINUM | D10.0 | WARGA |
| 507 | DACARBAZINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 508 | DACARBAZINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 509 | DACARBAZINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 510 | DACARBAZINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 511 | DACARBAZINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 512 | DACARBAZINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 513 | DACARBAZINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 514 | DACARBAZINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 515 | DACARBAZINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 516 | DACARBAZINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 517 | DACARBAZINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 518 | DACARBAZINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 519 | DACARBAZINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 520 | DACARBAZINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 521 | DACARBAZINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 522 | DACARBAZINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 523 | DACARBAZINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 524 | DACARBAZINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 525 | DACARBAZINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 526 | DACARBAZINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 527 | DACARBAZINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 528 | DACARBAZINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 529 | DACARBAZINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 530 | DACARBAZINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 531 | DACARBAZINUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 532 | DACARBAZINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 533 | DACARBAZINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 534 | DACARBAZINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 535 | DACARBAZINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 536 | DACARBAZINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZ WĄTROBOWE |
| 537 | DACARBAZINUM | D13.6 | TRZUSTKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 538 | DACARBAZINUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 539 | DACARBAZINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 540 | DACARBAZINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 541 | DACARBAZINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 542 | DACARBAZINUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 543 | DACARBAZINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 544 | DACARBAZINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 545 | DACARBAZINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 546 | DACARBAZINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 547 | DACARBAZINUM | D15.0 | GRASICA |
| 548 | DACARBAZINUM | D15.1 | SERCE |
| 549 | DACARBAZINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 550 | DACARBAZINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 551 | DACARBAZINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 552 | DACARBAZINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 553 | DACARBAZINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 554 | DACARBAZINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 555 | DACARBAZINUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 556 | DACARBAZINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 557 | DACARBAZINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 558 | DACARBAZINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 559 | DACARBAZINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 560 | DACARBAZINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 561 | DACARBAZINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 562 | DACARBAZINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 563 | DACARBAZINUM | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 564 | DACARBAZINUM | D18.0 | NACZYNIANKA KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 565 | DACARBAZINUM | D18.1 | NACZYNIAK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 566 | DACARBAZINUM | D19 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE MIĘDZYBŁONKA |
| 567 | DACARBAZINUM | D19.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ |
| 568 | DACARBAZINUM | D19.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 569 | DACARBAZINUM | D19.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 570 | DACARBAZINUM | D19.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 571 | DACARBAZINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 572 | DACARBAZINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 573 | DACARBAZINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 574 | DACARBAZINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 575 | DACARBAZINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 576 | DACARBAZINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 577 | DACARBAZINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 578 | DACARBAZINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 579 | DACARBAZINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 580 | DACARBAZINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 581 | DACARBAZINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 582 | DACARBAZINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 583 | DACARBAZINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 584 | DACARBAZINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 585 | DACARBAZINUM | D28.0 | SRÓM |
| 586 | DACARBAZINUM | D28.1 | POCHWA |
| 587 | DACARBAZINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 588 | DACARBAZINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 589 | DACARBAZINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 590 | DACARBAZINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 591 | DACARBAZINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 592 | DACARBAZINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 593 | DACARBAZINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 594 | DACARBAZINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 595 | DACARBAZINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 596 | DACARBAZINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 597 | DACARBAZINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 598 | DACARBAZINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 599 | DACARBAZINUM | D30.0 | NERKA |
| 600 | DACARBAZINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 601 | DACARBAZINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 602 | DACARBAZINUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 603 | DACARBAZINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 604 | DACARBAZINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 605 | DACARBAZINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 606 | DACARBAZINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 607 | DACARBAZINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 608 | DACARBAZINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 609 | DACARBAZINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 610 | DACARBAZINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 611 | DACARBAZINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 612 | DACARBAZINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 613 | DACARBAZINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 614 | DACARBAZINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 615 | DACARBAZINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 616 | DACARBAZINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 617 | DACARBAZINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 618 | DACARBAZINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 619 | DACARBAZINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 620 | DACARBAZINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 621 | DACARBAZINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 622 | DACARBAZINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 623 | DACARBAZINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 624 | DACARBAZINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 625 | DACARBAZINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 626 | DACARBAZINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 627 | DACARBAZINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 628 | DACARBAZINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 629 | DACARBAZINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 630 | DACARBAZINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 631 | DACARBAZINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 632 | DACARBAZINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 633 | DACARBAZINUM | D35.4 | SZYSZYNKĄ |
| 634 | DACARBAZINUM | D35.5 | KLĘBEK SZYJNY |
| 635 | DACARBAZINUM | D35.6 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 636 | DACARBAZINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 637 | DACARBAZINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 638 | DACARBAZINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 639 | DACARBAZINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 640 | DACARBAZINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 641 | DACARBAZINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 642 | DACARBAZINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 643 | DACARBAZINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 644 | DACARBAZINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 645 | DACARBAZINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 646 | DACARBAZINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 647 | DACARBAZINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 648 | DACARBAZINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 649 | DACARBAZINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 650 | DACARBAZINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 651 | DACARBAZINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 652 | DACARBAZINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 653 | DACARBAZINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 654 | DACARBAZINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 655 | DACARBAZINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 656 | DACARBAZINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 657 | DACARBAZINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 658 | DACARBAZINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 659 | DACARBAZINUM | D38.4 | GRASICA |
| 660 | DACARBAZINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 661 | DACARBAZINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 662 | DACARBAZINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 663 | DACARBAZINUM | D39.0 | MACICA |
| 664 | DACARBAZINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 665 | DACARBAZINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 666 | DACARBAZINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 667 | DACARBAZINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 668 | DACARBAZINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 669 | DACARBAZINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 670 | DACARBAZINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 671 | DACARBAZINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 672 | DACARBAZINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 673 | DACARBAZINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 674 | DACARBAZINUM | D41.0 | NERKA |
| 675 | DACARBAZINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 676 | DACARBAZINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 677 | DACARBAZINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 678 | DACARBAZINUM | D41.4 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 679 | DACARBAZINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 680 | DACARBAZINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 681 | DACARBAZINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 682 | DACARBAZINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 683 | DACARBAZINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 684 | DACARBAZINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 685 | DACARBAZINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 686 | DACARBAZINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 687 | DACARBAZINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 688 | DACARBAZINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 689 | DACARBAZINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 690 | DACARBAZINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 691 | DACARBAZINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 692 | DACARBAZINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 693 | DACARBAZINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 694 | DACARBAZINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 695 | DACARBAZINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 696 | DACARBAZINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 697 | DACARBAZINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 698 | DACARBAZINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 699 | DACARBAZINUM | D44.5 | SZYSZYŃKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 700 | DACARBAZINUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 701 | DACARBAZINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 702 | DACARBAZINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 703 | DACARBAZINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 704 | DACARBAZINUM | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 705 | DACARBAZINUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 706 | DACARBAZINUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 707 | DACARBAZINUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 708 | DACARBAZINUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 709 | DACARBAZINUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 710 | DACARBAZINUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 711 | DACARBAZINUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 712 | DACARBAZINUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 713 | DACARBAZINUM | D47 | INNY NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 714 | DACARBAZINUM | D47.0 | GUZY HISTIOCYTÓW I KOMÓREK TUCZNYCH O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE |
| 715 | DACARBAZINUM | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 716 | DACARBAZINUM | D47.2 | GAMMOPATIA MONOKLONALNA |
| 717 | DACARBAZINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 718 | DACARBAZINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 719 | DACARBAZINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 720 | DACARBAZINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 721 | DACARBAZINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 722 | DACARBAZINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 723 | DACARBAZINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 724 | DACARBAZINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 725 | DACARBAZINUM | D48.4 | OTRZEWNIA |
| 726 | DACARBAZINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 727 | DACARBAZINUM | D48.6 | SUTEK |
| 728 | DACARBAZINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 729 | DACARBAZINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 730 | DACARBAZINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 731 | DACARBAZINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 732 | DACARBAZINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 733 | DACARBAZINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 734 | DACARBAZINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 735 | DACARBAZINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 736 | DACARBAZINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 737 | DACARBAZINUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 738 | DACARBAZINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 739 | DACARBAZINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.19.

DOCETAXELUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | DOCETAXELUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | DOCETAXELUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | DOCETAXELUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | DOCETAXELUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | DOCETAXELUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | DOCETAXELUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | DOCETAXELUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | DOCETAXELUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | DOCETAXELUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | DOCETAXELUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | DOCETAXELUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | DOCETAXELUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | DOCETAXELUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | DOCETAXELUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | DOCETAXELUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | DOCETAXELUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | DOCETAXELUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | DOCETAXELUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | DOCETAXELUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | DOCETAXELUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | DOCETAXELUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | DOCETAXELUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | DOCETAXELUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | DOCETAXELUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | DOCETAXELUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | DOCETAXELUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | DOCETAXELUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | DOCETAXELUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | DOCETAXELUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | DOCETAXELUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | DOCETAXELUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | DOCETAXELUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | DOCETAXELUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | DOCETAXELUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | DOCETAXELUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | DOCETAXELUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | DOCETAXELUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | DOCETAXELUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | DOCETAXELUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | DOCETAXELUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | DOCETAXELUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | DOCETAXELUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | DOCETAXELUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | DOCETAXELUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | DOCETAXELUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | DOCETAXELUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | DOCETAXELUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | DOCETAXELUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | DOCETAXELUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | DOCETAXELUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | DOCETAXELUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | DOCETAXELUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | DOCETAXELUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | DOCETAXELUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | DOCETAXELUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | DOCETAXELUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | DOCETAXELUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | DOCETAXELUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | DOCETAXELUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | DOCETAXELUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | DOCETAXELUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | DOCETAXELUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | DOCETAXELUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | DOCETAXELUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | DOCETAXELUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | DOCETAXELUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | DOCETAXELUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | DOCETAXELUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69 | DOCETAXELUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | DOCETAXELUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | DOCETAXELUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | DOCETAXELUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | DOCETAXELUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | DOCETAXELUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | DOCETAXELUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | DOCETAXELUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | DOCETAXELUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | DOCETAXELUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79 | DOCETAXELUM | C16.0 | WPUST |
| 80 | DOCETAXELUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81 | DOCETAXELUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82 | DOCETAXELUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83 | DOCETAXELUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84 | DOCETAXELUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85 | DOCETAXELUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86 | DOCETAXELUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87 | DOCETAXELUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88 | DOCETAXELUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 89 | DOCETAXELUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 90 | DOCETAXELUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 91 | DOCETAXELUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 92 | DOCETAXELUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 93 | DOCETAXELUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 94 | DOCETAXELUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 95 | DOCETAXELUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 96 | DOCETAXELUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 97 | DOCETAXELUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 98 | DOCETAXELUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 99 | DOCETAXELUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 100 | DOCETAXELUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 101 | DOCETAXELUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 102 | DOCETAXELUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 103 | DOCETAXELUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 104 | DOCETAXELUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--------------------------------------|
| 105 | DOCETAXELUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 106 | DOCETAXELUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 107 | DOCETAXELUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 108 | DOCETAXELUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 109 | DOCETAXELUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 110 | DOCETAXELUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |

Załącznik C.20.

DOXORUBICINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | DOXORUBICINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | DOXORUBICINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | DOXORUBICINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | DOXORUBICINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | DOXORUBICINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | DOXORUBICINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | DOXORUBICINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | DOXORUBICINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | DOXORUBICINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | DOXORUBICINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | DOXORUBICINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | DOXORUBICINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | DOXORUBICINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | DOXORUBICINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | DOXORUBICINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | DOXORUBICINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | DOXORUBICINUM | C02.4 | MIGDALEK JĘZYKOWY |
| 18. | DOXORUBICINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | DOXORUBICINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | DOXORUBICINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | DOXORUBICINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | DOXORUBICINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 23. | DOXORUBICINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | DOXORUBICINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25. | DOXORUBICINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | DOXORUBICINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | DOXORUBICINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | DOXORUBICINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | DOXORUBICINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | DOXORUBICINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | DOXORUBICINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | DOXORUBICINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | DOXORUBICINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | DOXORUBICINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | DOXORUBICINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | DOXORUBICINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | DOXORUBICINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | DOXORUBICINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | DOXORUBICINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | DOXORUBICINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | DOXORUBICINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | DOXORUBICINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | DOXORUBICINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44. | DOXORUBICINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | DOXORUBICINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | DOXORUBICINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | DOXORUBICINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | DOXORUBICINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 49. | DOXORUBICINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50. | DOXORUBICINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | DOXORUBICINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | DOXORUBICINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53. | DOXORUBICINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | DOXORUBICINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | DOXORUBICINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | DOXORUBICINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | DOXORUBICINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58. | DOXORUBICINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | DOXORUBICINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | DOXORUBICINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | DOXORUBICINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | DOXORUBICINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | DOXORUBICINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | DOXORUBICINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | DOXORUBICINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66. | DOXORUBICINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | DOXORUBICINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68. | DOXORUBICINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69. | DOXORUBICINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | DOXORUBICINUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FALDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | DOXORUBICINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | DOXORUBICINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | DOXORUBICINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | DOXORUBICINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 75. | DOXORUBICINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76. | DOXORUBICINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77. | DOXORUBICINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78. | DOXORUBICINUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |
| 79. | DOXORUBICINUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 80. | DOXORUBICINUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 81. | DOXORUBICINUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 82. | DOXORUBICINUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 83. | DOXORUBICINUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 84. | DOXORUBICINUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 85. | DOXORUBICINUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 86. | DOXORUBICINUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 87. | DOXORUBICINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 88. | DOXORUBICINUM | C16.0 | WPUST |
| 89. | DOXORUBICINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 90. | DOXORUBICINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 91. | DOXORUBICINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 92. | DOXORUBICINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 93. | DOXORUBICINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 94. | DOXORUBICINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 95. | DOXORUBICINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 96. | DOXORUBICINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 97. | DOXORUBICINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 98. | DOXORUBICINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 99. | DOXORUBICINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 100. | DOXORUBICINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 101. | DOXORUBICINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 102. | DOXORUBICINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 103. | DOXORUBICINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 104. | DOXORUBICINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 105. | DOXORUBICINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 106. | DOXORUBICINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 107. | DOXORUBICINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 108. | DOXORUBICINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 109. | DOXORUBICINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 110. | DOXORUBICINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 111. | DOXORUBICINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 112. | DOXORUBICINUM | C18.7 | ESICA |
| 113. | DOXORUBICINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 114. | DOXORUBICINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 115. | DOXORUBICINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 116. | DOXORUBICINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 117. | DOXORUBICINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 118. | DOXORUBICINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 119. | DOXORUBICINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 120. | DOXORUBICINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 121. | DOXORUBICINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 122. | DOXORUBICINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 123. | DOXORUBICINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 124. | DOXORUBICINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 125. | DOXORUBICINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 126. | DOXORUBICINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 127. | DOXORUBICINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 128. | DOXORUBICINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 129. | DOXORUBICINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 130. | DOXORUBICINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 131. | DOXORUBICINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 132. | DOXORUBICINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 133. | DOXORUBICINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 134. | DOXORUBICINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 135. | DOXORUBICINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 136. | DOXORUBICINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 137. | DOXORUBICINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 138. | DOXORUBICINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 139. | DOXORUBICINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 140. | DOXORUBICINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 141. | DOXORUBICINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 142. | DOXORUBICINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 143. | DOXORUBICINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 144. | DOXORUBICINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 145. | DOXORUBICINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 146. | DOXORUBICINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 147. | DOXORUBICINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 148. | DOXORUBICINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 149. | DOXORUBICINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 150. | DOXORUBICINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 151. | DOXORUBICINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 152. | DOXORUBICINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 153. | DOXORUBICINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 154. | DOXORUBICINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 155. | DOXORUBICINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 156. | DOXORUBICINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 157. | DOXORUBICINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 158. | DOXORUBICINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 159. | DOXORUBICINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 160. | DOXORUBICINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 161. | DOXORUBICINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 162. | DOXORUBICINUM | C34.1 | PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 163. | DOXORUBICINUM | C34.2 | PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 164. | DOXORUBICINUM | C34.3 | PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 165. | DOXORUBICINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 166. | DOXORUBICINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 167. | DOXORUBICINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 168. | DOXORUBICINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 169. | DOXORUBICINUM | C38.0 | SERCE |
| 170. | DOXORUBICINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 171. | DOXORUBICINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 172. | DOXORUBICINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 173. | DOXORUBICINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 174. | DOXORUBICINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 175. | DOXORUBICINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 176. | DOXORUBICINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 177. | DOXORUBICINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 178. | DOXORUBICINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 179. | DOXORUBICINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 180. | DOXORUBICINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 181. | DOXORUBICINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 182. | DOXORUBICINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 183. | DOXORUBICINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 184. | DOXORUBICINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 185. | DOXORUBICINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 186. | DOXORUBICINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 187. | DOXORUBICINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 188. | DOXORUBICINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 189. | DOXORUBICINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 190. | DOXORUBICINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 191. | DOXORUBICINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 192. | DOXORUBICINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 193. | DOXORUBICINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 194. | DOXORUBICINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 195. | DOXORUBICINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 196. | DOXORUBICINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 197. | DOXORUBICINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 198. | DOXORUBICINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 199. | DOXORUBICINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 200. | DOXORUBICINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 201. | DOXORUBICINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 202. | DOXORUBICINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 203. | DOXORUBICINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 204. | DOXORUBICINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 205. | DOXORUBICINUM | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 206. | DOXORUBICINUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ |
| 207. | DOXORUBICINUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 208. | DOXORUBICINUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 209. | DOXORUBICINUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 210. | DOXORUBICINUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 211. | DOXORUBICINUM | C46 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO |
| 212. | DOXORUBICINUM | C46.0 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO SKÓRY |
| 213. | DOXORUBICINUM | C46.1 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 214. | DOXORUBICINUM | C46.2 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA |
| 215. | DOXORUBICINUM | C46.3 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 216. | DOXORUBICINUM | C46.7 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 217. | DOXORUBICINUM | C46.8 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 218. | DOXORUBICINUM | C46.9 | MIĘŚSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 219. | DOXORUBICINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 220. | DOXORUBICINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 221. | DOXORUBICINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 222. | DOXORUBICINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 223. | DOXORUBICINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 224. | DOXORUBICINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 225. | DOXORUBICINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 226. | DOXORUBICINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 227. | DOXORUBICINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 228. | DOXORUBICINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 229. | DOXORUBICINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 230. | DOXORUBICINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 231. | DOXORUBICINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 232. | DOXORUBICINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 233. | DOXORUBICINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 234. | DOXORUBICINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 235. | DOXORUBICINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 236. | DOXORUBICINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 237. | DOXORUBICINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 238. | DOXORUBICINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 239. | DOXORUBICINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 240. | DOXORUBICINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 241. | DOXORUBICINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 242. | DOXORUBICINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 243. | DOXORUBICINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 244. | DOXORUBICINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 245. | DOXORUBICINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 246. | DOXORUBICINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 247. | DOXORUBICINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 248. | DOXORUBICINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 249. | DOXORUBICINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 250. | DOXORUBICINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 251. | DOXORUBICINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 252. | DOXORUBICINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 253. | DOXORUBICINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 254. | DOXORUBICINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 255. | DOXORUBICINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 256. | DOXORUBICINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 257. | DOXORUBICINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 258. | DOXORUBICINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 259. | DOXORUBICINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 260. | DOXORUBICINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 261. | DOXORUBICINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 262. | DOXORUBICINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 263. | DOXORUBICINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 264. | DOXORUBICINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 265. | DOXORUBICINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 266. | DOXORUBICINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 267. | DOXORUBICINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 268. | DOXORUBICINUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 269. | DOXORUBICINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 270. | DOXORUBICINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 271. | DOXORUBICINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 272. | DOXORUBICINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 273. | DOXORUBICINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 274. | DOXORUBICINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 275. | DOXORUBICINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 276. | DOXORUBICINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 277. | DOXORUBICINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 278. | DOXORUBICINUM | C57.3 | PRZYMAGICZA |
| 279. | DOXORUBICINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 280. | DOXORUBICINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 281. | DOXORUBICINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 282. | DOXORUBICINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 283. | DOXORUBICINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 284. | DOXORUBICINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 285. | DOXORUBICINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 286. | DOXORUBICINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 287. | DOXORUBICINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 288. | DOXORUBICINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 289. | DOXORUBICINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 290. | DOXORUBICINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 291. | DOXORUBICINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 292. | DOXORUBICINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 293. | DOXORUBICINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 294. | DOXORUBICINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 295. | DOXORUBICINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 296. | DOXORUBICINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 297. | DOXORUBICINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 298. | DOXORUBICINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 299. | DOXORUBICINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 300. | DOXORUBICINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 301. | DOXORUBICINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 302. | DOXORUBICINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 303. | DOXORUBICINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 304. | DOXORUBICINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 305. | DOXORUBICINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 306. | DOXORUBICINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 307. | DOXORUBICINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 308. | DOXORUBICINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 309. | DOXORUBICINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 310. | DOXORUBICINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 311. | DOXORUBICINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 312. | DOXORUBICINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 313. | DOXORUBICINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 314. | DOXORUBICINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 315. | DOXORUBICINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 316. | DOXORUBICINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 317. | DOXORUBICINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 318. | DOXORUBICINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 319. | DOXORUBICINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 320. | DOXORUBICINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 321. | DOXORUBICINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 322. | DOXORUBICINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 323. | DOXORUBICINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 324. | DOXORUBICINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 325. | DOXORUBICINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 326. | DOXORUBICINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 327. | DOXORUBICINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 328. | DOXORUBICINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 329. | DOXORUBICINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 330. | DOXORUBICINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 331. | DOXORUBICINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 332. | DOXORUBICINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 333. | DOXORUBICINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 334. | DOXORUBICINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 335. | DOXORUBICINUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 336. | DOXORUBICINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 337. | DOXORUBICINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 338. | DOXORUBICINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 339. | DOXORUBICINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 340. | DOXORUBICINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 341. | DOXORUBICINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 342. | DOXORUBICINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 343. | DOXORUBICINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 344. | DOXORUBICINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 345. | DOXORUBICINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 346. | DOXORUBICINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 347. | DOXORUBICINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 348. | DOXORUBICINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 349. | DOXORUBICINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 350. | DOXORUBICINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 351. | DOXORUBICINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 352. | DOXORUBICINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 353. | DOXORUBICINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 354. | DOXORUBICINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 355. | DOXORUBICINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 356. | DOXORUBICINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 357. | DOXORUBICINUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 358. | DOXORUBICINUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 359. | DOXORUBICINUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 360. | DOXORUBICINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 361. | DOXORUBICINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 362. | DOXORUBICINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 363. | DOXORUBICINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 364. | DOXORUBICINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 365. | DOXORUBICINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 366. | DOXORUBICINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 367. | DOXORUBICINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 368. | DOXORUBICINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 369. | DOXORUBICINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 370. | DOXORUBICINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 371. | DOXORUBICINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 372. | DOXORUBICINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 373. | DOXORUBICINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 374. | DOXORUBICINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 375. | DOXORUBICINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 376. | DOXORUBICINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 377. | DOXORUBICINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 378. | DOXORUBICINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 379. | DOXORUBICINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 380. | DOXORUBICINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 381. | DOXORUBICINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 382. | DOXORUBICINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 383. | DOXORUBICINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ |
| 384. | DOXORUBICINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 385. | DOXORUBICINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 386. | DOXORUBICINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 387. | DOXORUBICINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 388. | DOXORUBICINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 389. | DOXORUBICINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 390. | DOXORUBICINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 391. | DOXORUBICINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 392. | DOXORUBICINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 393. | DOXORUBICINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 394. | DOXORUBICINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 395. | DOXORUBICINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 396. | DOXORUBICINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 397. | DOXORUBICINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 398. | DOXORUBICINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 399. | DOXORUBICINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 400. | DOXORUBICINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 401. | DOXORUBICINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 402. | DOXORUBICINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 403. | DOXORUBICINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 404. | DOXORUBICINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 405. | DOXORUBICINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 406. | DOXORUBICINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 407. | DOXORUBICINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 408. | DOXORUBICINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 409. | DOXORUBICINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 410. | DOXORUBICINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 411. | DOXORUBICINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 412. | DOXORUBICINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 413. | DOXORUBICINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 414. | DOXORUBICINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 415. | DOXORUBICINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 416. | DOXORUBICINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 417. | DOXORUBICINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 418. | DOXORUBICINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 419. | DOXORUBICINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 420. | DOXORUBICINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 421. | DOXORUBICINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 422. | DOXORUBICINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 423. | DOXORUBICINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 424. | DOXORUBICINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 425. | DOXORUBICINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 426. | DOXORUBICINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 427. | DOXORUBICINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 428. | DOXORUBICINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 429. | DOXORUBICINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 430. | DOXORUBICINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 431. | DOXORUBICINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 432. | DOXORUBICINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 433. | DOXORUBICINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 434. | DOXORUBICINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 435. | DOXORUBICINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 436. | DOXORUBICINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 437. | DOXORUBICINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 438. | DOXORUBICINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 439. | DOXORUBICINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 440. | DOXORUBICINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 441. | DOXORUBICINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 442. | DOXORUBICINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 443. | DOXORUBICINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 444. | DOXORUBICINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 445. | DOXORUBICINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 446. | DOXORUBICINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 447. | DOXORUBICINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 448. | DOXORUBICINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 449. | DOXORUBICINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 450. | DOXORUBICINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 451. | DOXORUBICINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 452. | DOXORUBICINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 453. | DOXORUBICINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 454. | DOXORUBICINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 455. | DOXORUBICINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 456. | DOXORUBICINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 457. | DOXORUBICINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 458. | DOXORUBICINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 459. | DOXORUBICINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 460. | DOXORUBICINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 461. | DOXORUBICINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 462. | DOXORUBICINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 463. | DOXORUBICINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 464. | DOXORUBICINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 465. | DOXORUBICINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 466. | DOXORUBICINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 467. | DOXORUBICINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 468. | DOXORUBICINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 469. | DOXORUBICINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 470. | DOXORUBICINUM | C96.3 | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 471. | DOXORUBICINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 472. | DOXORUBICINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 473. | DOXORUBICINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 474. | DOXORUBICINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 475. | DOXORUBICINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 476. | DOXORUBICINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 477. | DOXORUBICINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 478. | DOXORUBICINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 479. | DOXORUBICINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 480. | DOXORUBICINUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 481. | DOXORUBICINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 482. | DOXORUBICINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 483. | DOXORUBICINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 484. | DOXORUBICINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 485. | DOXORUBICINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 486. | DOXORUBICINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 487. | DOXORUBICINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 488. | DOXORUBICINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 489. | DOXORUBICINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 490. | DOXORUBICINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 491. | DOXORUBICINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 492. | DOXORUBICINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 493. | DOXORUBICINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 494. | DOXORUBICINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 495. | DOXORUBICINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 496. | DOXORUBICINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 497. | DOXORUBICINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 498. | DOXORUBICINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 499. | DOXORUBICINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 500. | DOXORUBICINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 501. | DOXORUBICINUM | D07.1 | SROM |
| 502. | DOXORUBICINUM | D07.2 | POCHWA |
| 503. | DOXORUBICINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 504. | DOXORUBICINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 505. | DOXORUBICINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 506. | DOXORUBICINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 507. | DOXORUBICINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 508. | DOXORUBICINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 509. | DOXORUBICINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 510. | DOXORUBICINUM | D09.2 | OKO |
| 511. | DOXORUBICINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 512. | DOXORUBICINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 513. | DOXORUBICINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 514. | DOXORUBICINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 515. | DOXORUBICINUM | D10.0 | WARGA |
| 516. | DOXORUBICINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 517. | DOXORUBICINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 518. | DOXORUBICINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 519. | DOXORUBICINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 520. | DOXORUBICINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 521. | DOXORUBICINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 522. | DOXORUBICINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 523. | DOXORUBICINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 524. | DOXORUBICINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 525. | DOXORUBICINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 526. | DOXORUBICINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 527. | DOXORUBICINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 528. | DOXORUBICINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 529. | DOXORUBICINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 530. | DOXORUBICINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 531. | DOXORUBICINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 532. | DOXORUBICINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 533. | DOXORUBICINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 534. | DOXORUBICINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 535. | DOXORUBICINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 536. | DOXORUBICINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 537. | DOXORUBICINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 538. | DOXORUBICINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 539. | DOXORUBICINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 540. | DOXORUBICINUM | D13.0 | PRZELYK |
| 541. | DOXORUBICINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 542. | DOXORUBICINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 543. | DOXORUBICINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 544. | DOXORUBICINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 545. | DOXORUBICINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 546. | DOXORUBICINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 547. | DOXORUBICINUM | D13.7 | WSPY TRZUSTKI |
| 548. | DOXORUBICINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 549. | DOXORUBICINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 550. | DOXORUBICINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 551. | DOXORUBICINUM | D14.1 | KRTAŃ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 552. | DOXORUBICINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 553. | DOXORUBICINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 554. | DOXORUBICINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 555. | DOXORUBICINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 556. | DOXORUBICINUM | D15.0 | GRASICA |
| 557. | DOXORUBICINUM | D15.1 | SERCE |
| 558. | DOXORUBICINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 559. | DOXORUBICINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 560. | DOXORUBICINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 561. | DOXORUBICINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 562. | DOXORUBICINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 563. | DOXORUBICINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 564. | DOXORUBICINUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 565. | DOXORUBICINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 566. | DOXORUBICINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 567. | DOXORUBICINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 568. | DOXORUBICINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 569. | DOXORUBICINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 570. | DOXORUBICINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 571. | DOXORUBICINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 572. | DOXORUBICINUM | D17 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE Z TKANKI TŁUSZCZOWEJ |
| 573. | DOXORUBICINUM | D17.0 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 574. | DOXORUBICINUM | D17.1 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ TUŁOWIA |
| 575. | DOXORUBICINUM | D17.2 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ KOŃCZYŃ |
| 576. | DOXORUBICINUM | D17.3 | TŁUSZCZAK SKÓRY I TKANKI PODSKÓRNEJ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 577. | DOXORUBICINUM | D17.4 | TŁUSZCZAK NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 578. | DOXORUBICINUM | D17.5 | TŁUSZCZAK NARZĄDÓW JAMY BRZUSZNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 579. | DOXORUBICINUM | D17.6 | TŁUSZCZAK POWRÓZKA NASIENNEGO |
| 580. | DOXORUBICINUM | D17.7 | TŁUSZCZAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 581. | DOXORUBICINUM | D17.9 | TŁUSZCZAK, NIEOKREŚLONY |
| 582. | DOXORUBICINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 583. | DOXORUBICINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 584. | DOXORUBICINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 585. | DOXORUBICINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 586. | DOXORUBICINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 587. | DOXORUBICINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 588. | DOXORUBICINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 589. | DOXORUBICINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 590. | DOXORUBICINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 591. | DOXORUBICINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 592. | DOXORUBICINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 593. | DOXORUBICINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 594. | DOXORUBICINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 595. | DOXORUBICINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 596. | DOXORUBICINUM | D28.0 | SROM |
| 597. | DOXORUBICINUM | D28.1 | POCHWA |
| 598. | DOXORUBICINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 599. | DOXORUBICINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 600. | DOXORUBICINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 601. | DOXORUBICINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 602. | DOXORUBICINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 603. | DOXORUBICINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 604. | DOXORUBICINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 605. | DOXORUBICINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 606. | DOXORUBICINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 607. | DOXORUBICINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 608. | DOXORUBICINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 609. | DOXORUBICINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 610. | DOXORUBICINUM | D30.0 | NERKA |
| 611. | DOXORUBICINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 612. | DOXORUBICINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 613. | DOXORUBICINUM | D30.3 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 614. | DOXORUBICINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 615. | DOXORUBICINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 616. | DOXORUBICINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 617. | DOXORUBICINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 618. | DOXORUBICINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 619. | DOXORUBICINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 620. | DOXORUBICINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 621. | DOXORUBICINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 622. | DOXORUBICINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 623. | DOXORUBICINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 624. | DOXORUBICINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 625. | DOXORUBICINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 626. | DOXORUBICINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 627. | DOXORUBICINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 628. | DOXORUBICINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 629. | DOXORUBICINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 630. | DOXORUBICINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 631. | DOXORUBICINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMBIOTOWE |
| 632. | DOXORUBICINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMBIOTOWE |
| 633. | DOXORUBICINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 634. | DOXORUBICINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 635. | DOXORUBICINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 636. | DOXORUBICINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 637. | DOXORUBICINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 638. | DOXORUBICINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 639. | DOXORUBICINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 640. | DOXORUBICINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 641. | DOXORUBICINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 642. | DOXORUBICINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 643. | DOXORUBICINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 644. | DOXORUBICINUM | D35.4 | SZYSZYNKI |
| 645. | DOXORUBICINUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 646. | DOXORUBICINUM | D35.6 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 647. | DOXORUBICINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 648. | DOXORUBICINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 649. | DOXORUBICINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 650. | DOXORUBICINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 651. | DOXORUBICINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 652. | DOXORUBICINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 653. | DOXORUBICINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 654. | DOXORUBICINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 655. | DOXORUBICINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 656. | DOXORUBICINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 657. | DOXORUBICINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 658. | DOXORUBICINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 659. | DOXORUBICINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 660. | DOXORUBICINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 661. | DOXORUBICINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 662. | DOXORUBICINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 663. | DOXORUBICINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 664. | DOXORUBICINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 665. | DOXORUBICINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 666. | DOXORUBICINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 667. | DOXORUBICINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 668. | DOXORUBICINUM | D38.2 | OPŁUCNA |
| 669. | DOXORUBICINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 670. | DOXORUBICINUM | D38.4 | GRASICA |
| 671. | DOXORUBICINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 672. | DOXORUBICINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 673. | DOXORUBICINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 674. | DOXORUBICINUM | D39.0 | MACICA |
| 675. | DOXORUBICINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 676. | DOXORUBICINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 677. | DOXORUBICINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 678. | DOXORUBICINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 679. | DOXORUBICINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 680. | DOXORUBICINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 681. | DOXORUBICINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 682. | DOXORUBICINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 683. | DOXORUBICINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 684. | DOXORUBICINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 685. | DOXORUBICINUM | D41.0 | NERKA |
| 686. | DOXORUBICINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 687. | DOXORUBICINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 688. | DOXORUBICINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 689. | DOXORUBICINUM | D41.4 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 690. | DOXORUBICINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 691. | DOXORUBICINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 692. | DOXORUBICINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 693. | DOXORUBICINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 694. | DOXORUBICINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 695. | DOXORUBICINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 696. | DOXORUBICINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 697. | DOXORUBICINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMBIOTOWE |
| 698. | DOXORUBICINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMBIOTOWE |
| 699. | DOXORUBICINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 700. | DOXORUBICINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 701. | DOXORUBICINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 702. | DOXORUBICINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 703. | DOXORUBICINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 704. | DOXORUBICINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WĘWNETRZNEGO |
| 705. | DOXORUBICINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 706. | DOXORUBICINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 707. | DOXORUBICINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 708. | DOXORUBICINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 709. | DOXORUBICINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 710. | DOXORUBICINUM | D44.5 | SZYSZYNKKA |
| 711. | DOXORUBICINUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 712. | DOXORUBICINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 713. | DOXORUBICINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 714. | DOXORUBICINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 715. | DOXORUBICINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 716. | DOXORUBICINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 717. | DOXORUBICINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE |
| 718. | DOXORUBICINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 719. | DOXORUBICINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 720. | DOXORUBICINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 721. | DOXORUBICINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 722. | DOXORUBICINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 723. | DOXORUBICINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 724. | DOXORUBICINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 725. | DOXORUBICINUM | D48.6 | SUTEK |
| 726. | DOXORUBICINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 727. | DOXORUBICINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 728. | DOXORUBICINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 729. | DOXORUBICINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 730. | DOXORUBICINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 731. | DOXORUBICINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 732. | DOXORUBICINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 733. | DOXORUBICINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 734. | DOXORUBICINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 735. | DOXORUBICINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 736. | DOXORUBICINUM | E85.4 | ZŁOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 737. | DOXORUBICINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 738. | DOXORUBICINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.21.

DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--------------------------------------|
| 1. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 2. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 3. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 4. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 5. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 6. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 7. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 8. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 9. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 10. | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.22.

DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46 | MIĘSAK KAPOS'I EGO |
| 2 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY |
| 3 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 4 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA |
| 5 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 6 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 7 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 8 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY |
| 9 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 10 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 11 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 12 | DOXORUBICINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|--|------------|--|
| | LIPOSOMANUM PEGYLATUM | | |
| 13 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 14 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 15 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 16 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 17 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 18 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 19 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 20 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 21 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 22 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 23 | DOXORUBICINUM LIPOSOMANUM PEGYLATUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |

Załącznik C.23.

EPIRUBICINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | EPIRUBICINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 2 | EPIRUBICINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 3 | EPIRUBICINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 4 | EPIRUBICINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 5 | EPIRUBICINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 6 | EPIRUBICINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 7 | EPIRUBICINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 8 | EPIRUBICINUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |
| 9 | EPIRUBICINUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 10 | EPIRUBICINUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 11 | EPIRUBICINUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 12 | EPIRUBICINUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 13 | EPIRUBICINUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 14 | EPIRUBICINUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 15 | EPIRUBICINUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 16 | EPIRUBICINUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 17 | EPIRUBICINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 18 | EPIRUBICINUM | C16.0 | WPUST |
| 19 | EPIRUBICINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 20 | EPIRUBICINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 21 | EPIRUBICINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 22 | EPIRUBICINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 23 | EPIRUBICINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 24 | EPIRUBICINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 25 | EPIRUBICINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 26 | EPIRUBICINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 27 | EPIRUBICINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 28 | EPIRUBICINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 29 | EPIRUBICINUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 30 | EPIRUBICINUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 31 | EPIRUBICINUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 32 | EPIRUBICINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 33 | EPIRUBICINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 34 | EPIRUBICINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 35 | EPIRUBICINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 36 | EPIRUBICINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 37 | EPIRUBICINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 38 | EPIRUBICINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 39 | EPIRUBICINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 40 | EPIRUBICINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 41 | EPIRUBICINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 42 | EPIRUBICINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 43 | EPIRUBICINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 44 | EPIRUBICINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 45 | EPIRUBICINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 46 | EPIRUBICINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 47 | EPIRUBICINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 48 | EPIRUBICINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 49 | EPIRUBICINUM | C46 | MIĘSAK KAPOSI' EGO |
| 50 | EPIRUBICINUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | EPIRUBICINUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 52 | EPIRUBICINUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA |
| 53 | EPIRUBICINUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 54 | EPIRUBICINUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 55 | EPIRUBICINUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 56 | EPIRUBICINUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 57 | EPIRUBICINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 58 | EPIRUBICINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 59 | EPIRUBICINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 60 | EPIRUBICINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 61 | EPIRUBICINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 62 | EPIRUBICINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 63 | EPIRUBICINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 64 | EPIRUBICINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 65 | EPIRUBICINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 66 | EPIRUBICINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 67 | EPIRUBICINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 68 | EPIRUBICINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 69 | EPIRUBICINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 70 | EPIRUBICINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 71 | EPIRUBICINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 72 | EPIRUBICINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 73 | EPIRUBICINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 74 | EPIRUBICINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 75 | EPIRUBICINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 76 | EPIRUBICINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 77 | EPIRUBICINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 78 | EPIRUBICINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 79 | EPIRUBICINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 80 | EPIRUBICINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 81 | EPIRUBICINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 82 | EPIRUBICINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 83 | EPIRUBICINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 84 | EPIRUBICINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 85 | EPIRUBICINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 86 | EPIRUBICINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 87 | EPIRUBICINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 88 | EPIRUBICINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 89 | EPIRUBICINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 90 | EPIRUBICINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 91 | EPIRUBICINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 92 | EPIRUBICINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 93 | EPIRUBICINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 94 | EPIRUBICINUM | C54.1 | BŁONA ŚLIZOWA MACICY |
| 95 | EPIRUBICINUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 96 | EPIRUBICINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 97 | EPIRUBICINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 98 | EPIRUBICINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 99 | EPIRUBICINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 100 | EPIRUBICINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 101 | EPIRUBICINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 102 | EPIRUBICINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 103 | EPIRUBICINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 104 | EPIRUBICINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 105 | EPIRUBICINUM | C57.3 | PRZYMACICZA |
| 106 | EPIRUBICINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 107 | EPIRUBICINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 108 | EPIRUBICINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 109 | EPIRUBICINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 110 | EPIRUBICINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 111 | EPIRUBICINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 112 | EPIRUBICINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 113 | EPIRUBICINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 114 | EPIRUBICINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 115 | EPIRUBICINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 116 | EPIRUBICINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 117 | EPIRUBICINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 118 | EPIRUBICINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 119 | EPIRUBICINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 120 | EPIRUBICINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 121 | EPIRUBICINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 122 | EPIRUBICINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 123 | EPIRUBICINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 124 | EPIRUBICINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 125 | EPIRUBICINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 126 | EPIRUBICINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 127 | EPIRUBICINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 128 | EPIRUBICINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 129 | EPIRUBICINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 130 | EPIRUBICINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 131 | EPIRUBICINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 132 | EPIRUBICINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 133 | EPIRUBICINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 134 | EPIRUBICINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 135 | EPIRUBICINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 136 | EPIRUBICINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 137 | EPIRUBICINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 138 | EPIRUBICINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 139 | EPIRUBICINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 140 | EPIRUBICINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 141 | EPIRUBICINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 142 | EPIRUBICINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 143 | EPIRUBICINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 144 | EPIRUBICINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 145 | EPIRUBICINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 146 | EPIRUBICINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 147 | EPIRUBICINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 148 | EPIRUBICINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 149 | EPIRUBICINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 150 | EPIRUBICINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 151 | EPIRUBICINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 152 | EPIRUBICINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 153 | EPIRUBICINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 154 | EPIRUBICINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 155 | EPIRUBICINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 156 | EPIRUBICINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 157 | EPIRUBICINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 158 | EPIRUBICINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 159 | EPIRUBICINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 160 | EPIRUBICINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 161 | EPIRUBICINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 162 | EPIRUBICINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 163 | EPIRUBICINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 164 | EPIRUBICINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 165 | EPIRUBICINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 166 | EPIRUBICINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 167 | EPIRUBICINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 168 | EPIRUBICINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 169 | EPIRUBICINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 170 | EPIRUBICINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 171 | EPIRUBICINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 172 | EPIRUBICINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 173 | EPIRUBICINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 174 | EPIRUBICINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 175 | EPIRUBICINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 176 | EPIRUBICINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 177 | EPIRUBICINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 178 | EPIRUBICINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 179 | EPIRUBICINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 180 | EPIRUBICINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 181 | EPIRUBICINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 182 | EPIRUBICINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 183 | EPIRUBICINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 184 | EPIRUBICINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 185 | EPIRUBICINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 186 | EPIRUBICINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 187 | EPIRUBICINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIANA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 188 | EPIRUBICINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 189 | EPIRUBICINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 190 | EPIRUBICINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 191 | EPIRUBICINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 192 | EPIRUBICINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 193 | EPIRUBICINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 194 | EPIRUBICINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 195 | EPIRUBICINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 196 | EPIRUBICINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 197 | EPIRUBICINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 198 | EPIRUBICINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 199 | EPIRUBICINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 200 | EPIRUBICINUM | C96.3 | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 201 | EPIRUBICINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 202 | EPIRUBICINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 203 | EPIRUBICINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 204 | EPIRUBICINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 205 | EPIRUBICINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 206 | EPIRUBICINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 207 | EPIRUBICINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 208 | EPIRUBICINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 209 | EPIRUBICINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 210 | EPIRUBICINUM | D48.6 | SUTEK |
| 211 | EPIRUBICINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 212 | EPIRUBICINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 213 | EPIRUBICINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 214 | EPIRUBICINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 215 | EPIRUBICINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 216 | EPIRUBICINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 217 | EPIRUBICINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 218 | EPIRUBICINUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 219 | EPIRUBICINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 220 | EPIRUBICINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.24.

ETOPOSIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | ETOPOSIDUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | ETOPOSIDUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | ETOPOSIDUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | ETOPOSIDUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | ETOPOSIDUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | ETOPOSIDUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | ETOPOSIDUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | ETOPOSIDUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | ETOPOSIDUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | ETOPOSIDUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | ETOPOSIDUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | ETOPOSIDUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | ETOPOSIDUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | ETOPOSIDUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | ETOPOSIDUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | ETOPOSIDUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | ETOPOSIDUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | ETOPOSIDUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | ETOPOSIDUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | ETOPOSIDUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | ETOPOSIDUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | ETOPOSIDUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | ETOPOSIDUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | ETOPOSIDUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | ETOPOSIDUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | ETOPOSIDUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | ETOPOSIDUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | ETOPOSIDUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | ETOPOSIDUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | ETOPOSIDUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | ETOPOSIDUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | ETOPOSIDUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | ETOPOSIDUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | ETOPOSIDUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | ETOPOSIDUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | ETOPOSIDUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | ETOPOSIDUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | ETOPOSIDUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | ETOPOSIDUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | ETOPOSIDUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | ETOPOSIDUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | ETOPOSIDUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | ETOPOSIDUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | ETOPOSIDUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | ETOPOSIDUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | ETOPOSIDUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | ETOPOSIDUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | ETOPOSIDUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | ETOPOSIDUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | ETOPOSIDUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | ETOPOSIDUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | ETOPOSIDUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | ETOPOSIDUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | ETOPOSIDUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | ETOPOSIDUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | ETOPOSIDUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | ETOPOSIDUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | ETOPOSIDUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | ETOPOSIDUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | ETOPOSIDUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | ETOPOSIDUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | ETOPOSIDUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | ETOPOSIDUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | ETOPOSIDUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | ETOPOSIDUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | ETOPOSIDUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | ETOPOSIDUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | ETOPOSIDUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69 | ETOPOSIDUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | ETOPOSIDUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | ETOPOSIDUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | ETOPOSIDUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | ETOPOSIDUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | ETOPOSIDUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | ETOPOSIDUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | ETOPOSIDUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | ETOPOSIDUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | ETOPOSIDUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79 | ETOPOSIDUM | C16.0 | WPUST |
| 80 | ETOPOSIDUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81 | ETOPOSIDUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82 | ETOPOSIDUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83 | ETOPOSIDUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84 | ETOPOSIDUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85 | ETOPOSIDUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86 | ETOPOSIDUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87 | ETOPOSIDUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88 | ETOPOSIDUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89 | ETOPOSIDUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90 | ETOPOSIDUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91 | ETOPOSIDUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92 | ETOPOSIDUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93 | ETOPOSIDUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94 | ETOPOSIDUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95 | ETOPOSIDUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96 | ETOPOSIDUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97 | ETOPOSIDUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98 | ETOPOSIDUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99 | ETOPOSIDUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100 | ETOPOSIDUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101 | ETOPOSIDUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 102 | ETOPOSIDUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103 | ETOPOSIDUM | C18.7 | ESICA |
| 104 | ETOPOSIDUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105 | ETOPOSIDUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | ETOPOSIDUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107 | ETOPOSIDUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108 | ETOPOSIDUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109 | ETOPOSIDUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110 | ETOPOSIDUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111 | ETOPOSIDUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112 | ETOPOSIDUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113 | ETOPOSIDUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114 | ETOPOSIDUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115 | ETOPOSIDUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116 | ETOPOSIDUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117 | ETOPOSIDUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118 | ETOPOSIDUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119 | ETOPOSIDUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120 | ETOPOSIDUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121 | ETOPOSIDUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122 | ETOPOSIDUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123 | ETOPOSIDUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124 | ETOPOSIDUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125 | ETOPOSIDUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126 | ETOPOSIDUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127 | ETOPOSIDUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 128 | ETOPOSIDUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129 | ETOPOSIDUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130 | ETOPOSIDUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131 | ETOPOSIDUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132 | ETOPOSIDUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | ETOPOSIDUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134 | ETOPOSIDUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135 | ETOPOSIDUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136 | ETOPOSIDUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137 | ETOPOSIDUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138 | ETOPOSIDUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139 | ETOPOSIDUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140 | ETOPOSIDUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141 | ETOPOSIDUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142 | ETOPOSIDUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143 | ETOPOSIDUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144 | ETOPOSIDUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145 | ETOPOSIDUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146 | ETOPOSIDUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147 | ETOPOSIDUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148 | ETOPOSIDUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149 | ETOPOSIDUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150 | ETOPOSIDUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151 | ETOPOSIDUM | C33 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY |
| 152 | ETOPOSIDUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 153 | ETOPOSIDUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 154 | ETOPOSIDUM | C34.1 | PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 155 | ETOPOSIDUM | C34.2 | PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 156 | ETOPOSIDUM | C34.3 | PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 157 | ETOPOSIDUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 158 | ETOPOSIDUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 159 | ETOPOSIDUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 160 | ETOPOSIDUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 161 | ETOPOSIDUM | C38.0 | SERCE |
| 162 | ETOPOSIDUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 163 | ETOPOSIDUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 164 | ETOPOSIDUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 165 | ETOPOSIDUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 166 | ETOPOSIDUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 167 | ETOPOSIDUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 168 | ETOPOSIDUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 169 | ETOPOSIDUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 170 | ETOPOSIDUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 171 | ETOPOSIDUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 172 | ETOPOSIDUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 173 | ETOPOSIDUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 174 | ETOPOSIDUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 175 | ETOPOSIDUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 176 | ETOPOSIDUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 177 | ETOPOSIDUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 178 | ETOPOSIDUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 179 | ETOPOSIDUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 180 | ETOPOSIDUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 181 | ETOPOSIDUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 182 | ETOPOSIDUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 183 | ETOPOSIDUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 184 | ETOPOSIDUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 185 | ETOPOSIDUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 186 | ETOPOSIDUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 187 | ETOPOSIDUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 188 | ETOPOSIDUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 189 | ETOPOSIDUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 190 | ETOPOSIDUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 191 | ETOPOSIDUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 192 | ETOPOSIDUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 193 | ETOPOSIDUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 194 | ETOPOSIDUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 195 | ETOPOSIDUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 196 | ETOPOSIDUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 197 | ETOPOSIDUM | C46 | MIĘSAK KAPOSI' EGO |
| 198 | ETOPOSIDUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY |
| 199 | ETOPOSIDUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 200 | ETOPOSIDUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA |
| 201 | ETOPOSIDUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 202 | ETOPOSIDUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 203 | ETOPOSIDUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 204 | ETOPOSIDUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 205 | ETOPOSIDUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 206 | ETOPOSIDUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 207 | ETOPOSIDUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 208 | ETOPOSIDUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 209 | ETOPOSIDUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 210 | ETOPOSIDUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 211 | ETOPOSIDUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 212 | ETOPOSIDUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 213 | ETOPOSIDUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 214 | ETOPOSIDUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 215 | ETOPOSIDUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 216 | ETOPOSIDUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 217 | ETOPOSIDUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 218 | ETOPOSIDUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 219 | ETOPOSIDUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 220 | ETOPOSIDUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 221 | ETOPOSIDUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 222 | ETOPOSIDUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 223 | ETOPOSIDUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 224 | ETOPOSIDUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 225 | ETOPOSIDUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 226 | ETOPOSIDUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 227 | ETOPOSIDUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 228 | ETOPOSIDUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 229 | ETOPOSIDUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 230 | ETOPOSIDUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 231 | ETOPOSIDUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 232 | ETOPOSIDUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 233 | ETOPOSIDUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 234 | ETOPOSIDUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 235 | ETOPOSIDUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 236 | ETOPOSIDUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 237 | ETOPOSIDUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 238 | ETOPOSIDUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 239 | ETOPOSIDUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 240 | ETOPOSIDUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 241 | ETOPOSIDUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 242 | ETOPOSIDUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 243 | ETOPOSIDUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 244 | ETOPOSIDUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 245 | ETOPOSIDUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 246 | ETOPOSIDUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 247 | ETOPOSIDUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 248 | ETOPOSIDUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 249 | ETOPOSIDUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 250 | ETOPOSIDUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 251 | ETOPOSIDUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 252 | ETOPOSIDUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 253 | ETOPOSIDUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 254 | ETOPOSIDUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 255 | ETOPOSIDUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 256 | ETOPOSIDUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 257 | ETOPOSIDUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 258 | ETOPOSIDUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 259 | ETOPOSIDUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 260 | ETOPOSIDUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 261 | ETOPOSIDUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 262 | ETOPOSIDUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 263 | ETOPOSIDUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 264 | ETOPOSIDUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 265 | ETOPOSIDUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 266 | ETOPOSIDUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 267 | ETOPOSIDUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 268 | ETOPOSIDUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 269 | ETOPOSIDUM | C57.9 | ZĘŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 270 | ETOPOSIDUM | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |
| 271 | ETOPOSIDUM | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 272 | ETOPOSIDUM | C60.0 | NAPLETEK |
| 273 | ETOPOSIDUM | C60.1 | ŻOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 274 | ETOPOSIDUM | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 275 | ETOPOSIDUM | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |
| 276 | ETOPOSIDUM | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 277 | ETOPOSIDUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 278 | ETOPOSIDUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 279 | ETOPOSIDUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 280 | ETOPOSIDUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 281 | ETOPOSIDUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 282 | ETOPOSIDUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 283 | ETOPOSIDUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 284 | ETOPOSIDUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 285 | ETOPOSIDUM | C63.2 | MOSZNA |
| 286 | ETOPOSIDUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 287 | ETOPOSIDUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 288 | ETOPOSIDUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 289 | ETOPOSIDUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 290 | ETOPOSIDUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 291 | ETOPOSIDUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 292 | ETOPOSIDUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 293 | ETOPOSIDUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 294 | ETOPOSIDUM | C67.1 | SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 295 | ETOPOSIDUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 296 | ETOPOSIDUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 297 | ETOPOSIDUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 298 | ETOPOSIDUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 299 | ETOPOSIDUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 300 | ETOPOSIDUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 301 | ETOPOSIDUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 302 | ETOPOSIDUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 303 | ETOPOSIDUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 304 | ETOPOSIDUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 305 | ETOPOSIDUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 306 | ETOPOSIDUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 307 | ETOPOSIDUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 308 | ETOPOSIDUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 309 | ETOPOSIDUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 310 | ETOPOSIDUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 311 | ETOPOSIDUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 312 | ETOPOSIDUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 313 | ETOPOSIDUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 314 | ETOPOSIDUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 315 | ETOPOSIDUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 316 | ETOPOSIDUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 317 | ETOPOSIDUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 318 | ETOPOSIDUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 319 | ETOPOSIDUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 320 | ETOPOSIDUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 321 | ETOPOSIDUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 322 | ETOPOSIDUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 323 | ETOPOSIDUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 324 | ETOPOSIDUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 325 | ETOPOSIDUM | C71.2 | PLAT SKRONIOWY |
| 326 | ETOPOSIDUM | C71.3 | PLAT CIEMIENOWY |
| 327 | ETOPOSIDUM | C71.4 | PLAT POTYLICZNY |
| 328 | ETOPOSIDUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 329 | ETOPOSIDUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 330 | ETOPOSIDUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 331 | ETOPOSIDUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 332 | ETOPOSIDUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 333 | ETOPOSIDUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 334 | ETOPOSIDUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 335 | ETOPOSIDUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 336 | ETOPOSIDUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 337 | ETOPOSIDUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 338 | ETOPOSIDUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 339 | ETOPOSIDUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 340 | ETOPOSIDUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 341 | ETOPOSIDUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 342 | ETOPOSIDUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 343 | ETOPOSIDUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 344 | ETOPOSIDUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 345 | ETOPOSIDUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 346 | ETOPOSIDUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 347 | ETOPOSIDUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 348 | ETOPOSIDUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 349 | ETOPOSIDUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 350 | ETOPOSIDUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 351 | ETOPOSIDUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 352 | ETOPOSIDUM | C75.4 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 353 | ETOPOSIDUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 354 | ETOPOSIDUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 355 | ETOPOSIDUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 356 | ETOPOSIDUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 357 | ETOPOSIDUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 358 | ETOPOSIDUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 359 | ETOPOSIDUM | C76.2 | BRZUCH |
| 360 | ETOPOSIDUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 361 | ETOPOSIDUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 362 | ETOPOSIDUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 363 | ETOPOSIDUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 364 | ETOPOSIDUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 365 | ETOPOSIDUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 366 | ETOPOSIDUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 367 | ETOPOSIDUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 368 | ETOPOSIDUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 369 | ETOPOSIDUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 370 | ETOPOSIDUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 371 | ETOPOSIDUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 372 | ETOPOSIDUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 373 | ETOPOSIDUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 374 | ETOPOSIDUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 375 | ETOPOSIDUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 376 | ETOPOSIDUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 377 | ETOPOSIDUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ |
| 378 | ETOPOSIDUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 379 | ETOPOSIDUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 380 | ETOPOSIDUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 381 | ETOPOSIDUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 382 | ETOPOSIDUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 383 | ETOPOSIDUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 384 | ETOPOSIDUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 385 | ETOPOSIDUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 386 | ETOPOSIDUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 387 | ETOPOSIDUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 388 | ETOPOSIDUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 389 | ETOPOSIDUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 390 | ETOPOSIDUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 391 | ETOPOSIDUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 392 | ETOPOSIDUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 393 | ETOPOSIDUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 394 | ETOPOSIDUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 395 | ETOPOSIDUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 396 | ETOPOSIDUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 397 | ETOPOSIDUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 398 | ETOPOSIDUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 399 | ETOPOSIDUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 400 | ETOPOSIDUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 401 | ETOPOSIDUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 402 | ETOPOSIDUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 403 | ETOPOSIDUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 404 | ETOPOSIDUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 405 | ETOPOSIDUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 406 | ETOPOSIDUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 407 | ETOPOSIDUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 408 | ETOPOSIDUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 409 | ETOPOSIDUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 410 | ETOPOSIDUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 411 | ETOPOSIDUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 412 | ETOPOSIDUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 413 | ETOPOSIDUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 414 | ETOPOSIDUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 415 | ETOPOSIDUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 416 | ETOPOSIDUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 417 | ETOPOSIDUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 418 | ETOPOSIDUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 419 | ETOPOSIDUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 420 | ETOPOSIDUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 421 | ETOPOSIDUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 422 | ETOPOSIDUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 423 | ETOPOSIDUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 424 | ETOPOSIDUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 425 | ETOPOSIDUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 426 | ETOPOSIDUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 427 | ETOPOSIDUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 428 | ETOPOSIDUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 429 | ETOPOSIDUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 430 | ETOPOSIDUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 431 | ETOPOSIDUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 432 | ETOPOSIDUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 433 | ETOPOSIDUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 434 | ETOPOSIDUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 435 | ETOPOSIDUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 436 | ETOPOSIDUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 437 | ETOPOSIDUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 438 | ETOPOSIDUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 439 | ETOPOSIDUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 440 | ETOPOSIDUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 441 | ETOPOSIDUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 442 | ETOPOSIDUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 443 | ETOPOSIDUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 444 | ETOPOSIDUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 445 | ETOPOSIDUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 446 | ETOPOSIDUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 447 | ETOPOSIDUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 448 | ETOPOSIDUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 449 | ETOPOSIDUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 450 | ETOPOSIDUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 451 | ETOPOSIDUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 452 | ETOPOSIDUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 453 | ETOPOSIDUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 454 | ETOPOSIDUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 455 | ETOPOSIDUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 456 | ETOPOSIDUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 457 | ETOPOSIDUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 458 | ETOPOSIDUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 459 | ETOPOSIDUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 460 | ETOPOSIDUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 461 | ETOPOSIDUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 462 | ETOPOSIDUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 463 | ETOPOSIDUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 464 | ETOPOSIDUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 465 | ETOPOSIDUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 466 | ETOPOSIDUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 467 | ETOPOSIDUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 468 | ETOPOSIDUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 469 | ETOPOSIDUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 470 | ETOPOSIDUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 471 | ETOPOSIDUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 472 | ETOPOSIDUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 473 | ETOPOSIDUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 474 | ETOPOSIDUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 475 | ETOPOSIDUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 476 | ETOPOSIDUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 477 | ETOPOSIDUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 478 | ETOPOSIDUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 479 | ETOPOSIDUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 480 | ETOPOSIDUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 481 | ETOPOSIDUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 482 | ETOPOSIDUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 483 | ETOPOSIDUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 484 | ETOPOSIDUM | C96.3 | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 485 | ETOPOSIDUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 486 | ETOPOSIDUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 487 | ETOPOSIDUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 488 | ETOPOSIDUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 489 | ETOPOSIDUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 490 | ETOPOSIDUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 491 | ETOPOSIDUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 492 | ETOPOSIDUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 493 | ETOPOSIDUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 494 | ETOPOSIDUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 495 | ETOPOSIDUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 496 | ETOPOSIDUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 497 | ETOPOSIDUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 498 | ETOPOSIDUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 499 | ETOPOSIDUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 500 | ETOPOSIDUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 501 | ETOPOSIDUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 502 | ETOPOSIDUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 503 | ETOPOSIDUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 504 | ETOPOSIDUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 505 | ETOPOSIDUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 506 | ETOPOSIDUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 507 | ETOPOSIDUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 508 | ETOPOSIDUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 509 | ETOPOSIDUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 510 | ETOPOSIDUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 511 | ETOPOSIDUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 512 | ETOPOSIDUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 513 | ETOPOSIDUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 514 | ETOPOSIDUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 515 | ETOPOSIDUM | D07.1 | SROM |
| 516 | ETOPOSIDUM | D07.2 | POCHWA |
| 517 | ETOPOSIDUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 518 | ETOPOSIDUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 519 | ETOPOSIDUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 520 | ETOPOSIDUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 521 | ETOPOSIDUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 522 | ETOPOSIDUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 523 | ETOPOSIDUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 524 | ETOPOSIDUM | D09.2 | OKO |
| 525 | ETOPOSIDUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 526 | ETOPOSIDUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 527 | ETOPOSIDUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 528 | ETOPOSIDUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 529 | ETOPOSIDUM | D10.0 | WARGA |
| 530 | ETOPOSIDUM | D10.1 | JĘZYK |
| 531 | ETOPOSIDUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 532 | ETOPOSIDUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 533 | ETOPOSIDUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 534 | ETOPOSIDUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 535 | ETOPOSIDUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 536 | ETOPOSIDUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 537 | ETOPOSIDUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 538 | ETOPOSIDUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 539 | ETOPOSIDUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 540 | ETOPOSIDUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 541 | ETOPOSIDUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 542 | ETOPOSIDUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 543 | ETOPOSIDUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 544 | ETOPOSIDUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 545 | ETOPOSIDUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 546 | ETOPOSIDUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 547 | ETOPOSIDUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 548 | ETOPOSIDUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 549 | ETOPOSIDUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 550 | ETOPOSIDUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 551 | ETOPOSIDUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 552 | ETOPOSIDUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 553 | ETOPOSIDUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 554 | ETOPOSIDUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 555 | ETOPOSIDUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 556 | ETOPOSIDUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 557 | ETOPOSIDUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 558 | ETOPOSIDUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 559 | ETOPOSIDUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 560 | ETOPOSIDUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 561 | ETOPOSIDUM | D13.7 | WYSPIY TRZUSTKI |
| 562 | ETOPOSIDUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 563 | ETOPOSIDUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 564 | ETOPOSIDUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 565 | ETOPOSIDUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 566 | ETOPOSIDUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 567 | ETOPOSIDUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 568 | ETOPOSIDUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 569 | ETOPOSIDUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 570 | ETOPOSIDUM | D15.0 | GRASICA |
| 571 | ETOPOSIDUM | D15.1 | SERCE |
| 572 | ETOPOSIDUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 573 | ETOPOSIDUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 574 | ETOPOSIDUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 575 | ETOPOSIDUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 576 | ETOPOSIDUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 577 | ETOPOSIDUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 578 | ETOPOSIDUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 579 | ETOPOSIDUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 580 | ETOPOSIDUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 581 | ETOPOSIDUM | D16.5 | ZUCHWA |
| 582 | ETOPOSIDUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 583 | ETOPOSIDUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 584 | ETOPOSIDUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 585 | ETOPOSIDUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 586 | ETOPOSIDUM | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 587 | ETOPOSIDUM | D18.0 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 588 | ETOPOSIDUM | D18.1 | NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 589 | ETOPOSIDUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNEJ |
| 590 | ETOPOSIDUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNA |
| 591 | ETOPOSIDUM | D20.1 | OTRZEWA |
| 592 | ETOPOSIDUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 593 | ETOPOSIDUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 594 | ETOPOSIDUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 595 | ETOPOSIDUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 596 | ETOPOSIDUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 597 | ETOPOSIDUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 598 | ETOPOSIDUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 599 | ETOPOSIDUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 600 | ETOPOSIDUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 601 | ETOPOSIDUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 602 | ETOPOSIDUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 603 | ETOPOSIDUM | D28.0 | SRÓM |
| 604 | ETOPOSIDUM | D28.1 | POCHWA |
| 605 | ETOPOSIDUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 606 | ETOPOSIDUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 607 | ETOPOSIDUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 608 | ETOPOSIDUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 609 | ETOPOSIDUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 610 | ETOPOSIDUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 611 | ETOPOSIDUM | D29.2 | JĄDRO |
| 612 | ETOPOSIDUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 613 | ETOPOSIDUM | D29.4 | MOSZNA |
| 614 | ETOPOSIDUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 615 | ETOPOSIDUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 616 | ETOPOSIDUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 617 | ETOPOSIDUM | D30.0 | NERKA |
| 618 | ETOPOSIDUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 619 | ETOPOSIDUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 620 | ETOPOSIDUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 621 | ETOPOSIDUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 622 | ETOPOSIDUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 623 | ETOPOSIDUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 624 | ETOPOSIDUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 625 | ETOPOSIDUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 626 | ETOPOSIDUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 627 | ETOPOSIDUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 628 | ETOPOSIDUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 629 | ETOPOSIDUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 630 | ETOPOSIDUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 631 | ETOPOSIDUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 632 | ETOPOSIDUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 633 | ETOPOSIDUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 634 | ETOPOSIDUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 635 | ETOPOSIDUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 636 | ETOPOSIDUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 637 | ETOPOSIDUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 638 | ETOPOSIDUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 639 | ETOPOSIDUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 640 | ETOPOSIDUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 641 | ETOPOSIDUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 642 | ETOPOSIDUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 643 | ETOPOSIDUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 644 | ETOPOSIDUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 645 | ETOPOSIDUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 646 | ETOPOSIDUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 647 | ETOPOSIDUM | D35.0 | NADNERCZA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 648 | ETOPOSIDUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 649 | ETOPOSIDUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 650 | ETOPOSIDUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 651 | ETOPOSIDUM | D35.4 | SZYSZYNKI |
| 652 | ETOPOSIDUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 653 | ETOPOSIDUM | D35.6 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 654 | ETOPOSIDUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 655 | ETOPOSIDUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 656 | ETOPOSIDUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 657 | ETOPOSIDUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 658 | ETOPOSIDUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 659 | ETOPOSIDUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 660 | ETOPOSIDUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 661 | ETOPOSIDUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 662 | ETOPOSIDUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 663 | ETOPOSIDUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 664 | ETOPOSIDUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 665 | ETOPOSIDUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 666 | ETOPOSIDUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 667 | ETOPOSIDUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 668 | ETOPOSIDUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 669 | ETOPOSIDUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 670 | ETOPOSIDUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 671 | ETOPOSIDUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 672 | ETOPOSIDUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 673 | ETOPOSIDUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 674 | ETOPOSIDUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 675 | ETOPOSIDUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 676 | ETOPOSIDUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 677 | ETOPOSIDUM | D38.4 | GRASICA |
| 678 | ETOPOSIDUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 679 | ETOPOSIDUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 680 | ETOPOSIDUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 681 | ETOPOSIDUM | D39.0 | MACICA |
| 682 | ETOPOSIDUM | D39.1 | JAJNIK |
| 683 | ETOPOSIDUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 684 | ETOPOSIDUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 685 | ETOPOSIDUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 686 | ETOPOSIDUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 687 | ETOPOSIDUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 688 | ETOPOSIDUM | D40.1 | JĄDRO |
| 689 | ETOPOSIDUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 690 | ETOPOSIDUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 691 | ETOPOSIDUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 692 | ETOPOSIDUM | D41.0 | NERKA |
| 693 | ETOPOSIDUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 694 | ETOPOSIDUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 695 | ETOPOSIDUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 696 | ETOPOSIDUM | D41.4 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 697 | ETOPOSIDUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 698 | ETOPOSIDUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 699 | ETOPOSIDUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 700 | ETOPOSIDUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 701 | ETOPOSIDUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 702 | ETOPOSIDUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 703 | ETOPOSIDUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 704 | ETOPOSIDUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMBIOTOWE |
| 705 | ETOPOSIDUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMBIOTOWE |
| 706 | ETOPOSIDUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 707 | ETOPOSIDUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 708 | ETOPOSIDUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 709 | ETOPOSIDUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 710 | ETOPOSIDUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 711 | ETOPOSIDUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 712 | ETOPOSIDUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 713 | ETOPOSIDUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 714 | ETOPOSIDUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 715 | ETOPOSIDUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 716 | ETOPOSIDUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 717 | ETOPOSIDUM | D44.5 | SZYSZYŃKA |
| 718 | ETOPOSIDUM | D44.6 | KLĘBEK SZYJNY |
| 719 | ETOPOSIDUM | D44.7 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 720 | ETOPOSIDUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 721 | ETOPOSIDUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 722 | ETOPOSIDUM | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 723 | ETOPOSIDUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 724 | ETOPOSIDUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 725 | ETOPOSIDUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 726 | ETOPOSIDUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 727 | ETOPOSIDUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 728 | ETOPOSIDUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 729 | ETOPOSIDUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 730 | ETOPOSIDUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 731 | ETOPOSIDUM | D47 | INNY NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 732 | ETOPOSIDUM | D47.0 | GUZY HISTIOCYTÓW I KOMÓREK TUCZNYCH O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE |
| 733 | ETOPOSIDUM | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 734 | ETOPOSIDUM | D47.2 | GAMMOPATIA MONOKLONALNA |
| 735 | ETOPOSIDUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 736 | ETOPOSIDUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 737 | ETOPOSIDUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 738 | ETOPOSIDUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 739 | ETOPOSIDUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 740 | ETOPOSIDUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 741 | ETOPOSIDUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 742 | ETOPOSIDUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 743 | ETOPOSIDUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 744 | ETOPOSIDUM | D48.5 | SKÓRA |
| 745 | ETOPOSIDUM | D48.6 | SUTEK |
| 746 | ETOPOSIDUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 747 | ETOPOSIDUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 748 | ETOPOSIDUM | D63.0 | NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU CHOROBY NOWOTWOROWEJ (C00-D48□) |
| 749 | ETOPOSIDUM | D63.8 | NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU INNYCH CHORÓB PRZEWLEKŁYCH SKLASYFIKOWANYCH GDZIE INDZIEJ |
| 750 | ETOPOSIDUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 751 | ETOPOSIDUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 752 | ETOPOSIDUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 753 | ETOPOSIDUM | D81.9 | ZŁOŻONE NIEDOBORY ODPORNOŚCI, NIEOKREŚLONE |
| 754 | ETOPOSIDUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 755 | ETOPOSIDUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 756 | ETOPOSIDUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 757 | ETOPOSIDUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 758 | ETOPOSIDUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 759 | ETOPOSIDUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 760 | ETOPOSIDUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 761 | ETOPOSIDUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.25.

FLUDARABINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 1 | FLUDARABINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 2 | FLUDARABINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 3 | FLUDARABINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 4 | FLUDARABINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 5 | FLUDARABINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 6 | FLUDARABINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 7 | FLUDARABINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 8 | FLUDARABINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 9 | FLUDARABINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 10 | FLUDARABINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 11 | FLUDARABINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 12 | FLUDARABINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 13 | FLUDARABINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 14 | FLUDARABINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 15 | FLUDARABINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 16 | FLUDARABINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 17 | FLUDARABINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 18 | FLUDARABINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 19 | FLUDARABINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 20 | FLUDARABINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 21 | FLUDARABINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 22 | FLUDARABINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 23 | FLUDARABINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 24 | FLUDARABINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 25 | FLUDARABINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 26 | FLUDARABINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 27 | FLUDARABINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 28 | FLUDARABINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 29 | FLUDARABINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 30 | FLUDARABINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 31 | FLUDARABINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 32 | FLUDARABINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 33 | FLUDARABINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 34 | FLUDARABINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 35 | FLUDARABINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 36 | FLUDARABINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 37 | FLUDARABINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 38 | FLUDARABINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 39 | FLUDARABINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 40 | FLUDARABINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 41 | FLUDARABINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 42 | FLUDARABINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 43 | FLUDARABINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 44 | FLUDARABINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 45 | FLUDARABINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 46 | FLUDARABINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 47 | FLUDARABINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 48 | FLUDARABINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 49 | FLUDARABINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 50 | FLUDARABINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | FLUDARABINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 52 | FLUDARABINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 53 | FLUDARABINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 54 | FLUDARABINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 55 | FLUDARABINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 56 | FLUDARABINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 57 | FLUDARABINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 58 | FLUDARABINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 59 | FLUDARABINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 60 | FLUDARABINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 61 | FLUDARABINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 62 | FLUDARABINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 63 | FLUDARABINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 64 | FLUDARABINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 65 | FLUDARABINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 66 | FLUDARABINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 67 | FLUDARABINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 68 | FLUDARABINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 69 | FLUDARABINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 70 | FLUDARABINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 71 | FLUDARABINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 72 | FLUDARABINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 73 | FLUDARABINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 74 | FLUDARABINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 75 | FLUDARABINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 76 | FLUDARABINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 77 | FLUDARABINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 78 | FLUDARABINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 79 | FLUDARABINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 80 | FLUDARABINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 81 | FLUDARABINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 82 | FLUDARABINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 83 | FLUDARABINUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 84 | FLUDARABINUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 85 | FLUDARABINUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 86 | FLUDARABINUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 87 | FLUDARABINUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 88 | FLUDARABINUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 89 | FLUDARABINUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 90 | FLUDARABINUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.26.

FLUOROURACILUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | FLUOROURACILUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | FLUOROURACILUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | FLUOROURACILUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | FLUOROURACILUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | FLUOROURACILUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | FLUOROURACILUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | FLUOROURACILUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | FLUOROURACILUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | FLUOROURACILUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | FLUOROURACILUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | FLUOROURACILUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | FLUOROURACILUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | FLUOROURACILUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | FLUOROURACILUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | FLUOROURACILUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | FLUOROURACILUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | FLUOROURACILUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | FLUOROURACILUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | FLUOROURACILUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | FLUOROURACILUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | FLUOROURACILUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | FLUOROURACILUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | FLUOROURACILUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | FLUOROURACILUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | FLUOROURACILUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | FLUOROURACILUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | FLUOROURACILUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | FLUOROURACILUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | FLUOROURACILUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | FLUOROURACILUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | FLUOROURACILUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | FLUOROURACILUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | FLUOROURACILUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | FLUOROURACILUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | FLUOROURACILUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | FLUOROURACILUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | FLUOROURACILUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | FLUOROURACILUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | FLUOROURACILUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | FLUOROURACILUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | FLUOROURACILUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | FLUOROURACILUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | FLUOROURACILUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | FLUOROURACILUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | FLUOROURACILUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | FLUOROURACILUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | FLUOROURACILUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | FLUOROURACILUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | FLUOROURACILUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | FLUOROURACILUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | FLUOROURACILUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | FLUOROURACILUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | FLUOROURACILUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | FLUOROURACILUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | FLUOROURACILUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | FLUOROURACILUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | FLUOROURACILUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | FLUOROURACILUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | FLUOROURACILUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | FLUOROURACILUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | FLUOROURACILUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | FLUOROURACILUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | FLUOROURACILUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | FLUOROURACILUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | FLUOROURACILUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | FLUOROURACILUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | FLUOROURACILUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | FLUOROURACILUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69 | FLUOROURACILUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | FLUOROURACILUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | FLUOROURACILUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | FLUOROURACILUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | FLUOROURACILUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | FLUOROURACILUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | FLUOROURACILUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | FLUOROURACILUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | FLUOROURACILUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | FLUOROURACILUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |
| 79 | FLUOROURACILUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 80 | FLUOROURACILUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 81 | FLUOROURACILUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 82 | FLUOROURACILUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 83 | FLUOROURACILUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 84 | FLUOROURACILUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 85 | FLUOROURACILUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 86 | FLUOROURACILUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 87 | FLUOROURACILUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 88 | FLUOROURACILUM | C16.0 | WPUST |
| 89 | FLUOROURACILUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 90 | FLUOROURACILUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 91 | FLUOROURACILUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 92 | FLUOROURACILUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 93 | FLUOROURACILUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 94 | FLUOROURACILUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 95 | FLUOROURACILUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 96 | FLUOROURACILUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 97 | FLUOROURACILUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 98 | FLUOROURACILUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 99 | FLUOROURACILUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 100 | FLUOROURACILUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 101 | FLUOROURACILUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 102 | FLUOROURACILUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 103 | FLUOROURACILUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 104 | FLUOROURACILUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 105 | FLUOROURACILUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | FLUOROURACILUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 107 | FLUOROURACILUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 108 | FLUOROURACILUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 109 | FLUOROURACILUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 110 | FLUOROURACILUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 111 | FLUOROURACILUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 112 | FLUOROURACILUM | C18.7 | ESICA |
| 113 | FLUOROURACILUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 114 | FLUOROURACILUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 115 | FLUOROURACILUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 116 | FLUOROURACILUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 117 | FLUOROURACILUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 118 | FLUOROURACILUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 119 | FLUOROURACILUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 120 | FLUOROURACILUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 121 | FLUOROURACILUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 122 | FLUOROURACILUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 123 | FLUOROURACILUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 124 | FLUOROURACILUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 125 | FLUOROURACILUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 126 | FLUOROURACILUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 127 | FLUOROURACILUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 128 | FLUOROURACILUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 129 | FLUOROURACILUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 130 | FLUOROURACILUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 131 | FLUOROURACILUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 132 | FLUOROURACILUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | FLUOROURACILUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 134 | FLUOROURACILUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 135 | FLUOROURACILUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 136 | FLUOROURACILUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 137 | FLUOROURACILUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 138 | FLUOROURACILUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 139 | FLUOROURACILUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 140 | FLUOROURACILUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 141 | FLUOROURACILUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 142 | FLUOROURACILUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 143 | FLUOROURACILUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 144 | FLUOROURACILUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 145 | FLUOROURACILUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 146 | FLUOROURACILUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 147 | FLUOROURACILUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 148 | FLUOROURACILUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 149 | FLUOROURACILUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 150 | FLUOROURACILUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 151 | FLUOROURACILUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 152 | FLUOROURACILUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 153 | FLUOROURACILUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 154 | FLUOROURACILUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 155 | FLUOROURACILUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 156 | FLUOROURACILUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 157 | FLUOROURACILUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 158 | FLUOROURACILUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 159 | FLUOROURACILUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 160 | FLUOROURACILUM | C32 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 161 | FLUOROURACILUM | C32.0 | GŁOŚNIA |
| 162 | FLUOROURACILUM | C32.1 | NAGŁOŚNIA |
| 163 | FLUOROURACILUM | C32.2 | JAMA PODGŁOŚNIOWA |
| 164 | FLUOROURACILUM | C32.3 | CHRZĄSTKI KRTANI |
| 165 | FLUOROURACILUM | C32.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI |
| 166 | FLUOROURACILUM | C32.9 | KRTAŃ, NIEOKREŚLONA |
| 167 | FLUOROURACILUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 168 | FLUOROURACILUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 169 | FLUOROURACILUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 170 | FLUOROURACILUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 171 | FLUOROURACILUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 172 | FLUOROURACILUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 173 | FLUOROURACILUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 174 | FLUOROURACILUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 175 | FLUOROURACILUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 176 | FLUOROURACILUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 177 | FLUOROURACILUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 178 | FLUOROURACILUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 179 | FLUOROURACILUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 180 | FLUOROURACILUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 181 | FLUOROURACILUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 182 | FLUOROURACILUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 183 | FLUOROURACILUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 184 | FLUOROURACILUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 185 | FLUOROURACILUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 186 | FLUOROURACILUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 187 | FLUOROURACILUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 188 | FLUOROURACILUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 189 | FLUOROURACILUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 190 | FLUOROURACILUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 191 | FLUOROURACILUM | C54.1 | BŁONA ŚLIZOWA MACICY |
| 192 | FLUOROURACILUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 193 | FLUOROURACILUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 194 | FLUOROURACILUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 195 | FLUOROURACILUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 196 | FLUOROURACILUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 197 | FLUOROURACILUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 198 | FLUOROURACILUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 199 | FLUOROURACILUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 200 | FLUOROURACILUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 201 | FLUOROURACILUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 202 | FLUOROURACILUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 203 | FLUOROURACILUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 204 | FLUOROURACILUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 205 | FLUOROURACILUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 206 | FLUOROURACILUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 207 | FLUOROURACILUM | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 208 | FLUOROURACILUM | C60.0 | NAPLETEK |
| 209 | FLUOROURACILUM | C60.1 | ŻOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 210 | FLUOROURACILUM | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 211 | FLUOROURACILUM | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |
| 212 | FLUOROURACILUM | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 213 | FLUOROURACILUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 214 | FLUOROURACILUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 215 | FLUOROURACILUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 216 | FLUOROURACILUM | C76.2 | BRZUCH |
| 217 | FLUOROURACILUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 218 | FLUOROURACILUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 219 | FLUOROURACILUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 220 | FLUOROURACILUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 221 | FLUOROURACILUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 222 | FLUOROURACILUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 223 | FLUOROURACILUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 224 | FLUOROURACILUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 225 | FLUOROURACILUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ |
| 226 | FLUOROURACILUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 227 | FLUOROURACILUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 228 | FLUOROURACILUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 229 | FLUOROURACILUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 230 | FLUOROURACILUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 231 | FLUOROURACILUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 232 | FLUOROURACILUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 233 | FLUOROURACILUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 234 | FLUOROURACILUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 235 | FLUOROURACILUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 236 | FLUOROURACILUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 237 | FLUOROURACILUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 238 | FLUOROURACILUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 239 | FLUOROURACILUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 240 | FLUOROURACILUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 241 | FLUOROURACILUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 242 | FLUOROURACILUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 243 | FLUOROURACILUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 244 | FLUOROURACILUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 245 | FLUOROURACILUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 246 | FLUOROURACILUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 247 | FLUOROURACILUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 248 | FLUOROURACILUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 249 | FLUOROURACILUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 250 | FLUOROURACILUM | D48.5 | SKÓRA |
| 251 | FLUOROURACILUM | D48.6 | SUTEK |
| 252 | FLUOROURACILUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 253 | FLUOROURACILUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.27.

FULVESTRANT

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--------------------------------------|
| 1 | FULVESTRANT | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 2 | FULVESTRANT | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 3 | FULVESTRANT | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 4 | FULVESTRANT | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 5 | FULVESTRANT | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 6 | FULVESTRANT | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 7 | FULVESTRANT | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 8 | FULVESTRANT | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 9 | FULVESTRANT | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 10 | FULVESTRANT | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.28.

GEMCYTABINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | GEMCYTABINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 2 | GEMCYTABINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 3 | GEMCYTABINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 4 | GEMCYTABINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 5 | GEMCYTABINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 6 | GEMCYTABINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 7 | GEMCYTABINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 8 | GEMCYTABINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 9 | GEMCYTABINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 10 | GEMCYTABINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 11 | GEMCYTABINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 12 | GEMCYTABINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 13 | GEMCYTABINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 14 | GEMCYTABINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 15 | GEMCYTABINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 16 | GEMCYTABINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 17 | GEMCYTABINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 18 | GEMCYTABINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 19 | GEMCYTABINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 20 | GEMCYTABINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 21 | GEMCYTABINUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 22 | GEMCYTABINUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 23 | GEMCYTABINUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | GEMCYTABINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 25 | GEMCYTABINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 26 | GEMCYTABINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 27 | GEMCYTABINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 28 | GEMCYTABINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 29 | GEMCYTABINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 30 | GEMCYTABINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 31 | GEMCYTABINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 32 | GEMCYTABINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 33 | GEMCYTABINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 34 | GEMCYTABINUM | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 35 | GEMCYTABINUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ |
| 36 | GEMCYTABINUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 37 | GEMCYTABINUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 38 | GEMCYTABINUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 39 | GEMCYTABINUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 40 | GEMCYTABINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 41 | GEMCYTABINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 42 | GEMCYTABINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 43 | GEMCYTABINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 44 | GEMCYTABINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 45 | GEMCYTABINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 46 | GEMCYTABINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 47 | GEMCYTABINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 48 | GEMCYTABINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 49 | GEMCYTABINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 50 | GEMCYTABINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | GEMCYTABINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 52 | GEMCYTABINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 53 | GEMCYTABINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 54 | GEMCYTABINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 55 | GEMCYTABINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 56 | GEMCYTABINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 57 | GEMCYTABINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 58 | GEMCYTABINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 59 | GEMCYTABINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 60 | GEMCYTABINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 61 | GEMCYTABINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 62 | GEMCYTABINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 63 | GEMCYTABINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 64 | GEMCYTABINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 65 | GEMCYTABINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 66 | GEMCYTABINUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 67 | GEMCYTABINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 68 | GEMCYTABINUM | C57.7 | INNE OKRESŁONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 69 | GEMCYTABINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 70 | GEMCYTABINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 71 | GEMCYTABINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 72 | GEMCYTABINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 73 | GEMCYTABINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 74 | GEMCYTABINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 75 | GEMCYTABINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 76 | GEMCYTABINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 77 | GEMCYTABINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 78 | GEMCYTABINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 79 | GEMCYTABINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 80 | GEMCYTABINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 81 | GEMCYTABINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 82 | GEMCYTABINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 83 | GEMCYTABINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 84 | GEMCYTABINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 85 | GEMCYTABINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 86 | GEMCYTABINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 87 | GEMCYTABINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 88 | GEMCYTABINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 89 | GEMCYTABINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 90 | GEMCYTABINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 91 | GEMCYTABINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 92 | GEMCYTABINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 93 | GEMCYTABINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 94 | GEMCYTABINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 95 | GEMCYTABINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 96 | GEMCYTABINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |

Załącznik C.29.

HYDROXYCARBAMIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 2 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 3 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 4 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 5 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 6 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 7 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 8 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 9 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 10 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 11 | HYDROXYCARBAMIDUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 12 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 13 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 14 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 15 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 16 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 17 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 18 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 19 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 20 | HYDROXYCARBAMIDUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 21 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 22 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 23 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 24 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 25 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81.3 | ZMNIJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 26 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 27 | HYDROXYCARBAMIDUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 28 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 29 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 30 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 31 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 32 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 33 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 34 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 35 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 36 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 37 | HYDROXYCARBAMIDUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 38 | HYDROXYCARBAMIDUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 39 | HYDROXYCARBAMIDUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 40 | HYDROXYCARBAMIDUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 41 | HYDROXYCARBAMIDUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 42 | HYDROXYCARBAMIDUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 43 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 44 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 45 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 46 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 47 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 48 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 49 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 50 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 51 | HYDROXYCARBAMIDUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 52 | HYDROXYCARBAMIDUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 53 | HYDROXYCARBAMIDUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 54 | HYDROXYCARBAMIDUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 55 | HYDROXYCARBAMIDUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 56 | HYDROXYCARBAMIDUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 57 | HYDROXYCARBAMIDUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 58 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 59 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 60 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 61 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 62 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 63 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 64 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 65 | HYDROXYCARBAMIDUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 66 | HYDROXYCARBAMIDUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 67 | HYDROXYCARBAMIDUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 68 | HYDROXYCARBAMIDUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 69 | HYDROXYCARBAMIDUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 70 | HYDROXYCARBAMIDUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 71 | HYDROXYCARBAMIDUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 72 | HYDROXYCARBAMIDUM | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 73 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 74 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 75 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 76 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 77 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 78 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 79 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 80 | HYDROXYCARBAMIDUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 81 | HYDROXYCARBAMIDUM | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 82 | HYDROXYCARBAMIDUM | D57 | ZABURZENIA POŁĄCZONE Z SIERPOWATOKRWINKOWOŚCIĄ |
| 83 | HYDROXYCARBAMIDUM | D57.0 | NIEDOKRWISTOŚĆ SIEROPAWTOKRWINKOWA Z PRZEŁOMEM |
| 84 | HYDROXYCARBAMIDUM | D57.1 | NIEDOKRWISTOŚĆ SIEROPAWTOKRWINKOWA BEZ PRZEŁOMU |
| 85 | HYDROXYCARBAMIDUM | D57.2 | PODWÓJNA HETEROZYGOTA W POŁĄCZENIU Z SIERPOWATOKRWINKOWOŚCIĄ |
| 86 | HYDROXYCARBAMIDUM | D57.3 | CECHA SIERPOWATOKRWINKOWOŚCI |
| 87 | HYDROXYCARBAMIDUM | D57.8 | INNE SIERPOWATOKRWINKOWOŚCI |
| 88 | HYDROXYCARBAMIDUM | D75.2 | NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA |
| 89 | HYDROXYCARBAMIDUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDEJ |
| 90 | HYDROXYCARBAMIDUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 91 | HYDROXYCARBAMIDUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |

Załącznik C.30.

IDARUBICIN

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 1 | IDARUBICIN | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 2 | IDARUBICIN | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 3 | IDARUBICIN | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 4 | IDARUBICIN | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 5 | IDARUBICIN | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 6 | IDARUBICIN | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 7 | IDARUBICIN | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 8 | IDARUBICIN | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 9 | IDARUBICIN | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 10 | IDARUBICIN | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 11 | IDARUBICIN | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 12 | IDARUBICIN | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 13 | IDARUBICIN | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 14 | IDARUBICIN | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 15 | IDARUBICIN | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 16 | IDARUBICIN | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 17 | IDARUBICIN | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 18 | IDARUBICIN | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 19 | IDARUBICIN | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 20 | IDARUBICIN | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 21 | IDARUBICIN | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 22 | IDARUBICIN | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 23 | IDARUBICIN | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 24 | IDARUBICIN | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 25 | IDARUBICIN | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 26 | IDARUBICIN | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 27 | IDARUBICIN | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 28 | IDARUBICIN | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 29 | IDARUBICIN | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 30 | IDARUBICIN | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 31 | IDARUBICIN | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 32 | IDARUBICIN | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 33 | IDARUBICIN | C76.2 | BRZUCH |
| 34 | IDARUBICIN | C76.3 | MIEDNICA |
| 35 | IDARUBICIN | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 36 | IDARUBICIN | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 37 | IDARUBICIN | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 38 | IDARUBICIN | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 39 | IDARUBICIN | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 40 | IDARUBICIN | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 41 | IDARUBICIN | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 42 | IDARUBICIN | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 43 | IDARUBICIN | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 44 | IDARUBICIN | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 45 | IDARUBICIN | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 46 | IDARUBICIN | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 47 | IDARUBICIN | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 48 | IDARUBICIN | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 49 | IDARUBICIN | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 50 | IDARUBICIN | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 51 | IDARUBICIN | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 52 | IDARUBICIN | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 53 | IDARUBICIN | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 54 | IDARUBICIN | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 55 | IDARUBICIN | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 56 | IDARUBICIN | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 57 | IDARUBICIN | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 58 | IDARUBICIN | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 59 | IDARUBICIN | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 60 | IDARUBICIN | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 61 | IDARUBICIN | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 62 | IDARUBICIN | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 63 | IDARUBICIN | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 64 | IDARUBICIN | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 65 | IDARUBICIN | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 66 | IDARUBICIN | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 67 | IDARUBICIN | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 68 | IDARUBICIN | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 69 | IDARUBICIN | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 70 | IDARUBICIN | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 71 | IDARUBICIN | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 72 | IDARUBICIN | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 73 | IDARUBICIN | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 74 | IDARUBICIN | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 75 | IDARUBICIN | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 76 | IDARUBICIN | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 77 | IDARUBICIN | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 78 | IDARUBICIN | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 79 | IDARUBICIN | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 80 | IDARUBICIN | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 81 | IDARUBICIN | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 82 | IDARUBICIN | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 83 | IDARUBICIN | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 84 | IDARUBICIN | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 85 | IDARUBICIN | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 86 | IDARUBICIN | C96.3 | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 87 | IDARUBICIN | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 88 | IDARUBICIN | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 89 | IDARUBICIN | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 90 | IDARUBICIN | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 91 | IDARUBICIN | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 92 | IDARUBICIN | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 93 | IDARUBICIN | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 94 | IDARUBICIN | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 95 | IDARUBICIN | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 96 | IDARUBICIN | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.31.

IFOSFAMIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|--|------------|---|
| 1 | IFOSFAMIDUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2 | IFOSFAMIDUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3 | IFOSFAMIDUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4 | IFOSFAMIDUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5 | IFOSFAMIDUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6 | IFOSFAMIDUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7 | IFOSFAMIDUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8 | IFOSFAMIDUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9 | IFOSFAMIDUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10 | IFOSFAMIDUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11 | IFOSFAMIDUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12 | IFOSFAMIDUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13 | IFOSFAMIDUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14 | IFOSFAMIDUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15 | IFOSFAMIDUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16 | IFOSFAMIDUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17 | IFOSFAMIDUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18 | IFOSFAMIDUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19 | IFOSFAMIDUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20 | IFOSFAMIDUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21 | IFOSFAMIDUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22 | IFOSFAMIDUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23 | IFOSFAMIDUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|--|
| 24 | IFOSFAMIDUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25 | IFOSFAMIDUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26 | IFOSFAMIDUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27 | IFOSFAMIDUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28 | IFOSFAMIDUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29 | IFOSFAMIDUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30 | IFOSFAMIDUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31 | IFOSFAMIDUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32 | IFOSFAMIDUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33 | IFOSFAMIDUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34 | IFOSFAMIDUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35 | IFOSFAMIDUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36 | IFOSFAMIDUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37 | IFOSFAMIDUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38 | IFOSFAMIDUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39 | IFOSFAMIDUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40 | IFOSFAMIDUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41 | IFOSFAMIDUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42 | IFOSFAMIDUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43 | IFOSFAMIDUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44 | IFOSFAMIDUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45 | IFOSFAMIDUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46 | IFOSFAMIDUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47 | IFOSFAMIDUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48 | IFOSFAMIDUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49 | IFOSFAMIDUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50 | IFOSFAMIDUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|----|---|------------|---|
| 51 | IFOSFAMIDUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52 | IFOSFAMIDUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53 | IFOSFAMIDUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54 | IFOSFAMIDUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55 | IFOSFAMIDUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56 | IFOSFAMIDUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57 | IFOSFAMIDUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZEŁOWA |
| 58 | IFOSFAMIDUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59 | IFOSFAMIDUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60 | IFOSFAMIDUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61 | IFOSFAMIDUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62 | IFOSFAMIDUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63 | IFOSFAMIDUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64 | IFOSFAMIDUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65 | IFOSFAMIDUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66 | IFOSFAMIDUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67 | IFOSFAMIDUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68 | IFOSFAMIDUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69 | IFOSFAMIDUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70 | IFOSFAMIDUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71 | IFOSFAMIDUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72 | IFOSFAMIDUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73 | IFOSFAMIDUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74 | IFOSFAMIDUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75 | IFOSFAMIDUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76 | IFOSFAMIDUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77 | IFOSFAMIDUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 78 | IFOSFAMIDUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79 | IFOSFAMIDUM | C16.0 | WPUST |
| 80 | IFOSFAMIDUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81 | IFOSFAMIDUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82 | IFOSFAMIDUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83 | IFOSFAMIDUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84 | IFOSFAMIDUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85 | IFOSFAMIDUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86 | IFOSFAMIDUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87 | IFOSFAMIDUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88 | IFOSFAMIDUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89 | IFOSFAMIDUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90 | IFOSFAMIDUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91 | IFOSFAMIDUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92 | IFOSFAMIDUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93 | IFOSFAMIDUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94 | IFOSFAMIDUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95 | IFOSFAMIDUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96 | IFOSFAMIDUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97 | IFOSFAMIDUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98 | IFOSFAMIDUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99 | IFOSFAMIDUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100 | IFOSFAMIDUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101 | IFOSFAMIDUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 102 | IFOSFAMIDUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103 | IFOSFAMIDUM | C18.7 | ESICA |
| 104 | IFOSFAMIDUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105 | IFOSFAMIDUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 106 | IFOSFAMIDUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107 | IFOSFAMIDUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108 | IFOSFAMIDUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109 | IFOSFAMIDUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110 | IFOSFAMIDUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111 | IFOSFAMIDUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112 | IFOSFAMIDUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113 | IFOSFAMIDUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114 | IFOSFAMIDUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115 | IFOSFAMIDUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116 | IFOSFAMIDUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117 | IFOSFAMIDUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118 | IFOSFAMIDUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119 | IFOSFAMIDUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120 | IFOSFAMIDUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121 | IFOSFAMIDUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122 | IFOSFAMIDUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123 | IFOSFAMIDUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124 | IFOSFAMIDUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125 | IFOSFAMIDUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126 | IFOSFAMIDUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127 | IFOSFAMIDUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 128 | IFOSFAMIDUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129 | IFOSFAMIDUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130 | IFOSFAMIDUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131 | IFOSFAMIDUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132 | IFOSFAMIDUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 133 | IFOSFAMIDUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134 | IFOSFAMIDUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135 | IFOSFAMIDUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136 | IFOSFAMIDUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137 | IFOSFAMIDUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138 | IFOSFAMIDUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139 | IFOSFAMIDUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140 | IFOSFAMIDUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141 | IFOSFAMIDUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142 | IFOSFAMIDUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143 | IFOSFAMIDUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144 | IFOSFAMIDUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145 | IFOSFAMIDUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146 | IFOSFAMIDUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147 | IFOSFAMIDUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148 | IFOSFAMIDUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149 | IFOSFAMIDUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150 | IFOSFAMIDUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151 | IFOSFAMIDUM | C32 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI |
| 152 | IFOSFAMIDUM | C32.0 | GŁOŚNIA |
| 153 | IFOSFAMIDUM | C32.1 | NAGŁOŚNIA |
| 154 | IFOSFAMIDUM | C32.2 | JAMA PODGŁOŚNIOWA |
| 155 | IFOSFAMIDUM | C32.3 | CHRZĄSTKI KRTANI |
| 156 | IFOSFAMIDUM | C32.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI |
| 157 | IFOSFAMIDUM | C32.9 | KRTAŃ, NIEOKREŚLONA |
| 158 | IFOSFAMIDUM | C33 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY |
| 159 | IFOSFAMIDUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 160 | IFOSFAMIDUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 161 | IFOSFAMIDUM | C34.1 | PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 162 | IFOSFAMIDUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 163 | IFOSFAMIDUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 164 | IFOSFAMIDUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 165 | IFOSFAMIDUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 166 | IFOSFAMIDUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 167 | IFOSFAMIDUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 168 | IFOSFAMIDUM | C38.0 | SERCE |
| 169 | IFOSFAMIDUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 170 | IFOSFAMIDUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 171 | IFOSFAMIDUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 172 | IFOSFAMIDUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 173 | IFOSFAMIDUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 174 | IFOSFAMIDUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 175 | IFOSFAMIDUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 176 | IFOSFAMIDUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNĘTRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 177 | IFOSFAMIDUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 178 | IFOSFAMIDUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 179 | IFOSFAMIDUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 180 | IFOSFAMIDUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 181 | IFOSFAMIDUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 182 | IFOSFAMIDUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 183 | IFOSFAMIDUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 184 | IFOSFAMIDUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 185 | IFOSFAMIDUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 186 | IFOSFAMIDUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 187 | IFOSFAMIDUM | C41.1 | ZUCHWA |
| 188 | IFOSFAMIDUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 189 | IFOSFAMIDUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 190 | IFOSFAMIDUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 191 | IFOSFAMIDUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 192 | IFOSFAMIDUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 193 | IFOSFAMIDUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 194 | IFOSFAMIDUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 195 | IFOSFAMIDUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 196 | IFOSFAMIDUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 197 | IFOSFAMIDUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 198 | IFOSFAMIDUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 199 | IFOSFAMIDUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 200 | IFOSFAMIDUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 201 | IFOSFAMIDUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 202 | IFOSFAMIDUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 203 | IFOSFAMIDUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 204 | IFOSFAMIDUM | C46 | MIĘSAK KAPOSI' EGO |
| 205 | IFOSFAMIDUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY |
| 206 | IFOSFAMIDUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 207 | IFOSFAMIDUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA |
| 208 | IFOSFAMIDUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 209 | IFOSFAMIDUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 210 | IFOSFAMIDUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 211 | IFOSFAMIDUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 212 | IFOSFAMIDUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 213 | IFOSFAMIDUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 214 | IFOSFAMIDUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 215 | IFOSFAMIDUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 216 | IFOSFAMIDUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 217 | IFOSFAMIDUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 218 | IFOSFAMIDUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 219 | IFOSFAMIDUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 220 | IFOSFAMIDUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 221 | IFOSFAMIDUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 222 | IFOSFAMIDUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 223 | IFOSFAMIDUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 224 | IFOSFAMIDUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 225 | IFOSFAMIDUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 226 | IFOSFAMIDUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 227 | IFOSFAMIDUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 228 | IFOSFAMIDUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 229 | IFOSFAMIDUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 230 | IFOSFAMIDUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 231 | IFOSFAMIDUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 232 | IFOSFAMIDUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 233 | IFOSFAMIDUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 234 | IFOSFAMIDUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 235 | IFOSFAMIDUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 236 | IFOSFAMIDUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 237 | IFOSFAMIDUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 238 | IFOSFAMIDUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 239 | IFOSFAMIDUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 240 | IFOSFAMIDUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 241 | IFOSFAMIDUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 242 | IFOSFAMIDUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 243 | IFOSFAMIDUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 244 | IFOSFAMIDUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 245 | IFOSFAMIDUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 246 | IFOSFAMIDUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 247 | IFOSFAMIDUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 248 | IFOSFAMIDUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 249 | IFOSFAMIDUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 250 | IFOSFAMIDUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 251 | IFOSFAMIDUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 252 | IFOSFAMIDUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 253 | IFOSFAMIDUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 254 | IFOSFAMIDUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 255 | IFOSFAMIDUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 256 | IFOSFAMIDUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 257 | IFOSFAMIDUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 258 | IFOSFAMIDUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 259 | IFOSFAMIDUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 260 | IFOSFAMIDUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 261 | IFOSFAMIDUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 262 | IFOSFAMIDUM | C54.2 | MIEŚNIÓWKA MACICY |
| 263 | IFOSFAMIDUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 264 | IFOSFAMIDUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 265 | IFOSFAMIDUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 266 | IFOSFAMIDUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 267 | IFOSFAMIDUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 268 | IFOSFAMIDUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 269 | IFOSFAMIDUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 270 | IFOSFAMIDUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 271 | IFOSFAMIDUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 272 | IFOSFAMIDUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 273 | IFOSFAMIDUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 274 | IFOSFAMIDUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 275 | IFOSFAMIDUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 276 | IFOSFAMIDUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 277 | IFOSFAMIDUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 278 | IFOSFAMIDUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 279 | IFOSFAMIDUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 280 | IFOSFAMIDUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 281 | IFOSFAMIDUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 282 | IFOSFAMIDUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 283 | IFOSFAMIDUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 284 | IFOSFAMIDUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 285 | IFOSFAMIDUM | C63.2 | MOSZNA |
| 286 | IFOSFAMIDUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 287 | IFOSFAMIDUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 288 | IFOSFAMIDUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 289 | IFOSFAMIDUM | C64.9 | NEPHROBLASTOMA (GUZ WILMSA) |
| 290 | IFOSFAMIDUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 291 | IFOSFAMIDUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 292 | IFOSFAMIDUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 293 | IFOSFAMIDUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 294 | IFOSFAMIDUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 295 | IFOSFAMIDUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 296 | IFOSFAMIDUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 297 | IFOSFAMIDUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 298 | IFOSFAMIDUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 299 | IFOSFAMIDUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 300 | IFOSFAMIDUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 301 | IFOSFAMIDUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 302 | IFOSFAMIDUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 303 | IFOSFAMIDUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 304 | IFOSFAMIDUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 305 | IFOSFAMIDUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 306 | IFOSFAMIDUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 307 | IFOSFAMIDUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 308 | IFOSFAMIDUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 309 | IFOSFAMIDUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 310 | IFOSFAMIDUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 311 | IFOSFAMIDUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 312 | IFOSFAMIDUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 313 | IFOSFAMIDUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 314 | IFOSFAMIDUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 315 | IFOSFAMIDUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 316 | IFOSFAMIDUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 317 | IFOSFAMIDUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 318 | IFOSFAMIDUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 319 | IFOSFAMIDUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 320 | IFOSFAMIDUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 321 | IFOSFAMIDUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 322 | IFOSFAMIDUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 323 | IFOSFAMIDUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 324 | IFOSFAMIDUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 325 | IFOSFAMIDUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 326 | IFOSFAMIDUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 327 | IFOSFAMIDUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 328 | IFOSFAMIDUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 329 | IFOSFAMIDUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 330 | IFOSFAMIDUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 331 | IFOSFAMIDUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 332 | IFOSFAMIDUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 333 | IFOSFAMIDUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 334 | IFOSFAMIDUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 335 | IFOSFAMIDUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 336 | IFOSFAMIDUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 337 | IFOSFAMIDUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 338 | IFOSFAMIDUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 339 | IFOSFAMIDUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 340 | IFOSFAMIDUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 341 | IFOSFAMIDUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 342 | IFOSFAMIDUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 343 | IFOSFAMIDUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 344 | IFOSFAMIDUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 345 | IFOSFAMIDUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 346 | IFOSFAMIDUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 347 | IFOSFAMIDUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 348 | IFOSFAMIDUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 349 | IFOSFAMIDUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 350 | IFOSFAMIDUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 351 | IFOSFAMIDUM | C75.3 | SZYSZYNKA |
| 352 | IFOSFAMIDUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 353 | IFOSFAMIDUM | C75.5 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 354 | IFOSFAMIDUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 355 | IFOSFAMIDUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 356 | IFOSFAMIDUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 357 | IFOSFAMIDUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 358 | IFOSFAMIDUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 359 | IFOSFAMIDUM | C76.2 | BRZUCH |
| 360 | IFOSFAMIDUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 361 | IFOSFAMIDUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 362 | IFOSFAMIDUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 363 | IFOSFAMIDUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 364 | IFOSFAMIDUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 365 | IFOSFAMIDUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 366 | IFOSFAMIDUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 367 | IFOSFAMIDUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 368 | IFOSFAMIDUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 369 | IFOSFAMIDUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 370 | IFOSFAMIDUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 371 | IFOSFAMIDUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 372 | IFOSFAMIDUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 373 | IFOSFAMIDUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 374 | IFOSFAMIDUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 375 | IFOSFAMIDUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 376 | IFOSFAMIDUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 377 | IFOSFAMIDUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 378 | IFOSFAMIDUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 379 | IFOSFAMIDUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 380 | IFOSFAMIDUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 381 | IFOSFAMIDUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 382 | IFOSFAMIDUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 383 | IFOSFAMIDUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 384 | IFOSFAMIDUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 385 | IFOSFAMIDUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 386 | IFOSFAMIDUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 387 | IFOSFAMIDUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 388 | IFOSFAMIDUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 389 | IFOSFAMIDUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 390 | IFOSFAMIDUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 391 | IFOSFAMIDUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 392 | IFOSFAMIDUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 393 | IFOSFAMIDUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 394 | IFOSFAMIDUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 395 | IFOSFAMIDUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 396 | IFOSFAMIDUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 397 | IFOSFAMIDUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 398 | IFOSFAMIDUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 399 | IFOSFAMIDUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 400 | IFOSFAMIDUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 401 | IFOSFAMIDUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 402 | IFOSFAMIDUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 403 | IFOSFAMIDUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 404 | IFOSFAMIDUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 405 | IFOSFAMIDUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 406 | IFOSFAMIDUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 407 | IFOSFAMIDUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 408 | IFOSFAMIDUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 409 | IFOSFAMIDUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 410 | IFOSFAMIDUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 411 | IFOSFAMIDUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 412 | IFOSFAMIDUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 413 | IFOSFAMIDUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 414 | IFOSFAMIDUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 415 | IFOSFAMIDUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 416 | IFOSFAMIDUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 417 | IFOSFAMIDUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 418 | IFOSFAMIDUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 419 | IFOSFAMIDUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 420 | IFOSFAMIDUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 421 | IFOSFAMIDUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 422 | IFOSFAMIDUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 423 | IFOSFAMIDUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 424 | IFOSFAMIDUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 425 | IFOSFAMIDUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 426 | IFOSFAMIDUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 427 | IFOSFAMIDUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 428 | IFOSFAMIDUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 429 | IFOSFAMIDUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 430 | IFOSFAMIDUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 431 | IFOSFAMIDUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 432 | IFOSFAMIDUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 433 | IFOSFAMIDUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 434 | IFOSFAMIDUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 435 | IFOSFAMIDUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 436 | IFOSFAMIDUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 437 | IFOSFAMIDUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 438 | IFOSFAMIDUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 439 | IFOSFAMIDUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 440 | IFOSFAMIDUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 441 | IFOSFAMIDUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 442 | IFOSFAMIDUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 443 | IFOSFAMIDUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 444 | IFOSFAMIDUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 445 | IFOSFAMIDUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 446 | IFOSFAMIDUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 447 | IFOSFAMIDUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 448 | IFOSFAMIDUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 449 | IFOSFAMIDUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 450 | IFOSFAMIDUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 451 | IFOSFAMIDUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 452 | IFOSFAMIDUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 453 | IFOSFAMIDUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 454 | IFOSFAMIDUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 455 | IFOSFAMIDUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 456 | IFOSFAMIDUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 457 | IFOSFAMIDUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 458 | IFOSFAMIDUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 459 | IFOSFAMIDUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 460 | IFOSFAMIDUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 461 | IFOSFAMIDUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 462 | IFOSFAMIDUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 463 | IFOSFAMIDUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 464 | IFOSFAMIDUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 465 | IFOSFAMIDUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 466 | IFOSFAMIDUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 467 | IFOSFAMIDUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 468 | IFOSFAMIDUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 469 | IFOSFAMIDUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 470 | IFOSFAMIDUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 471 | IFOSFAMIDUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 472 | IFOSFAMIDUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 473 | IFOSFAMIDUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 474 | IFOSFAMIDUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 475 | IFOSFAMIDUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 476 | IFOSFAMIDUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 477 | IFOSFAMIDUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 478 | IFOSFAMIDUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 479 | IFOSFAMIDUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 480 | IFOSFAMIDUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 481 | IFOSFAMIDUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 482 | IFOSFAMIDUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 483 | IFOSFAMIDUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 484 | IFOSFAMIDUM | C96.3 | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 485 | IFOSFAMIDUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 486 | IFOSFAMIDUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 487 | IFOSFAMIDUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 488 | IFOSFAMIDUM | D01 | RAKI IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 489 | IFOSFAMIDUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 490 | IFOSFAMIDUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 491 | IFOSFAMIDUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 492 | IFOSFAMIDUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 493 | IFOSFAMIDUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 494 | IFOSFAMIDUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 495 | IFOSFAMIDUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 496 | IFOSFAMIDUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 497 | IFOSFAMIDUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 498 | IFOSFAMIDUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 499 | IFOSFAMIDUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 500 | IFOSFAMIDUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 501 | IFOSFAMIDUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 502 | IFOSFAMIDUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 503 | IFOSFAMIDUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 504 | IFOSFAMIDUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 505 | IFOSFAMIDUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 506 | IFOSFAMIDUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 507 | IFOSFAMIDUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 508 | IFOSFAMIDUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 509 | IFOSFAMIDUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 510 | IFOSFAMIDUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 511 | IFOSFAMIDUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 512 | IFOSFAMIDUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 513 | IFOSFAMIDUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 514 | IFOSFAMIDUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 515 | IFOSFAMIDUM | D07.1 | SROM |
| 516 | IFOSFAMIDUM | D07.2 | POCHWA |
| 517 | IFOSFAMIDUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 518 | IFOSFAMIDUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 519 | IFOSFAMIDUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 520 | IFOSFAMIDUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 521 | IFOSFAMIDUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 522 | IFOSFAMIDUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 523 | IFOSFAMIDUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 524 | IFOSFAMIDUM | D09.2 | OKO |
| 525 | IFOSFAMIDUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 526 | IFOSFAMIDUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 527 | IFOSFAMIDUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 528 | IFOSFAMIDUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 529 | IFOSFAMIDUM | D10.0 | WARGA |
| 530 | IFOSFAMIDUM | D10.1 | JĘZYK |
| 531 | IFOSFAMIDUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 532 | IFOSFAMIDUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 533 | IFOSFAMIDUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 534 | IFOSFAMIDUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 535 | IFOSFAMIDUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 536 | IFOSFAMIDUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 537 | IFOSFAMIDUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 538 | IFOSFAMIDUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 539 | IFOSFAMIDUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 540 | IFOSFAMIDUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 541 | IFOSFAMIDUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 542 | IFOSFAMIDUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 543 | IFOSFAMIDUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 544 | IFOSFAMIDUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 545 | IFOSFAMIDUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 546 | IFOSFAMIDUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 547 | IFOSFAMIDUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 548 | IFOSFAMIDUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 549 | IFOSFAMIDUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 550 | IFOSFAMIDUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 551 | IFOSFAMIDUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 552 | IFOSFAMIDUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 553 | IFOSFAMIDUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 554 | IFOSFAMIDUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 555 | IFOSFAMIDUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 556 | IFOSFAMIDUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 557 | IFOSFAMIDUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 558 | IFOSFAMIDUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 559 | IFOSFAMIDUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 560 | IFOSFAMIDUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 561 | IFOSFAMIDUM | D13.7 | WYSPIY TRZUSTKI |
| 562 | IFOSFAMIDUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 563 | IFOSFAMIDUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 564 | IFOSFAMIDUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 565 | IFOSFAMIDUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 566 | IFOSFAMIDUM | D14.2 | TCHAWICA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 567 | IFOSFAMIDUM | D14.3 | OSKRZELA I PLUCA |
| 568 | IFOSFAMIDUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 569 | IFOSFAMIDUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 570 | IFOSFAMIDUM | D15.0 | GRASICA |
| 571 | IFOSFAMIDUM | D15.1 | SERCE |
| 572 | IFOSFAMIDUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 573 | IFOSFAMIDUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 574 | IFOSFAMIDUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 575 | IFOSFAMIDUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 576 | IFOSFAMIDUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 577 | IFOSFAMIDUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 578 | IFOSFAMIDUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 579 | IFOSFAMIDUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 580 | IFOSFAMIDUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 581 | IFOSFAMIDUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 582 | IFOSFAMIDUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 583 | IFOSFAMIDUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 584 | IFOSFAMIDUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 585 | IFOSFAMIDUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 586 | IFOSFAMIDUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 587 | IFOSFAMIDUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 588 | IFOSFAMIDUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 589 | IFOSFAMIDUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 590 | IFOSFAMIDUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 591 | IFOSFAMIDUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 592 | IFOSFAMIDUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 593 | IFOSFAMIDUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 594 | IFOSFAMIDUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 595 | IFOSFAMIDUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 596 | IFOSFAMIDUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 597 | IFOSFAMIDUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 598 | IFOSFAMIDUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 599 | IFOSFAMIDUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 600 | IFOSFAMIDUM | D28.0 | SROM |
| 601 | IFOSFAMIDUM | D28.1 | POCHWA |
| 602 | IFOSFAMIDUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 603 | IFOSFAMIDUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 604 | IFOSFAMIDUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 605 | IFOSFAMIDUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 606 | IFOSFAMIDUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 607 | IFOSFAMIDUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 608 | IFOSFAMIDUM | D29.2 | JĄDRO |
| 609 | IFOSFAMIDUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 610 | IFOSFAMIDUM | D29.4 | MOSZNA |
| 611 | IFOSFAMIDUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 612 | IFOSFAMIDUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 613 | IFOSFAMIDUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 614 | IFOSFAMIDUM | D30.0 | NERKA |
| 615 | IFOSFAMIDUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 616 | IFOSFAMIDUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 617 | IFOSFAMIDUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 618 | IFOSFAMIDUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 619 | IFOSFAMIDUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 620 | IFOSFAMIDUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 621 | IFOSFAMIDUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 622 | IFOSFAMIDUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 623 | IFOSFAMIDUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 624 | IFOSFAMIDUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 625 | IFOSFAMIDUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 626 | IFOSFAMIDUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 627 | IFOSFAMIDUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 628 | IFOSFAMIDUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 629 | IFOSFAMIDUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 630 | IFOSFAMIDUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 631 | IFOSFAMIDUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 632 | IFOSFAMIDUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 633 | IFOSFAMIDUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 634 | IFOSFAMIDUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 635 | IFOSFAMIDUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMOTOWE |
| 636 | IFOSFAMIDUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMOTOWE |
| 637 | IFOSFAMIDUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 638 | IFOSFAMIDUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 639 | IFOSFAMIDUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 640 | IFOSFAMIDUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 641 | IFOSFAMIDUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 642 | IFOSFAMIDUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 643 | IFOSFAMIDUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 644 | IFOSFAMIDUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 645 | IFOSFAMIDUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 646 | IFOSFAMIDUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 647 | IFOSFAMIDUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 648 | IFOSFAMIDUM | D35.4 | SZYSZYNKA |
| 649 | IFOSFAMIDUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 650 | IFOSFAMIDUM | D35.6 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 651 | IFOSFAMIDUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 652 | IFOSFAMIDUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 653 | IFOSFAMIDUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 654 | IFOSFAMIDUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 655 | IFOSFAMIDUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 656 | IFOSFAMIDUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 657 | IFOSFAMIDUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 658 | IFOSFAMIDUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 659 | IFOSFAMIDUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 660 | IFOSFAMIDUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 661 | IFOSFAMIDUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 662 | IFOSFAMIDUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 663 | IFOSFAMIDUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 664 | IFOSFAMIDUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 665 | IFOSFAMIDUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 666 | IFOSFAMIDUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 667 | IFOSFAMIDUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 668 | IFOSFAMIDUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 669 | IFOSFAMIDUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 670 | IFOSFAMIDUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 671 | IFOSFAMIDUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 672 | IFOSFAMIDUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 673 | IFOSFAMIDUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 674 | IFOSFAMIDUM | D38.4 | GRASICA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 675 | IFOSFAMIDUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 676 | IFOSFAMIDUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 677 | IFOSFAMIDUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 678 | IFOSFAMIDUM | D39.0 | MACICA |
| 679 | IFOSFAMIDUM | D39.1 | JAJNIK |
| 680 | IFOSFAMIDUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 681 | IFOSFAMIDUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 682 | IFOSFAMIDUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 683 | IFOSFAMIDUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 684 | IFOSFAMIDUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 685 | IFOSFAMIDUM | D40.1 | JĄDRO |
| 686 | IFOSFAMIDUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 687 | IFOSFAMIDUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 688 | IFOSFAMIDUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 689 | IFOSFAMIDUM | D41.0 | NERKA |
| 690 | IFOSFAMIDUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 691 | IFOSFAMIDUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 692 | IFOSFAMIDUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 693 | IFOSFAMIDUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 694 | IFOSFAMIDUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 695 | IFOSFAMIDUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 696 | IFOSFAMIDUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 697 | IFOSFAMIDUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 698 | IFOSFAMIDUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 699 | IFOSFAMIDUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 700 | IFOSFAMIDUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 701 | IFOSFAMIDUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 702 | IFOSFAMIDUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 703 | IFOSFAMIDUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 704 | IFOSFAMIDUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 705 | IFOSFAMIDUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 706 | IFOSFAMIDUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 707 | IFOSFAMIDUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 708 | IFOSFAMIDUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 709 | IFOSFAMIDUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 710 | IFOSFAMIDUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 711 | IFOSFAMIDUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 712 | IFOSFAMIDUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 713 | IFOSFAMIDUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 714 | IFOSFAMIDUM | D44.5 | SZYSZYNKA |
| 715 | IFOSFAMIDUM | D44.6 | KLĘBEK SZYJNY |
| 716 | IFOSFAMIDUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 717 | IFOSFAMIDUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 718 | IFOSFAMIDUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 719 | IFOSFAMIDUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 720 | IFOSFAMIDUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 721 | IFOSFAMIDUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 722 | IFOSFAMIDUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 723 | IFOSFAMIDUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 724 | IFOSFAMIDUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 725 | IFOSFAMIDUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 726 | IFOSFAMIDUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 727 | IFOSFAMIDUM | D48.4 | OTRZEWNIA |
| 728 | IFOSFAMIDUM | D48.5 | SKÓRA |
| 729 | IFOSFAMIDUM | D48.6 | SUTEK |
| 730 | IFOSFAMIDUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 731 | IFOSFAMIDUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 732 | IFOSFAMIDUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDEJ |
| 733 | IFOSFAMIDUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 734 | IFOSFAMIDUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 735 | IFOSFAMIDUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 736 | IFOSFAMIDUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 737 | IFOSFAMIDUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 738 | IFOSFAMIDUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 739 | IFOSFAMIDUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 740 | IFOSFAMIDUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 741 | IFOSFAMIDUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.32.

INTERFERON ALFA

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. | INTERFERON ALFA | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 2. | INTERFERON ALFA | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 3. | INTERFERON ALFA | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 4. | INTERFERON ALFA | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 5. | INTERFERON ALFA | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 6. | INTERFERON ALFA | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 7. | INTERFERON ALFA | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 8. | INTERFERON ALFA | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 9. | INTERFERON ALFA | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 10. | INTERFERON ALFA | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 11. | INTERFERON ALFA | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 12. | INTERFERON ALFA | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 13. | INTERFERON ALFA | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 14. | INTERFERON ALFA | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 15. | INTERFERON ALFA | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 16. | INTERFERON ALFA | C69.1 | ROGÓWKA |
| 17. | INTERFERON ALFA | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 18. | INTERFERON ALFA | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 19. | INTERFERON ALFA | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 20. | INTERFERON ALFA | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 21. | INTERFERON ALFA | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 22. | INTERFERON ALFA | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 23. | INTERFERON ALFA | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | INTERFERON ALFA | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 25. | INTERFERON ALFA | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 26. | INTERFERON ALFA | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 27. | INTERFERON ALFA | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNIKOMÓRKOWA |
| 28. | INTERFERON ALFA | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 29. | INTERFERON ALFA | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 30. | INTERFERON ALFA | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 31. | INTERFERON ALFA | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 32. | INTERFERON ALFA | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 33. | INTERFERON ALFA | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 34. | INTERFERON ALFA | C92.3 | MIEŚSAK SZPIKOWY |
| 35. | INTERFERON ALFA | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 36. | INTERFERON ALFA | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 37. | INTERFERON ALFA | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 38. | INTERFERON ALFA | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 39. | INTERFERON ALFA | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 40. | INTERFERON ALFA | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 41. | INTERFERON ALFA | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 42. | INTERFERON ALFA | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 43. | INTERFERON ALFA | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 44. | INTERFERON ALFA | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 45. | INTERFERON ALFA | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 46. | INTERFERON ALFA | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 47. | INTERFERON ALFA | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 48. | INTERFERON ALFA | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 49. | INTERFERON ALFA | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 50. | INTERFERON ALFA | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 51. | INTERFERON ALFA | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 52. | INTERFERON ALFA | D18.0 | NACZYNIANKA KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 53. | INTERFERON ALFA | D18.1 | NACZYNIANKA CHŁONNA JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 54. | INTERFERON ALFA | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 55. | INTERFERON ALFA | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 56. | INTERFERON ALFA | D75.2 | NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA |
| 57. | INTERFERON ALFA | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 58. | INTERFERON ALFA | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 59. | INTERFERON ALFA | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 60. | INTERFERON ALFA | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE, POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 61. | INTERFERON ALFA | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 62. | INTERFERON ALFA | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 63. | INTERFERON ALFA | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 64. | INTERFERON ALFA | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIAWATYCH |
| 65. | INTERFERON ALFA | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 66. | INTERFERON ALFA | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.33.

INTERFERONUM ALFA-2A

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. | INTERFERONUM ALFA-2A | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 2. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 3. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 4. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 5. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 6. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 7. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 8. | INTERFERONUM ALFA-2A | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 9. | INTERFERONUM ALFA-2A | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 10. | INTERFERONUM ALFA-2A | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 11. | INTERFERONUM ALFA-2A | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 12. | INTERFERONUM ALFA-2A | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 13. | INTERFERONUM ALFA-2A | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 14. | INTERFERONUM ALFA-2A | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 15. | INTERFERONUM ALFA-2A | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 16. | INTERFERONUM ALFA-2A | D18.0 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 17. | INTERFERONUM ALFA-2A | D18.1 | NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 18. | INTERFERONUM ALFA-2A | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 19. | INTERFERONUM ALFA-2A | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 20. | INTERFERONUM ALFA-2A | D75.2 | NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA |

Załącznik C.34.

INTERFERONUM ALFA-2B

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 2. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 3. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 4. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 5. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 6. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 7. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 8. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 9. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 10. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 11. | INTERFERONUM ALFA-2B | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 12. | INTERFERONUM ALFA-2B | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 13. | INTERFERONUM ALFA-2B | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 14. | INTERFERONUM ALFA-2B | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 15. | INTERFERONUM ALFA-2B | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 16. | INTERFERONUM ALFA-2B | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 17. | INTERFERONUM ALFA-2B | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 18. | INTERFERONUM ALFA-2B | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 19. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 20. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 21. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 22. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 23. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 24. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 25. | INTERFERONUM ALFA-2B | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 26. | INTERFERONUM ALFA-2B | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 27. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 28. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 29. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 30. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 31. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 32. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 33. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 34. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 35. | INTERFERONUM ALFA-2B | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 36. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 37. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 38. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 39. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 40. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 41. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 42. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 43. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 44. | INTERFERONUM ALFA-2B | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 45. | INTERFERONUM ALFA-2B | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 46. | INTERFERONUM ALFA-2B | D47.1 | PRZEWLEKŁA CHOROBA UKŁADU WYTWÓRCZEGO SZPIKU |
| 47. | INTERFERONUM ALFA-2B | D75.2 | NADPLYTKOWOŚĆ SAMOISTNA |
| 48. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 49. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE, POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 50. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 51. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 52. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 53. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 54. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 55. | INTERFERONUM ALFA-2B | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.35.

IRINOTECANUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | IRINOTECANUM | C15 | RAK PRZELYKU |
| 2. | IRINOTECANUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 3. | IRINOTECANUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 4. | IRINOTECANUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 5. | IRINOTECANUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 6. | IRINOTECANUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 7. | IRINOTECANUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 8. | IRINOTECANUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 9. | IRINOTECANUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 10. | IRINOTECANUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 11. | IRINOTECANUM | C16.0 | WPUST |
| 12. | IRINOTECANUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 13. | IRINOTECANUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 14. | IRINOTECANUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 15. | IRINOTECANUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 16. | IRINOTECANUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 17. | IRINOTECANUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 18. | IRINOTECANUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 19. | IRINOTECANUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | IRINOTECANUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 21. | IRINOTECANUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 22. | IRINOTECANUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 23. | IRINOTECANUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 24. | IRINOTECANUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 25. | IRINOTECANUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 26. | IRINOTECANUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 27. | IRINOTECANUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 28. | IRINOTECANUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 29. | IRINOTECANUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 30. | IRINOTECANUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 31. | IRINOTECANUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 32. | IRINOTECANUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 33. | IRINOTECANUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 34. | IRINOTECANUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 35. | IRINOTECANUM | C18.7 | ESICA |
| 36. | IRINOTECANUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 37. | IRINOTECANUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 38. | IRINOTECANUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 39. | IRINOTECANUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 40. | IRINOTECANUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 41. | IRINOTECANUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 42. | IRINOTECANUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 43. | IRINOTECANUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 44. | IRINOTECANUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 45. | IRINOTECANUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 46. | IRINOTECANUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 47. | IRINOTECANUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 48. | IRINOTECANUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 49. | IRINOTECANUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 50. | IRINOTECANUM | C34.1 | PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 51. | IRINOTECANUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 52. | IRINOTECANUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 53. | IRINOTECANUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 54. | IRINOTECANUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 55. | IRINOTECANUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 56. | IRINOTECANUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|---|
| 57. | IRINOTECANUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 58. | IRINOTECANUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 59. | IRINOTECANUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 60. | IRINOTECANUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 61. | IRINOTECANUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 62. | IRINOTECANUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 63. | IRINOTECANUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 64. | IRINOTECANUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 65. | IRINOTECANUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 66. | IRINOTECANUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 67. | IRINOTECANUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 68. | IRINOTECANUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 69. | IRINOTECANUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 70. | IRINOTECANUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 71. | IRINOTECANUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 72. | IRINOTECANUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 73. | IRINOTECANUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 74. | IRINOTECANUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 75. | IRINOTECANUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 76. | IRINOTECANUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 77. | IRINOTECANUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 78. | IRINOTECANUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 79. | IRINOTECANUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 80. | IRINOTECANUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 81. | IRINOTECANUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 82. | IRINOTECANUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 83. | IRINOTECANUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 84. | IRINOTECANUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 85. | IRINOTECANUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 86. | IRINOTECANUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 87. | IRINOTECANUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 88. | IRINOTECANUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 89. | IRINOTECANUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 90. | IRINOTECANUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 91. | IRINOTECANUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 92. | IRINOTECANUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 93. | IRINOTECANUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 94. | IRINOTECANUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 95. | IRINOTECANUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 96. | IRINOTECANUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 97. | IRINOTECANUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 98. | IRINOTECANUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 99. | IRINOTECANUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY |
| 100. | IRINOTECANUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 101. | IRINOTECANUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 102. | IRINOTECANUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 103. | IRINOTECANUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 104. | IRINOTECANUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 105. | IRINOTECANUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 106. | IRINOTECANUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 107. | IRINOTECANUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 108. | IRINOTECANUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 109. | IRINOTECANUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 110. | IRINOTECANUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 111. | IRINOTECANUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 112. | IRINOTECANUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 113. | IRINOTECANUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 114. | IRINOTECANUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 115. | IRINOTECANUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 116. | IRINOTECANUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 117. | IRINOTECANUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 118. | IRINOTECANUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 119. | IRINOTECANUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 120. | IRINOTECANUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 121. | IRINOTECANUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 122. | IRINOTECANUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 123. | IRINOTECANUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 124. | IRINOTECANUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 125. | IRINOTECANUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 126. | IRINOTECANUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 127. | IRINOTECANUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 128. | IRINOTECANUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 129. | IRINOTECANUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 130. | IRINOTECANUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 131. | IRINOTECANUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 132. | IRINOTECANUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |

Załącznik C.36.

ISOTRETINOINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 1. | ISOTRETINOINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 2. | ISOTRETINOINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 3. | ISOTRETINOINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 4. | ISOTRETINOINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 5. | ISOTRETINOINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 6. | ISOTRETINOINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 7. | ISOTRETINOINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 8. | ISOTRETINOINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 9. | ISOTRETINOINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 10. | ISOTRETINOINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 11. | ISOTRETINOINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 12. | ISOTRETINOINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 13. | ISOTRETINOINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 14. | ISOTRETINOINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 15. | ISOTRETINOINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 16. | ISOTRETINOINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 17. | ISOTRETINOINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 18. | ISOTRETINOINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 19. | ISOTRETINOINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 20. | ISOTRETINOINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |

| | | | |
|-----|-----------------------|-------|--------------------------------|
| 21. | ISOTRETINOINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
|-----|-----------------------|-------|--------------------------------|

Załącznik C.37.

LANREOTIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | LANREOTIDUM | C15 | RAK PRZELYKU |
| 2. | LANREOTIDUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 3. | LANREOTIDUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 4. | LANREOTIDUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 5. | LANREOTIDUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 6. | LANREOTIDUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 7. | LANREOTIDUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 8. | LANREOTIDUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 9. | LANREOTIDUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 10. | LANREOTIDUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 11. | LANREOTIDUM | C16.0 | WPUST |
| 12. | LANREOTIDUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 13. | LANREOTIDUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 14. | LANREOTIDUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 15. | LANREOTIDUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 16. | LANREOTIDUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 17. | LANREOTIDUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 18. | LANREOTIDUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 19. | LANREOTIDUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | LANREOTIDUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 21. | LANREOTIDUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 22. | LANREOTIDUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 23. | LANREOTIDUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 24. | LANREOTIDUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 25. | LANREOTIDUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 26. | LANREOTIDUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 27. | LANREOTIDUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 28. | LANREOTIDUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 29. | LANREOTIDUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 30. | LANREOTIDUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 31. | LANREOTIDUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 32. | LANREOTIDUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 33. | LANREOTIDUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 34. | LANREOTIDUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 35. | LANREOTIDUM | C18.7 | ESICA |
| 36. | LANREOTIDUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 37. | LANREOTIDUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 38. | LANREOTIDUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 39. | LANREOTIDUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 40. | LANREOTIDUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 41. | LANREOTIDUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 42. | LANREOTIDUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 43. | LANREOTIDUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 44. | LANREOTIDUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 45. | LANREOTIDUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWIYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 46. | LANREOTIDUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 47. | LANREOTIDUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 48. | LANREOTIDUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 49. | LANREOTIDUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 50. | LANREOTIDUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 51. | LANREOTIDUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 52. | LANREOTIDUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 53. | LANREOTIDUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 54. | LANREOTIDUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 55. | LANREOTIDUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 56. | LANREOTIDUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 57. | LANREOTIDUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 58. | LANREOTIDUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 59. | LANREOTIDUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 60. | LANREOTIDUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 61. | LANREOTIDUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 62. | LANREOTIDUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 63. | LANREOTIDUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 64. | LANREOTIDUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 65. | LANREOTIDUM | C75.3 | SZYSZYNKA |
| 66. | LANREOTIDUM | C75.4 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 67. | LANREOTIDUM | C75.5 | CIAŁA PRZY AORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 68. | LANREOTIDUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 69. | LANREOTIDUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 70. | LANREOTIDUM | E34 | INNE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE |
| 71. | LANREOTIDUM | E34.0 | ZESPÓŁ RAKOWIĄKA |
| 72. | LANREOTIDUM | E34.1 | INNE NADMIERNE WYDZIELANIE HORMONÓW POCHODZENIA JELITOWEGO |
| 73. | LANREOTIDUM | E34.2 | EKTÓPOWE WYDZIELANIE HORMONÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| 74. | LANREOTIDUM | E34.3 | KARŁOWATOŚĆ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 75. | LANREOTIDUM | E34.4 | KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST |
| 76. | LANREOTIDUM | E34.5 | ZESPÓŁ OPORNOŚCI ANDROGENNEJ |
| 77. | LANREOTIDUM | E34.8 | INNE OKREŚLONE ZABURZENIA WEWNĄTRZWDZIELNICZE |
| 78. | LANREOTIDUM | E34.9 | ZABURZENIA WEWNĄTRZWDZIELNICZE, NIEOKREŚLONE |

Załącznik C.39.

MELPHALANUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|--|
| 1. | MELPHALANUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 2. | MELPHALANUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 3. | MELPHALANUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 4. | MELPHALANUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 5. | MELPHALANUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 6. | MELPHALANUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 7. | MELPHALANUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 8. | MELPHALANUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 9. | MELPHALANUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 10. | MELPHALANUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 11. | MELPHALANUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 12. | MELPHALANUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 13. | MELPHALANUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 14. | MELPHALANUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 15. | MELPHALANUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 16. | MELPHALANUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 17. | MELPHALANUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 18. | MELPHALANUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 19. | MELPHALANUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 20. | MELPHALANUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 21. | MELPHALANUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 22. | MELPHALANUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 23. | MELPHALANUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 24. | MELPHALANUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 25. | MELPHALANUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 26. | MELPHALANUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 27. | MELPHALANUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 28. | MELPHALANUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 29. | MELPHALANUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 30. | MELPHALANUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 31. | MELPHALANUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 32. | MELPHALANUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 33. | MELPHALANUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 34. | MELPHALANUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 35. | MELPHALANUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 36. | MELPHALANUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 37. | MELPHALANUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 38. | MELPHALANUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 39. | MELPHALANUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 40. | MELPHALANUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 41. | MELPHALANUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 42. | MELPHALANUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 43. | MELPHALANUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 44. | MELPHALANUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 45. | MELPHALANUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 46. | MELPHALANUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 47. | MELPHALANUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 48. | MELPHALANUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 49. | MELPHALANUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 50. | MELPHALANUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 51. | MELPHALANUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 52. | MELPHALANUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 53. | MELPHALANUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 54. | MELPHALANUM | D45 | CZERWIENICA PRAWDZIWA |
| 55. | MELPHALANUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 56. | MELPHALANUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 57. | MELPHALANUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 58. | MELPHALANUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 59. | MELPHALANUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 60. | MELPHALANUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 61. | MELPHALANUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 62. | MELPHALANUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.40.

MERCAPTOPURINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | MERCAPTOPURINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 2. | MERCAPTOPURINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 3. | MERCAPTOPURINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 4. | MERCAPTOPURINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 5. | MERCAPTOPURINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 6. | MERCAPTOPURINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 7. | MERCAPTOPURINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 8. | MERCAPTOPURINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 9. | MERCAPTOPURINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 10. | MERCAPTOPURINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 11. | MERCAPTOPURINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 12. | MERCAPTOPURINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 13. | MERCAPTOPURINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 14. | MERCAPTOPURINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 15. | MERCAPTOPURINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 16. | MERCAPTOPURINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 17. | MERCAPTOPURINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 18. | MERCAPTOPURINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 19. | MERCAPTOPURINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 20. | MERCAPTOPURINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 21. | MERCAPTOPURINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 22. | MERCAPTOPURINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 23. | MERCAPTOPURINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 24. | MERCAPTOPURINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 25. | MERCAPTOPURINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 26. | MERCAPTOPURINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 27. | MERCAPTOPURINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 28. | MERCAPTOPURINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 29. | MERCAPTOPURINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 30. | MERCAPTOPURINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 31. | MERCAPTOPURINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 32. | MERCAPTOPURINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 33. | MERCAPTOPURINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 34. | MERCAPTOPURINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 35. | MERCAPTOPURINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 36. | MERCAPTOPURINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 37. | MERCAPTOPURINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 38. | MERCAPTOPURINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 39. | MERCAPTOPURINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 40. | MERCAPTOPURINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 41. | MERCAPTOPURINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 42. | MERCAPTOPURINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 43. | MERCAPTOPURINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 44. | MERCAPTOPURINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 45. | MERCAPTOPURINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 46. | MERCAPTOPURINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 47. | MERCAPTOPURINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 48. | MERCAPTOPURINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 49. | MERCAPTOPURINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 50. | MERCAPTOPURINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 51. | MERCAPTOPURINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 52. | MERCAPTOPURINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 53. | MERCAPTOPURINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 54. | MERCAPTOPURINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 55. | MERCAPTOPURINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 56. | MERCAPTOPURINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 57. | MERCAPTOPURINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 58. | MERCAPTOPURINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 59. | MERCAPTOPURINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 60. | MERCAPTOPURINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 61. | MERCAPTOPURINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 62. | MERCAPTOPURINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 63. | MERCAPTOPURINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 64. | MERCAPTOPURINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 65. | MERCAPTOPURINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 66. | MERCAPTOPURINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 67. | MERCAPTOPURINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 68. | MERCAPTOPURINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 69. | MERCAPTOPURINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 70. | MERCAPTOPURINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 71. | MERCAPTOPURINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 72. | MERCAPTOPURINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 73. | MERCAPTOPURINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 74. | MERCAPTOPURINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 75. | MERCAPTOPURINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 76. | MERCAPTOPURINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 77. | MERCAPTOPURINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 78. | MERCAPTOPURINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 79. | MERCAPTOPURINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 80. | MERCAPTOPURINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 81. | MERCAPTOPURINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 82. | MERCAPTOPURINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 83. | MERCAPTOPURINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 84. | MERCAPTOPURINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 85. | MERCAPTOPURINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 86. | MERCAPTOPURINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 87. | MERCAPTOPURINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 88. | MERCAPTOPURINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 89. | MERCAPTOPURINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 90. | MERCAPTOPURINUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 91. | MERCAPTOPURINUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 92. | MERCAPTOPURINUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 93. | MERCAPTOPURINUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 94. | MERCAPTOPURINUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 95. | MERCAPTOPURINUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 96. | MERCAPTOPURINUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 97. | MERCAPTOPURINUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 98. | MERCAPTOPURINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 99. | MERCAPTOPURINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 100. | MERCAPTOPURINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 101. | MERCAPTOPURINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 102. | MERCAPTOPURINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 103. | MERCAPTOPURINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 104. | MERCAPTOPURINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 105. | MERCAPTOPURINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 106. | MERCAPTOPURINUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIEWATYCH |
| 107. | MERCAPTOPURINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 108. | MERCAPTOPURINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.41.

METHOTREXATUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|---|
| 1. | METHOTREXATUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | METHOTREXATUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | METHOTREXATUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | METHOTREXATUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | METHOTREXATUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | METHOTREXATUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | METHOTREXATUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | METHOTREXATUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | METHOTREXATUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | METHOTREXATUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | METHOTREXATUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | METHOTREXATUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | METHOTREXATUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | METHOTREXATUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | METHOTREXATUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | METHOTREXATUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | METHOTREXATUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18. | METHOTREXATUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | METHOTREXATUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | METHOTREXATUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | METHOTREXATUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | METHOTREXATUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |
| 23. | METHOTREXATUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | METHOTREXATUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 25. | METHOTREXATUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | METHOTREXATUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | METHOTREXATUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | METHOTREXATUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | METHOTREXATUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | METHOTREXATUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | METHOTREXATUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | METHOTREXATUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | METHOTREXATUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | METHOTREXATUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | METHOTREXATUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | METHOTREXATUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | METHOTREXATUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | METHOTREXATUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | METHOTREXATUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | METHOTREXATUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | METHOTREXATUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | METHOTREXATUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | METHOTREXATUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44. | METHOTREXATUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | METHOTREXATUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | METHOTREXATUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | METHOTREXATUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | METHOTREXATUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49. | METHOTREXATUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50. | METHOTREXATUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | METHOTREXATUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | METHOTREXATUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|---|
| 53. | METHOTREXATUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | METHOTREXATUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | METHOTREXATUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | METHOTREXATUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | METHOTREXATUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZELOWA |
| 58. | METHOTREXATUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | METHOTREXATUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | METHOTREXATUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | METHOTREXATUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | METHOTREXATUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | METHOTREXATUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | METHOTREXATUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | METHOTREXATUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (PATRZ) |
| 66. | METHOTREXATUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | METHOTREXATUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZACHYLKA GRUSZKOWATEGO |
| 68. | METHOTREXATUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69. | METHOTREXATUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | METHOTREXATUM | C13.1 | FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | METHOTREXATUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | METHOTREXATUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | METHOTREXATUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | METHOTREXATUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75. | METHOTREXATUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 76. | METHOTREXATUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 77. | METHOTREXATUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 78. | METHOTREXATUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 79. | METHOTREXATUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 80. | METHOTREXATUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 81. | METHOTREXATUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 82. | METHOTREXATUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 83. | METHOTREXATUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 84. | METHOTREXATUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 85. | METHOTREXATUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 86. | METHOTREXATUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 87. | METHOTREXATUM | C32 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI |
| 88. | METHOTREXATUM | C32.0 | GŁOŚNIA |
| 89. | METHOTREXATUM | C32.1 | NAGŁOŚNIA |
| 90. | METHOTREXATUM | C32.2 | JAMA PODGŁOŚNIOWA |
| 91. | METHOTREXATUM | C32.3 | CHRZĄSTKI KRTANI |
| 92. | METHOTREXATUM | C32.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI |
| 93. | METHOTREXATUM | C32.9 | KRTAŃ, NIEOKREŚLONA |
| 94. | METHOTREXATUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 95. | METHOTREXATUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 96. | METHOTREXATUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 97. | METHOTREXATUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 98. | METHOTREXATUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 99. | METHOTREXATUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 100. | METHOTREXATUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 101. | METHOTREXATUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 102. | METHOTREXATUM | C38.0 | SERCE |
| 103. | METHOTREXATUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 104. | METHOTREXATUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 105. | METHOTREXATUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 106. | METHOTREXATUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 107. | METHOTREXATUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 108. | METHOTREXATUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 109. | METHOTREXATUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 110. | METHOTREXATUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 111. | METHOTREXATUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 112. | METHOTREXATUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 113. | METHOTREXATUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 114. | METHOTREXATUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 115. | METHOTREXATUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 116. | METHOTREXATUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 117. | METHOTREXATUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 118. | METHOTREXATUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 119. | METHOTREXATUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 120. | METHOTREXATUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 121. | METHOTREXATUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 122. | METHOTREXATUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 123. | METHOTREXATUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 124. | METHOTREXATUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 125. | METHOTREXATUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 126. | METHOTREXATUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127. | METHOTREXATUM | C44 | INNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE SKÓRY |
| 128. | METHOTREXATUM | C44.0 | SKÓRA WARGI |
| 129. | METHOTREXATUM | C44.1 | SKÓRA POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 130. | METHOTREXATUM | C44.2 | SKÓRA UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 131. | METHOTREXATUM | C44.3 | SKÓRA INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 132. | METHOTREXATUM | C44.4 | SKÓRA OWŁOSIONA GŁOWY I SZYI |
| 133. | METHOTREXATUM | C44.5 | SKÓRA TUŁOWIA |
| 134. | METHOTREXATUM | C44.6 | SKÓRA KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 135. | METHOTREXATUM | C44.7 | SKÓRA KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 136. | METHOTREXATUM | C44.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE OKREŚLONE KODAMI |
| 137. | METHOTREXATUM | C44.9 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 138. | METHOTREXATUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 139. | METHOTREXATUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 140. | METHOTREXATUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 141. | METHOTREXATUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 142. | METHOTREXATUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 143. | METHOTREXATUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 144. | METHOTREXATUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 145. | METHOTREXATUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 146. | METHOTREXATUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 147. | METHOTREXATUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 148. | METHOTREXATUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 149. | METHOTREXATUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 150. | METHOTREXATUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 151. | METHOTREXATUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 152. | METHOTREXATUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 153. | METHOTREXATUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 154. | METHOTREXATUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 155. | METHOTREXATUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 156. | METHOTREXATUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 157. | METHOTREXATUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 158. | METHOTREXATUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 159. | METHOTREXATUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 160. | METHOTREXATUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 161. | METHOTREXATUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 162. | METHOTREXATUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 163. | METHOTREXATUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 164. | METHOTREXATUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 165. | METHOTREXATUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 166. | METHOTREXATUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 167. | METHOTREXATUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 168. | METHOTREXATUM | C57.3 | PRZYMACICZA |
| 169. | METHOTREXATUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 170. | METHOTREXATUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 171. | METHOTREXATUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 172. | METHOTREXATUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 173. | METHOTREXATUM | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |
| 174. | METHOTREXATUM | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 175. | METHOTREXATUM | C60.0 | NAPLETEK |
| 176. | METHOTREXATUM | C60.1 | ŻOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 177. | METHOTREXATUM | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 178. | METHOTREXATUM | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |
| 179. | METHOTREXATUM | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 180. | METHOTREXATUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 181. | METHOTREXATUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 182. | METHOTREXATUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 183. | METHOTREXATUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 184. | METHOTREXATUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 185. | METHOTREXATUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 186. | METHOTREXATUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 187. | METHOTREXATUM | C63.2 | MOSZNA |
| 188. | METHOTREXATUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 189. | METHOTREXATUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 190. | METHOTREXATUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 191. | METHOTREXATUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 192. | METHOTREXATUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 193. | METHOTREXATUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 194. | METHOTREXATUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 195. | METHOTREXATUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 196. | METHOTREXATUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 197. | METHOTREXATUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 198. | METHOTREXATUM | C67.5 | SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 199. | METHOTREXATUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 200. | METHOTREXATUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 201. | METHOTREXATUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 202. | METHOTREXATUM | C67.9 | PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 203. | METHOTREXATUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 204. | METHOTREXATUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 205. | METHOTREXATUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 206. | METHOTREXATUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 207. | METHOTREXATUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 208. | METHOTREXATUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 209. | METHOTREXATUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 210. | METHOTREXATUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 211. | METHOTREXATUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 212. | METHOTREXATUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 213. | METHOTREXATUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 214. | METHOTREXATUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 215. | METHOTREXATUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 216. | METHOTREXATUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 217. | METHOTREXATUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 218. | METHOTREXATUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 219. | METHOTREXATUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 220. | METHOTREXATUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 221. | METHOTREXATUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 222. | METHOTREXATUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 223. | METHOTREXATUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 224. | METHOTREXATUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 225. | METHOTREXATUM | C76.2 | BRZUCH |
| 226. | METHOTREXATUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 227. | METHOTREXATUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 228. | METHOTREXATUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 229. | METHOTREXATUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 230. | METHOTREXATUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 231. | METHOTREXATUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 232. | METHOTREXATUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 233. | METHOTREXATUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 234. | METHOTREXATUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 235. | METHOTREXATUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 236. | METHOTREXATUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 237. | METHOTREXATUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 238. | METHOTREXATUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 239. | METHOTREXATUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 240. | METHOTREXATUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 241. | METHOTREXATUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 242. | METHOTREXATUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 243. | METHOTREXATUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 244. | METHOTREXATUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 245. | METHOTREXATUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 246. | METHOTREXATUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 247. | METHOTREXATUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 248. | METHOTREXATUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 249. | METHOTREXATUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 250. | METHOTREXATUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 251. | METHOTREXATUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 252. | METHOTREXATUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 253. | METHOTREXATUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 254. | METHOTREXATUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 255. | METHOTREXATUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 256. | METHOTREXATUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 257. | METHOTREXATUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 258. | METHOTREXATUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 259. | METHOTREXATUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 260. | METHOTREXATUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 261. | METHOTREXATUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 262. | METHOTREXATUM | C83.6 | NIEZRÓZNICOWANY (ROZLANY) |
| 263. | METHOTREXATUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 264. | METHOTREXATUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 265. | METHOTREXATUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 266. | METHOTREXATUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 267. | METHOTREXATUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 268. | METHOTREXATUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 269. | METHOTREXATUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 270. | METHOTREXATUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 271. | METHOTREXATUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 272. | METHOTREXATUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 273. | METHOTREXATUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 274. | METHOTREXATUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 275. | METHOTREXATUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 276. | METHOTREXATUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 277. | METHOTREXATUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 278. | METHOTREXATUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 279. | METHOTREXATUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 280. | METHOTREXATUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 281. | METHOTREXATUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 282. | METHOTREXATUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 283. | METHOTREXATUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 284. | METHOTREXATUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 285. | METHOTREXATUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNOKOMÓRKOWA |
| 286. | METHOTREXATUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 287. | METHOTREXATUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 288. | METHOTREXATUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 289. | METHOTREXATUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 290. | METHOTREXATUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 291. | METHOTREXATUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 292. | METHOTREXATUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 293. | METHOTREXATUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 294. | METHOTREXATUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 295. | METHOTREXATUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 296. | METHOTREXATUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 297. | METHOTREXATUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 298. | METHOTREXATUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 299. | METHOTREXATUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 300. | METHOTREXATUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 301. | METHOTREXATUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 302. | METHOTREXATUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 303. | METHOTREXATUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 304. | METHOTREXATUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 305. | METHOTREXATUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 306. | METHOTREXATUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 307. | METHOTREXATUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 308. | METHOTREXATUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 309. | METHOTREXATUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 310. | METHOTREXATUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 311. | METHOTREXATUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 312. | METHOTREXATUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 313. | METHOTREXATUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 314. | METHOTREXATUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 315. | METHOTREXATUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 316. | METHOTREXATUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 317. | METHOTREXATUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 318. | METHOTREXATUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 319. | METHOTREXATUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 320. | METHOTREXATUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 321. | METHOTREXATUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 322. | METHOTREXATUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 323. | METHOTREXATUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 324. | METHOTREXATUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 325. | METHOTREXATUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 326. | METHOTREXATUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 327. | METHOTREXATUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 328. | METHOTREXATUM | C96.3 | PRAWDZIWIY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 329. | METHOTREXATUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 330. | METHOTREXATUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 331. | METHOTREXATUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 332. | METHOTREXATUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 333. | METHOTREXATUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 334. | METHOTREXATUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 335. | METHOTREXATUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 336. | METHOTREXATUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 337. | METHOTREXATUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 338. | METHOTREXATUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 339. | METHOTREXATUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 340. | METHOTREXATUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 341. | METHOTREXATUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 342. | METHOTREXATUM | D38.4 | GRASICA |
| 343. | METHOTREXATUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 344. | METHOTREXATUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 345. | METHOTREXATUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 346. | METHOTREXATUM | D39.0 | MACICA |
| 347. | METHOTREXATUM | D39.1 | JAJNIK |
| 348. | METHOTREXATUM | D39.2 | CIAŻOWA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA |
| 349. | METHOTREXATUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 350. | METHOTREXATUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 351. | METHOTREXATUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 352. | METHOTREXATUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 353. | METHOTREXATUM | D40.1 | JĄDRO |
| 354. | METHOTREXATUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 355. | METHOTREXATUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 356. | METHOTREXATUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 357. | METHOTREXATUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 358. | METHOTREXATUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 359. | METHOTREXATUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 360. | METHOTREXATUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 361. | METHOTREXATUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIAOTOWE |
| 362. | METHOTREXATUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIAOTOWE |
| 363. | METHOTREXATUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 364. | METHOTREXATUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 365. | METHOTREXATUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 366. | METHOTREXATUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 367. | METHOTREXATUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 368. | METHOTREXATUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 369. | METHOTREXATUM | D44.5 | SZYSZYNKĄ |
| 370. | METHOTREXATUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 371. | METHOTREXATUM | D46 | ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 372. | METHOTREXATUM | D46.0 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ BEZ SYDEROBLASTÓW |
| 373. | METHOTREXATUM | D46.1 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z SYDEROBLASTAMI |
| 374. | METHOTREXATUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |
| 375. | METHOTREXATUM | D46.3 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW Z TRANSFORMACJĄ |
| 376. | METHOTREXATUM | D46.4 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ, NIEOKREŚLONA |
| 377. | METHOTREXATUM | D46.7 | INNE ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE |
| 378. | METHOTREXATUM | D46.9 | ZESPÓŁ MIELODYSPLASTYCZNY, NIEOKREŚLONY |
| 379. | METHOTREXATUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 380. | METHOTREXATUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 381. | METHOTREXATUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 382. | METHOTREXATUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 383. | METHOTREXATUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 384. | METHOTREXATUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 385. | METHOTREXATUM | D48.5 | SKÓRA |
| 386. | METHOTREXATUM | D48.6 | SUTEK |
| 387. | METHOTREXATUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 388. | METHOTREXATUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 389. | METHOTREXATUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 390. | METHOTREXATUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 391. | METHOTREXATUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 392. | METHOTREXATUM | O01 | ZAŚNIAD GRONIASTY |
| 393. | METHOTREXATUM | O01.0 | KLASYCZNY ZAŚNIAD GRONIASTY |
| 394. | METHOTREXATUM | O01.1 | NIEZUPEŁNY LUB CZĘŚCIOWY ZAŚNIAD GRONIASTY |
| 395. | METHOTREXATUM | O01.9 | ZAŚNIAD GRONIASTY NIEOKREŚLONY |
| 396. | METHOTREXATUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 397. | METHOTREXATUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 398. | METHOTREXATUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 399. | METHOTREXATUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |
| 400. | METHOTREXATUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 401. | METHOTREXATUM | E85.4 | ZLOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 402. | METHOTREXATUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 403. | METHOTREXATUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.42.

MITOMYCINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | MITOMYCINUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |
| 2. | MITOMYCINUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 3. | MITOMYCINUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 4. | MITOMYCINUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 5. | MITOMYCINUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 6. | MITOMYCINUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 7. | MITOMYCINUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 8. | MITOMYCINUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 9. | MITOMYCINUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 10. | MITOMYCINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 11. | MITOMYCINUM | C16.0 | WPUST |
| 12. | MITOMYCINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 13. | MITOMYCINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 14. | MITOMYCINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 15. | MITOMYCINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 16. | MITOMYCINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 17. | MITOMYCINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 18. | MITOMYCINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 19. | MITOMYCINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | MITOMYCINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 21. | MITOMYCINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 22. | MITOMYCINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 23. | MITOMYCINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 24. | MITOMYCINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 25. | MITOMYCINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 26. | MITOMYCINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 27. | MITOMYCINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 28. | MITOMYCINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 29. | MITOMYCINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 30. | MITOMYCINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 31. | MITOMYCINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 32. | MITOMYCINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 33. | MITOMYCINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 34. | MITOMYCINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 35. | MITOMYCINUM | C18.7 | ESICA |
| 36. | MITOMYCINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 37. | MITOMYCINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 38. | MITOMYCINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 39. | MITOMYCINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 40. | MITOMYCINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 41. | MITOMYCINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 42. | MITOMYCINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 43. | MITOMYCINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 44. | MITOMYCINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 45. | MITOMYCINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 46. | MITOMYCINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 47. | MITOMYCINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 48. | MITOMYCINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 49. | MITOMYCINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 50. | MITOMYCINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 51. | MITOMYCINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 52. | MITOMYCINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 53. | MITOMYCINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 54. | MITOMYCINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 55. | MITOMYCINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 56. | MITOMYCINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 57. | MITOMYCINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 58. | MITOMYCINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 59. | MITOMYCINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 60. | MITOMYCINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 61. | MITOMYCINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 62. | MITOMYCINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 63. | MITOMYCINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 64. | MITOMYCINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 65. | MITOMYCINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 66. | MITOMYCINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 67. | MITOMYCINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 68. | MITOMYCINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 69. | MITOMYCINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 70. | MITOMYCINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 71. | MITOMYCINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 72. | MITOMYCINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 73. | MITOMYCINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 74. | MITOMYCINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 75. | MITOMYCINUM | C34.1 | PLAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 76. | MITOMYCINUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 77. | MITOMYCINUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 78. | MITOMYCINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 79. | MITOMYCINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 80. | MITOMYCINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 81. | MITOMYCINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 82. | MITOMYCINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 83. | MITOMYCINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 84. | MITOMYCINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 85. | MITOMYCINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 86. | MITOMYCINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 87. | MITOMYCINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 88. | MITOMYCINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 89. | MITOMYCINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 90. | MITOMYCINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 91. | MITOMYCINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 92. | MITOMYCINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 93. | MITOMYCINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 94. | MITOMYCINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 95. | MITOMYCINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 96. | MITOMYCINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 97. | MITOMYCINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 98. | MITOMYCINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 99. | MITOMYCINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 100. | MITOMYCINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 101. | MITOMYCINUM | C51 | RAK SROMU |
| 102. | MITOMYCINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 103. | MITOMYCINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 104. | MITOMYCINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 105. | MITOMYCINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 106. | MITOMYCINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 107. | MITOMYCINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 108. | MITOMYCINUM | C53.0 | BLONA ŚLIZOWA SZYJKI MACICY |
| 109. | MITOMYCINUM | C53.1 | BLONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 110. | MITOMYCINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 111. | MITOMYCINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 112. | MITOMYCINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 113. | MITOMYCINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 114. | MITOMYCINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 115. | MITOMYCINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 116. | MITOMYCINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 117. | MITOMYCINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 118. | MITOMYCINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 119. | MITOMYCINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 120. | MITOMYCINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 121. | MITOMYCINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 122. | MITOMYCINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 123. | MITOMYCINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.43.

MITOTANUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 1. | MITOTANUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 2. | MITOTANUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 3. | MITOTANUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 4. | MITOTANUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 5. | MITOTANUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 6. | MITOTANUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 7. | MITOTANUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 8. | MITOTANUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 9. | MITOTANUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 10. | MITOTANUM | C75.4 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 11. | MITOTANUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 12. | MITOTANUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 13. | MITOTANUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.45.

OCTREOTIDUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | OCTREOTIDUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 2. | OCTREOTIDUM | C16.0 | WPUST |
| 3. | OCTREOTIDUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 4. | OCTREOTIDUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 5. | OCTREOTIDUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 6. | OCTREOTIDUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 7. | OCTREOTIDUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 8. | OCTREOTIDUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 9. | OCTREOTIDUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 10. | OCTREOTIDUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 11. | OCTREOTIDUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 12. | OCTREOTIDUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 13. | OCTREOTIDUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 14. | OCTREOTIDUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 15. | OCTREOTIDUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 16. | OCTREOTIDUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 17. | OCTREOTIDUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 18. | OCTREOTIDUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 19. | OCTREOTIDUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 20. | OCTREOTIDUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 21. | OCTREOTIDUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 22. | OCTREOTIDUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 23. | OCTREOTIDUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 24. | OCTREOTIDUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 25. | OCTREOTIDUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 26. | OCTREOTIDUM | C18.7 | ESICA |
| 27. | OCTREOTIDUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 28. | OCTREOTIDUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 29. | OCTREOTIDUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 30. | OCTREOTIDUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 31. | OCTREOTIDUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 32. | OCTREOTIDUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 33. | OCTREOTIDUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 34. | OCTREOTIDUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 35. | OCTREOTIDUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 36. | OCTREOTIDUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 37. | OCTREOTIDUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 38. | OCTREOTIDUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 39. | OCTREOTIDUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 40. | OCTREOTIDUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 41. | OCTREOTIDUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 42. | OCTREOTIDUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 43. | OCTREOTIDUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 44. | OCTREOTIDUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 45. | OCTREOTIDUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 46. | OCTREOTIDUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 47. | OCTREOTIDUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 48. | OCTREOTIDUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 49. | OCTREOTIDUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 50. | OCTREOTIDUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 51. | OCTREOTIDUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 52. | OCTREOTIDUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 53. | OCTREOTIDUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 54. | OCTREOTIDUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 55. | OCTREOTIDUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 56. | OCTREOTIDUM | C75.3 | SZYSZYNKA |
| 57. | OCTREOTIDUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 58. | OCTREOTIDUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 59. | OCTREOTIDUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 60. | OCTREOTIDUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 61. | OCTREOTIDUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 62. | OCTREOTIDUM | E34 | INNE ZABURZENIA ENDOKRYNOLOGICZNE |
| 63. | OCTREOTIDUM | E34.0 | ZESPÓŁ RAKOWIAKA |
| 64. | OCTREOTIDUM | E34.1 | INNE NADMIERNE WYDZIELANIE HORMONÓW POCHODZENIA JELITOWEGO |
| 65. | OCTREOTIDUM | E34.2 | EKTOPOWE WYDZIELANIE HORMONÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| 66. | OCTREOTIDUM | E34.3 | KARŁOWATOŚĆ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| 67. | OCTREOTIDUM | E34.4 | KONSTYTUCJONALNY WYSOKI WZROST |
| 68. | OCTREOTIDUM | E34.5 | ZESPÓŁ OPORNOŚCI ANDROGENNEJ |
| 69. | OCTREOTIDUM | E34.8 | INNE OKREŚLONE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE |
| 70. | OCTREOTIDUM | E34.9 | ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE, NIEOKREŚLONE |

Załącznik C.46.

OXALIPLATINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. | OXALIPLATINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 2. | OXALIPLATINUM | C16.0 | WPUST |
| 3. | OXALIPLATINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 4. | OXALIPLATINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 5. | OXALIPLATINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 6. | OXALIPLATINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 7. | OXALIPLATINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 8. | OXALIPLATINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 9. | OXALIPLATINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 10. | OXALIPLATINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 11. | OXALIPLATINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 12. | OXALIPLATINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 13. | OXALIPLATINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 14. | OXALIPLATINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 15. | OXALIPLATINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 16. | OXALIPLATINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 17. | OXALIPLATINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 18. | OXALIPLATINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 19. | OXALIPLATINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 20. | OXALIPLATINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 21. | OXALIPLATINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 22. | OXALIPLATINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 23. | OXALIPLATINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 24. | OXALIPLATINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 25. | OXALIPLATINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 26. | OXALIPLATINUM | C18.7 | ESICA |
| 27. | OXALIPLATINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 28. | OXALIPLATINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 29. | OXALIPLATINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 30. | OXALIPLATINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 31. | OXALIPLATINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 32. | OXALIPLATINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 33. | OXALIPLATINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 34. | OXALIPLATINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 35. | OXALIPLATINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 36. | OXALIPLATINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 37. | OXALIPLATINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 38. | OXALIPLATINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 39. | OXALIPLATINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 40. | OXALIPLATINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 41. | OXALIPLATINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 42. | OXALIPLATINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 43. | OXALIPLATINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 44. | OXALIPLATINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 45. | OXALIPLATINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 46. | OXALIPLATINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 47. | OXALIPLATINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 48. | OXALIPLATINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |

Załącznik C.47.

PACLITAXELUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | PACLITAXELUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | PACLITAXELUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | PACLITAXELUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | PACLITAXELUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | PACLITAXELUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | PACLITAXELUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | PACLITAXELUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | PACLITAXELUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | PACLITAXELUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | PACLITAXELUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | PACLITAXELUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | PACLITAXELUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | PACLITAXELUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | PACLITAXELUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | PACLITAXELUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | PACLITAXELUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | PACLITAXELUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18. | PACLITAXELUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | PACLITAXELUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | PACLITAXELUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | PACLITAXELUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | PACLITAXELUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 23. | PACLITAXELUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | PACLITAXELUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25. | PACLITAXELUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | PACLITAXELUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | PACLITAXELUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | PACLITAXELUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | PACLITAXELUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | PACLITAXELUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | PACLITAXELUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | PACLITAXELUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | PACLITAXELUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | PACLITAXELUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | PACLITAXELUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | PACLITAXELUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | PACLITAXELUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | PACLITAXELUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | PACLITAXELUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | PACLITAXELUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | PACLITAXELUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | PACLITAXELUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | PACLITAXELUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44. | PACLITAXELUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | PACLITAXELUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | PACLITAXELUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | PACLITAXELUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | PACLITAXELUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |
| 49. | PACLITAXELUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 50. | PACLITAXELUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | PACLITAXELUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | PACLITAXELUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53. | PACLITAXELUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | PACLITAXELUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | PACLITAXELUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | PACLITAXELUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | PACLITAXELUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZELOWA |
| 58. | PACLITAXELUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | PACLITAXELUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | PACLITAXELUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | PACLITAXELUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | PACLITAXELUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | PACLITAXELUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | PACLITAXELUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | PACLITAXELUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (PATRZ) |
| 66. | PACLITAXELUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | PACLITAXELUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZACHYLKA GRUSZKOWATEGO |
| 68. | PACLITAXELUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69. | PACLITAXELUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | PACLITAXELUM | C13.1 | FALD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | PACLITAXELUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | PACLITAXELUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | PACLITAXELUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | PACLITAXELUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 75. | PACLITAXELUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76. | PACLITAXELUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 77. | PACLITAXELUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78. | PACLITAXELUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 79. | PACLITAXELUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 80. | PACLITAXELUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 81. | PACLITAXELUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 82. | PACLITAXELUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 83. | PACLITAXELUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 84. | PACLITAXELUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 85. | PACLITAXELUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 86. | PACLITAXELUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 87. | PACLITAXELUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 88. | PACLITAXELUM | C32 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KRTANI |
| 89. | PACLITAXELUM | C32.0 | GŁOŚNIA |
| 90. | PACLITAXELUM | C32.1 | NAGŁOŚNIA |
| 91. | PACLITAXELUM | C32.2 | JAMA PODGŁOŚNIOWA |
| 92. | PACLITAXELUM | C32.3 | CHRZĄSTKI KRTANI |
| 93. | PACLITAXELUM | C32.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KRTANI |
| 94. | PACLITAXELUM | C32.9 | KRTAŃ, NIEOKREŚLONA |
| 95. | PACLITAXELUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 96. | PACLITAXELUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 97. | PACLITAXELUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 98. | PACLITAXELUM | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 99. | PACLITAXELUM | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 100. | PACLITAXELUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 101. | PACLITAXELUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 102. | PACLITAXELUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 103. | PACLITAXELUM | C38.0 | SERCE |
| 104. | PACLITAXELUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 105. | PACLITAXELUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 106. | PACLITAXELUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 107. | PACLITAXELUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 108. | PACLITAXELUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 109. | PACLITAXELUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 110. | PACLITAXELUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 111. | PACLITAXELUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 112. | PACLITAXELUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 113. | PACLITAXELUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 114. | PACLITAXELUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 115. | PACLITAXELUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 116. | PACLITAXELUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 117. | PACLITAXELUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 118. | PACLITAXELUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 119. | PACLITAXELUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 120. | PACLITAXELUM | C46 | MIĘSAK KAPOS'I EGO |
| 121. | PACLITAXELUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY |
| 122. | PACLITAXELUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 123. | PACLITAXELUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA |
| 124. | PACLITAXELUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 125. | PACLITAXELUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 126. | PACLITAXELUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 127. | PACLITAXELUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY |
| 128. | PACLITAXELUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 129. | PACLITAXELUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 130. | PACLITAXELUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 131. | PACLITAXELUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 132. | PACLITAXELUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 133. | PACLITAXELUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 134. | PACLITAXELUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 135. | PACLITAXELUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 136. | PACLITAXELUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 137. | PACLITAXELUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 138. | PACLITAXELUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 139. | PACLITAXELUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 140. | PACLITAXELUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 141. | PACLITAXELUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 142. | PACLITAXELUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 143. | PACLITAXELUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 144. | PACLITAXELUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 145. | PACLITAXELUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 146. | PACLITAXELUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 147. | PACLITAXELUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 148. | PACLITAXELUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 149. | PACLITAXELUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 150. | PACLITAXELUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 151. | PACLITAXELUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 152. | PACLITAXELUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 153. | PACLITAXELUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 154. | PACLITAXELUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 155. | PACLITAXELUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 156. | PACLITAXELUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY |
| 157. | PACLITAXELUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 158. | PACLITAXELUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 159. | PACLITAXELUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 160. | PACLITAXELUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 161. | PACLITAXELUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 162. | PACLITAXELUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 163. | PACLITAXELUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 164. | PACLITAXELUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 165. | PACLITAXELUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 166. | PACLITAXELUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 167. | PACLITAXELUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 168. | PACLITAXELUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 169. | PACLITAXELUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 170. | PACLITAXELUM | C57.3 | PRZYMACICZA |
| 171. | PACLITAXELUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 172. | PACLITAXELUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 173. | PACLITAXELUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 174. | PACLITAXELUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 175. | PACLITAXELUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 176. | PACLITAXELUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 177. | PACLITAXELUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 178. | PACLITAXELUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 179. | PACLITAXELUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 180. | PACLITAXELUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 181. | PACLITAXELUM | C67.1 | SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 182. | PACLITAXELUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 183. | PACLITAXELUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 184. | PACLITAXELUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 185. | PACLITAXELUM | C67.5 | SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 186. | PACLITAXELUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 187. | PACLITAXELUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 188. | PACLITAXELUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 189. | PACLITAXELUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 190. | PACLITAXELUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 191. | PACLITAXELUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 192. | PACLITAXELUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 193. | PACLITAXELUM | C76.2 | BRZUCH |
| 194. | PACLITAXELUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 195. | PACLITAXELUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 196. | PACLITAXELUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 197. | PACLITAXELUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 198. | PACLITAXELUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 199. | PACLITAXELUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 200. | PACLITAXELUM | D39.2 | CIAŻOWA CHOROBA TROFOBLASTYCZNA |

Załącznik C.48.

PEGASPARAGASUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. | PEGASPARAGASUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 2. | PEGASPARAGASUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 3. | PEGASPARAGASUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 4. | PEGASPARAGASUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 5. | PEGASPARAGASUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 6. | PEGASPARAGASUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 7. | PEGASPARAGASUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 8. | PEGASPARAGASUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 9. | PEGASPARAGASUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 10. | PEGASPARAGASUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 11. | PEGASPARAGASUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 12. | PEGASPARAGASUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 13. | PEGASPARAGASUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 14. | PEGASPARAGASUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 15. | PEGASPARAGASUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 16. | PEGASPARAGASUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 17. | PEGASPARAGASUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 18. | PEGASPARAGASUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 19. | PEGASPARAGASUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 20. | PEGASPARAGASUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 21. | PEGASPARAGASUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 22. | PEGASPARAGASUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 23. | PEGASPARAGASUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 24. | PEGASPARAGASUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 25. | PEGASPARAGASUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 26. | PEGASPARAGASUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 27. | PEGASPARAGASUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 28. | PEGASPARAGASUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 29. | PEGASPARAGASUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 30. | PEGASPARAGASUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 31. | PEGASPARAGASUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 32. | PEGASPARAGASUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 33. | PEGASPARAGASUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 34. | PEGASPARAGASUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 35. | PEGASPARAGASUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 36. | PEGASPARAGASUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 37. | PEGASPARAGASUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 38. | PEGASPARAGASUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 39. | PEGASPARAGASUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 40. | PEGASPARAGASUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 41. | PEGASPARAGASUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 42. | PEGASPARAGASUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 43. | PEGASPARAGASUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 44. | PEGASPARAGASUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 45. | PEGASPARAGASUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 46. | PEGASPARAGASUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 47. | PEGASPARAGASUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.49.

PEMETREKSED

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|-----------------------------------|
| 1. | PEMETREKSED | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 2. | PEMETREKSED | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPŁUCNEJ |
| 3. | PEMETREKSED | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 4. | PEMETREKSED | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 5. | PEMETREKSED | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 6. | PEMETREKSED | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.51.

RITUXIMABUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 1. | RITUXIMABUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 2. | RITUXIMABUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 3. | RITUXIMABUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 4. | RITUXIMABUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 5. | RITUXIMABUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 6. | RITUXIMABUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 7. | RITUXIMABUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 8. | RITUXIMABUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 9. | RITUXIMABUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 10. | RITUXIMABUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 11. | RITUXIMABUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 12. | RITUXIMABUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 13. | RITUXIMABUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 14. | RITUXIMABUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 15. | RITUXIMABUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 16. | RITUXIMABUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 17. | RITUXIMABUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 18. | RITUXIMABUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 19. | RITUXIMABUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 20. | RITUXIMABUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 21. | RITUXIMABUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 22. | RITUXIMABUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 23. | RITUXIMABUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |

| | | | |
|-----|--------------------|-------|--|
| 24. | RITUXIMABUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 25. | RITUXIMABUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 26. | RITUXIMABUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 27. | RITUXIMABUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 28. | RITUXIMABUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.52.

TAMOXIFENUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | TAMOXIFENUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 2. | TAMOXIFENUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 3. | TAMOXIFENUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 4. | TAMOXIFENUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 5. | TAMOXIFENUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 6. | TAMOXIFENUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 7. | TAMOXIFENUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 8. | TAMOXIFENUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 9. | TAMOXIFENUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 10. | TAMOXIFENUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 11. | TAMOXIFENUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 12. | TAMOXIFENUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 13. | TAMOXIFENUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 14. | TAMOXIFENUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 15. | TAMOXIFENUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 16. | TAMOXIFENUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 17. | TAMOXIFENUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 18. | TAMOXIFENUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 19. | TAMOXIFENUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 20. | TAMOXIFENUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 21. | TAMOXIFENUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 22. | TAMOXIFENUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 23. | TAMOXIFENUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 24. | TAMOXIFENUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 25. | TAMOXIFENUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 26. | TAMOXIFENUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 27. | TAMOXIFENUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 28. | TAMOXIFENUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 29. | TAMOXIFENUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 30. | TAMOXIFENUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 31. | TAMOXIFENUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 32. | TAMOXIFENUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 33. | TAMOXIFENUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 34. | TAMOXIFENUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 35. | TAMOXIFENUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 36. | TAMOXIFENUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 37. | TAMOXIFENUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 38. | TAMOXIFENUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 39. | TAMOXIFENUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 40. | TAMOXIFENUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 41. | TAMOXIFENUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 42. | TAMOXIFENUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 43. | TAMOXIFENUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 44. | TAMOXIFENUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 45. | TAMOXIFENUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 46. | TAMOXIFENUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 47. | TAMOXIFENUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 48. | TAMOXIFENUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 49. | TAMOXIFENUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 50. | TAMOXIFENUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 51. | TAMOXIFENUM | Q85.0 | NERWIAKOWŁÓKNIAKOWATOŚĆ NIEZŁOŚLIWA |
| 52. | TAMOXIFENUM | Q85.1 | STWARDNIENIE GUZOWATE |
| 53. | TAMOXIFENUM | Q85.8 | INNE FAKOMATOZY NIE SKLASYFIKOWANE GDZIE INDZIEJ |
| 54. | TAMOXIFENUM | Q85.9 | FAKOMATOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.55.

THIOTEPUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 1. | THIOTEPUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 2. | THIOTEPUM | C38.0 | SERCE |
| 3. | THIOTEPUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 4. | THIOTEPUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 5. | THIOTEPUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 6. | THIOTEPUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 7. | THIOTEPUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 8. | THIOTEPUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 9. | THIOTEPUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 10. | THIOTEPUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 11. | THIOTEPUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 12. | THIOTEPUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 13. | THIOTEPUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 14. | THIOTEPUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 15. | THIOTEPUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 16. | THIOTEPUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 17. | THIOTEPUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 18. | THIOTEPUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 19. | THIOTEPUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 20. | THIOTEPUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 21. | THIOTEPUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 22. | THIOTEPUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 23. | THIOTEPUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 24. | THIOTEPUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 25. | THIOTEPUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 26. | THIOTEPUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 27. | THIOTEPUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 28. | THIOTEPUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 29. | THIOTEPUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 30. | THIOTEPUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 31. | THIOTEPUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 32. | THIOTEPUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 33. | THIOTEPUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 34. | THIOTEPUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 35. | THIOTEPUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 36. | THIOTEPUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 37. | THIOTEPUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 38. | THIOTEPUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 39. | THIOTEPUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 40. | THIOTEPUM | C67.6 | UIŚCIE MOCZOWODU |
| 41. | THIOTEPUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 42. | THIOTEPUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 43. | THIOTEPUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 44. | THIOTEPUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 45. | THIOTEPUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 46. | THIOTEPUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 47. | THIOTEPUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 48. | THIOTEPUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 49. | THIOTEPUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 50. | THIOTEPUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 51. | THIOTEPUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 52. | THIOTEPUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 53. | THIOTEPUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 54. | THIOTEPUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 55. | THIOTEPUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 56. | THIOTEPUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 57. | THIOTEPUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 58. | THIOTEPUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 59. | THIOTEPUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 60. | THIOTEPUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 61. | THIOTEPUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 62. | THIOTEPUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 63. | THIOTEPUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 64. | THIOTEPUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 65. | THIOTEPUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 66. | THIOTEPUM | C74.9 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY (NADNERCZE NIEOKREŚLONE) |
| 67. | THIOTEPUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 68. | THIOTEPUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 69. | THIOTEPUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 70. | THIOTEPUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 71. | THIOTEPUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 72. | THIOTEPUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 73. | THIOTEPUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | THIOTEPUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 75. | THIOTEPUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 76. | THIOTEPUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 77. | THIOTEPUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 78. | THIOTEPUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 79. | THIOTEPUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 80. | THIOTEPUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 81. | THIOTEPUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 82. | THIOTEPUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 83. | THIOTEPUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 84. | THIOTEPUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 85. | THIOTEPUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 86. | THIOTEPUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 87. | THIOTEPUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 88. | THIOTEPUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 89. | THIOTEPUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 90. | THIOTEPUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 91. | THIOTEPUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 92. | THIOTEPUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 93. | THIOTEPUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 94. | THIOTEPUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 95. | THIOTEPUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 96. | THIOTEPUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 97. | THIOTEPUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 98. | THIOTEPUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 99. | THIOTEPUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 100. | THIOTEPUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 101. | THIOTEPUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 102. | THIOTEPUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |

Załącznik C.56.

TIOGUANINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. | TIOGUANINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 2. | TIOGUANINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 3. | TIOGUANINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 4. | TIOGUANINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 5. | TIOGUANINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 6. | TIOGUANINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 7. | TIOGUANINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 8. | TIOGUANINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 9. | TIOGUANINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 10. | TIOGUANINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 11. | TIOGUANINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 12. | TIOGUANINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 13. | TIOGUANINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 14. | TIOGUANINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 15. | TIOGUANINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 16. | TIOGUANINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 17. | TIOGUANINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 18. | TIOGUANINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 19. | TIOGUANINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 20. | TIOGUANINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 21. | TIOGUANINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 22. | TIOGUANINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 23. | TIOGUANINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 24. | TIOGUANINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 25. | TIOGUANINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 26. | TIOGUANINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 27. | TIOGUANINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 28. | TIOGUANINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 29. | TIOGUANINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 30. | TIOGUANINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 31. | TIOGUANINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 32. | TIOGUANINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 33. | TIOGUANINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 34. | TIOGUANINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 35. | TIOGUANINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 36. | TIOGUANINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 37. | TIOGUANINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 38. | TIOGUANINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 39. | TIOGUANINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 40. | TIOGUANINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 41. | TIOGUANINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 42. | TIOGUANINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 43. | TIOGUANINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 44. | TIOGUANINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 45. | TIOGUANINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 46. | TIOGUANINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 47. | TIOGUANINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 48. | TIOGUANINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 49. | TIOGUANINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 50. | TIOGUANINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 51. | TIOGUANINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 52. | TIOGUANINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 53. | TIOGUANINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 54. | TIOGUANINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 55. | TIOGUANINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 56. | TIOGUANINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 57. | TIOGUANINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 58. | TIOGUANINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 59. | TIOGUANINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 60. | TIOGUANINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 61. | TIOGUANINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 62. | TIOGUANINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 63. | TIOGUANINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 64. | TIOGUANINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 65. | TIOGUANINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 66. | TIOGUANINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 67. | TIOGUANINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 68. | TIOGUANINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 69. | TIOGUANINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 70. | TIOGUANINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 71. | TIOGUANINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 72. | TIOGUANINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 73. | TIOGUANINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 74. | TIOGUANINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 75. | TIOGUANINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 76. | TIOGUANINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 77. | TIOGUANINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 78. | TIOGUANINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 79. | TIOGUANINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 80. | TIOGUANINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 81. | TIOGUANINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 82. | TIOGUANINUM | D46.2 | OPORNA NIEDOKRWISTOŚĆ Z NADMIAREM BLASTÓW |

Załącznik C.57.1.

TOPOTECANUM p.o.

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | TOPOTECANUM doustnie | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 2. | TOPOTECANUM doustnie | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 3. | TOPOTECANUM doustnie | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 4. | TOPOTECANUM doustnie | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 5. | TOPOTECANUM doustnie | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 6. | TOPOTECANUM doustnie | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 7. | TOPOTECANUM doustnie | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 8. | TOPOTECANUM doustnie | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |

Załącznik C.57.2.

TOPOTECANUM inj.

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 1. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 2. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 3. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 4. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34.2 | PŁAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 5. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34.3 | PŁAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 6. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 7. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 8. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 9. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38.0 | SERCE |
| 10. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 11. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 12. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 13. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38.4 | OPLUCNA |
| 14. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 15. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 16. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 17. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 18. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 19. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 20. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 21. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 22. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|---|
| 23. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 24. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 25. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 26. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 27. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 28. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 29. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 30. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 31. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 32. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 33. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 34. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 35. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 36. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 37. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 38. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 39. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 40. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 41. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 42. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 43. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY |
| 44. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 45. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 46. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 47. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 48. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C74.0 | KORA NADNERCZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|-------------------------|
| 49. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 50. | TOPOTECANUM wstrzyknięcie | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |

Załącznik C.58.

TRETINOINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | TRETINOINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 2. | TRETINOINUM | C38.0 | SERCE |
| 3. | TRETINOINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 4. | TRETINOINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 5. | TRETINOINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 6. | TRETINOINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 7. | TRETINOINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 8. | TRETINOINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 9. | TRETINOINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 10. | TRETINOINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 11. | TRETINOINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 12. | TRETINOINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 13. | TRETINOINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 14. | TRETINOINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 15. | TRETINOINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 16. | TRETINOINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 17. | TRETINOINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 18. | TRETINOINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 19. | TRETINOINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 20. | TRETINOINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 21. | TRETINOINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 22. | TRETINOINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 23. | TRETINOINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |

| | | | |
|-----|--------------------|-------|--------------------------|
| 24. | TRETINOINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
|-----|--------------------|-------|--------------------------|

Załącznik C.60.

VINBLASTINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | VINBLASTINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | VINBLASTINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | VINBLASTINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | VINBLASTINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | VINBLASTINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | VINBLASTINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | VINBLASTINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | VINBLASTINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | VINBLASTINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | VINBLASTINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | VINBLASTINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | VINBLASTINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | VINBLASTINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | VINBLASTINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | VINBLASTINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | VINBLASTINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | VINBLASTINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18. | VINBLASTINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | VINBLASTINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | VINBLASTINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | VINBLASTINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | VINBLASTINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|--|
| 23. | VINBLASTINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | VINBLASTINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25. | VINBLASTINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | VINBLASTINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | VINBLASTINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | VINBLASTINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | VINBLASTINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | VINBLASTINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | VINBLASTINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | VINBLASTINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | VINBLASTINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | VINBLASTINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | VINBLASTINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | VINBLASTINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | VINBLASTINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | VINBLASTINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | VINBLASTINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | VINBLASTINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | VINBLASTINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | VINBLASTINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | VINBLASTINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44. | VINBLASTINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | VINBLASTINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | VINBLASTINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | VINBLASTINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | VINBLASTINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|---|
| 49. | VINBLASTINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50. | VINBLASTINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | VINBLASTINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | VINBLASTINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53. | VINBLASTINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | VINBLASTINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | VINBLASTINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | VINBLASTINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | VINBLASTINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZELOWA |
| 58. | VINBLASTINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | VINBLASTINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | VINBLASTINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | VINBLASTINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | VINBLASTINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | VINBLASTINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | VINBLASTINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | VINBLASTINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66. | VINBLASTINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | VINBLASTINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68. | VINBLASTINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69. | VINBLASTINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | VINBLASTINUM | C13.1 | FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | VINBLASTINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | VINBLASTINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | VINBLASTINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | VINBLASTINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 75. | VINBLASTINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76. | VINBLASTINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77. | VINBLASTINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78. | VINBLASTINUM | C15 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZELYKU |
| 79. | VINBLASTINUM | C15.0 | SZYJNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 80. | VINBLASTINUM | C15.1 | PIERSIOWA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 81. | VINBLASTINUM | C15.2 | BRZUSZNA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 82. | VINBLASTINUM | C15.3 | GÓRNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 83. | VINBLASTINUM | C15.4 | ŚRODKOWA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 84. | VINBLASTINUM | C15.5 | DOLNA TRZECIA CZĘŚĆ PRZELYKU |
| 85. | VINBLASTINUM | C15.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZELYKU |
| 86. | VINBLASTINUM | C15.9 | PRZELYK, NIEOKREŚLONY |
| 87. | VINBLASTINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 88. | VINBLASTINUM | C16.0 | WPUST |
| 89. | VINBLASTINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 90. | VINBLASTINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 91. | VINBLASTINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 92. | VINBLASTINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 93. | VINBLASTINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 94. | VINBLASTINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 95. | VINBLASTINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 96. | VINBLASTINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 97. | VINBLASTINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 98. | VINBLASTINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 99. | VINBLASTINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 100. | VINBLASTINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 101. | VINBLASTINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 102. | VINBLASTINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 103. | VINBLASTINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 104. | VINBLASTINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 105. | VINBLASTINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 106. | VINBLASTINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 107. | VINBLASTINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 108. | VINBLASTINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 109. | VINBLASTINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 110. | VINBLASTINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |
| 111. | VINBLASTINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 112. | VINBLASTINUM | C18.7 | ESICA |
| 113. | VINBLASTINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 114. | VINBLASTINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 115. | VINBLASTINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 116. | VINBLASTINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 117. | VINBLASTINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 118. | VINBLASTINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 119. | VINBLASTINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 120. | VINBLASTINUM | C21.2 | STREFA KŁOAKOGENNA |
| 121. | VINBLASTINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 122. | VINBLASTINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 123. | VINBLASTINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 124. | VINBLASTINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 125. | VINBLASTINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 126. | VINBLASTINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 127. | VINBLASTINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 128. | VINBLASTINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 129. | VINBLASTINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 130. | VINBLASTINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 131. | VINBLASTINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 132. | VINBLASTINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 133. | VINBLASTINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 134. | VINBLASTINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 135. | VINBLASTINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 136. | VINBLASTINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |
| 137. | VINBLASTINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 138. | VINBLASTINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 139. | VINBLASTINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 140. | VINBLASTINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 141. | VINBLASTINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 142. | VINBLASTINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 143. | VINBLASTINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 144. | VINBLASTINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 145. | VINBLASTINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 146. | VINBLASTINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 147. | VINBLASTINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 148. | VINBLASTINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 149. | VINBLASTINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 150. | VINBLASTINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 151. | VINBLASTINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 152. | VINBLASTINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 153. | VINBLASTINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 154. | VINBLASTINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 155. | VINBLASTINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 156. | VINBLASTINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 157. | VINBLASTINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 158. | VINBLASTINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 159. | VINBLASTINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 160. | VINBLASTINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 161. | VINBLASTINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 162. | VINBLASTINUM | C34.1 | PLĄT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |
| 163. | VINBLASTINUM | C34.2 | PLĄT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 164. | VINBLASTINUM | C34.3 | PLĄT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 165. | VINBLASTINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 166. | VINBLASTINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 167. | VINBLASTINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 168. | VINBLASTINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 169. | VINBLASTINUM | C38.0 | SERCE |
| 170. | VINBLASTINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 171. | VINBLASTINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 172. | VINBLASTINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 173. | VINBLASTINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 174. | VINBLASTINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 175. | VINBLASTINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 176. | VINBLASTINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 177. | VINBLASTINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 178. | VINBLASTINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 179. | VINBLASTINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 180. | VINBLASTINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 181. | VINBLASTINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 182. | VINBLASTINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 183. | VINBLASTINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 184. | VINBLASTINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 185. | VINBLASTINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 186. | VINBLASTINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 187. | VINBLASTINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 188. | VINBLASTINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 189. | VINBLASTINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 190. | VINBLASTINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 191. | VINBLASTINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 192. | VINBLASTINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 193. | VINBLASTINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 194. | VINBLASTINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 195. | VINBLASTINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 196. | VINBLASTINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 197. | VINBLASTINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 198. | VINBLASTINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 199. | VINBLASTINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 200. | VINBLASTINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 201. | VINBLASTINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 202. | VINBLASTINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 203. | VINBLASTINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 204. | VINBLASTINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 205. | VINBLASTINUM | C46 | MIĘSAK KAPOS'I EGO |
| 206. | VINBLASTINUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 207. | VINBLASTINUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 208. | VINBLASTINUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA |
| 209. | VINBLASTINUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 210. | VINBLASTINUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 211. | VINBLASTINUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 212. | VINBLASTINUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY |
| 213. | VINBLASTINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 214. | VINBLASTINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 215. | VINBLASTINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 216. | VINBLASTINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 217. | VINBLASTINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 218. | VINBLASTINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 219. | VINBLASTINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 220. | VINBLASTINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 221. | VINBLASTINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 222. | VINBLASTINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 223. | VINBLASTINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 224. | VINBLASTINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 225. | VINBLASTINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 226. | VINBLASTINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 227. | VINBLASTINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 228. | VINBLASTINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 229. | VINBLASTINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 230. | VINBLASTINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 231. | VINBLASTINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 232. | VINBLASTINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 233. | VINBLASTINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 234. | VINBLASTINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 235. | VINBLASTINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 236. | VINBLASTINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 237. | VINBLASTINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 238. | VINBLASTINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 239. | VINBLASTINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 240. | VINBLASTINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 241. | VINBLASTINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 242. | VINBLASTINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 243. | VINBLASTINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 244. | VINBLASTINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 245. | VINBLASTINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 246. | VINBLASTINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 247. | VINBLASTINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 248. | VINBLASTINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 249. | VINBLASTINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 250. | VINBLASTINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 251. | VINBLASTINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 252. | VINBLASTINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 253. | VINBLASTINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 254. | VINBLASTINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 255. | VINBLASTINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 256. | VINBLASTINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 257. | VINBLASTINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 258. | VINBLASTINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 259. | VINBLASTINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 260. | VINBLASTINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 261. | VINBLASTINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 262. | VINBLASTINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 263. | VINBLASTINUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 264. | VINBLASTINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 265. | VINBLASTINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 266. | VINBLASTINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 267. | VINBLASTINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 268. | VINBLASTINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 269. | VINBLASTINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 270. | VINBLASTINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 271. | VINBLASTINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 272. | VINBLASTINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 273. | VINBLASTINUM | C57.3 | PRZYMACICZA |
| 274. | VINBLASTINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 275. | VINBLASTINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 276. | VINBLASTINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 277. | VINBLASTINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 278. | VINBLASTINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 279. | VINBLASTINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 280. | VINBLASTINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 281. | VINBLASTINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 282. | VINBLASTINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 283. | VINBLASTINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 284. | VINBLASTINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 285. | VINBLASTINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 286. | VINBLASTINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 287. | VINBLASTINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 288. | VINBLASTINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 289. | VINBLASTINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 290. | VINBLASTINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 291. | VINBLASTINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 292. | VINBLASTINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 293. | VINBLASTINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 294. | VINBLASTINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 295. | VINBLASTINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 296. | VINBLASTINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 297. | VINBLASTINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 298. | VINBLASTINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 299. | VINBLASTINUM | C67.5 | SZYJA PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 300. | VINBLASTINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 301. | VINBLASTINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 302. | VINBLASTINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCHERZA MOCZOWEGO |
| 303. | VINBLASTINUM | C67.9 | PĘCHERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 304. | VINBLASTINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 305. | VINBLASTINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 306. | VINBLASTINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 307. | VINBLASTINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 308. | VINBLASTINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 309. | VINBLASTINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 310. | VINBLASTINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 311. | VINBLASTINUM | C69.1 | ROGÓWKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 312. | VINBLASTINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 313. | VINBLASTINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 314. | VINBLASTINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 315. | VINBLASTINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 316. | VINBLASTINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 317. | VINBLASTINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 318. | VINBLASTINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 319. | VINBLASTINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 320. | VINBLASTINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 321. | VINBLASTINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 322. | VINBLASTINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 323. | VINBLASTINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 324. | VINBLASTINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 325. | VINBLASTINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 326. | VINBLASTINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 327. | VINBLASTINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 328. | VINBLASTINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 329. | VINBLASTINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 330. | VINBLASTINUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 331. | VINBLASTINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 332. | VINBLASTINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 333. | VINBLASTINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 334. | VINBLASTINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 335. | VINBLASTINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 336. | VINBLASTINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 337. | VINBLASTINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 338. | VINBLASTINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 339. | VINBLASTINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 340. | VINBLASTINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 341. | VINBLASTINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 342. | VINBLASTINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 343. | VINBLASTINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 344. | VINBLASTINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 345. | VINBLASTINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 346. | VINBLASTINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 347. | VINBLASTINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 348. | VINBLASTINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 349. | VINBLASTINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 350. | VINBLASTINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 351. | VINBLASTINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 352. | VINBLASTINUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 353. | VINBLASTINUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 354. | VINBLASTINUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 355. | VINBLASTINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 356. | VINBLASTINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 357. | VINBLASTINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 358. | VINBLASTINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 359. | VINBLASTINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 360. | VINBLASTINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 361. | VINBLASTINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 362. | VINBLASTINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 363. | VINBLASTINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 364. | VINBLASTINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 365. | VINBLASTINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 366. | VINBLASTINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 367. | VINBLASTINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 368. | VINBLASTINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 369. | VINBLASTINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 370. | VINBLASTINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 371. | VINBLASTINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 372. | VINBLASTINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 373. | VINBLASTINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 374. | VINBLASTINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 375. | VINBLASTINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 376. | VINBLASTINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 377. | VINBLASTINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 378. | VINBLASTINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 379. | VINBLASTINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 380. | VINBLASTINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 381. | VINBLASTINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 382. | VINBLASTINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 383. | VINBLASTINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 384. | VINBLASTINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 385. | VINBLASTINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 386. | VINBLASTINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 387. | VINBLASTINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 388. | VINBLASTINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 389. | VINBLASTINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 390. | VINBLASTINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 391. | VINBLASTINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 392. | VINBLASTINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 393. | VINBLASTINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 394. | VINBLASTINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 395. | VINBLASTINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 396. | VINBLASTINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 397. | VINBLASTINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 398. | VINBLASTINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 399. | VINBLASTINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 400. | VINBLASTINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 401. | VINBLASTINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 402. | VINBLASTINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 403. | VINBLASTINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 404. | VINBLASTINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 405. | VINBLASTINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 406. | VINBLASTINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 407. | VINBLASTINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 408. | VINBLASTINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 409. | VINBLASTINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 410. | VINBLASTINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 411. | VINBLASTINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 412. | VINBLASTINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 413. | VINBLASTINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 414. | VINBLASTINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 415. | VINBLASTINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 416. | VINBLASTINUM | C83.6 | NIEZRÓŻNICOWANY (ROZLANY) |
| 417. | VINBLASTINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 418. | VINBLASTINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 419. | VINBLASTINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 420. | VINBLASTINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 421. | VINBLASTINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 422. | VINBLASTINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 423. | VINBLASTINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 424. | VINBLASTINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 425. | VINBLASTINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 426. | VINBLASTINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 427. | VINBLASTINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 428. | VINBLASTINUM | C85.0 | MIĘSAK LIMFATYCZNY |
| 429. | VINBLASTINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 430. | VINBLASTINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 431. | VINBLASTINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 432. | VINBLASTINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 433. | VINBLASTINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 434. | VINBLASTINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 435. | VINBLASTINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |
| 436. | VINBLASTINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 437. | VINBLASTINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 438. | VINBLASTINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 439. | VINBLASTINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 440. | VINBLASTINUM | C91.0 | OŚTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 441. | VINBLASTINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 442. | VINBLASTINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 443. | VINBLASTINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 444. | VINBLASTINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 445. | VINBLASTINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 446. | VINBLASTINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 447. | VINBLASTINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 448. | VINBLASTINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 449. | VINBLASTINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 450. | VINBLASTINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 451. | VINBLASTINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 452. | VINBLASTINUM | C92.3 | MIĘSAK SZPIKOWY |
| 453. | VINBLASTINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 454. | VINBLASTINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 455. | VINBLASTINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 456. | VINBLASTINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 457. | VINBLASTINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 458. | VINBLASTINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 459. | VINBLASTINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 460. | VINBLASTINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 461. | VINBLASTINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 462. | VINBLASTINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 463. | VINBLASTINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 464. | VINBLASTINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 465. | VINBLASTINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 466. | VINBLASTINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 467. | VINBLASTINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 468. | VINBLASTINUM | D00.2 | ZOŁĄDEK |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 469. | VINBLASTINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 470. | VINBLASTINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 471. | VINBLASTINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 472. | VINBLASTINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 473. | VINBLASTINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 474. | VINBLASTINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 475. | VINBLASTINUM | D01.5 | WĄTROBA, PEŁCERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 476. | VINBLASTINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 477. | VINBLASTINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 478. | VINBLASTINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 479. | VINBLASTINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 480. | VINBLASTINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 481. | VINBLASTINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 482. | VINBLASTINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 483. | VINBLASTINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 484. | VINBLASTINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 485. | VINBLASTINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 486. | VINBLASTINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 487. | VINBLASTINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 488. | VINBLASTINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 489. | VINBLASTINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 490. | VINBLASTINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 491. | VINBLASTINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 492. | VINBLASTINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 493. | VINBLASTINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 494. | VINBLASTINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 495. | VINBLASTINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 496. | VINBLASTINUM | D07.1 | SROM |
| 497. | VINBLASTINUM | D07.2 | POCHWA |
| 498. | VINBLASTINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ZEŃSKIE |
| 499. | VINBLASTINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 500. | VINBLASTINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 501. | VINBLASTINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 502. | VINBLASTINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 503. | VINBLASTINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 504. | VINBLASTINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 505. | VINBLASTINUM | D09.2 | OKO |
| 506. | VINBLASTINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 507. | VINBLASTINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 508. | VINBLASTINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 509. | VINBLASTINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 510. | VINBLASTINUM | D10.0 | WARGA |
| 511. | VINBLASTINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 512. | VINBLASTINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 513. | VINBLASTINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 514. | VINBLASTINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 515. | VINBLASTINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 516. | VINBLASTINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 517. | VINBLASTINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 518. | VINBLASTINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 519. | VINBLASTINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 520. | VINBLASTINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 521. | VINBLASTINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 522. | VINBLASTINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 523. | VINBLASTINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 524. | VINBLASTINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 525. | VINBLASTINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 526. | VINBLASTINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 527. | VINBLASTINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 528. | VINBLASTINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 529. | VINBLASTINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 530. | VINBLASTINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 531. | VINBLASTINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 532. | VINBLASTINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 533. | VINBLASTINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 534. | VINBLASTINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 535. | VINBLASTINUM | D13.0 | PRZEŁYK |
| 536. | VINBLASTINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 537. | VINBLASTINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 538. | VINBLASTINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 539. | VINBLASTINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 540. | VINBLASTINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 541. | VINBLASTINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 542. | VINBLASTINUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 543. | VINBLASTINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 544. | VINBLASTINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 545. | VINBLASTINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 546. | VINBLASTINUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 547. | VINBLASTINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 548. | VINBLASTINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 549. | VINBLASTINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 550. | VINBLASTINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 551. | VINBLASTINUM | D15.0 | GRASICA |
| 552. | VINBLASTINUM | D15.1 | SERCE |
| 553. | VINBLASTINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 554. | VINBLASTINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 555. | VINBLASTINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 556. | VINBLASTINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 557. | VINBLASTINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 558. | VINBLASTINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 559. | VINBLASTINUM | D16.2 | KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 560. | VINBLASTINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 561. | VINBLASTINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 562. | VINBLASTINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 563. | VINBLASTINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 564. | VINBLASTINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 565. | VINBLASTINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 566. | VINBLASTINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 567. | VINBLASTINUM | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 568. | VINBLASTINUM | D18.0 | NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 569. | VINBLASTINUM | D18.1 | NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 570. | VINBLASTINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 571. | VINBLASTINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 572. | VINBLASTINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 573. | VINBLASTINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 574. | VINBLASTINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 575. | VINBLASTINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 576. | VINBLASTINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 577. | VINBLASTINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 578. | VINBLASTINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 579. | VINBLASTINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 580. | VINBLASTINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 581. | VINBLASTINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 582. | VINBLASTINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 583. | VINBLASTINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 584. | VINBLASTINUM | D28.0 | SROM |
| 585. | VINBLASTINUM | D28.1 | POCHWA |
| 586. | VINBLASTINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 587. | VINBLASTINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 588. | VINBLASTINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 589. | VINBLASTINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 590. | VINBLASTINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 591. | VINBLASTINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 592. | VINBLASTINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 593. | VINBLASTINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 594. | VINBLASTINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 595. | VINBLASTINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 596. | VINBLASTINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 597. | VINBLASTINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 598. | VINBLASTINUM | D30.0 | NERKA |
| 599. | VINBLASTINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 600. | VINBLASTINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 601. | VINBLASTINUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 602. | VINBLASTINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 603. | VINBLASTINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 604. | VINBLASTINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 605. | VINBLASTINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 606. | VINBLASTINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 607. | VINBLASTINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 608. | VINBLASTINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 609. | VINBLASTINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 610. | VINBLASTINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 611. | VINBLASTINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 612. | VINBLASTINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 613. | VINBLASTINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 614. | VINBLASTINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 615. | VINBLASTINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 616. | VINBLASTINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 617. | VINBLASTINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 618. | VINBLASTINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 619. | VINBLASTINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 620. | VINBLASTINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 621. | VINBLASTINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 622. | VINBLASTINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 623. | VINBLASTINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 624. | VINBLASTINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 625. | VINBLASTINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 626. | VINBLASTINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 627. | VINBLASTINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 628. | VINBLASTINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 629. | VINBLASTINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 630. | VINBLASTINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 631. | VINBLASTINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 632. | VINBLASTINUM | D35.4 | SZYSZYNKA |
| 633. | VINBLASTINUM | D35.5 | KLĘBEK SZYJNY |
| 634. | VINBLASTINUM | D35.6 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 635. | VINBLASTINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 636. | VINBLASTINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 637. | VINBLASTINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 638. | VINBLASTINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 639. | VINBLASTINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 640. | VINBLASTINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 641. | VINBLASTINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 642. | VINBLASTINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 643. | VINBLASTINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 644. | VINBLASTINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 645. | VINBLASTINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 646. | VINBLASTINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 647. | VINBLASTINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 648. | VINBLASTINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 649. | VINBLASTINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 650. | VINBLASTINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 651. | VINBLASTINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 652. | VINBLASTINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 653. | VINBLASTINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 654. | VINBLASTINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 655. | VINBLASTINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 656. | VINBLASTINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 657. | VINBLASTINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 658. | VINBLASTINUM | D38.4 | GRASICA |
| 659. | VINBLASTINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 660. | VINBLASTINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 661. | VINBLASTINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 662. | VINBLASTINUM | D39.0 | MACICA |
| 663. | VINBLASTINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 664. | VINBLASTINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 665. | VINBLASTINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 666. | VINBLASTINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 667. | VINBLASTINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 668. | VINBLASTINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 669. | VINBLASTINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 670. | VINBLASTINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 671. | VINBLASTINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 672. | VINBLASTINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 673. | VINBLASTINUM | D41.0 | NERKA |
| 674. | VINBLASTINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 675. | VINBLASTINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 676. | VINBLASTINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 677. | VINBLASTINUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 678. | VINBLASTINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 679. | VINBLASTINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 680. | VINBLASTINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 681. | VINBLASTINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 682. | VINBLASTINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 683. | VINBLASTINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 684. | VINBLASTINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 685. | VINBLASTINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 686. | VINBLASTINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 687. | VINBLASTINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 688. | VINBLASTINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 689. | VINBLASTINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 690. | VINBLASTINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 691. | VINBLASTINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 692. | VINBLASTINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 693. | VINBLASTINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 694. | VINBLASTINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 695. | VINBLASTINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 696. | VINBLASTINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 697. | VINBLASTINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 698. | VINBLASTINUM | D44.5 | SZYSZYNKA |
| 699. | VINBLASTINUM | D44.6 | KLĘBEK SZYJNY |
| 700. | VINBLASTINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 701. | VINBLASTINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 702. | VINBLASTINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 703. | VINBLASTINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 704. | VINBLASTINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 705. | VINBLASTINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE |
| 706. | VINBLASTINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 707. | VINBLASTINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 708. | VINBLASTINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 709. | VINBLASTINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 710. | VINBLASTINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 711. | VINBLASTINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 712. | VINBLASTINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 713. | VINBLASTINUM | D48.6 | SUTEK |
| 714. | VINBLASTINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 715. | VINBLASTINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 716. | VINBLASTINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSZA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 717. | VINBLASTINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 718. | VINBLASTINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTOWY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |

Załącznik C.61.

VINCRISTINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | VINCRISTINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | VINCRISTINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | VINCRISTINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | VINCRISTINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | VINCRISTINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | VINCRISTINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | VINCRISTINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | VINCRISTINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | VINCRISTINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | VINCRISTINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | VINCRISTINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | VINCRISTINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | VINCRISTINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | VINCRISTINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | VINCRISTINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | VINCRISTINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | VINCRISTINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18. | VINCRISTINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | VINCRISTINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | VINCRISTINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | VINCRISTINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | VINCRISTINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|--|
| 23. | VINCRISTINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | VINCRISTINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25. | VINCRISTINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | VINCRISTINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | VINCRISTINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | VINCRISTINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | VINCRISTINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | VINCRISTINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | VINCRISTINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | VINCRISTINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | VINCRISTINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | VINCRISTINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | VINCRISTINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | VINCRISTINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | VINCRISTINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | VINCRISTINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | VINCRISTINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | VINCRISTINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | VINCRISTINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | VINCRISTINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | VINCRISTINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44. | VINCRISTINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | VINCRISTINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | VINCRISTINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | VINCRISTINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | VINCRISTINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|--|------------|---|
| 49. | VINCRISTINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50. | VINCRISTINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | VINCRISTINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | VINCRISTINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53. | VINCRISTINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | VINCRISTINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | VINCRISTINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | VINCRISTINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | VINCRISTINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZELOWA |
| 58. | VINCRISTINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | VINCRISTINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | VINCRISTINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | VINCRISTINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | VINCRISTINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | VINCRISTINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | VINCRISTINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | VINCRISTINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66. | VINCRISTINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | VINCRISTINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68. | VINCRISTINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPARYNX) |
| 69. | VINCRISTINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | VINCRISTINUM | C13.1 | FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | VINCRISTINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | VINCRISTINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | VINCRISTINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | VINCRISTINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 75. | VINCRISTINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76. | VINCRISTINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77. | VINCRISTINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78. | VINCRISTINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79. | VINCRISTINUM | C16.0 | WPUST |
| 80. | VINCRISTINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81. | VINCRISTINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82. | VINCRISTINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83. | VINCRISTINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84. | VINCRISTINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85. | VINCRISTINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86. | VINCRISTINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87. | VINCRISTINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88. | VINCRISTINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89. | VINCRISTINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90. | VINCRISTINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91. | VINCRISTINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92. | VINCRISTINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93. | VINCRISTINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94. | VINCRISTINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95. | VINCRISTINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96. | VINCRISTINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97. | VINCRISTINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98. | VINCRISTINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99. | VINCRISTINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100. | VINCRISTINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101. | VINCRISTINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 102. | VINCRISTINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103. | VINCRISTINUM | C18.7 | ESICA |
| 104. | VINCRISTINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105. | VINCRISTINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 106. | VINCRISTINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107. | VINCRISTINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108. | VINCRISTINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109. | VINCRISTINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110. | VINCRISTINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111. | VINCRISTINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112. | VINCRISTINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113. | VINCRISTINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114. | VINCRISTINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115. | VINCRISTINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116. | VINCRISTINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117. | VINCRISTINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118. | VINCRISTINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119. | VINCRISTINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120. | VINCRISTINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121. | VINCRISTINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122. | VINCRISTINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123. | VINCRISTINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124. | VINCRISTINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125. | VINCRISTINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126. | VINCRISTINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127. | VINCRISTINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 128. | VINCRISTINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129. | VINCRISTINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130. | VINCRISTINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131. | VINCRISTINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132. | VINCRISTINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 133. | VINCRISTINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134. | VINCRISTINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135. | VINCRISTINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136. | VINCRISTINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137. | VINCRISTINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138. | VINCRISTINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139. | VINCRISTINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140. | VINCRISTINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141. | VINCRISTINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142. | VINCRISTINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143. | VINCRISTINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144. | VINCRISTINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145. | VINCRISTINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146. | VINCRISTINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147. | VINCRISTINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148. | VINCRISTINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149. | VINCRISTINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150. | VINCRISTINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151. | VINCRISTINUM | C33 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY |
| 152. | VINCRISTINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 153. | VINCRISTINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 154. | VINCRISTINUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 155. | VINCRISTINUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 156. | VINCRISTINUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 157. | VINCRISTINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 158. | VINCRISTINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 159. | VINCRISTINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 160. | VINCRISTINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 161. | VINCRISTINUM | C38.0 | SERCE |
| 162. | VINCRISTINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 163. | VINCRISTINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 164. | VINCRISTINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 165. | VINCRISTINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 166. | VINCRISTINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 167. | VINCRISTINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 168. | VINCRISTINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 169. | VINCRISTINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 170. | VINCRISTINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 171. | VINCRISTINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 172. | VINCRISTINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 173. | VINCRISTINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 174. | VINCRISTINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 175. | VINCRISTINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 176. | VINCRISTINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 177. | VINCRISTINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 178. | VINCRISTINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 179. | VINCRISTINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 180. | VINCRISTINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 181. | VINCRISTINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 182. | VINCRISTINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 183. | VINCRISTINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 184. | VINCRISTINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 185. | VINCRISTINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 186. | VINCRISTINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 187. | VINCRISTINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 188. | VINCRISTINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 189. | VINCRISTINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 190. | VINCRISTINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 191. | VINCRISTINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 192. | VINCRISTINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 193. | VINCRISTINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 194. | VINCRISTINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 195. | VINCRISTINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 196. | VINCRISTINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 197. | VINCRISTINUM | C45 | MIĘDZYBŁONIAK |
| 198. | VINCRISTINUM | C45.0 | MIĘDZYBŁONIAK OPLUCNEJ |
| 199. | VINCRISTINUM | C45.1 | MIĘDZYBŁONIAK OTRZEWNEJ |
| 200. | VINCRISTINUM | C45.2 | MIĘDZYBŁONIAK OSIERDZIA |
| 201. | VINCRISTINUM | C45.7 | MIĘDZYBŁONIAK INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 202. | VINCRISTINUM | C45.9 | MIĘDZYBŁONIAK, NIEOKREŚLONY |
| 203. | VINCRISTINUM | C46 | MIĘSAK KAPOS'I EGO |
| 204. | VINCRISTINUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOS'I EGO SKÓRY |
| 205. | VINCRISTINUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOS'I EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 206. | VINCRISTINUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOS'I EGO PODNIEBIENIA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 207. | VINCRISTINUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOS'I EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 208. | VINCRISTINUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOS'I EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 209. | VINCRISTINUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOS'I EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 210. | VINCRISTINUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOS'I EGO, NIEOKREŚLONY |
| 211. | VINCRISTINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 212. | VINCRISTINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 213. | VINCRISTINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 214. | VINCRISTINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 215. | VINCRISTINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 216. | VINCRISTINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 217. | VINCRISTINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 218. | VINCRISTINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 219. | VINCRISTINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 220. | VINCRISTINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 221. | VINCRISTINUM | C48. | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 222. | VINCRISTINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 223. | VINCRISTINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 224. | VINCRISTINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 225. | VINCRISTINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 226. | VINCRISTINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 227. | VINCRISTINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 228. | VINCRISTINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 229. | VINCRISTINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 230. | VINCRISTINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 231. | VINCRISTINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 232. | VINCRISTINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 233. | VINCRISTINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 234. | VINCRISTINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 235. | VINCRISTINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 236. | VINCRISTINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |
| 237. | VINCRISTINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 238. | VINCRISTINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 239. | VINCRISTINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 240. | VINCRISTINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 241. | VINCRISTINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 242. | VINCRISTINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 243. | VINCRISTINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 244. | VINCRISTINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 245. | VINCRISTINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 246. | VINCRISTINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 247. | VINCRISTINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 248. | VINCRISTINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 249. | VINCRISTINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 250. | VINCRISTINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 251. | VINCRISTINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 252. | VINCRISTINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 253. | VINCRISTINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 254. | VINCRISTINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 255. | VINCRISTINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 256. | VINCRISTINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SZYJKI MACICY |
| 257. | VINCRISTINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 258. | VINCRISTINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 259. | VINCRISTINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 260. | VINCRISTINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 261. | VINCRISTINUM | C54.2 | MIEŚNIÓWKA MACICY |
| 262. | VINCRISTINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 263. | VINCRISTINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |
| 264. | VINCRISTINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 265. | VINCRISTINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 266. | VINCRISTINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 267. | VINCRISTINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 268. | VINCRISTINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 269. | VINCRISTINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 270. | VINCRISTINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 271. | VINCRISTINUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 272. | VINCRISTINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 273. | VINCRISTINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 274. | VINCRISTINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 275. | VINCRISTINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 276. | VINCRISTINUM | C58 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŁOŻYSKA |
| 277. | VINCRISTINUM | C60 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRĄCIA |
| 278. | VINCRISTINUM | C60.0 | NAPLETEK |
| 279. | VINCRISTINUM | C60.1 | ŻOŁĄDŹ PRĄCIA |
| 280. | VINCRISTINUM | C60.2 | TRZON PRĄCIA |
| 281. | VINCRISTINUM | C60.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRĄCIA |
| 282. | VINCRISTINUM | C60.9 | PRĄCIE, NIEOKREŚLONE |
| 283. | VINCRISTINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOLU KROKOWEGO |
| 284. | VINCRISTINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 285. | VINCRISTINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 286. | VINCRISTINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 287. | VINCRISTINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 288. | VINCRISTINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 289. | VINCRISTINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 290. | VINCRISTINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 291. | VINCRISTINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 292. | VINCRISTINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 293. | VINCRISTINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 294. | VINCRISTINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 295. | VINCRISTINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 296. | VINCRISTINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 297. | VINCRISTINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 298. | VINCRISTINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 299. | VINCRISTINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 300. | VINCRISTINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 301. | VINCRISTINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 302. | VINCRISTINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 303. | VINCRISTINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 304. | VINCRISTINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 305. | VINCRISTINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 306. | VINCRISTINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 307. | VINCRISTINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 308. | VINCRISTINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 309. | VINCRISTINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 310. | VINCRISTINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 311. | VINCRISTINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 312. | VINCRIStINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 313. | VINCRIStINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 314. | VINCRIStINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 315. | VINCRIStINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 316. | VINCRIStINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 317. | VINCRIStINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 318. | VINCRIStINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 319. | VINCRIStINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 320. | VINCRIStINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 321. | VINCRIStINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 322. | VINCRIStINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 323. | VINCRIStINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 324. | VINCRIStINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 325. | VINCRIStINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 326. | VINCRIStINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 327. | VINCRIStINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 328. | VINCRIStINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 329. | VINCRIStINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 330. | VINCRIStINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 331. | VINCRIStINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 332. | VINCRIStINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 333. | VINCRIStINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 334. | VINCRIStINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 335. | VINCRIStINUM | C71.6 | MÓZDZEK |
| 336. | VINCRIStINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 337. | VINCRIStINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 338. | VINCRIStINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 339. | VINCRIStINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 340. | VINCRIStINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 341. | VINCRIStINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 342. | VINCRIStINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 343. | VINCRIStINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 344. | VINCRIStINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 345. | VINCRIStINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 346. | VINCRIStINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 347. | VINCRIStINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 348. | VINCRIStINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 349. | VINCRIStINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 350. | VINCRIStINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 351. | VINCRIStINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 352. | VINCRIStINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 353. | VINCRIStINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 354. | VINCRIStINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 355. | VINCRIStINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 356. | VINCRIStINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 357. | VINCRIStINUM | C75.3 | SZYSZYŃKA |
| 358. | VINCRIStINUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 359. | VINCRIStINUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 360. | VINCRIStINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 361. | VINCRIStINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 362. | VINCRIStINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 363. | VINCRIStINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 364. | VINCRISTINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 365. | VINCRISTINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 366. | VINCRISTINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 367. | VINCRISTINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 368. | VINCRISTINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 369. | VINCRISTINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 370. | VINCRISTINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 371. | VINCRISTINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 372. | VINCRISTINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 373. | VINCRISTINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 374. | VINCRISTINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 375. | VINCRISTINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |
| 376. | VINCRISTINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 377. | VINCRISTINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 378. | VINCRISTINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 379. | VINCRISTINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 380. | VINCRISTINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 381. | VINCRISTINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 382. | VINCRISTINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 383. | VINCRISTINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPLUCNEJ |
| 384. | VINCRISTINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 385. | VINCRISTINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 386. | VINCRISTINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 387. | VINCRISTINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 388. | VINCRISTINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 389. | VINCRISTINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 390. | VINCRISTINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 391. | VINCRISTINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 392. | VINCRISTINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 393. | VINCRISTINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 394. | VINCRISTINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 395. | VINCRISTINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 396. | VINCRISTINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 397. | VINCRISTINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 398. | VINCRISTINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 399. | VINCRISTINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 400. | VINCRISTINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 401. | VINCRISTINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 402. | VINCRISTINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 403. | VINCRISTINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 404. | VINCRISTINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 405. | VINCRISTINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 406. | VINCRISTINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 407. | VINCRISTINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 408. | VINCRISTINUM | C82 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY GUZKOWY (GRUDKOWY) |
| 409. | VINCRISTINUM | C82.0 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK, GUZKOWY |
| 410. | VINCRISTINUM | C82.1 | MIESZANY Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) I WIELKICH KOMÓREK, GUZKOWY |
| 411. | VINCRISTINUM | C82.2 | WIELKOMÓRKOWY, GUZKOWY |
| 412. | VINCRISTINUM | C82.7 | INNE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO GUZKOWEGO |
| 413. | VINCRISTINUM | C82.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 414. | VINCRISTINUM | C83 | CHŁONIAKI NIEZIARNICZE ROZLANE |
| 415. | VINCRISTINUM | C83.0 | Z MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 416. | VINCRISTINUM | C83.1 | Z MAŁYCH WPUKLONYCH (SZCZELINOWATYCH = CLEAVED) KOMÓREK (ROZLANY) |
| 417. | VINCRISTINUM | C83.2 | MIESZANY Z DUŻYCH I MAŁYCH KOMÓREK (ROZLANY) |
| 418. | VINCRISTINUM | C83.3 | WIELKOMÓRKOWY (ROZLANY) |
| 419. | VINCRISTINUM | C83.4 | IMMUNOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 420. | VINCRISTINUM | C83.5 | LIMFOBLASTYCZNY (ROZLANY) |
| 421. | VINCRISTINUM | C83.6 | NIEZRÓZNICOWANY (ROZLANY) |
| 422. | VINCRISTINUM | C83.7 | GUZ (CHŁONIAK) BURKITTA |
| 423. | VINCRISTINUM | C83.8 | INNE POSTACIE ROZLANYCH CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 424. | VINCRISTINUM | C83.9 | ROZLANY CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 425. | VINCRISTINUM | C84 | OBWODOWY I SKÓRNY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 426. | VINCRISTINUM | C84.0 | ZIARNINIAK GRZYBIASTY |
| 427. | VINCRISTINUM | C84.1 | CHOROBA SEZARY' EGO |
| 428. | VINCRISTINUM | C84.2 | CHŁONIAK STREFY T |
| 429. | VINCRISTINUM | C84.3 | CHŁONIAK LIMFOEPITELIOIDALNY |
| 430. | VINCRISTINUM | C84.4 | OBWODOWY CHŁONIAK Z KOMÓREK T |
| 431. | VINCRISTINUM | C84.5 | INNE I NIEOKREŚLONE CHŁONIAKI T |
| 432. | VINCRISTINUM | C85 | INNE I NIEOKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH |
| 433. | VINCRISTINUM | C85.0 | MIEŚSAK LIMFATYCZNY |
| 434. | VINCRISTINUM | C85.1 | CHŁONIAK Z KOMÓREK B, NIEOKREŚLONY |
| 435. | VINCRISTINUM | C85.7 | INNE OKREŚLONE POSTACIE CHŁONIAKA NIEZIARNICZEGO |
| 436. | VINCRISTINUM | C85.9 | CHŁONIAK NIEZIARNICZY, NIEOKREŚLONY |
| 437. | VINCRISTINUM | C88 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 438. | VINCRISTINUM | C88.0 | MAKROGLOBULINEMIA WALDENSTRÖMA |
| 439. | VINCRISTINUM | C88.1 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH ALFA |
| 440. | VINCRISTINUM | C88.2 | CHOROBA ŁAŃCUCHÓW CIĘŻKICH GAMMA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 441. | VINCRISTINUM | C88.3 | CHOROBA IMMUNOPROLIFERACYJNA JELITA CIENKIEGO |
| 442. | VINCRISTINUM | C88.7 | INNE ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE |
| 443. | VINCRISTINUM | C88.9 | ZŁOŚLIWE CHOROBY IMMUNOPROLIFERACYJNE, NIEOKREŚLONE |
| 444. | VINCRISTINUM | C90 | SZPICZAK MNOGI I NOWOTWORY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK PLAZMATYCZNYCH |
| 445. | VINCRISTINUM | C90.0 | SZPICZAK MNOGI |
| 446. | VINCRISTINUM | C90.1 | BIAŁACZKA PLAZMATYCZNAKOMÓRKOWA |
| 447. | VINCRISTINUM | C90.2 | POZASZPIKOWA POSTAĆ SZPICZAKA |
| 448. | VINCRISTINUM | C91 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 449. | VINCRISTINUM | C91.0 | OSTRA BIAŁACZKA LIMFOBLASTYCZNA |
| 450. | VINCRISTINUM | C91.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 451. | VINCRISTINUM | C91.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA LIMFOCYTOWA |
| 452. | VINCRISTINUM | C91.3 | BIAŁACZKA PROLIMFOCYTARNA |
| 453. | VINCRISTINUM | C91.4 | BIAŁACZKA WŁOCHATOKOMÓRKOWA (HAIRY-CELL) |
| 454. | VINCRISTINUM | C91.5 | BIAŁACZKA DOROSŁYCH Z KOMÓREK T |
| 455. | VINCRISTINUM | C91.7 | INNA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA |
| 456. | VINCRISTINUM | C91.9 | BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, NIEOKREŚLONA |
| 457. | VINCRISTINUM | C92 | BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 458. | VINCRISTINUM | C92.0 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 459. | VINCRISTINUM | C92.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 460. | VINCRISTINUM | C92.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 461. | VINCRISTINUM | C92.3 | MIEŚSAK SZPIKOWY |
| 462. | VINCRISTINUM | C92.4 | OSTRA BIAŁACZKA PROMIELOCYTOWA |
| 463. | VINCRISTINUM | C92.5 | OSTRA BIAŁACZKA SZPIKOWO-MONOCYTOWA |
| 464. | VINCRISTINUM | C92.7 | INNA BIAŁACZKA SZPIKOWA |
| 465. | VINCRISTINUM | C92.9 | BIAŁACZKA SZPIKOWA, NIEOKREŚLONA |
| 466. | VINCRISTINUM | C93 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 467. | VINCRISTINUM | C93.0 | OSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 468. | VINCRISTINUM | C93.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 469. | VINCRISTINUM | C93.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 470. | VINCRISTINUM | C93.7 | INNA BIAŁACZKA MONOCYTOWA |
| 471. | VINCRISTINUM | C93.9 | BIAŁACZKA MONOCYTOWA, NIEOKREŚLONA |
| 472. | VINCRISTINUM | C94 | INNE BIAŁACZKI OKREŚLONEGO RODZAJU |
| 473. | VINCRISTINUM | C94.0 | OSTRA CZERWIENICA I BIAŁACZKA ERYTROBLASTYCZNA (ERYTROLEUKEMIA) |
| 474. | VINCRISTINUM | C94.1 | PRZEWLEKŁA CZERWIENICA |
| 475. | VINCRISTINUM | C94.2 | OSTRA BIAŁACZKA MEGAKARIOBLASTYCZNA |
| 476. | VINCRISTINUM | C94.3 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 477. | VINCRISTINUM | C94.4 | OSTRA SZPIKOWICA UOGÓLNIONA |
| 478. | VINCRISTINUM | C94.5 | OSTRE ZWŁÓKNIENIE SZPIKU |
| 479. | VINCRISTINUM | C94.7 | INNA OKREŚLONA BIAŁACZKA |
| 480. | VINCRISTINUM | C95 | BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 481. | VINCRISTINUM | C95.0 | OSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 482. | VINCRISTINUM | C95.1 | PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 483. | VINCRISTINUM | C95.2 | PODOSTRA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 484. | VINCRISTINUM | C95.7 | INNA BIAŁACZKA Z KOMÓREK NIEOKREŚLONEGO RODZAJU |
| 485. | VINCRISTINUM | C95.9 | BIAŁACZKA, NIEOKREŚLONA |
| 486. | VINCRISTINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 487. | VINCRISTINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 488. | VINCRISTINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 489. | VINCRISTINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 490. | VINCRISTINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 491. | VINCRISTINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 492. | VINCRISTINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 493. | VINCRISTINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 494. | VINCRISTINUM | D00.2 | ŻOŁĄDEK |
| 495. | VINCRISTINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 496. | VINCRISTINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 497. | VINCRISTINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 498. | VINCRISTINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 499. | VINCRISTINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 500. | VINCRISTINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 501. | VINCRISTINUM | D01.5 | WĄTROBA, PĘCHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 502. | VINCRISTINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 503. | VINCRISTINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 504. | VINCRISTINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 505. | VINCRISTINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 506. | VINCRISTINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 507. | VINCRISTINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 508. | VINCRISTINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 509. | VINCRISTINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 510. | VINCRISTINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 511. | VINCRISTINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 512. | VINCRISTINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 513. | VINCRISTINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 514. | VINCRISTINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 515. | VINCRISTINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 516. | VINCRISTINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 517. | VINCRISTINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 518. | VINCRISTINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 519. | VINCRISTINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 520. | VINCRISTINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 521. | VINCRISTINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 522. | VINCRISTINUM | D07.1 | SROM |
| 523. | VINCRISTINUM | D07.2 | POCHWA |
| 524. | VINCRISTINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 525. | VINCRISTINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 526. | VINCRISTINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 527. | VINCRISTINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 528. | VINCRISTINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 529. | VINCRISTINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 530. | VINCRISTINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 531. | VINCRISTINUM | D09.2 | OKO |
| 532. | VINCRISTINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 533. | VINCRISTINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 534. | VINCRISTINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 535. | VINCRISTINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 536. | VINCRISTINUM | D10.0 | WARGA |
| 537. | VINCRISTINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 538. | VINCRISTINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 539. | VINCRISTINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 540. | VINCRISTINUM | D10.4 | MIGDAŁEK |
| 541. | VINCRISTINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 542. | VINCRISTINUM | D10.6 | CZEŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 543. | VINCRISTINUM | D10.7 | CZEŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 544. | VINCRISTINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 545. | VINCRISTINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 546. | VINCRISTINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 547. | VINCRISTINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 548. | VINCRISTINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 549. | VINCRISTINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICZY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 550. | VINCRISTINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 551. | VINCRISTINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 552. | VINCRISTINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 553. | VINCRISTINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 554. | VINCRISTINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 555. | VINCRISTINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 556. | VINCRISTINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 557. | VINCRISTINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 558. | VINCRISTINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 559. | VINCRISTINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 560. | VINCRISTINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 561. | VINCRISTINUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 562. | VINCRISTINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 563. | VINCRISTINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 564. | VINCRISTINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 565. | VINCRISTINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 566. | VINCRISTINUM | D13.5 | DROGI ŻÓLCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 567. | VINCRISTINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 568. | VINCRISTINUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 569. | VINCRISTINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 570. | VINCRISTINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 571. | VINCRISTINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 572. | VINCRISTINUM | D14.1 | KRTAŃ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 573. | VINCRISTINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 574. | VINCRISTINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 575. | VINCRISTINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 576. | VINCRISTINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 577. | VINCRISTINUM | D15.0 | GRASICA |
| 578. | VINCRISTINUM | D15.1 | SERCE |
| 579. | VINCRISTINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 580. | VINCRISTINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 581. | VINCRISTINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 582. | VINCRISTINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 583. | VINCRISTINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 584. | VINCRISTINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 585. | VINCRISTINUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 586. | VINCRISTINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 587. | VINCRISTINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 588. | VINCRISTINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 589. | VINCRISTINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 590. | VINCRISTINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 591. | VINCRISTINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 592. | VINCRISTINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 593. | VINCRISTINUM | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 594. | VINCRISTINUM | D18.0 | NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 595. | VINCRISTINUM | D18.1 | NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 596. | VINCRISTINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 597. | VINCRISTINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 598. | VINCRISTINUM | D20.1 | OTRZEWNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 599. | VINCRIStINUM | D21 | INNE NOWOTWORy NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 600. | VINCRIStINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 601. | VINCRIStINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 602. | VINCRIStINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 603. | VINCRIStINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 604. | VINCRIStINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 605. | VINCRIStINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 606. | VINCRIStINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 607. | VINCRIStINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 608. | VINCRIStINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWy NOWOTWÓR JAJNIKA |
| 609. | VINCRIStINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWy NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOwYCH |
| 610. | VINCRIStINUM | D28.0 | SROM |
| 611. | VINCRIStINUM | D28.1 | POCHWA |
| 612. | VINCRIStINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 613. | VINCRIStINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOwE |
| 614. | VINCRIStINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOwE, NIEOKREŚLONE |
| 615. | VINCRIStINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWy NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOwYCH |
| 616. | VINCRIStINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 617. | VINCRIStINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 618. | VINCRIStINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 619. | VINCRIStINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 620. | VINCRIStINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 621. | VINCRIStINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOwE |
| 622. | VINCRIStINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOwE, NIEOKREŚLONE |
| 623. | VINCRIStINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWy NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|--|
| 624. | VINCRISTINUM | D30.0 | NERKA |
| 625. | VINCRISTINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 626. | VINCRISTINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 627. | VINCRISTINUM | D30.3 | PĘCHERZ MOCZOWY |
| 628. | VINCRISTINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 629. | VINCRISTINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 630. | VINCRISTINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 631. | VINCRISTINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 632. | VINCRISTINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 633. | VINCRISTINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 634. | VINCRISTINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 635. | VINCRISTINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |
| 636. | VINCRISTINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 637. | VINCRISTINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 638. | VINCRISTINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 639. | VINCRISTINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 640. | VINCRISTINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 641. | VINCRISTINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 642. | VINCRISTINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 643. | VINCRISTINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 644. | VINCRISTINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 645. | VINCRISTINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 646. | VINCRISTINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 647. | VINCRISTINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 648. | VINCRISTINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 649. | VINCRISTINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 650. | VINCRISTINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 651. | VINCRISTINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 652. | VINCRISTINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 653. | VINCRISTINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 654. | VINCRISTINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 655. | VINCRISTINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 656. | VINCRISTINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 657. | VINCRISTINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 658. | VINCRISTINUM | D35.4 | SZYSZYNKĄ |
| 659. | VINCRISTINUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 660. | VINCRISTINUM | D35.6 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 661. | VINCRISTINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 662. | VINCRISTINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 663. | VINCRISTINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 664. | VINCRISTINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 665. | VINCRISTINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 666. | VINCRISTINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 667. | VINCRISTINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 668. | VINCRISTINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 669. | VINCRISTINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 670. | VINCRISTINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 671. | VINCRISTINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 672. | VINCRISTINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 673. | VINCRISTINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 674. | VINCRISTINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 675. | VINCRISTINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 676. | VINCRISTINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 677. | VINCRISTINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 678. | VINCRISTINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 679. | VINCRISTINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 680. | VINCRISTINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 681. | VINCRISTINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 682. | VINCRISTINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 683. | VINCRISTINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 684. | VINCRISTINUM | D38.4 | GRASICA |
| 685. | VINCRISTINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 686. | VINCRISTINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 687. | VINCRISTINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 688. | VINCRISTINUM | D39.0 | MACICA |
| 689. | VINCRISTINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 690. | VINCRISTINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 691. | VINCRISTINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 692. | VINCRISTINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 693. | VINCRISTINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 694. | VINCRISTINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 695. | VINCRISTINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 696. | VINCRISTINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 697. | VINCRISTINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 698. | VINCRISTINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 699. | VINCRISTINUM | D41.0 | NERKA |
| 700. | VINCRISTINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 701. | VINCRISTINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 702. | VINCRISTINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 703. | VINCRISTINUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 704. | VINCRISTINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 705. | VINCRISTINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 706. | VINCRISTINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 707. | VINCRISTINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 708. | VINCRISTINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 709. | VINCRISTINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 710. | VINCRISTINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 711. | VINCRISTINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 712. | VINCRISTINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 713. | VINCRISTINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 714. | VINCRISTINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 715. | VINCRISTINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 716. | VINCRISTINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 717. | VINCRISTINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 718. | VINCRISTINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 719. | VINCRISTINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 720. | VINCRISTINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 721. | VINCRISTINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 722. | VINCRISTINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 723. | VINCRISTINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 724. | VINCRISTINUM | D44.5 | SZYSZYŃKA |
| 725. | VINCRISTINUM | D44.6 | KLĘBEK SZYJNY |
| 726. | VINCRISTINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 727. | VINCRISTINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|--|------------|---|
| 728. | VINCRISTINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 729. | VINCRISTINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 730. | VINCRISTINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 731. | VINCRISTINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓTRZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE |
| 732. | VINCRISTINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 733. | VINCRISTINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 734. | VINCRISTINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 735. | VINCRISTINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 736. | VINCRISTINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 737. | VINCRISTINUM | D48.4 | OTRZEWNA |
| 738. | VINCRISTINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 739. | VINCRISTINUM | D48.6 | SUTEK |
| 740. | VINCRISTINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 741. | VINCRISTINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 742. | VINCRISTINUM | D69.3 | SAMOISTNA PŁAMICA MAŁOPLYTKOWA |
| 743. | VINCRISTINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 744. | VINCRISTINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |
| 745. | VINCRISTINUM | D76.2 | ZESPÓŁ HEMOFAGOCYTARNY ZWIĄZANY Z ZAKAŻENIEM |
| 746. | VINCRISTINUM | E85 | AMYLOIDOZA /SKROBIAWICA/ |
| 747. | VINCRISTINUM | E85.0 | SKROBIAWICE UKŁADOWE DZIEDZICZNE LUB RODZINNE,POSTAĆ NIE-NEUROPATYCZNA |
| 748. | VINCRISTINUM | E85.1 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA,POSTAĆ NEUROPATYCZNA |
| 749. | VINCRISTINUM | E85.2 | SKROBIAWICA UKŁADOWA DZIEDZICZNA LUB RODZINNA, NIEOKREŚLONA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 750. | VINCRISTINUM | E85.3 | WTÓRNE AMYLOIDOZY NARZĄDOWE |
| 751. | VINCRISTINUM | E85.4 | ZŁOKALIZOWANE (NARZĄDOWE) ODKŁADANIE SIĘ MAS SKROBIOWATYCH |
| 752. | VINCRISTINUM | E85.8 | INNE AMYLOIDOZY |
| 753. | VINCRISTINUM | E85.9 | AMYLOIDOZA, NIEOKREŚLONA |

Załącznik C.63.

VINORELBINUM

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 1. | VINORELBINUM | C00 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WARGI |
| 2. | VINORELBINUM | C00.0 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 3. | VINORELBINUM | C00.1 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 4. | VINORELBINUM | C00.2 | POWIERZCHNIA ZEWNĘTRZNA WARGI, NIEOKREŚLONA |
| 5. | VINORELBINUM | C00.3 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI GÓRNEJ |
| 6. | VINORELBINUM | C00.4 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI DOLNEJ |
| 7. | VINORELBINUM | C00.5 | POWIERZCHNIA WEWNĘTRZNA WARGI NIEOKREŚLONEJ (GÓRNA LUB DOLNA) |
| 8. | VINORELBINUM | C00.6 | SPOIDŁO WARGI |
| 9. | VINORELBINUM | C00.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI |
| 10. | VINORELBINUM | C00.9 | WARGA, NIEOKREŚLONA |
| 11. | VINORELBINUM | C01 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NASADY JĘZYKA |
| 12. | VINORELBINUM | C02 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JĘZYKA |
| 13. | VINORELBINUM | C02.0 | POWIERZCHNIA GRZBIETOWA JĘZYKA |
| 14. | VINORELBINUM | C02.1 | BRZEG JĘZYKA |
| 15. | VINORELBINUM | C02.2 | DOLNA POWIERZCHNIA JĘZYKA |
| 16. | VINORELBINUM | C02.3 | PRZEDNIE DWIE TRZECIE CZĘŚCI JĘZYKA, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 17. | VINORELBINUM | C02.4 | MIGDAŁEK JĘZYKOWY |
| 18. | VINORELBINUM | C02.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JĘZYKA |
| 19. | VINORELBINUM | C02.9 | JĘZYK, NIEOKREŚLONY |
| 20. | VINORELBINUM | C03 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DZIAŚŁA |
| 21. | VINORELBINUM | C03.0 | DZIAŚŁO GÓRNE |
| 22. | VINORELBINUM | C03.1 | DZIAŚŁO DOLNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|--|
| 23. | VINORELBINUM | C03.9 | DZIAŚŁO, NIEOKREŚLONE |
| 24. | VINORELBINUM | C04 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY DNA JAMY USTNEJ |
| 25. | VINORELBINUM | C04.0 | PRZEDNIA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 26. | VINORELBINUM | C04.1 | BOCZNA CZĘŚĆ DNA JAMY USTNEJ |
| 27. | VINORELBINUM | C04.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DNA JAMY USTNEJ |
| 28. | VINORELBINUM | C04.9 | DNO JAMY USTNEJ, NIEOKREŚLONE |
| 29. | VINORELBINUM | C05 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PODNIEBIENIA |
| 30. | VINORELBINUM | C05.0 | PODNIEBIENIE TWARDE |
| 31. | VINORELBINUM | C05.1 | PODNIEBIENIE MIĘKKIE |
| 32. | VINORELBINUM | C05.2 | JĘZYCZEK |
| 33. | VINORELBINUM | C05.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PODNIEBIENIA MIĘKKIEGO |
| 34. | VINORELBINUM | C05.9 | PODNIEBIENIE, NIEOKREŚLONE |
| 35. | VINORELBINUM | C06 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 36. | VINORELBINUM | C06.0 | ŚLUZÓWKA POLICZKA |
| 37. | VINORELBINUM | C06.1 | PRZEDSIONEK JAMY USTNEJ |
| 38. | VINORELBINUM | C06.2 | PRZESTRZEŃ ZATRZONOWA |
| 39. | VINORELBINUM | C06.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 40. | VINORELBINUM | C06.9 | JAMA USTNA, NIEOKREŚLONA |
| 41. | VINORELBINUM | C07 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚLINIANKI PRZYUSZNEJ |
| 42. | VINORELBINUM | C08 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 43. | VINORELBINUM | C08.0 | ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA |
| 44. | VINORELBINUM | C08.1 | ŚLINIANKA PODJĘZYKOWA |
| 45. | VINORELBINUM | C08.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 46. | VINORELBINUM | C08.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 47. | VINORELBINUM | C09 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE MIGDAŁKA |
| 48. | VINORELBINUM | C09.0 | DÓŁ MIGDAŁKOWY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----|---|------------|---|
| 49. | VINORELBINUM | C09.1 | ŁUKI PODNIEBIENNE (PODNIEBIENNO-JĘZYKOWY) (PODNIEBIENNO-GARDŁOWY) |
| 50. | VINORELBINUM | C09.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MIGDAŁKA |
| 51. | VINORELBINUM | C09.9 | MIGDAŁEK, NIEOKREŚLONY |
| 52. | VINORELBINUM | C10 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA (OROPHARYNX) |
| 53. | VINORELBINUM | C10.0 | DOLINKA NAGŁOŚNIOWA |
| 54. | VINORELBINUM | C10.1 | PRZEDNIA POWIERZCHNIA NAGŁOŚNI |
| 55. | VINORELBINUM | C10.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 56. | VINORELBINUM | C10.3 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 57. | VINORELBINUM | C10.4 | SZCZELINA SKRZELOWA |
| 58. | VINORELBINUM | C10.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI USTNEJ GARDŁA |
| 59. | VINORELBINUM | C10.9 | CZĘŚĆ USTNA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 60. | VINORELBINUM | C11 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA (NASOPHARYNX) |
| 61. | VINORELBINUM | C11.0 | ŚCIANA GÓRNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 62. | VINORELBINUM | C11.1 | ŚCIANA TYLNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 63. | VINORELBINUM | C11.2 | ŚCIANA BOCZNA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 64. | VINORELBINUM | C11.3 | ŚCIANA PRZEDNIA CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 65. | VINORELBINUM | C11.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE CZĘŚCI NOSOWEJ GARDŁA |
| 66. | VINORELBINUM | C11.9 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 67. | VINORELBINUM | C12 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZCHYLKU GRUSZKOWATEGO |
| 68. | VINORELBINUM | C13 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA (HYPOPHARYNX) |
| 69. | VINORELBINUM | C13.0 | OKOLICA PŁYTKI CHRZĄSTKI PIERŚCIENIOWATEJ |
| 70. | VINORELBINUM | C13.1 | FAŁD NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWY I POWIERZCHNIA GARDŁOWA FAŁDU NALEWKOWO-NAGŁOŚNIOWEGO |
| 71. | VINORELBINUM | C13.2 | TYLNA ŚCIANA CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 72. | VINORELBINUM | C13.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE CZĘŚCI KRTANIOWEJ GARDŁA |
| 73. | VINORELBINUM | C13.9 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA, NIEOKREŚLONA |
| 74. | VINORELBINUM | C14 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY O INNYM I O BLIŻEJ NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU W OBRĘBIE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 75. | VINORELBINUM | C14.0 | GARDŁO O UMIEJSCOWIENIU NIEOKREŚLONYM |
| 76. | VINORELBINUM | C14.2 | PIERŚCIEŃ CHŁONNY GARDŁOWY WALDEYERA |
| 77. | VINORELBINUM | C14.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE WARGI, JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 78. | VINORELBINUM | C16 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŻOŁĄDKA |
| 79. | VINORELBINUM | C16.0 | WPUST |
| 80. | VINORELBINUM | C16.1 | DNO ŻOŁĄDKA |
| 81. | VINORELBINUM | C16.2 | TRZON ŻOŁĄDKA |
| 82. | VINORELBINUM | C16.3 | UJŚCIE ODŹWIERNIKA |
| 83. | VINORELBINUM | C16.4 | ODŹWIERNIK |
| 84. | VINORELBINUM | C16.5 | KRZYWIZNA MNIEJSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 85. | VINORELBINUM | C16.6 | KRZYWIZNA WIĘKSZA ŻOŁĄDKA, NIEOKREŚLONA |
| 86. | VINORELBINUM | C16.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻOŁĄDKA |
| 87. | VINORELBINUM | C16.9 | ŻOŁĄDEK, NIEOKREŚLONY |
| 88. | VINORELBINUM | C17 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 89. | VINORELBINUM | C17.0 | DWUNASTNICA |
| 90. | VINORELBINUM | C17.1 | JELITO CZCZE |
| 91. | VINORELBINUM | C17.2 | JELITO KRĘTE |
| 92. | VINORELBINUM | C17.3 | UCHYLEK MECKELA |
| 93. | VINORELBINUM | C17.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE JELITA CIENKIEGO |
| 94. | VINORELBINUM | C17.9 | JELITO CIENKIE, NIEOKREŚLONE |
| 95. | VINORELBINUM | C18 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO |
| 96. | VINORELBINUM | C18.0 | JELITO ŚLEPE |
| 97. | VINORELBINUM | C18.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 98. | VINORELBINUM | C18.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 99. | VINORELBINUM | C18.3 | ZGIĘCIE WĄTROBOWE |
| 100. | VINORELBINUM | C18.4 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 101. | VINORELBINUM | C18.5 | ZGIĘCIE ŚLEDZIONOWE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 102. | VINORELBINUM | C18.6 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 103. | VINORELBINUM | C18.7 | ESICA |
| 104. | VINORELBINUM | C18.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKRĘŻNICY |
| 105. | VINORELBINUM | C18.9 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 106. | VINORELBINUM | C19 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZGIĘCIA ESICZO-ODBYTNICZEGO |
| 107. | VINORELBINUM | C20 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTNICY |
| 108. | VINORELBINUM | C21 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 109. | VINORELBINUM | C21.0 | ODBYT, NIEOKREŚLONY |
| 110. | VINORELBINUM | C21.1 | KANAŁ ODBYTU |
| 111. | VINORELBINUM | C21.2 | STREFA KLOAKOGENNA |
| 112. | VINORELBINUM | C21.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 113. | VINORELBINUM | C22 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 114. | VINORELBINUM | C22.0 | RAK KOMÓREK WĄTROBY |
| 115. | VINORELBINUM | C22.1 | RAK PRZEWODÓW ŻÓLCIOWYCH WEWNĄTRZWĄTROBOWYCH |
| 116. | VINORELBINUM | C22.2 | WĄTROBIAK ZARODKOWY (HEPATOBLASTOMA) |
| 117. | VINORELBINUM | C22.3 | MIĘSAK NACZYNIOWY WĄTROBY |
| 118. | VINORELBINUM | C22.4 | INNE MIĘSAKI WĄTROBY |
| 119. | VINORELBINUM | C22.7 | INNE NIEOKREŚLONE RAKI WĄTROBY |
| 120. | VINORELBINUM | C22.9 | WĄTROBA, NIEOKREŚLONA |
| 121. | VINORELBINUM | C23 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCHERZYKA ŻÓLCIOWEGO |
| 122. | VINORELBINUM | C24 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 123. | VINORELBINUM | C24.0 | ZEWNĄTRZWĄTROBOWE DROGI ŻÓLCIOWE |
| 124. | VINORELBINUM | C24.1 | BRODAWKA WIĘKSZA DWUNASTNICY VATERA |
| 125. | VINORELBINUM | C24.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE DRÓG ŻÓLCIOWYCH |
| 126. | VINORELBINUM | C24.9 | DROGI ŻÓLCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 127. | VINORELBINUM | C25 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZUSTKI |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 128. | VINORELBINUM | C25.0 | GŁOWA TRZUSTKI |
| 129. | VINORELBINUM | C25.1 | TRZON TRZUSTKI |
| 130. | VINORELBINUM | C25.2 | OGON TRZUSTKI |
| 131. | VINORELBINUM | C25.3 | PRZEWÓD TRZUSTKOWY |
| 132. | VINORELBINUM | C25.4 | CZĘŚĆ WEWNĄTRZWYDZIELNICZA TRZUSTKI |
| 133. | VINORELBINUM | C25.7 | INNA CZĘŚĆ TRZUSTKI |
| 134. | VINORELBINUM | C25.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZUSTKI |
| 135. | VINORELBINUM | C25.9 | TRZUSTKA, NIEOKREŚLONA |
| 136. | VINORELBINUM | C26 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 137. | VINORELBINUM | C26.0 | PRZEWÓD POKARMOWY, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 138. | VINORELBINUM | C26.1 | ŚLEDZIONA |
| 139. | VINORELBINUM | C26.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 140. | VINORELBINUM | C26.9 | CZĘŚĆ UKŁADU TRAWIENNEGO NIEDOKŁADNIEOKREŚLONA |
| 141. | VINORELBINUM | C30 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAMY NOSOWEJ I UCHA ŚRODKOWEGO |
| 142. | VINORELBINUM | C30.0 | JAMA NOSOWA |
| 143. | VINORELBINUM | C30.1 | UCHO ŚRODKOWE |
| 144. | VINORELBINUM | C31 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 145. | VINORELBINUM | C31.0 | ZATOKA SZCZĘKOWA |
| 146. | VINORELBINUM | C31.1 | KOMÓRKI SITOWE |
| 147. | VINORELBINUM | C31.2 | ZATOKA CZOŁOWA |
| 148. | VINORELBINUM | C31.3 | ZATOKA KLINOWA |
| 149. | VINORELBINUM | C31.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ZATOK PRZYNOSOWYCH |
| 150. | VINORELBINUM | C31.9 | ZATOKA PRZYNOSOWA, NIEOKREŚLONA |
| 151. | VINORELBINUM | C33 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TCHAWICY |
| 152. | VINORELBINUM | C34 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OSKRZELA I PŁUCA |
| 153. | VINORELBINUM | C34.0 | OSKRZELE GŁÓWNE |
| 154. | VINORELBINUM | C34.1 | PŁAT GÓRNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE GÓRNE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 155. | VINORELBINUM | C34.2 | PLAT ŚRODKOWY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE ŚRODKOWE |
| 156. | VINORELBINUM | C34.3 | PLAT DOLNY PŁUCA LUB OSKRZELE PŁATOWE DOLNE |
| 157. | VINORELBINUM | C34.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OSKRZELA I PŁUCA |
| 158. | VINORELBINUM | C34.9 | OSKRZELE LUB PŁUCO, NIEOKREŚLONE |
| 159. | VINORELBINUM | C37 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRASICY |
| 160. | VINORELBINUM | C38 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 161. | VINORELBINUM | C38.0 | SERCE |
| 162. | VINORELBINUM | C38.1 | SRÓDPIERSIE PRZEDNIE |
| 163. | VINORELBINUM | C38.2 | SRÓDPIERSIE TYLNE |
| 164. | VINORELBINUM | C38.3 | SRÓDPIERSIE, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 165. | VINORELBINUM | C38.4 | OPLUCNA |
| 166. | VINORELBINUM | C38.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SERCA, ŚRÓDPIERSIA I OPLUCNEJ |
| 167. | VINORELBINUM | C39 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 168. | VINORELBINUM | C39.0 | GÓRNA CZĘŚĆ DRÓG ODDECHOWYCH, CZĘŚĆ NIEOKREŚLONA |
| 169. | VINORELBINUM | C39.8 | ZMIANY PRZEKRACZAJĄCE GRANICE UKŁADU ODDECHOWEGO I NARZĄDÓW WNETRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 170. | VINORELBINUM | C39.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE W OBRĘBIE UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 171. | VINORELBINUM | C40 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 172. | VINORELBINUM | C40.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 173. | VINORELBINUM | C40.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 174. | VINORELBINUM | C40.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 175. | VINORELBINUM | C40.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 176. | VINORELBINUM | C40.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ KOŃCZYN |
| 177. | VINORELBINUM | C40.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE KOŃCZYN, NIEOKREŚLONE |
| 178. | VINORELBINUM | C41 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 179. | VINORELBINUM | C41.0 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 180. | VINORELBINUM | C41.1 | ŻUCHWA |
| 181. | VINORELBINUM | C41.2 | KOŚCI KRĘGOSŁUPA |
| 182. | VINORELBINUM | C41.3 | KOŚCI ŻEBRA, MOSTKA I OBOJCZYKA |
| 183. | VINORELBINUM | C41.4 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 184. | VINORELBINUM | C41.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWEJ |
| 185. | VINORELBINUM | C41.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 186. | VINORELBINUM | C43 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 187. | VINORELBINUM | C43.0 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY WARGI |
| 188. | VINORELBINUM | C43.1 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY POWIEKI, ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 189. | VINORELBINUM | C43.2 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 190. | VINORELBINUM | C43.3 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 191. | VINORELBINUM | C43.4 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SKÓRY SZYI |
| 192. | VINORELBINUM | C43.5 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY TUŁOWIA |
| 193. | VINORELBINUM | C43.6 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 194. | VINORELBINUM | C43.7 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 195. | VINORELBINUM | C43.8 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY PRZEKRACZAJĄCY WYŻEJ OKREŚLONE GRANICE |
| 196. | VINORELBINUM | C43.9 | CZERNIAK ZŁOŚLIWY SKÓRY, NIEOKREŚLONY |
| 197. | VINORELBINUM | C46 | MIĘSAK KAPOSI' EGO |
| 198. | VINORELBINUM | C46.0 | MIĘSAK KAPOSI' EGO SKÓRY |
| 199. | VINORELBINUM | C46.1 | MIĘSAK KAPOSI' EGO TKANKI MIĘKKIEJ |
| 200. | VINORELBINUM | C46.2 | MIĘSAK KAPOSI' EGO PODNIEBIENIA |
| 201. | VINORELBINUM | C46.3 | MIĘSAK KAPOSI' EGO WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 202. | VINORELBINUM | C46.7 | MIĘSAK KAPOSI' EGO INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 203. | VINORELBINUM | C46.8 | MIĘSAK KAPOSI' EGO LICZNYCH NARZĄDÓW |
| 204. | VINORELBINUM | C46.9 | MIĘSAK KAPOSI' EGO, NIEOKREŚLONY |
| 205. | VINORELBINUM | C47 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 206. | VINORELBINUM | C47.0 | NERWY OBWODOWE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 207. | VINORELBINUM | C47.1 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 208. | VINORELBINUM | C47.2 | NERWY OBWODOWE KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 209. | VINORELBINUM | C47.3 | NERWY OBWODOWE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 210. | VINORELBINUM | C47.4 | NERWY OBWODOWE BRZUCHA |
| 211. | VINORELBINUM | C47.5 | NERWY OBWODOWE MIEDNICY |
| 212. | VINORELBINUM | C47.6 | NERWY OBWODOWE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 213. | VINORELBINUM | C47.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE NERWÓW OBWODOWYCH I AUTONOMICZNEGO UKŁADU NERWOWEGO |
| 214. | VINORELBINUM | C47.9 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 215. | VINORELBINUM | C48 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 216. | VINORELBINUM | C48.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 217. | VINORELBINUM | C48.1 | OKREŚLONA CZĘŚĆ OTRZEWNEJ |
| 218. | VINORELBINUM | C48.2 | OTRZEWNA, NIEOKREŚLONA |
| 219. | VINORELBINUM | C48.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ I OTRZEWNEJ |
| 220. | VINORELBINUM | C49 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 221. | VINORELBINUM | C49.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 222. | VINORELBINUM | C49.1 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 223. | VINORELBINUM | C49.2 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 224. | VINORELBINUM | C49.3 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 225. | VINORELBINUM | C49.4 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA BRZUCHA |
| 226. | VINORELBINUM | C49.5 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA MIEDNICY |
| 227. | VINORELBINUM | C49.6 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA TUŁOWIA, NIEOKREŚLONA |
| 228. | VINORELBINUM | C49.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TKANKI ŁĄCZNEJ I TKANKI MIĘKKIEJ |
| 229. | VINORELBINUM | C49.9 | TKANKA ŁĄCZNA I TKANKA MIĘKKA, NIEOKREŚLONE |
| 230. | VINORELBINUM | C50 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SUTKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 231. | VINORELBINUM | C50.0 | BRODAWKA I OTOCZKA BRODAWKI SUTKOWEJ |
| 232. | VINORELBINUM | C50.1 | CENTRALNA CZĘŚĆ SUTKA |
| 233. | VINORELBINUM | C50.2 | ĆWIARTKA GÓRNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 234. | VINORELBINUM | C50.3 | ĆWIARTKA DOLNA WEWNĘTRZNA SUTKA |
| 235. | VINORELBINUM | C50.4 | ĆWIARTKA GÓRNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 236. | VINORELBINUM | C50.5 | ĆWIARTKA DOLNA ZEWNĘTRZNA SUTKA |
| 237. | VINORELBINUM | C50.6 | CZĘŚĆ PACHOWA SUTKA |
| 238. | VINORELBINUM | C50.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SUTKA |
| 239. | VINORELBINUM | C50.9 | SUTEK, NIEOKREŚLONY |
| 240. | VINORELBINUM | C51 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SROMU |
| 241. | VINORELBINUM | C51.0 | WARGI SROMOWE WIĘKSZE |
| 242. | VINORELBINUM | C51.1 | WARGI SROMOWE MNIEJSZE |
| 243. | VINORELBINUM | C51.2 | ŁECHTACZKA |
| 244. | VINORELBINUM | C51.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE SROMU |
| 245. | VINORELBINUM | C51.9 | SROM, NIEOKREŚLONE |
| 246. | VINORELBINUM | C52 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY POCHWY |
| 247. | VINORELBINUM | C53 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SZYJKI MACICY |
| 248. | VINORELBINUM | C53.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 249. | VINORELBINUM | C53.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 250. | VINORELBINUM | C53.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICĘ SZYJKI MACICY |
| 251. | VINORELBINUM | C53.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 252. | VINORELBINUM | C54 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TRZONU MACICY |
| 253. | VINORELBINUM | C54.0 | CIEŚŃ MACICY |
| 254. | VINORELBINUM | C54.1 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 255. | VINORELBINUM | C54.2 | MIĘŚNIÓWKA MACICY |
| 256. | VINORELBINUM | C54.3 | DNO MACICY |
| 257. | VINORELBINUM | C54.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE TRZONU MACICY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 258. | VINORELBINUM | C54.9 | TRZON MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 259. | VINORELBINUM | C55 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NIEOKREŚLONEJ CZĘŚCI MACICY |
| 260. | VINORELBINUM | C56 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 261. | VINORELBINUM | C57 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 262. | VINORELBINUM | C57.0 | TRĄBKA FALLOPIA |
| 263. | VINORELBINUM | C57.1 | WIĘZADŁO SZEROKIE MACICY |
| 264. | VINORELBINUM | C57.2 | WIĘZADŁO OBŁE MACICY |
| 265. | VINORELBINUM | C57.3 | PRZYMATICZA |
| 266. | VINORELBINUM | C57.4 | PRZYDATKI MACICY, NIEOKREŚLONE |
| 267. | VINORELBINUM | C57.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 268. | VINORELBINUM | C57.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 269. | VINORELBINUM | C57.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 270. | VINORELBINUM | C61 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY GRUCZOŁU KROKOWEGO |
| 271. | VINORELBINUM | C62 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JĄDRA |
| 272. | VINORELBINUM | C62.0 | JĄDRO NIEZSTĄPIONE |
| 273. | VINORELBINUM | C62.1 | JĄDRO ZSTĄPIONE |
| 274. | VINORELBINUM | C62.9 | JĄDRO, NIEOKREŚLONE |
| 275. | VINORELBINUM | C63 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 276. | VINORELBINUM | C63.0 | NAJĄDRZE |
| 277. | VINORELBINUM | C63.1 | POWRÓZEK NASIENNY |
| 278. | VINORELBINUM | C63.2 | MOSZNA |
| 279. | VINORELBINUM | C63.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 280. | VINORELBINUM | C63.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 281. | VINORELBINUM | C63.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 282. | VINORELBINUM | C64 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI, Z WYJĄTKIEM MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 283. | VINORELBINUM | C65 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MIEDNICZKI NERKOWEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 284. | VINORELBINUM | C66 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MOCZOWODU |
| 285. | VINORELBINUM | C67 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 286. | VINORELBINUM | C67.0 | TRÓJKĄT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 287. | VINORELBINUM | C67.1 | SZCZYT PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 288. | VINORELBINUM | C67.2 | ŚCIANA BOCZNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 289. | VINORELBINUM | C67.3 | ŚCIANA PRZEDNIA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 290. | VINORELBINUM | C67.4 | ŚCIANA TYLNA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 291. | VINORELBINUM | C67.5 | SZYJA PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 292. | VINORELBINUM | C67.6 | UJŚCIE MOCZOWODU |
| 293. | VINORELBINUM | C67.7 | MOCZOWNIK |
| 294. | VINORELBINUM | C67.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE PĘCZERZA MOCZOWEGO |
| 295. | VINORELBINUM | C67.9 | PĘCZERZ MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 296. | VINORELBINUM | C68 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 297. | VINORELBINUM | C68.0 | CEWKA MOCZOWA |
| 298. | VINORELBINUM | C68.1 | GRUCZOŁY CEWKI MOCZOWEJ |
| 299. | VINORELBINUM | C68.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE UKŁADU MOCZOWEGO |
| 300. | VINORELBINUM | C68.9 | UKŁAD MOCZOWY, NIEOKREŚLONY |
| 301. | VINORELBINUM | C69 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OKA |
| 302. | VINORELBINUM | C69.0 | SPOJÓWKA |
| 303. | VINORELBINUM | C69.1 | ROGÓWKA |
| 304. | VINORELBINUM | C69.2 | SIATKÓWKA |
| 305. | VINORELBINUM | C69.3 | NACZYNIÓWKA |
| 306. | VINORELBINUM | C69.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 307. | VINORELBINUM | C69.5 | GRUCZOŁ I DROGI ŁZOWE |
| 308. | VINORELBINUM | C69.6 | OCZODÓŁ |
| 309. | VINORELBINUM | C69.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE OKA |
| 310. | VINORELBINUM | C69.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 311. | VINORELBINUM | C70 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPON |
| 312. | VINORELBINUM | C70.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 313. | VINORELBINUM | C70.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 314. | VINORELBINUM | C70.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 315. | VINORELBINUM | C71 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU |
| 316. | VINORELBINUM | C71.0 | MÓZG Z WYJĄTKIEM PŁATÓW I KOMÓR |
| 317. | VINORELBINUM | C71.1 | PŁAT CZOŁOWY |
| 318. | VINORELBINUM | C71.2 | PŁAT SKRONIOWY |
| 319. | VINORELBINUM | C71.3 | PŁAT CIEMIENOWY |
| 320. | VINORELBINUM | C71.4 | PŁAT POTYLICZNY |
| 321. | VINORELBINUM | C71.5 | KOMORY MÓZGOWE |
| 322. | VINORELBINUM | C71.6 | MÓZDŻEK |
| 323. | VINORELBINUM | C71.7 | PIEŃ MÓZGU |
| 324. | VINORELBINUM | C71.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU |
| 325. | VINORELBINUM | C71.9 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 326. | VINORELBINUM | C72 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY RDZENIA KRĘGOWEGO, NERWÓW CZASZKOWYCH I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 327. | VINORELBINUM | C72.0 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 328. | VINORELBINUM | C72.1 | OGON KOŃSKI |
| 329. | VINORELBINUM | C72.2 | NERW WĘCHOWY |
| 330. | VINORELBINUM | C72.3 | NERW WZROKOWY |
| 331. | VINORELBINUM | C72.4 | NERW PRZEDSIONKOWO-ŚLIMAKOWY |
| 332. | VINORELBINUM | C72.5 | INNE I NIEOKREŚLONE NERWY CZASZKOWE |
| 333. | VINORELBINUM | C72.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 334. | VINORELBINUM | C72.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 335. | VINORELBINUM | C73 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TARCZYCY |
| 336. | VINORELBINUM | C74 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 337. | VINORELBINUM | C74.0 | KORA NADNERCZY |
| 338. | VINORELBINUM | C74.1 | RDZEŃ NADNERCZY |
| 339. | VINORELBINUM | C74.9 | NADNERCZE, NIEOKREŚLONE |
| 340. | VINORELBINUM | C75 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO I STRUKTUR POKREWNYCH |
| 341. | VINORELBINUM | C75.0 | GRUCZOŁ PRZYTARCZOWY |
| 342. | VINORELBINUM | C75.1 | PRZYSADKA GRUCZOŁOWA |
| 343. | VINORELBINUM | C75.2 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 344. | VINORELBINUM | C75.3 | SZYSZYNKA |
| 345. | VINORELBINUM | C75.4 | KLĘBEK SZYJNY |
| 346. | VINORELBINUM | C75.5 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 347. | VINORELBINUM | C75.8 | ZAJĘCIE WIELU GRUCZOŁÓW DOKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 348. | VINORELBINUM | C75.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 349. | VINORELBINUM | C76 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY UMIEJSCOWIEŃ INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH |
| 350. | VINORELBINUM | C76.0 | GŁOWA, TWARZ I SZYJA |
| 351. | VINORELBINUM | C76.1 | KLATKA PIERSIOWA |
| 352. | VINORELBINUM | C76.2 | BRZUCH |
| 353. | VINORELBINUM | C76.3 | MIEDNICA |
| 354. | VINORELBINUM | C76.4 | KOŃCZYNA GÓRNA |
| 355. | VINORELBINUM | C76.5 | KOŃCZYNA DOLNA |
| 356. | VINORELBINUM | C76.7 | INNE NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 357. | VINORELBINUM | C76.8 | ZMIANA PRZEKRACZAJĄCA GRANICE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 358. | VINORELBINUM | C77 | WTÓRNE I NIEOKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE WĘZŁÓW CHŁONNYCH |
| 359. | VINORELBINUM | C77.0 | WĘZŁY CHŁONNE GŁOWY, TWARZY I SZYI |
| 360. | VINORELBINUM | C77.1 | WĘZŁY CHŁONNE WNEŹRZA KLATKI PIERSIOWEJ |
| 361. | VINORELBINUM | C77.2 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ JAMY BRZUSZNEJ |
| 362. | VINORELBINUM | C77.3 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY GÓRNEJ I PACHY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 363. | VINORELBINUM | C77.4 | WĘZŁY CHŁONNE KOŃCZYNY DOLNEJ I PACHWINY |
| 364. | VINORELBINUM | C77.5 | WĘZŁY CHŁONNE WEWNĄTRZ MIEDNICY |
| 365. | VINORELBINUM | C77.8 | WĘZŁY CHŁONNE MNOGICH REGIONÓW |
| 366. | VINORELBINUM | C77.9 | WĘZŁY CHŁONNE, NIEOKREŚLONE |
| 367. | VINORELBINUM | C78 | WTÓRNE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE UKŁADU ODDECHOWEJ I TRAWIENNEGO |
| 368. | VINORELBINUM | C78.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PŁUC |
| 369. | VINORELBINUM | C78.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY ŚRÓDPIERSIA |
| 370. | VINORELBINUM | C78.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OPŁUCNEJ |
| 371. | VINORELBINUM | C78.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW ODDECHOWYCH |
| 372. | VINORELBINUM | C78.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA CIENKIEGO |
| 373. | VINORELBINUM | C78.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JELITA GRUBEGO I ODBYTNICY |
| 374. | VINORELBINUM | C78.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOWEJ |
| 375. | VINORELBINUM | C78.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY WĄTROBY |
| 376. | VINORELBINUM | C78.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI PRZEWODU POKARMOWEGO |
| 377. | VINORELBINUM | C79 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 378. | VINORELBINUM | C79.0 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NERKI I MIEDNICZKI NERKOWEJ |
| 379. | VINORELBINUM | C79.1 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY PĘCZERZA ORAZ INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |
| 380. | VINORELBINUM | C79.2 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY SKÓRY |
| 381. | VINORELBINUM | C79.3 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY MÓZGU I OPON MÓZGOWYCH |
| 382. | VINORELBINUM | C79.4 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU NERWOWEGO |
| 383. | VINORELBINUM | C79.5 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY KOŚCI I SZPIKU KOSTNEGO |
| 384. | VINORELBINUM | C79.6 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY JAJNIKA |
| 385. | VINORELBINUM | C79.7 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY NADNERCZY |
| 386. | VINORELBINUM | C79.8 | WTÓRNY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 387. | VINORELBINUM | C80 | NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY BEZ OKREŚLENIA JEGO UMIEJSCOWIENIA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 388. | VINORELBINUM | C81 | CHOROBA HODGKINA |
| 389. | VINORELBINUM | C81.0 | PRZEWAGA LIMFOCYTÓW |
| 390. | VINORELBINUM | C81.1 | STWARDNIENIE GUZKOWE |
| 391. | VINORELBINUM | C81.2 | MIESZANOKOMÓRKOWA |
| 392. | VINORELBINUM | C81.3 | ZMNIEJSZENIE LIMFOCYTÓW |
| 393. | VINORELBINUM | C81.7 | INNA CHOROBA HODGKINA |
| 394. | VINORELBINUM | C81.9 | CHOROBA HODGKINA, NIEOKREŚLONA |
| 395. | VINORELBINUM | C96 | INNY I NIEOKREŚLONY NOWOTWÓR ZŁOŚLIWY TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 396. | VINORELBINUM | C96.0 | CHOROBA LETTERERA-SIWEGO |
| 397. | VINORELBINUM | C96.1 | HISTIOCYTOZA ZŁOŚLIWA |
| 398. | VINORELBINUM | C96.2 | GUZY ZŁOŚLIWE Z KOMÓREK TUCZNYCH |
| 399. | VINORELBINUM | C96.3 | PRAWDZIWY CHŁONIAK HISTIOCYTARNY |
| 400. | VINORELBINUM | C96.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I TKANEK POKREWNYCH |
| 401. | VINORELBINUM | C96.9 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE TKANKI LIMFATYCZNEJ, KRWIOTWÓRCZEJ I POKREWNYCH, NIEOKREŚLONE |
| 402. | VINORELBINUM | C97 | NOWOTWORY ZŁOŚLIWE NIEZALEŻNYCH (PIERWOTNYCH) MNOGICH UMIEJSCOWIEŃ |
| 403. | VINORELBINUM | D00.2 | ŻOŁĄDEK |
| 404. | VINORELBINUM | D01 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 405. | VINORELBINUM | D01.0 | OKRĘŻNICA |
| 406. | VINORELBINUM | D01.1 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |
| 407. | VINORELBINUM | D01.2 | ODBYTNICA |
| 408. | VINORELBINUM | D01.3 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 409. | VINORELBINUM | D01.4 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA |
| 410. | VINORELBINUM | D01.5 | WĄTROBA, PEČHERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 411. | VINORELBINUM | D01.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 412. | VINORELBINUM | D01.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 413. | VINORELBINUM | D03 | CZERNIAK IN SITU |
| 414. | VINORELBINUM | D03.0 | CZERNIAK IN SITU WARGI |
| 415. | VINORELBINUM | D03.1 | CZERNIAK IN SITU POWIEKI ŁĄCZNIE Z KĄTEM OKA |
| 416. | VINORELBINUM | D03.2 | CZERNIAK IN SITU UCHA I PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO |
| 417. | VINORELBINUM | D03.3 | CZERNIAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI TWARZY |
| 418. | VINORELBINUM | D03.4 | CZERNIAK IN SITU SKÓRY OWŁOSIONEJ GŁOWY I SZYI |
| 419. | VINORELBINUM | D03.5 | CZERNIAK IN SITU TUŁOWIA |
| 420. | VINORELBINUM | D03.6 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY GÓRNEJ ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 421. | VINORELBINUM | D03.7 | CZERNIAK IN SITU KOŃCZYNY DOLNEJ ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 422. | VINORELBINUM | D03.8 | CZERNIAK IN SITU INNYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 423. | VINORELBINUM | D03.9 | CZERNIAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 424. | VINORELBINUM | D06 | RAK IN SITU SZYJKI MACICY |
| 425. | VINORELBINUM | D06.0 | BŁONA ŚLUZOWA SZYJKI MACICY |
| 426. | VINORELBINUM | D06.1 | BŁONA ZEWNĘTRZNA SZYJKI MACICY |
| 427. | VINORELBINUM | D06.7 | INNA CZĘŚĆ SZYJKI MACICY |
| 428. | VINORELBINUM | D06.9 | SZYJKA MACICY, NIEOKREŚLONA |
| 429. | VINORELBINUM | D07 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 430. | VINORELBINUM | D07.0 | BŁONA ŚLUZOWA MACICY |
| 431. | VINORELBINUM | D07.1 | SROM |
| 432. | VINORELBINUM | D07.2 | POCHWA |
| 433. | VINORELBINUM | D07.3 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE ŻEŃSKIE |
| 434. | VINORELBINUM | D07.4 | PRĄCIE |
| 435. | VINORELBINUM | D07.5 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 436. | VINORELBINUM | D07.6 | INNE I NIEOKREŚLONE NARZĄDY PŁCIOWE MĘSKIE |
| 437. | VINORELBINUM | D09 | RAK IN SITU INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 438. | VINORELBINUM | D09.0 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 439. | VINORELBINUM | D09.1 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU MOCZOWEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 440. | VINORELBINUM | D09.2 | OKO |
| 441. | VINORELBINUM | D09.3 | TARCZYCA I INNE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 442. | VINORELBINUM | D09.7 | RAK IN SITU INNYCH OKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 443. | VINORELBINUM | D09.9 | RAK IN SITU, NIEOKREŚLONY |
| 444. | VINORELBINUM | D10 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY JAMY USTNEJ I GARDŁA |
| 445. | VINORELBINUM | D10.0 | WARGA |
| 446. | VINORELBINUM | D10.1 | JĘZYK |
| 447. | VINORELBINUM | D10.2 | DNO JAMY USTNEJ |
| 448. | VINORELBINUM | D10.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JAMY USTNEJ |
| 449. | VINORELBINUM | D10.4 | MIGDALEK |
| 450. | VINORELBINUM | D10.5 | INNE STRUKTURY USTNO-GARDŁOWE |
| 451. | VINORELBINUM | D10.6 | CZĘŚĆ NOSOWA GARDŁA |
| 452. | VINORELBINUM | D10.7 | CZĘŚĆ KRTANIOWA GARDŁA |
| 453. | VINORELBINUM | D10.9 | GARDŁO, NIEOKREŚLONE |
| 454. | VINORELBINUM | D11 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE DUŻYCH GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH |
| 455. | VINORELBINUM | D11.0 | ŚLINIANKA PRZYUSZNA |
| 456. | VINORELBINUM | D11.7 | INNE DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE |
| 457. | VINORELBINUM | D11.9 | DUŻE GRUCZOŁY ŚLINOWE, NIEOKREŚLONE |
| 458. | VINORELBINUM | D12 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE OKRĘŻNICY, ODBYTNICY, ODBYTU I KANAŁU ODBYTU |
| 459. | VINORELBINUM | D12.0 | JELITO ŚLEPE |
| 460. | VINORELBINUM | D12.1 | WYROSTEK ROBACZKOWY |
| 461. | VINORELBINUM | D12.2 | OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA |
| 462. | VINORELBINUM | D12.3 | OKRĘŻNICA POPRZECZNA |
| 463. | VINORELBINUM | D12.4 | OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA |
| 464. | VINORELBINUM | D12.5 | OKRĘŻNICA ESOWATA |
| 465. | VINORELBINUM | D12.6 | OKRĘŻNICA, NIEOKREŚLONA |
| 466. | VINORELBINUM | D12.7 | ZGIĘCIE ESICZO-ODBYTNICZE |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 467. | VINORELBINUM | D12.8 | ODBYTNICA |
| 468. | VINORELBINUM | D12.9 | ODBYT I KANAŁ ODBYTU |
| 469. | VINORELBINUM | D13 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE INNYCH I NIEDOKŁADNIEOKREŚLONYCH CZĘŚCI UKŁADU TRAWIENNEGO |
| 470. | VINORELBINUM | D13.0 | PRZĘLYK |
| 471. | VINORELBINUM | D13.1 | ŻOŁĄDEK |
| 472. | VINORELBINUM | D13.2 | DWUNASTNICA |
| 473. | VINORELBINUM | D13.3 | INNE I NIEOKREŚLONE CZĘŚCI JELITA CIENKIEGO |
| 474. | VINORELBINUM | D13.4 | WĄTROBA |
| 475. | VINORELBINUM | D13.5 | DROGI ŻÓŁCIOWE ZEWNĄTRZWĄTROBOWE |
| 476. | VINORELBINUM | D13.6 | TRZUSTKA |
| 477. | VINORELBINUM | D13.7 | WYSPY TRZUSTKI |
| 478. | VINORELBINUM | D13.9 | NIEDOKŁADNIEOKREŚLONE CZĘŚCI UKŁADU POKARMOWEGO |
| 479. | VINORELBINUM | D14 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE UCHA ŚRODKOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 480. | VINORELBINUM | D14.0 | UCHO ŚRODKOWE, JAMA NOSOWA I ZATOKI PRZYNOSOWE |
| 481. | VINORELBINUM | D14.1 | KRTAŃ |
| 482. | VINORELBINUM | D14.2 | TCHAWICA |
| 483. | VINORELBINUM | D14.3 | OSKRZELA I PŁUCA |
| 484. | VINORELBINUM | D14.4 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONE |
| 485. | VINORELBINUM | D15 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY INNYCH I NIEOKREŚLONYCH NARZĄDÓW KLATKI PIERSIOWEJ |
| 486. | VINORELBINUM | D15.0 | GRASICA |
| 487. | VINORELBINUM | D15.1 | SERCE |
| 488. | VINORELBINUM | D15.2 | SRÓDPIERSIE |
| 489. | VINORELBINUM | D15.7 | INNE OKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 490. | VINORELBINUM | D15.9 | NIEOKREŚLONE NARZĄDY KLATKI PIERSIOWEJ |
| 491. | VINORELBINUM | D16 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE KOŚCI I CHRZĄSTEK STAWOWYCH |
| 492. | VINORELBINUM | D16.0 | ŁOPATKA I KOŚCI DŁGIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 493. | VINORELBINUM | D16.1 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ |
| 494. | VINORELBINUM | D16.2 | KOŚCI DŁUGIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 495. | VINORELBINUM | D16.3 | KOŚCI KRÓTKIE KOŃCZYNY DOLNEJ |
| 496. | VINORELBINUM | D16.4 | KOŚCI CZASZKI I TWARZY |
| 497. | VINORELBINUM | D16.5 | ŻUCHWA |
| 498. | VINORELBINUM | D16.6 | KRĘGOSŁUP |
| 499. | VINORELBINUM | D16.7 | ŻEBRA, MOSTEK I OBOJCZYK |
| 500. | VINORELBINUM | D16.8 | KOŚCI MIEDNICY, KOŚĆ KRZYŻOWA I GUZICZNA |
| 501. | VINORELBINUM | D16.9 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE, NIEOKREŚLONE |
| 502. | VINORELBINUM | D18 | NACZYNIANKI KRWIONOŚNE I NACZYNIANKI CHŁONNE JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 503. | VINORELBINUM | D18.0 | NACZYNIANK KRWIONOŚNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 504. | VINORELBINUM | D18.1 | NACZYNIANK CHŁONNY JAKIEGOKOLWIEK UMIEJSCOWIENIA |
| 505. | VINORELBINUM | D20 | NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANEK MIĘKKICH OTRZEWNEJ I PRZESTRZENI ZAOTRZEWNOEJ |
| 506. | VINORELBINUM | D20.0 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 507. | VINORELBINUM | D20.1 | OTRZEWNA |
| 508. | VINORELBINUM | D21 | INNE NOWOTWORY NIEZŁOŚLIWE TKANKI ŁĄCZNEJ I INNYCH TKANEK MIĘKKICH |
| 509. | VINORELBINUM | D21.0 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE GŁOWY TWARZY I SZYI |
| 510. | VINORELBINUM | D21.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY GÓRNEJ, ŁĄCZNIE Z BARKIEM |
| 511. | VINORELBINUM | D21.2 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KOŃCZYNY DOLNEJ, ŁĄCZNIE Z BIODREM |
| 512. | VINORELBINUM | D21.3 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE KLATKI PIERSIOWEJ |
| 513. | VINORELBINUM | D21.4 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE BRZUCHA |
| 514. | VINORELBINUM | D21.5 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE MIEDNICY |
| 515. | VINORELBINUM | D21.6 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE TUŁOWIA, NIEOKREŚLONE |
| 516. | VINORELBINUM | D21.9 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE, NIEOKREŚLONE |
| 517. | VINORELBINUM | D27 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR JAJNIKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 518. | VINORELBINUM | D28 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 519. | VINORELBINUM | D28.0 | SROM |
| 520. | VINORELBINUM | D28.1 | POCHWA |
| 521. | VINORELBINUM | D28.2 | JAJOWODY I WIĘZADŁA |
| 522. | VINORELBINUM | D28.7 | INNE OKREŚLONE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 523. | VINORELBINUM | D28.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 524. | VINORELBINUM | D29 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 525. | VINORELBINUM | D29.0 | PRĄCIE |
| 526. | VINORELBINUM | D29.1 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 527. | VINORELBINUM | D29.2 | JĄDRO |
| 528. | VINORELBINUM | D29.3 | NAJĄDRZE |
| 529. | VINORELBINUM | D29.4 | MOSZNA |
| 530. | VINORELBINUM | D29.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 531. | VINORELBINUM | D29.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 532. | VINORELBINUM | D30 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 533. | VINORELBINUM | D30.0 | NERKA |
| 534. | VINORELBINUM | D30.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 535. | VINORELBINUM | D30.2 | MOCZOWÓD |
| 536. | VINORELBINUM | D30.3 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 537. | VINORELBINUM | D30.4 | CEWKA MOCZOWA |
| 538. | VINORELBINUM | D30.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 539. | VINORELBINUM | D30.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 540. | VINORELBINUM | D31 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR OKA |
| 541. | VINORELBINUM | D31.0 | SPOJÓWKA |
| 542. | VINORELBINUM | D31.1 | ROGÓWKA |
| 543. | VINORELBINUM | D31.2 | SIATKÓWKA |
| 544. | VINORELBINUM | D31.3 | NACZYNIÓWKA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|---|
| 545. | VINORELBINUM | D31.4 | CIAŁO RZĘSKOWE |
| 546. | VINORELBINUM | D31.5 | GRUCZOŁY I DROGI ŁZOWE |
| 547. | VINORELBINUM | D31.6 | OCZODÓŁ, NIEOKREŚLONY |
| 548. | VINORELBINUM | D31.9 | OKO, NIEOKREŚLONE |
| 549. | VINORELBINUM | D32 | NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY OPON MÓZGOWYCH |
| 550. | VINORELBINUM | D32.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 551. | VINORELBINUM | D32.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 552. | VINORELBINUM | D32.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 553. | VINORELBINUM | D33 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR MÓZGU I INNYCH CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 554. | VINORELBINUM | D33.0 | MÓZG, NADNAMBIOTOWE |
| 555. | VINORELBINUM | D33.1 | MÓZG, PODNAMBIOTOWE |
| 556. | VINORELBINUM | D33.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |
| 557. | VINORELBINUM | D33.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 558. | VINORELBINUM | D33.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 559. | VINORELBINUM | D33.7 | INNE OKREŚLONE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 560. | VINORELBINUM | D33.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONY |
| 561. | VINORELBINUM | D34 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR TARCZYCY |
| 562. | VINORELBINUM | D35 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR INNYCH I NIEOKREŚLONYCH GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 563. | VINORELBINUM | D35.0 | NADNERCZA |
| 564. | VINORELBINUM | D35.1 | PRZYTARCZYCE |
| 565. | VINORELBINUM | D35.2 | PRZYSADKA |
| 566. | VINORELBINUM | D35.3 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 567. | VINORELBINUM | D35.4 | SZYSZYNKI |
| 568. | VINORELBINUM | D35.5 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 569. | VINORELBINUM | D35.6 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 570. | VINORELBINUM | D35.7 | INNE OKREŚLONE GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 571. | VINORELBINUM | D35.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 572. | VINORELBINUM | D35.9 | GRUCZOŁ WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONY |
| 573. | VINORELBINUM | D36 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR O INNYM I NIEOKREŚLONYM UMIEJSCOWIENIU |
| 574. | VINORELBINUM | D36.0 | WĘZŁY CHŁONNE |
| 575. | VINORELBINUM | D36.1 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 576. | VINORELBINUM | D36.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 577. | VINORELBINUM | D36.9 | NIEZŁOŚLIWY NOWOTWÓR, NIEOKREŚLONEGO UMIEJSCOWIENIA |
| 578. | VINORELBINUM | D37 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE JAMY USTNEJ I NARZĄDÓW TRAWIENNYCH |
| 579. | VINORELBINUM | D37.0 | WARGA, JAMA USTNA I GARDŁO |
| 580. | VINORELBINUM | D37.1 | ŻOŁĄDEK |
| 581. | VINORELBINUM | D37.2 | JELITO CIENKIE |
| 582. | VINORELBINUM | D37.3 | JELIO ŚLEPE |
| 583. | VINORELBINUM | D37.4 | OKRĘŻNICA |
| 584. | VINORELBINUM | D37.5 | ODBYTNICA |
| 585. | VINORELBINUM | D37.6 | WĄTROBA, PĘCZERZYK ŻÓLCIOWY I DROGI ŻÓLCIOWE |
| 586. | VINORELBINUM | D37.7 | INNE NARZĄDY TRAWIENNE |
| 587. | VINORELBINUM | D37.9 | NARZĄDY TRAWIENNE, NIEOKREŚLONE |
| 588. | VINORELBINUM | D38 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UCHA ŚRODKOWEGO, NARZĄDÓW UKŁADU ODDECHOWEGO I KLATKI PIERSIOWEJ |
| 589. | VINORELBINUM | D38.0 | KRTAŃ |
| 590. | VINORELBINUM | D38.1 | TCHAWICA, OSKRZELA I PŁUCA |
| 591. | VINORELBINUM | D38.2 | OPLUCNA |
| 592. | VINORELBINUM | D38.3 | SRÓDPIERSIE |
| 593. | VINORELBINUM | D38.4 | GRASICA |
| 594. | VINORELBINUM | D38.5 | INNE NARZĄDY UKŁADU ODDECHOWEGO |
| 595. | VINORELBINUM | D38.6 | UKŁAD ODDECHOWY, NIEOKREŚLONY |
| 596. | VINORELBINUM | D39 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE ŻEŃSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|--|
| 597. | VINORELBINUM | D39.0 | MACICA |
| 598. | VINORELBINUM | D39.1 | JAJNIK |
| 599. | VINORELBINUM | D39.2 | ŁOŻYSKO |
| 600. | VINORELBINUM | D39.7 | INNE ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 601. | VINORELBINUM | D39.9 | ŻEŃSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 602. | VINORELBINUM | D40 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE MĘSKICH NARZĄDÓW PŁCIOWYCH |
| 603. | VINORELBINUM | D40.0 | GRUCZOŁ KROKOWY |
| 604. | VINORELBINUM | D40.1 | JĄDRO |
| 605. | VINORELBINUM | D40.7 | INNE MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE |
| 606. | VINORELBINUM | D40.9 | MĘSKIE NARZĄDY PŁCIOWE, NIEOKREŚLONE |
| 607. | VINORELBINUM | D41 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE NARZĄDÓW MOCZOWYCH |
| 608. | VINORELBINUM | D41.0 | NERKA |
| 609. | VINORELBINUM | D41.1 | MIEDNICZKA NERKOWA |
| 610. | VINORELBINUM | D41.2 | MOCZOWÓD |
| 611. | VINORELBINUM | D41.3 | CEWKA MOCZOWA |
| 612. | VINORELBINUM | D41.4 | PĘCZERZ MOCZOWY |
| 613. | VINORELBINUM | D41.7 | INNE NARZĄDY MOCZOWE |
| 614. | VINORELBINUM | D41.9 | NARZĄDY MOCZOWE, NIEOKREŚLONE |
| 615. | VINORELBINUM | D42 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE OPON |
| 616. | VINORELBINUM | D42.0 | OPONY MÓZGOWE |
| 617. | VINORELBINUM | D42.1 | OPONY RDZENIOWE |
| 618. | VINORELBINUM | D42.9 | OPONY, NIEOKREŚLONE |
| 619. | VINORELBINUM | D43 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 620. | VINORELBINUM | D43.0 | MÓZG, NADNAMIOTOWE |
| 621. | VINORELBINUM | D43.1 | MÓZG, PODNAMIOTOWE |
| 622. | VINORELBINUM | D43.2 | MÓZG, NIEOKREŚLONY |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|------|---|------------|---|
| 623. | VINORELBINUM | D43.3 | NERWY CZASZKOWE |
| 624. | VINORELBINUM | D43.4 | RDZEŃ KRĘGOWY |
| 625. | VINORELBINUM | D43.7 | INNE CZĘŚCI CENTRALNEGO SYSTEMU NERWOWEGO |
| 626. | VINORELBINUM | D43.9 | CENTRALNY SYSTEM NERWOWY, NIEOKREŚLONE |
| 627. | VINORELBINUM | D44 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 628. | VINORELBINUM | D44.0 | TARCZYCA |
| 629. | VINORELBINUM | D44.1 | NADNERCZA |
| 630. | VINORELBINUM | D44.2 | PRZYTARCZYCE |
| 631. | VINORELBINUM | D44.3 | PRZYSADKA |
| 632. | VINORELBINUM | D44.4 | PRZEWÓD NOSOWO-GARDŁOWY |
| 633. | VINORELBINUM | D44.5 | SZYSZYNKA |
| 634. | VINORELBINUM | D44.6 | KŁĘBEK SZYJNY |
| 635. | VINORELBINUM | D44.7 | CIAŁA PRZYAORTOWE I INNE CIAŁA PRYZWOJOWE |
| 636. | VINORELBINUM | D44.8 | ZAJĘCIE SZEREGU GRUCZOŁÓW WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO |
| 637. | VINORELBINUM | D44.9 | GRUCZOŁY WYDZIELANIA WEWNĘTRZNEGO, NIEOKREŚLONE |
| 638. | VINORELBINUM | D47.3 | SAMOISTNA TROMBOCYTOPENIA (KRWOTOCZNA) |
| 639. | VINORELBINUM | D47.7 | INNE OKREŚLONE NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH |
| 640. | VINORELBINUM | D47.9 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE UKŁADU LIMFATYCZNEGO, KRWIOTWÓRCZEGO I TKANEK POKREWNYCH , NIEOKREŚLONE |
| 641. | VINORELBINUM | D48 | NOWOTWORY O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE INNYCH I NIEOKREŚLONYCH UMIEJSCOWIEŃ |
| 642. | VINORELBINUM | D48.0 | KOŚCI I CHRZĄSTKI STAWOWE |
| 643. | VINORELBINUM | D48.1 | TKANKA ŁĄCZNA I INNE TKANKI MIĘKKIE |
| 644. | VINORELBINUM | D48.2 | NERWY OBWODOWE I AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY |
| 645. | VINORELBINUM | D48.3 | PRZESTRZEŃ ZAOTRZEWNOWA |
| 646. | VINORELBINUM | D48.4 | OTRZEWNA |

| Lp | NAZWA SUBSTANCJI CZYNNEJ ORAZ, JEŻELI DOTYCZY- DROGA PODANIA | KOD ICD-10 | NAZWA ICD-10 |
|-----------|---|-------------------|--|
| 647. | VINORELBINUM | D48.5 | SKÓRA |
| 648. | VINORELBINUM | D48.6 | SUTEK |
| 649. | VINORELBINUM | D48.7 | INNE OKREŚLONE UMIEJSCOWIENIE |
| 650. | VINORELBINUM | D48.9 | NOWOTWÓR O NIEPEWNYM LUB NIEZNANYM CHARAKTERZE, NIEOKREŚLONY |
| 651. | VINORELBINUM | D76.0 | HISTIOCYTOZA Z KOMÓREK LANGERHANSA NIESKLASYFIKOWANA GDZIE INDZIEJ |
| 652. | VINORELBINUM | D76.1 | LYMFOHISTIOCYTOZA Z ERYTROFAGOCYTOZĄ |