

**PROJEKT zmian na listach refundacyjnych od 1 lipca 2012 r.**  
**Opracowany na podstawie PROJEKTU obwieszczenia Ministra Zdrowia z dn. 20.06.2012 r.**

**UWAGA:** W poniższym wykazie zmian, w nawiasie (przy wielkości opakowania), umieszczony został kod EAN danej pozycji. Prosimy, aby państwo zwrócili na to uwagę - szczególnie przy pozycjach wykazanych jako usunięte z list. Zdarza się, że z list leków usunięte zostają określone pozycje, a inne o tej samej nazwie, posiadające inny kod EAN (najczęściej również inne opakowanie), pozostają na listach refundacyjnych.

| Pozycje <b>dopisane</b> do list refundacyjnych |  |             | Pozycje <b>dopisane</b> do list refundacyjnych |  |            | cd.       |
|--|--|-------------|--|--|------------|-----------|
| Odp.   | Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)  | Wskazanie   | Odp.   | Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)  | Wskazanie  | Wskazanie |
| 50%  | Aglan 15 tabl.15mg (10 tabl. 5909990224876, 20 tabl. 5909990224883, 30 tabl. 5909990610006)              | wzw         | 0%   | PermaFoam rozm.10x10cm (1 szt. 4049500587495)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Akineton tabl.2mg (50 tabl. 5909990503834)   | Ch.Parkins  | 30%  | PermaFoam rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586351)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Alarmed tabl.powl.10mg (30 tabl.w blis(3x10) 5909990910793)  | wzw         | 0%   | PermaFoam rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586351)  | Owrzodzen. |           |
| R  | Amaryl 4 tabl.4mg (30 tabl. 5909997076775)   | Cukrzyca    | 30%  | PermaFoam rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587501)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Aquacel AG płytki z włók. z dod.srebra rozm.20x30cm (1 szt. 768455106738)                                | Owrzodzen.  | 0%   | PermaFoam rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587501)  | Owrzodzen. |           |
| 0%   | Aquacel AG płytki z włók. z dod.srebra rozm.20x30cm (1 szt. 768455106738)                                | Owrzodzen.  | 30%  | PermaFoam rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587518)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Astmodil tabl.do zucia 4mg (28 tabs. 5909990881758)  | Ast.osk-pl  | 0%   | PermaFoam rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587518)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Astmodil tabl.do zucia 5mg (28 tabs. 5909990881772)  | Ast.osk-pl  | 30%  | PermaFoam rozm.18x18cm (1 szt. 4049500586368)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Atrauman Ag rozm. 5x5cm (1 szt. 4049500586412)   | Owrzodzen.  | 0%   | PermaFoam sacral rozm.18x18cm (1 szt. 4049500586368)   | Owrzodzen. |           |
| 0%   | Atrauman Ag rozm. 5x5cm (1 szt. 4049500586412)   | Owrzodzen.  | 30%  | PermaFoam sacral rozm.22x22cm (1 szt. 4049500586375)   | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Atrauman Ag rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586429)  | Owrzodzen.  | 0%   | PermaFoam sacral rozm.22x22cm (1 szt. 4049500586375)   | Owrzodzen. |           |
| 0%   | Atrauman Ag rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586429)  | Owrzodzen.  | R  | Pollinex Tree zaw. do inj. (1 zest. 1 fiol.1,5ml 5909990687428, 1 zest. 3 fiol. 1ml 5909990687411) | wzw        |           |
| 30%  | Atrauman Ag rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586436)  | Owrzodzen.  | R  | Pollinex+Rye zaw. do inj. (1 zest. 1 fiol.1,5ml 5909990684823, 1 zest. 3 fiol. 1ml 5909990684816)  | wzw        |           |
| 0%   | Atrauman Ag rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586436)  | Owrzodzen.  | R  | Ramipril Pfizer tabl. 5mg (28 tabl. 5909990796601)   | wzw        |           |
| 50%  | Bactrazol gr.sp.zaw.100mg/2ml (1 but.20 ml 5909990073559)  | wzw         | R  | Ramipril Pfizer tabl.10mg (28 tabl. 5909990796649)   | wzw        |           |
| 50%  | Bactrazol gr.sp.zaw.200mg/5ml (1 but.20 ml 5909990073566)  | wzw         | 30%  | Ranacand tabl. 8mg (28 tabl. 5909990801367)  | wzw        |           |
| 30%  | BTM Supercheck 1 test paskowy (50 szt. 4719932588185)  | Cukrzyca    | 30%  | Ranacand tabl.16mg (28 tabl. 5909990801350)  | wzw        |           |
| R  | BTM Supercheck 1 test paskowy (50 szt. 4719932588185)  | Cukrzyca    | R  | Sandostatin LAR s.s.do wstrz.0.03g (1 zest. 5909990459513)   | Akromegal. |           |
| R  | Cezarius rozt.doust.100mg/ml (300 ml 5909990928149)  | Padacz.opo  | 30%  | Simorion tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990793853)   | wzw        |           |
| R  | Cezarius tabl.powl.1000mg (50 tabl. 5909990928248)   | Padacz.opo  | 30%  | Simvastatin 40 mg tabl.powl.40mg (28 tabl. 5909990037575)  | wzw        |           |
| R  | Cezarius tabl.powl.250mg (50 tabl. 5909990928200)  | Padacz.opo  | 30%  | Simvastatin Pfizer tabl.powl.10mg (28 tabl. 5909990810871)   | wzw        |           |
| R  | Cezarius tabl.powl.500mg (50 tabl. 5909990928224)  | Padacz.opo  | 30%  | Simvastatin Pfizer tabl.powl.20mg (28 tabl. 5909990810895)   | wzw        |           |
| R  | Cezarius tabl.powl.750mg (50 tabl. 5909990928231)  | Padacz.opo  | 30%  | Simvastatin Pfizer tabl.powl.40mg (28 tabl. 5909990810949)   | wzw        |           |
| 30%  | Co-Bespres tabl.powl.80+12,5mg (28 tabl.w blis(2x14) 5909990740833)                                      | wzw         | R  | Solu-Medrol pr.wstrz. 500mg (1 fiol.s.s.+rozp. 5909990236718)                                      | Stw.rozsia |           |
| 30%  | Cukrotest Teva test paskowy (50 pasków 5907581253625)  | Cukrzyca    | R  | Solu-Medrol pr.wstrz.1000mg (1 fiol.s.s.+rozp. 5909990236817)                                      | Stw.rozsia |           |
| R  | Cukrotest Teva test paskowy (50 pasków 5907581253625)  | Cukrzyca    | 30%  | Sorbalgon rozm.10x20cm (1 szt. 4049500217927)  | Owrzodzen. |           |
| R  | Diaprel MR tabl.mod.uw.60mg (30 tabl. 5909990774746)   | Cukrzyca    | 0%   | Sorbalgon rozm.10x20cm (1 szt. 4049500217927)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Donecetil tabl.rozp.ust. 5mg (30 tabl. 590999090851478)  | Ch.Alzhei.  | 30%  | Sortabax HCT tabl.powl.100mg+25mg(28 tabl. 5909990806201)  | wzw        |           |
| 30%  | Donecetil tabl.rozp.ust.10mg (30 tabl. 5909990851492)  | Ch.Alzhei.  | 0%   | Sortabax HCT tabl.powl.50mg+12,5m(28 tabl. 5909990806195)  | wzw        |           |
| R  | Dotiteva kr.ocz.0.0g+5mg/1ml (5ml (1 but.) 5909990799343)  | Jaskra      | 30%  | Symex tabl.powl.25mg (30 tabl. 590999083090)   | Nowotwory  |           |
| 30%  | Finamox tabl. 5mg (30 tabl. 5909990794430)   | Waskra      | 30%  | Taflotan kr.ocz.0,015mg/1ml (3 saszetki po 10 poj 5909990675944)                                   | Jaskra     |           |
| 50%  | Fluconazole Polfarmex tabl.100mg (28 tabl. 5909990780181)  | wzw+wsk80   | 30%  | TenderWet Active Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500021746)  | Owrzodzen. |           |
| 30%  | Glucocard Vital Test Strip test paskowy (50 pasków 5028939000101)  | Cukrzyca    | 0%   | TenderWet Active Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500021746)  | Owrzodzen. |           |
| R  | Glucocard Vital Test Strip test paskowy (50 pasków 5028939000101)  | Cukrzyca    | 30%  | Tezeo tabl.40mg (28 tabl. 5909990818082)   | wzw        |           |
| 50%  | Helicid 20 kaps.20mg (28 kaps. 5909997014555)  | wzw         | 30%  | Tezeo tabl.80mg (28 tabl. 5909990818150)   | wzw        |           |
| 50%  | Helicid Forte kaps.doj.tw.40mg (28 kaps. 5909990921324)  | wzw         | 30%  | Tolura tabl. 0,04g (28 tabl. 5909997077604)  | wzw        |           |
| 30%  | HydroTac Comfort rozm.12,5x12,5cm (1 szt. 4049500736534)   | Owrzodzen.  | 30%  | Tolura tabl. 0,08g (28 tabl. 5909997077673)  | wzw        |           |
| 0%   | HydroTac Comfort rozm.12,5x12,5cm (1 szt. 4049500736534)   | Owrzodzen.  | 0%   | Trozebax tabl.powl.2,5mg (30 tabl. 5909990924585)  | Nowotwory  |           |
| 30%  | HydroTac rozm.10x10cm (1 szt. 4049500737043)   | Owrzodzen.  | 30%  | Valsotens HCT tabl.powl.160+12,5mg(28 tabl. powl. 5909990877386)                                   | wzw        |           |
| 0%   | HydroTac rozm.10x10cm (1 szt. 4049500737043)   | Owrzodzen.  | 30%  | Valsotens HCT tabl.powl.160+25mg (28 tabl. powl. 5909990877201)                                    | wzw        |           |
| 30%  | Indapamide SR Arrow tabl.prz.uw.1,5mg (30 tabl. 5909990223077)   | wzw         | R  | Vermox tabl.100mg (6 tabl. 5909997012339)  | wzw        |           |
| 30%  | Indipam SR tabl.prz.uw.1,5mg (30 tabl. 5909990702534)  | wzw         | R  | Vetira rozt.doust.100mg/ml (300 ml 5909990935901)  | Padacz.opo |           |
| 30%  | Lantus roz.do wstrz.100j/ml(5 wkl.(a 3ml) 5909990617555, 5 wkl.(a 3ml) 5909990895717)                    | Cukrzyca    | R  | Vetira tabl.powl.1000mg (50 tabletek 5909990936250)  | Padacz.opo |           |
| 30%  | Levemir Penfill roz.do wstrz. (5 wkl.(3 ml) 5909990005741)   | Cukrzyca    | R  | Vetira tabl.powl.250mg (50 tabletek 5909990935956)   | Padacz.opo |           |
| 30%  | Loreblok tabl.powl.50mg (28 tabl. 59099909770601)  | wzw         | R  | Vetira tabl.powl.500mg (50 tabletek 5909990936052)   | Padacz.opo |           |
| 30%  | Losacor HCT tabl.powl.50mg+12,5 (28 tabl. 5909990729685)   | wzw         | R  | Vetira tabl.powl.750mg (50 tabletek 5909990936151)   | Padacz.opo |           |
| 30%  | Losartan Pfizer tabl.powl.50mg (30 tabl. 5909990809790)  | wzw         | 50%  | Zinnat tabl.powl.250mg (10 tabl. 5909997198606)  | wzw        |           |
| R  | Megastiril zaw.doust.40mg/ml (240 ml 5909990895977)  | Nowotwory   | 50%  | Zinnat tabl.powl.500mg (10 tabl. 5909997198378)  | wzw        |           |
| 50%  | Meloxicam Arrow 15 mg tabl.15.g (20 tabl. 5909990042401, 30 tabl. 5909990042425, 10 tabl. 5909990637034) | wzw         |  |  |            |           |
| R  | Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,2 ml 5909990791309)  | wzw         |  |  |            |           |
| R  | Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,3 ml 5909990791361)  | wzw         |  |  |            |           |
| R  | Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,4 ml 5909990791446)  | wzw         |  |  |            |           |
| R  | Metex rozt.inj.50mg/ml (1 amp.-strz.a 0,5 ml 5909990791491)  | wzw         |  |  |            |           |
| R  | Milupa PKU 3 tempora proszek (450g 4008976599661, 450g 4008976340294)                                    | Fenyloket.  |  |  |            |           |
| 30%  | Nivenol tabl.powl.75mg (28 tabl.w blis(2x14) 5909990764280)  | Miażdżycyca |  |  |            |           |
| 30%  | Nutramigen 1 LGG proszek do sp.roztw.(1 op.400g 5909990586851, 1 op.400g 8712045027530)                  | Ze.Wr.Def.  |  |  |            |           |
| 30%  | Nutramigen 2 LGG proszek do sp.roztw.(1 op.400g 5909990586837, 1 op.400g 8712045027547)                  | Ze.Wr.Def.  |  |  |            |           |
| R  | Nutramigen AA proszek (400g 5909990799909, 400g 8712045027554)   | Ze.Wr.Def.  |  |  |            |           |
| 30%  | Orilukast tabl.10mg (28 tabl. 5909990832934)   | Ast.osk-pl  |  |  |            |           |
| 30%  | Orilukast tabl.do zucia 4mg (28 tabl. 5909990893188)   | Ast.osk-pl  |  |  |            |           |
| 30%  | Orilukast tabl.do zucia 5mg (28 tabl. 5909990893263)   | Ast.osk-pl  |  |  |            |           |
| 30%  | Oriven kaps.tw.prz.uw.37,5m(98 kaps. 5909990795819)  | Ch. psych.  |  |  |            |           |
| 50%  | Pantoprazole Arrow tabl.doj.20mg (28 tabl. 5909990866793)  | wzw         |  |  |            |           |
| 50%  | Pantoprazole Arrow tabl.doj.40mg (28 tabl. 5909990867066)  | wzw         |  |  |            |           |
| R  | Pentasa gran.prz.uw.1g (50 sasz. 5909990855315)  | Crohn.zap.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586399)   | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 0%   | PermaFoam Cavity rozm.10x10cm (1 szt. 4049500586399)   | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam Comfort rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586344)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 0%   | PermaFoam Comfort rozm.10x20cm (1 szt. 4049500586344)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam Comfort rozm.11x11cm (1 szt. 4049500587525)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 0%   | PermaFoam Comfort rozm.11x11cm (1 szt. 4049500587525)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam Comfort rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587532)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 0%   | PermaFoam Comfort rozm.15x15cm (1 szt. 4049500587532)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam Comfort rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587549)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 0%   | PermaFoam Comfort rozm.20x20cm (1 szt. 4049500587549)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam Concave rozm.16,5x18cm (1 szt. 4049500586382)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 0%   | PermaFoam Concave rozm.16,5x18cm (1 szt. 4049500586382)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |
| 30%  | PermaFoam rozm.10x10cm (1 szt. 4049500587495)  | Owrzodzen.  |  |  |            |           |

| Pozycje <b>usunięte</b> z list refundacyjnych |   |                  |
|---|---|------------------|
| Odp.  | Nazwa, postać i dawka (opakowanie, kod EAN)           | Wskazanie        |
| R   | Clexane roz. wst.100mg/1ml (1 fiol.3ml 5909990456116) |                  |
| R   | Dironat tabl.10mg (28 tabl. 5909990466511)            |                  |
| R   | Epilania tabl.powl.100mg (28 tabl. 5909990695775)     | Padacz.opo+wsk25 |
| R   | Epilania tabl.powl.200mg (28 tabl. 5909990696932)     | Padacz.opo+wsk25 |
| R   | Epilania tabl.powl.25mg (28 tabl. 5909990695669)      | Padacz.opo+wsk25 |
| R   | Epilania tabl.powl.50mg (28 tabl. 5909990695690)      | Padacz.opo+wsk25 |
| R   | Lisonid 10 tabl.powl. 10mg (28 tabl. 5909990431021)   |                  |
| R   | Lisonid 20 tabl.powl. 20mg (28 tabl. 5909990431076)   |                  |
| R   | Ranigast tabl.powl. 150mg (30 tabl. 5909990206735)    |                  |

**Uwaga:**  
**Treść projektu może różnić się od właściwego obwieszczenia.**

**OBJAŚNIENIE OZNACZEŃ WSKAZAŃ DO PROJEKTU ZMIAN**

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>wzw</b>         | <b>Wszystkie zarejestrowane wskazania na dzień wydania decyzji</b>   |
| <b>Akromegal.</b>  | Akromegalia  |
| <b>Ast.osk-pł</b>  | Astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc, eozynofilowe zapalenie oskrzeli  |
| <b>C.p.POChP</b>   | Ciężka postać POChP z udokumentowanym badaniem spirometrycznym z wartością wskaźnika FEV1<50% oraz ujemną próbą rozkurczową  |
| <b>Ch.psych.</b>   | Choroby psychiczne lub upośledzenia umysłowe   |
| <b>Ch.Alzhei.</b>  | Choroba Alzheimera   |
| <b>Ch.Crohna</b>   | Choroba Leśniowskiego-Crohna   |
| <b>Ch.kr.123</b>   | Miażdżyca objawowa naczyń wieńcowych leczona stentami metalowymi (do 6 tygodni od implantacji stentu) lub stentami antyrestenotycznymi uwalniającymi leki (do 12 miesięcy od implantacji stentu) w celu zapobiegania zakrzepom, stan po zawale mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST do 12 miesięcy stosowania, Stan po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST do 30 dni stosowania |
| <b>Ch.Parkins</b>  | Choroba i zespół Parkinsona  |
| <b>Crohn.zap.</b>  | Wrzodzące zapalenie jelita grubego i choroba Leśniowskiego-Crohna  |
| <b>Cuk.typ1</b>    | Cukrzyca typu I, pozostałe typy cukrzycy wymagające co najmniej 3 wstrzyknięć insuliny na dobę oraz terapia cukrzycy za pomocą pompy insulinowej   |
| <b>Cukrzyca</b>    | Cukrzyca   |
| <b>Endometri</b>   | Endometrioza   |
| <b>Epider.bul</b>  | Epidermolysis bullosa (pęcherzowe oddzielenie naskórka)  |
| <b>Fenyloket.</b>  | Fenyloketonuria  |
| <b>Gruźlica</b>    | Gruźlica, w tym również gruźlica wielolekooporna i inne mykobakteriozy   |
| <b>H.chol.LDL</b>  | Hipercholesterolemia LDL-C powyżej 130 mg/dl utrzymująca się pomimo terapii statynami w przypadku: stanu po zawale serca lub rewaskularyzacji wieńcowej (przezskórnej lub kardiochirurgicznej), stanu po rewaskularyzacji obwodowej lub amputacji obwodowej z powodu choroby miażdżycowej, hipercholesterolemii rodzinnej  |
| <b>Jaskra</b>      | Jaskra   |
| <b>L.b.ch.now</b>  | Leczenie bólu przebijającego u dorosłych pacjentów z chorobą nowotworową, którzy w ramach leczenia przewlekłego bólu nowotworowego poddawani są opioidowej terapii podtrzymującej, a u których istnieją udokumentowane przeciwwskazania do stosowania innych krótkotrwale działających opioidów lub stwierdzono nieskuteczność tych leków  |
| <b>Miastenia</b>   | Miastenia  |
| <b>Moczówka</b>    | Moczówka prosta przysadkowa  |
| <b>Mukowisc.</b>   | Mukowiscydoza  |
| <b>Muk.Dys.rz</b>  | Mukowiscydoza, pierwotna dyskineza rzęsek  |
| <b>Muk.Res.tr</b>  | Mukowiscydoza, stan po resekcji trzustki   |
| <b>NeuZBólDys</b>  | Neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II – kaulgalgia  |
| <b>Nied.tarcz</b>  | Niedoczynność tarczycy   |
| <b>Now.Neutr.</b>  | Nowotwory złośliwe, neutropenia w chorobach nowotworowych  |
| <b>Nowotwory</b>   | Nowotwory złośliwe   |
| <b>NYHA II-IV</b>  | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA II – NYHA IV  |
| <b>NYHA III-IV</b> | Udokumentowana niewydolność serca w klasach NYHA III– NYHA IV po udokumentowanym niepowodzeniu leczenia furosemidem  |
| <b>NowNeuZBól</b>  | Nowotwory złośliwe, neuralgia popółpaścowa przewlekła, wieloobjawowy miejscowy zespół bólowy typu I – odruchowa dystrofia współczulna oraz typu II - kaulgalgia  |
| <b>Osteopor.</b>   | Osteoporoza  |
| <b>Owrzodzen.</b>  | Przewlekłe owrzodzenie   |
| <b>P.Gr.Krok.</b>  | Przerost gruczołu krokowego  |
| <b>Pad.Ch.afe</b>  | Padaczka oporna na leczenie, choroba afektywna dwubiegunowa  |
| <b>Padacz.opo</b>  | Padaczka oporna na leczenie  |
| <b>Padaczka</b>    | Padaczka   |
| <b>Prz.Ch.Now</b>  | Nowotwory złośliwe - przerzuty osteolityczne w chorobach nowotworowych   |
| <b>Reum.z.st.</b>  | Aktywna postać reumatoidalnego zapalenia stawów  |
| <b>Rpil-Ilnow</b>  | Nowotwory złośliwe, wczesny rak piersi w I rzucie hormonoterapii, rak piersi w II rzucie hormonoterapii  |
| <b>R.pi.mc.pr</b>  | Nowotwory złośliwe - rak piersi, trzonu macicy, prostaty   |
| <b>R.pi.now</b>    | Rak piersi w II rzucie hormonoterapii, nowotwory złośliwe  |
| <b>Rak pi,mac</b>  | Nowotwory złośliwe - rak piersi i trzonu macicy  |
| <b>Rak prost.</b>  | Nowotwory złośliwe - rak prostaty  |
| <b>Sch.Ch.afe</b>  | Schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa   |
| <b>Sch.op.ps</b>   | Schizofrenia w przypadku nawrotu objawów psychotycznych podczas terapii neuroleptykami w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   |
| <b>Schi.stab.</b>  | Schizofrenię u dorosłych pacjentów, u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia olanzapiną w postaci doustnej, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego   |
| <b>Schizofre.</b>  | Schizofrenia   |
| <b>St.po.prz</b>   | Stan po przeszczepie narządu unaczynionego bądź szpiku   |
| <b>Stw.rozsia</b>  | Stwardnienie rozsiane  |
| <b>Stw.zan.b.</b>  | Stwardnienie zanikowe boczne   |
| <b>Wir.cytome</b>  | Zakażenie wirusem cytomegalii u pacjentów poddawanych przeszczepom narządów mięsnych - profilaktyka po zakończeniu hospitalizacji związanej z transplantacją do 110 dni po przeszczepie  |
| <b>Wrz.zap.j.</b>  | Wrzodzące zapalenie jelita grubego   |
| <b>Zap.wym.do</b>  | Wczesne albo późne wymioty u osób dorosłych związanych z silnie emetogenną chemioterapią z zastosowaniem ciplasty w dawce >70 mg/m <sup>2</sup> - profilaktyka   |
| <b>Ze.Wr.Def.</b>  | Zespoły wrodzonych defektów metabolicznych, alergie pokarmowe i biegunki przewlekłe  |
| <b>Ze.p.nadre</b>  | Zespół pęcherza nadreaktywnego potwierdzony badaniem urodynamicznym  |
| <b>Żył.p.zak.</b>  | Żyłne powikłania zakrzepowo-zatorowe u dorosłych pacjentów po przebytej planowej alloplastyce całkowitej stawu biodrowego (do 30 dnia po przebytej alloplastyce) lub kolanowego (do 14 dnia po przebytej alloplastyce) – prewencja pierwotna   |
| <b>wsk25</b>       | Lekooporne napady padaczkowe - do 12 roku życia  |

- wsk71** Profilaktyka osteoporozy posterydowej
- wsk72** Alergia na białko mleka krowiego, objawy związane z alergią pokarmową związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, nietolerancja laktozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, wtórna nietolerancja sacharozy związana z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, inne alergie związane z nadwrażliwością na białka mleka krowiego, alergia na białko sojowe z nadwrażliwością na białka mleka krowiego
- wsk73** Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci od 6 roku życia
- wsk74** Cukrzyca typu I u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat i powyżej
- wsk75** Obniżanie podwyższonego ciśnienia śródgałkowego w leczeniu jaskry z otwartym kątem przesączania lub nadciśnienia ocznego: 1) w monoterapii u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania; 2) jako leczenie wspomagające do terapii beta-adrenolitykami u pacjentów, którzy: a) mogą odnieść korzyść ze stosowania kropli do oczu bez środka konserwującego, b) niewystarczająco reagują na leczenie pierwszego rzutu, c) nie tolerują lub nie mogą stosować leczenia pierwszego z uwagi na przeciwwskazania.
- wsk76** Stosowanie dietetyczne u niemowląt od urodzenia i dzieci z ciężką postacią alergii na białko mleka krowiego oraz nietolerancją różnego rodzaju żywności, u których zastosowanie w postępowaniu dietetycznym hydrolizatów o znacznym stopniu hydrolizy nie
- wsk77** Zaostrzenie w przebiegu stwardnienia rozsianego
- wsk78** Małopłytkowość autoimmunizacyjna oporna na leczenie; Zespół mielodysplastyczny (MDS)
- wsk79** Choroba von Willebrandta
- wsk80** Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego
- wsk81** Leczenie zapobiegawcze (pierwotne lub wtórne) u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego
- wsk82** Leczenie zapobiegawcze u pacjentów po autologicznym lub allogenicznym przeszczepie szpiku; Leczenie profilaktyczne u pacjentów z zaburzeniami odporności lub chorobami rozrostowymi układu krwiotwórczego
- wsk83** Profilaktyka zakrzepicy w przebiegu chorób mieloproliferacyjnych
- wsk84** Zapobieganie zakażeniom u pacjentów z neutropenią